Guia de Formulações

DESPARASITAÇÃO COMPLETA

medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

IVERMECTINA
FASE DE ATAQUE · DOSE ÚNICA

IN

Ivermectina 6mg

Excipiente q.s.p. ..... 1 cápsula

Modo de uso: Dose de **200 mcg/kg**: 1 cápsula para cada 30 kg de peso (até 60 kg, 2 cápsulas; até 90 kg, 3 cápsulas), em jejum, com água, no **dia 1**. Repetir a mesma dose no **dia 15**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Ivermectina

Antiparasitário que se liga aos **canais de cloreto** do sistema nervoso e muscular dos parasitas, causando **paralisia e morte**. Eficaz contra **Strongyloides**, **Ascaris** e **Enterobius** (oxiúros), além de ectoparasitas como sarna e piolho.

ALBENDAZOL
FASE DE ATAQUE · DOSE ÚNICA

IN

Albendazol 400mg

Excipiente q.s.p. ..... 1 cápsula

Modo de uso: Tomar 1 cápsula no **dia 1**, junto com a ivermectina, e repetir no **dia 15**. Para tênias e estrongiloidíase, o prescritor pode estender para 3 dias seguidos.

Albendazol

Benzimidazol de **amplo espectro** que bloqueia a formação dos **microtúbulos** do parasita, impedindo a absorção de glicose. Atua sobre **Ascaris, ancilostomídeos, Trichuris, Enterobius, tênias** e **Giardia**, e complementa o espectro da ivermectina.

Como associar: ivermectina e albendazol no **dia 1** e no **dia 15** (a segunda dose atinge os parasitas que eclodiram dos ovos). As fórmulas fitoterápicas das páginas seguintes começam no dia 1 e seguem por 30 dias.

CÁPSULAS ANTIPARASITÁRIAS

FASE 1 · ELIMINAR

IN

- **Berberina** 500mg
- **Óleo de orégano** 200mg
- **Alicina (extrato de alho)** 150mg

Modo de uso: Tomar 1 dose após o almoço e 1 dose após o jantar, por 30 dias.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Berberina

Alcaloide vegetal com **ação antiparasitária e antimicrobiana** documentada contra protozoários intestinais como a **Giardia**. Também ajuda a **reequilibrar a microbiota** e a reduzir a **inflamação intestinal**.

Óleo de Orégano

Rico em **carvacrol e timol**, compostos de **amplo espectro antiparasitário, antifúngico e antibacteriano**, que atuam sobre a membrana dos microrganismos e completam a ação da berberina.

Alicina

Principal composto ativo do **alho**, com ação **antimicrobiana e antiparasitária**. Torna o intestino um **ambiente desfavorável** a parasitas, bactérias e fungos oportunistas.

MIX DE TINTURAS ANTIPARASITÁRIAS

FASE 1 · ELIMINAR

IN

COPIE A FÓRMULA AQUI

- **Tintura de nogueira-preta** 11%
- **Tintura de absinto** 12%
- **Tintura de cravinho** 11%
- **Tintura de Berberis vulgaris** 11%
- **Tintura de orégano** 11%
- **Tintura de espinheira-santa** 11%
- **Tintura de bardana** 11%
- **Tintura de erva-doce** 11%
- **Tintura de própolis** 11%

Modo de uso: Tomar 30 gotas diluídas em meio copo de água, 1 vez ao dia pela manhã, por 30 dias.

Nogueira-preta, absinto e cravinho

O **tripé clássico** da desparasitação. A **juglona** da nogueira age sobre os parasitas adultos, os **amargos** do absinto estimulam a bile e a eliminação, e o **eugenol** do cravinho atinge **ovos e larvas**, cobrindo **todo o ciclo de vida** do parasita.

Berberis e orégano

Reforçam o espectro **antimicrobiano**. A **berberina** do Berberis atua sobre **protozoários** como a Giardia, e o **carvacrol** do orégano sobre **fungos e bactérias oportunistas**.

Espinheira-santa, bardana, erva-doce e própolis

Tornam o mix **mais bem tolerado**. A espinheira-santa **protege o estômago**, a bardana tem ação **depurativa**, a erva-doce alivia **gases e cólicas** e a própolis apoia a **imunidade** da mucosa.

PROTEÇÃO HEPÁTICA
FASE 2 · PROTEGER

IN

- **N-acetilcisteína (NAC)** 600mg
- **Silimarina** 200mg
- **L-metionina** 100mg

Modo de uso: Tomar 1 dose pela manhã, após o café, por 30 dias.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Silimarina

Flavonolignanas do **cardo-mariano** com ação **hepatoprotetora e antioxidante**, que preservam a célula hepática durante a eliminação dos parasitas e das toxinas liberadas.

NAC

Precursora da **glutationa**, o principal antioxidante do fígado. Com a **L-metionina**, sustenta as vias de **detoxificação hepática** e ainda ajuda a **romper o biofilme** que protege os microrganismos.

CONFORTO DIGESTIVO
CÓLICAS, GASES E DIGESTÃO

IN

- **Biointestil®** 300mg
- **Menta piperita** 250mg
- **Bromelina** 100mg
- **Papaína** 100mg

Modo de uso: Tomar 1 dose 15 minutos antes do almoço, por 30 dias.

Biointestil® e Menta piperita

Óleos essenciais de palmarosa e gengibre com **menta piperita**: ação **antiespasmódica e carminativa** que alivia **cólicas, gases e distensão**. As enzimas **bromelina e papaína** completam a digestão e ajudam a degradar a camada proteica que protege os parasitas.

SACHÊ REPARADOR
FASE 3 · REPARAR

IN

- **L-Glutamina** 5g
- **Saccharomyces boulardii** 250mg
- **Aloe vera 200:1** 100mg
- **Sachê sabor limão** ..... 1 un

Modo de uso: Diluir 1 sachê em 200ml de água e tomar à noite, por 60 dias (desde o início do protocolo e por mais 30 dias após o fim da fase 1).

COPIE A FÓRMULA AQUI

Saccharomyces boulardii

Levedura probiótica que não é afetada pelos fitoterápicos antimicrobianos. Compete com patógenos, tem ação documentada contra **Giardia e Blastocystis** e **reduz diarreia e desconforto** durante o tratamento.

L-Glutamina

Principal **fonte de energia dos enterócitos**. Com o **Aloe vera**, ajuda a **regenerar a mucosa** agredida pelos parasitas e a reduzir a **permeabilidade intestinal**.

As **parasitoses intestinais** podem causar **distensão abdominal**, **alterações do trânsito**, **cansaço**, **coceira** e **má absorção de nutrientes**. Com o **ataque medicamentoso** nos dias 1 e 15, o protocolo segue três fases simultâneas — **eliminar** os parasitas em todo o ciclo de vida, **proteger** o fígado e **reparar** a mucosa e a microbiota — para um resultado duradouro.

Ivermectina e albendazol exigem receita médica. Contraindicados na **gestação** e na amamentação, em crianças com menos de 15 kg (ivermectina) e em doença hepática. O protocolo todo não é indicado para pessoas com epilepsia (absinto). A berberina pode interagir com medicamentos: informe o prescritor sobre os que você usa.