



한국한의학연구원

한의학 고문헌 분석을 통해 본 병증과 경혈의 관계 1

《침구자생경》 병증을 중심으로

오준호



한의학 고문헌 분석을 통해 본 병증과 경혈의 관계 1

《침구자생경》 병증을 중심으로

오준호



일러두기

- 이 책은 한의학 고문헌을 현대 분석 기법을 통해 분석하여 그 속에 내재된 지식을 정량적이고 명시적으로 도출해 내는 작업의 한 가지 결과이다.
- 《침구자생경》을 분석 대상으로 삼아 병증과 경혈 사이의 관계를 분석하고 그 결과를 정리하여 이 책에 담았다.
- 책은 모두 2부로 구성되었다. 1부는 개론에 해당하는 부분으로, 내용 소개 및 연구방법을 담았다. 주로 기존에 발표된 선행 연구 결과를 참고하여 작성하였다.
- 2부는 각론에 해당하는 부분으로, 책의 주제인 병증과 경혈의 관계에 대해서술하였다. 2부의 목차는 《침구자생경》을 따랐으며, 내용은 설명, 그림(figure), 표(table)로 나누어 담았다.
- 이 책은 전자 출판물로서 본문 검색이 가능하므로 따로 색인을 두지 않았다.



차 례

1 내용 소개	17
1.1 《침구자생경(鍼灸資生經)》 소개	17
1.2 연구 방법	18
1.2.1 전자 텍스트 구축	18
1.2.2 전자 텍스트 구조화	21
1.2.3 분석 용어 정리	22
1.2.4 분석 및 시각화	23
2 병증의 치료	25
2.1 虛損	25
2.2 勞瘵	28
2.3 腎虛	31
2.4 消渴	33
2.5 陰痿縮	36

2.6 陰挺出	39
2.7 轉胞	41
2.8 陰莖疼	44
2.9 膀胱氣	47
2.10 陰汗	49
2.11 陰腫	52
2.12 小腹痛	55
2.13 小腹脹滿	58
2.14 瘡瘍	61
2.15 痘痕	65
2.16 淋癰	67
2.17 小便難	70
2.18 小便五色	74
2.19 治夢遺失精	77
2.20 大便不通	81
2.21 大小便不通	84
2.22 小便不禁	87
2.23 大便不禁	90
2.24 泄瀉	93
2.25 殘泄	96
2.26 潿泄	99

2.27 痢	101
2.28 便血	104
2.29 痔	107
2.30 腸風	111
2.31 腸澼	113
2.32 腸痛	116
2.33 腸鳴	118
2.34 脫肛	122
2.35 瘰亂轉筋	124
2.36 瘰亂吐瀉	128
2.37 嘘吐	131
2.38 乾嘔	136
2.39 噎	138
2.40 傷寒嘔噦	142
2.41 哮	144
2.42 胃痛	147
2.43 反胃	150
2.44 食不下	153
2.45 不能食	156
2.46 不嗜食	159
2.47 食氣	162

2.48 食多	165
2.49 瘰	167
2.50 脾疼	172
2.51 心痛	174
2.52 心恍惚	178
2.53 心驚恐	181
2.54 心喜笑	185
2.55 心氣	188
2.56 心憂悲	191
2.57 歎息	194
2.58 心煩悶	197
2.59 膽虛	200
2.60 嗜臥	203
2.61 不臥	206
2.62 夢魘	209
2.63 癲邪	211
2.64 癲狂	214
2.65 癲癇瘻癰	219
2.66 癲癇	223
2.67 癲疾	226
2.68 驚癇	230

2.69 風癟	234
2.70 風勞	237
2.71 風痙	239
2.72 風眩	242
2.73 風痺	245
2.74 中風	248
2.75 中風不語	252
2.76 偏風	255
2.77 痰涎	259
2.78 唾血	262
2.79 喘	266
2.80 肺氣	270
2.81 咳嗽	273
2.82 咳逆	276
2.83 咳逆上氣	280
2.84 少氣	284
2.85 貢豚氣	287
2.86 痰癖	290
2.87 癪癖	293
2.88 積聚	296
2.89 積氣	299

2.90 腹痛	302
2.91 腹滿	306
2.92 腹脹	309
2.93 心腹堅大	313
2.94 鼓脹	316
2.95 水腫	319
2.96 脍痛	323
2.97 膚痛	325
2.98 胸滿	328
2.99 胸脇痛	333
2.100 痞痛	337
2.101 背痛	340
2.102 肩背酸痛	344
2.103 肩痺痛	348
2.104 臂痛	351
2.105 腹痛	354
2.106 腕勞	357
2.107 肘痛	360
2.108 手麻痺不仁	363
2.109 手指攣	366
2.110 手熱	369

2.111足麻痺	372
2.112足不能行	376
2.113足寒熱	379
2.114足雜病	382
2.115脚氣	386
2.116脚弱	389
2.117脚腫	391
2.118四肢厥	393
2.119屍厥	397
2.120脚膝痛	401
2.121膝痛	404
2.122腰脚痛	407
2.123腰痛	410
2.124腰脊痛	414
2.125脊痛	418
2.126腠理	421
2.127骨疼	423
2.128耳鳴	426
2.129耳痛	429
2.130耳聾	432
2.131停耳	436

2.132目痛	438
2.133目上視	442
2.134目涙出	446
2.135目眩	449
2.136目不明	452
2.137目翳膜	456
2.138目赤	460
2.139青盲	464
2.140口眼喰	466
2.141口瘡瘍	470
2.142舌強	474
2.143口緩	477
2.144齒齶	480
2.145口舌乾苦	483
2.146口齒疳瘍	486
2.147齒噤	489
2.148牙疼	492
2.149鼻塞不利	496
2.150鼻有息肉	499
2.151鼻涕出	501
2.152鼻痛	504

2.153鼻衄	507
2.154咽喉腫痛	510
2.155喉咽鳴	514
2.156咽喉乾	517
2.157喉痺	520
2.158脣頰腫痛	524
2.159頸項強	527
2.160頭風	532
2.161頭痛	535
2.162腦痛	540
2.163頸旋	543
2.164頸腫	545
2.165項腫痛	547
2.166面腫	550
2.167面痛	553
2.168傷寒	557
2.169黃疸	560
2.170傷寒頭痛	563
2.171傷寒寒熱	566
2.172寒熱	569
2.173腹寒熱氣	573

2.174身寒痺	576
2.175自汗	579
2.176汗不出	582
2.177傷寒無汗	586
2.178發背	590
2.179癰瘤	592
2.180瘻癰	596
2.181風疹	598
2.182歷節風	601
2.183丁瘡	604
2.184癬疥瘡	606
2.185蠭毒	609
2.186犬傷	609
2.187乳癰	609
2.188乳腫痛	612
2.189婦人無子	615
2.190婦人血氣痛	618
2.191血塊	620
2.192血崩	623
2.193產後餘疾	626
2.194難產	628

2.195月事	631
2.196赤白帶	634



제 1 장

내용 소개

《침구자생경》을 분석 대상으로 삼아 병증과 경혈 사이의 관계를 분석한 결과이다.¹

1.1 《침구자생경(鍼灸資生經)》 소개

동아시아 전통의학에서 병증과 경혈의 연관성을 가늠해 보기 위해 침구 치료와 관련된 여러 텍스트 가운데 치료 정보를 풍부하게싣고 있으면서 영향력 있었던 침구서로 《침구자생경》을 선택하였다.

《침구자생경》은 동아시아 전체에서 가장 권위 있는 침구학 서적 가운데 하나였다. 이 책은 남송(南宋)의 왕집중(王執中)이 12세기 말(1180~1195년 사이)에 저술한 침구학 전문 서적으로 7권으로 구성되어 있다. 흔히 《자생경(資生經)》이라고 약칭한다. 《소문(素問)》, 《갑을경(甲乙經)》, 《천금요방(千金要方)》, 《천금익방(千金翼方)》, 《육씨집함방(陸氏集驗方)》, 《명당상하경(明堂上下經)》 등 이전 시대 침구 문헌에서 당시 민간에 산재한 임상 경험까지 꽤 넓은 내용을 정리하고 여기에 자신의 임상 경험을 추가하여

¹이하 ‘내용 소개’ 부분은 다음의 선행 연구 내용을 참고하여 작성하였다. 오준호. 고의서에 나타난 경혈과 병증의 연관성 측정 및 시각화 (침구자생경 분석 예를 중심으로). Korean Journal of Acupuncture. 2016;33(1):18~32.

이 책을 저술하였다. 후세 침구학에 끼친 영향은 실로 북송(北宋) 관찬 침구경전인 《동인도경(銅人圖經)》에 뒤지지 않는다.

권1에서는 인체 각 부분의 수혈(腧穴)에 대해 설명하였다. 기재된 수혈의 편자는 왕유일(王維一)의 《동인도경》에서 채록하였다. 권2는 왕집중 자신의 독창적인 견해가 집중된 침구논문집에 해당하였다. 권3-7은 《동인도경》, 《천금요방》, 《태평성혜방(太平聖惠方)》에 수록된 수혈 주치에 관한 내용을 병증에 따라 분류하였다.

대표적인 판본으로는 원(元) 천력(天曆) 광근서당인본(廣勤書堂印本), 명(明) 정통(正統) 광근서당신간본(廣勤書堂新刊本), 청(清) 사고전서본(四庫全書本) 등이 있으며, 현대 교점본으로 침구명저집성(鍼灸名著集成, 1997) 수록본이 있다.

1.2 연구 방법

《침구자생경》에 수록된 침구 지식을 분석하기 위해 다음과 같은 작업을 수행하였다.

1. [전자 텍스트 구축] 분석 대상을 선정하여 디지털 텍스트로 구축
2. [전자 텍스트 구조화] 디지털 텍스트를 분석에 용이한 형태로 처리
3. [분석 용어 정리] 분석을 위해 용어를 정리
4. [분석 및 시각화] 분석 기법을 선택하여 분석하고 그 결과를 시각화

1.2.1 전자 텍스트 구축

현대 교점본을 기준으로 《침구자생경》 전자 텍스트를 구축하였다. 한자로 이루어진 텍스트를 전자 텍스트로 구축하는 일은 일견 단순하게 보일 수 있다. 그러나 표의문자(表意文字)인 한자를 디지털 형태로 바꾸는 일에는 몇 가지 문제가 존재한다.

첫번째 문제는 인코딩(encoding)이다. 인코딩은 문자나 기호들을 컴퓨터가 이해할 수 있는 숫자 또는 다른 형태의 데이터로 변환하는 과정을 말한다. 컴퓨터는 0과 1로 이루-

어진 2진 데이터만을 처리할 수 있기 때문에, 인간이 사용하는 다양한 언어와 문자를 컴퓨터가 이해하고 처리할 수 있도록 변환해주는 과정이 필수적이다. 인코딩은 일종의 규약이므로 국가와 언어에 따라 여러가지가 존재한다. 대표적으로 ASCII, ISO-8859, EUC, GB2312, UTF-8 등이 있다. 여기에서는 한자를 꼭넓게 구현할 수 있고 국제적으로 많이 통용되고 있는 유니코드(UTF-8)를 기준으로 전자 텍스트를 구축하였다.

두번째 문제는 유니코드에 존재하는 한자의 다중코드 문제이다. 유니코드는 엄청난 수의 한자를 구현할 수 있는 장점을 가지고 있지만 동일한 한자에 대해 여러 코드 포인트가 존재한다. 코드 포인트(code point)는 컴퓨터가 어떤 문자를 인식하는 고유번호라고 할 수 있다. UTF-8의 경우 16진수 4자리로 이루어져 있다. 유니코드에는 한자의 모양이 같으나 코드 포인트가 다른 복수의 글자가 존재한다. 주로 두음법칙 혹은 다수의 훈음(訓音) 등 음이 2개 이상인 한자 때문에 야기된 문제이다. '更'의 경우 '갱'과 '경' 두 가지 음으로 읽히는데, 각각의 음에 따라 유니코드에도 '更(F901)'와 '更(66F4)' 두 가지 코드가 존재한다(괄호 안은 코드 포인트). 육안으로 보았을 때에는 똑같지만 컴퓨터에서는 전혀 다른 글자로 인식되기 때문에 분석 대상 텍스트에 이러한 글자들을 하나로 합치지 않으면 서로 다른 용어로 인식된다. 한자 텍스트 검색을 지원하는 DB들에서도 데이터 입출력시 다중코드자 통합이 이루어지지 않아 검색 결과가 다르게 나타나는 경우가 드물지 않다. 여기에서는 The Unicode Consortium이 제공하고 있는 매핑 데이터를 이용해 다중코드자를 전부 통합하여 사용하였다.

표 1.1: 한자의 다중코드 통합(예시)

수정_전	수정_후
豈(F900)	豈(8C48)
更(F901)	更(66F4)
車(F902)	車(8ECA)
賈(F903)	賈(8CC8)
滑(F904)	滑(6ED1)
串(F905)	串(4E32)
句(F906)	句(53E5)
龜(F907)	龜(9F9C)

마지막으로 한자 자체에는 동일한 의미를 가지는 이체자가 존재한다. 이체자는 모양은 다르지만 유사하거나 동일한 의미를 가지는 글자로서, '絕'과 '絶', '蓋'와 '蓋', '脣'과 '胸' 등이 그것이다. 일반적인 이체자 외에 대상 문헌에만 등장하는 이체자도 존재한다.

예를 들어 '溪'와 '谿', '兪'와 '臘', '頤'와 '囟' 등과 같이 전통의학 중에서도 경혈에서만 통용되는 특수한 경우도 있다. 이들을 따로 처리하지 않을 경우 '太谿'와 '太溪'는 전혀 다른 2개의 경혈을 의미하는 것이 되어 잘못된 결과를 도출하게 된다. 여기에서는 원문에 사용된 경혈 명칭들을 전수 조사하여 통일하는 방식으로 이 문제를 해결하였다.

표 1.2: 한자의 이체자 통합

이체자

隸(隸)、窓(窗)、屏(屏)、齦(齦)、絕(絕)、蓋(蓋)、豐(豐)、脇(脇)、郎(郎)、郎(郎)、面(面)、胸(腎)、舉(舉)、兩(両)、繩(繩)、雙(雙)、窮(窮)、兩(両)、脈(脉)、關(閔)、麥(麦)、清(清)、青(青)、邊(邊)、鵝(鵝)、宮(宮)、壘(垒)、強(強)、往(往)、葱(葱)、葱(葱)、檳(柂)、蟲(虫)、蟲(虫)、鹽(塩)、條(条)、蘇(蘚)、屬(属)、解(解)、鹹(鹹)、蒜(蒜)、杯(盃)、怪(恠)、賓(賓)、靈(灵)、逃(逃)、體(體)、冒(胃)、竊(窃)、實(实)、腸(腸)、寇(寇)、喻(啣)、寶(宝)、驗(驗)、纏(纏)、裏(裡)、膽(胆)、曬(晒)、異(异)、斷(断)、來(来)、亂(乱)、竝(並)、濕(湿)、鬱(鬱)、鉛(鉛)、虎(虎)、略(畧)、蟹(蟹)、微(微)、澁(澁)、飲(飲)、疎(疎)、婿(婿)、敲(敲)、涼(涼)、腳(腳)、值(值)、群(羣)、偽(偽)、鑑(鑒)、啓(啟)、嘗(尝)、飢(饑)、甜(甜美)、雞(鷄)、奇(奇)、概(槩)、顛(顛)、填(填)、爲(為)、尙(尚)、喻(喻)、兪(兪)、苟(苟)、氷(冰)、眞(眞)、廿(廿)、濕(溼)、承(乘)、慎(慎)、既(既)、即(即)、昂(昂)、產(產)、痺(痺)、鉤(鉤)、鷄(鷄)、迥(迥)、併(併)、臯(臯)、沈(沉)、巔(巔)、驅(駆)、衆(眾)、棄(廐)、抵(抵)、隣(鄰)、闕(闕)、證(証)、教(教)、晚(晚)、姪(姪)、臟(脏)、脣(脣)、奮(奮)、溉(溉)、黃(黄)、鄉(鄉)、猪(豬)、概(槩)、頤(頤)、癰(癰)、溫(溫)、沈(沉)、寶(寶)、鐵(鉄)、頤(囟)、兌(兌)、臥(卧)、兔(兔)、瘧(瘧)、躡(蹠)、釐(厘)、啞(啞)、瘳(瘳)、最(最)、麴(麴)、陷(陷)、體(体)、殮(殮)、筋(筋)、喚(喚)、脈(脈)、軟(軟)、遍(徧)、麻(麻)、宿(宿)、却(卻)、鄰(邻)、咳(咳)、虛(虛)、悅(悅)、說(說)、蓋(蓋)、瓶(瓶)、羨(羨)、殼(殼)、研(研)、并(并)、別(另)、瘻(瘻)、暗(彦)、卷(卷)、卷(券)、經(経)、瘡(瘡)、瘻(啞)、顛(顛)、豎(豎)、鍼(針)、巖(岩)、商(商)、膊(膊)、歸(帰)、髮()、秘(祕)、脛()、鼈(鼈)、蝎(蠍)、鰭(鰭)、韭(韭)、薺(薺)、匱()、齁()、喰(喰)、蟬(蟬)、駁(駁)、癱()、覘()、蠶(蠶)、蠹(蠹)、蠅(蠅)、凡(凡)、黑(黑)、喉(喉)、焰(焰)、昏(昏)、瀉(瀉)、衄(衄)、滿(滿)、點(點)、贋(贋)、瘤(瘤)、遊(遊)、嚙(嚙)、臟(臟)、煮(煮)、鵝(鵝)、兒(兒)、雁(鴈)、檀(柂)、桑(桑)、陰(陰)、隱(隱)、搖(搖)、吞(吞)、髮(髮)、蔻(蔻)、穗(穗)、深(深)、更(更)、忘(忘)、選(選)、荒(荒)、旨(旨)、處(處)、處(處)、等(等)、鄙(鄙)、潔(潔)、概(槩)、游(游)、游(遊)、幼(幼)、幼()、疎(疎)、疎(疏)、臺(臺)、哉(哉)、觀(觀)、析(析)、修(脩)、國(国)、國(国)、第(第)、虎(虎)、變(变)、變(变)、顯(顯)、顯(顯)、挽(挽)、富(富)、覺(覺)、覺(竟)、從(從)、曾(曾)、協(協)、寧()、楚(楚)、飾(飾)、𠂔(𠂔)、淄(淄)、宜(宜)、鬱(鬱)、養(養)、氣(氣)、藥(藥)、惠(惠)、藏(藏)、濟(濟)、佛(佛)、續(續)、觀(觀)、縣(県)、傳(伝)、歷(歷)、廣(廣)、錢(錢)、縱(縱)、聰(聰)、增(增)、舉(舉)、閱(閱)、營(營)、搜(搜)、歲(歲)、廢(廢)、峻(峻)、拜(拜)、怯(怯)、圖(圖)、權(權)、團(團)、戶(戶)、變(變)、擴(扩)、榮(榮)、澤(澤)、贊(贊)、獸(獸)、溪(谿)、兪(兪)、頤(囟)

1.2.2 전자 텍스트 구조화

분석에 앞서 자연어로 이루어진 텍스트를 정리하는 작업이 선행되어야 한다. 《침구자생경》의 경우 권3 - 권7 부분에 194개의 병증 별로 침구치료 내용이 실려있다. 다음은 《침구자생경》 권3의 <중풍(中風)> 치료 부분 텍스트를 분석 가능한 형태로 정리한 구조화 과정의 예시이다.

표 1.3: 기준 텍스트

Original_Text

小兒但是風病，諸般醫治不瘥，灸率谷(『明下』). 黃帝療中風，眼戴上，及不能語者，灸第二椎、第五椎上各十壯，齊下火，炷如半棗核大，立瘥。黃帝問岐伯曰：中風半身不遂，如何灸？答曰：凡人未中風一兩月前，或三五月前，非時足脛上忽酸重頑痺，良久方解。此將中風之候，急灸三里、絕骨四處三壯，後用葱、薄荷、桃柳葉煎湯淋洗，驅逐風氣于瘡口出。凡人不信此法，飲食不節，酒色過度，忽中此風，言語謇澁，半身不遂。宜七處齊下火，各三壯。風在左灸右，右灸左。百會、耳前髮際、肩井、風市、三里、絕骨、曲池七穴，神效不能具錄，依法灸無不愈。百會、曲鬢、肩髃、曲池、風市、足三里、絕骨共十三穴，灸風中臟，氣塞涎上，不語，極危者，下火立效。其狀覺心中憤亂，神思不怡，或手足麻，此將中臟之候，不問風與氣，但依次自上及下，各灸五壯，日別灸隨年壯。凡遇春秋，常灸以泄風氣。素有風人，可保無虞。此能灸暴卒，百會、風池、大椎、肩井、曲池、間使、足三里，共十二穴。范子默自壬午五月間口眼喎斜，灸聽會等三穴即正。右手足麻無力，灸百會、髮際等七穴得愈。未年八月間，氣塞涎上，不能語，金虎丹加膩粉服至四丸半。氣不通，涎不下，藥從鼻中出，魂魄飛揚，如墮江湖中，頃欲絕，灸百會、風池等左右共十二穴。

표 1.4: 구조화 데이터

No	Semi.Structured_Data	Section	Sympoms	Acupoints
01	小兒但是風病，諸般醫治不瘥，灸率谷(『明下』).	中風	小兒；風病	率谷
02	黃帝療中風，眼戴上，及不能語者，灸第二椎、第五椎	中風	眼戴上；不能	第二椎；第五
	上各十壯，齊下火，炷如半棗核大，立瘥。		語	椎上
03	黃帝問岐伯曰：中風半身不遂，如何灸？答曰：凡人未中風一兩月前，或三五月前，非時足脛上忽酸重頑痺，良久方解。此將中風之候，急灸三里、絕骨四處三壯，後用葱、薄荷、桃柳葉煎湯淋洗，驅逐風氣于瘡口出。	中風	半身不遂；頑	三里；絕骨
			痺；淋；風氣；	
			瘡口	
04	凡人不信此法，飲食不節，酒色過度，忽中此風，言語謇澁，半身不遂。宜七處齊下火，各三壯。風在左灸右，右灸左。百會、耳前髮際、肩井、風市、三里、絕骨、曲池七穴，神效不能具錄，依法灸無不愈。	中風	言語謇澁；半身不遂	百會；耳前髮際；肩井；風市；三里；絕骨；曲池

05	百會、曲鬚、肩髃、曲池、風市、足三里、絕骨共十三穴。灸風中臟，氣塞涎上，不語，極危者，下火立效。其狀覺心中憤亂，神思不怡，或手足麻，此將中臟之候。不問風與氣，但依次自上及下，各灸五壯，日別灸隨年壯。	中風	曲鬚；中臟；氣塞；涎上；不語；心中憤亂；神思不怡；手足麻	百會；曲鬚；肩髃；曲池；風市；足三里；絕骨
06	凡遇春秋，常灸以泄風氣。素有風人，可保無虞。此能灸暴卒，百會、風池、大椎、肩井、曲池、間使、足三里，共十二穴。	中風	泄風；風氣	百會；風池；大椎；肩井；曲池；間使；足三里
07	范子默自壬午五月間口眼喎斜，灸聽會等三穴即正。	中風	口眼喎斜	聽會
08	右手足麻無力，灸百會、髮際等七穴得愈。	中風	手足麻；無力	百會；髮際
09	未年八月間，氣塞涎上，不能語，金虎丹加賦粉服至四丸半。	中風	氣塞；涎上；不能語	-
10	氣不通，涎不下，藥從鼻中出，魂魄飛揚，如墮江湖中，頃欲絕，灸百會、風池等左右共十二穴。	中風	氣不通；涎不下；藥從鼻中出；魂魄飛揚	百會；風池

1.2.3 분석 용어 정리

텍스트를 기반으로 한 데이터 분석에서는 용어의 빈도 측정이 정확하기 이루어져야 한다. 이를 위해 분석 용어 정리가 필수적이다. 대상 텍스트의 양이 적을 때에는 수작업으로 의미 있는 용어를 정리해 나갈 수 있지만, 텍스트의 양이 많아지면 오류의 가능성이 커지고 필요한 자원도 많아져 수작업은 사실상 불가능하다. 용어사전을 구축해 두면 짧은 시간 내에 용어의 빈도를 측정할 수 있고 분석 대상이 달라지는 경우에도 재활용할 수 있어 효율적이다. 본 연구에서는 《침구자생경》에 나타나는 병증과 경혈을 전수 조사하여 아래와 같이 통합 용어사전을 구축하고 분석에 활용하였다. 아래는 일부 예시이다.

표 1.5: 추출된 병증용어(예시)

용어	동의·유의어
遺精	泄精，精走，漏精，失精，精下，精出，遺泄，精溢
氣滯	氣結，氣隔，氣秘
白淫	白濁，便濁，尿精，精滑
腎虛	腎損，腎氣焦，腎藏衰，腎氣衰，腎精不固，腎水不足

표 1.6: 추출된 경혈용어(예시)

용어	동의 · 유의어
腰俞	髓空, 髓孔, 背解, 腰戶, 腰柱, 腰注, 髓俞
關元	下紀, 次門, 三結交, 丹田, 大中極, 小腸募
中脘	上紀, 胃脘, 大倉, 太倉, 胃管, 中管, 胃募, 中腕, 脘會
手五里	尺之五間, 尺之五里, 手之五里

1.2.4 분석 및 시각화

본 연구에서는 '병증-경혈' 상관성을 정량적으로 분석하고자 하였다. 이를 위해 다음과 같은 가정을 전제하였다.

1. 치료 대상은 대표 병증과 부가 병증의 합으로 본다. 2. 대표 병증은 부가 병증보다 치료 대상으로서의 의미가 더 크다. 3. 동일한 병증 치료에 나열되어 있는 경혈은 각각 독립적인 의미를 가진다. 4. 침 뜸 사혈 등 경혈 치료 수법(手法) 및 치료 강도는 고려하지 않는다.

정량적 분석에는 G-score를 사용하였다. G-score는 G-score는 Ted Dunning이 제안한 방식으로 두 범주형 변수의 독립성을 비교하는 방법이다. 두 변수가 함께 관찰된 실제 관찰값(observed value)을 O, 두 변수가 함께 관찰될 이론적 기댓값(Expected value)을 E라고 하였을 때, G-score의 근삿값은 아래와 같은 공식으로 계산할 수 있다. G-score가 낮을수록 대상 키워드는 독립적으로 출현한다고 해석할 수 있고, 반대로 값이 크다면 대상 키워드는 검색 키워드와 연관성이 높다고 해석할 수 있다.

$$G \approx 2 \left(O \cdot \log \frac{O}{E} - (O - E) \right)$$

측정 결과는 수치형태로 나타난다. 이때 같은 병증에 사용된 경혈들을 서로 비교한다거나 하나의 경혈이 사용된 병증들을 비교하기 위해서는 이에 적합한 시각화 방법이 필요하다. 병증과 경혈이라는 범주형 자료, 텍스트 상 용어의 빈도와 연관성 측정값이라는 수치형 자료를 모두 포괄하기 위해서는 다양한 변수들을 하나의 차트에 담을 수 있는

방법이어야 한다. 이러한 기준을 모두 만족하는 시각화 방법으로 트리맵(tree map)이 있다. 트리맵은 영역의 구분으로 범주형 자료를 표현할 수 있고, 영역의 크기와 색깔로 2가지 이상의 수치형 데이터를 나타낼 수 있다. 또 범주형 자료들을 크게 둑어 표현할 수 있다는 장점도 있다. 따라서 분석 결과를 트리맵으로 구현하였다.

제 2 장

병증의 치료

《침구자생경》에 수록된 병증을 원서 목차 순서대로 나열하고, 각 병증 치료에 어떤 경혈이 사용되었으며 병증과 경혈과의 연관성은 얼마나 되는지 살펴보자.

2.1 虛損

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 膏肓 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經 · 任脈으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.1: 병증 <虛損>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.2: 병증 <虛損>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.1: 병증 <虛損>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
膏肓	1	6.134	膏肓	1	6.134
水道	1	5.340	水道	1	5.340
曲骨	1	3.716	曲骨	1	3.716
頸會	1	3.628	頸會	1	3.628
神闕	1	3.466	神闕	1	3.466
胃俞	1	3.466	胃俞	1	3.466
氣海	1	3.248	氣海	1	3.248
上廉	1	3.248	上廉	1	3.248
小腸俞	1	3.248	小腸俞	1	3.248
中極	1	2.628	中極	1	2.628
心俞	1	2.537	心俞	1	2.537
脾俞	1	2.494	脾俞	1	2.494
涌泉	1	2.219	涌泉	1	2.219
腎俞	1	2.115	腎俞	1	2.115
石門	1	2.018	石門	1	2.018
中脘	1	1.762	中脘	1	1.762
足三里	1	1.592	足三里	1	1.592

표 2.2: 병증 <虛損>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	3.332
任脈	6	2.806
足陽明胃經	2	3.466
督脈	1	3.628
手陽明大腸經	1	3.248
足少陰腎經	1	2.219

표 2.3: 병증 <虛損>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	7	3.168
등	6	3.332
머리	1	3.628
하박	1	3.248
발	1	2.219
소퇴	1	1.592

2.2 勞瘵

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 下腕 · 胃俞 · 脾俞 · 章門 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 下腕 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.3: 병증 <勞瘵>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.4: 병증 <勞瘵>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.4: 병증 <勞瘵>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
下脘	2	9.799	下脘	2	9.799
胃俞	2	8.243	胃俞	2	8.243
脾俞	2	6.240	脾俞	2	6.240
章門	2	5.117	膏肓	1	5.459
膏肓	1	5.459	章門	2	5.117
中髎	1	4.672	中髎	1	4.672
魄戶	1	4.122	魄戶	1	4.122
漏谷	1	3.830	漏谷	1	3.830
肩井	1	3.700	肩井	1	3.700
支正	1	3.579	支正	1	3.579
腦空	1	3.360	腦空	1	3.360
大腸俞	1	3.166	大腸俞	1	3.166
曲骨	1	3.076	曲骨	1	3.076
大椎	1	2.760	大椎	1	2.760
氣海	1	2.623	氣海	1	2.623
三焦俞	1	2.496	三焦俞	1	2.496
下廉	1	2.496	下廉	1	2.496
肺俞	1	1.943	肺俞	1	1.943
腎俞	1	1.548	腎俞	1	1.548
足三里	1	1.070	足三里	1	1.070

표 2.5: 병증 <勞瘵>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	11	4.210
任脈	4	5.166
足厥陰肝經	2	5.117
足少陽膽經	2	3.530
足太陰脾經	1	3.830

手太陽小腸經	1	3.579
督脈	1	2.760
手陽明大腸經	1	2.496
足陽明胃經	1	1.070

표 2.6: 병증 <勞瘵>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	12	4.065
배	4	5.166
옆구리	2	5.117
하박	2	3.038
소퇴	2	2.450
상박	1	3.700
머리	1	3.360

2.3 腎虛

이 병증 치료에는 모두 4가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 中膂俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 2차례 사용되었다.




그림 2.5: 병증 <腎虛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.6: 병증 <腎虛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.7: 병증 <腎虛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中膂俞	1	7.623	中膂俞	1	7.623
申脈	1	6.714	申脈	1	6.714
下廉	1	5.881	下廉	1	5.881
腎俞	1	4.783	腎俞	1	4.783

표 2.8: 병증 <腎虛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	3	6.373
手陽明大腸經	1	5.881

표 2.9: 병증 <腎虛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	2	6.203
발	1	6.714
하박	1	5.881

2.4 消渴

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.214차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 意舍 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 意舍 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥

이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.889차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.7: 병증 <消渴>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.8: 병증 <消渴>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.10: 병증 <消渴>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
意舍	3	20.326	意舍	3	20.326
然谷	2	6.362	然谷	2	6.362
中脣俞	1	4.783	中脣俞	1	4.783
陽綱	1	4.486	陽綱	1	4.486
兌端	1	4.486	兌端	1	4.486
關衝	1	3.628	關衝	1	3.628
承漿	1	3.545	承漿	1	3.545
隱白	1	3.390	隱白	1	3.390
商丘	1	2.937	商丘	1	2.937
勞宮	1	2.775	勞宮	1	2.775
水溝	1	2.775	水溝	1	2.775
行間	1	2.410	行間	1	2.410
曲池	1	2.255	曲池	1	2.255

太衝	1	2.115	太衝	1	2.115
----	---	-------	----	---	-------

표 2.11: 병증 <消渴>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	5	9.865
足少陰腎經	2	6.362
督脈	2	3.631
足太陰脾經	2	3.164
足厥陰肝經	2	2.263
手少陽三焦經	1	3.628
任脈	1	3.545
手厥陰心包經	1	2.775
手陽明大腸經	1	2.255

표 2.12: 병증 <消渴>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	6	3.443
등	5	9.865
얼굴	3	3.602
손	2	3.202
하박	1	2.255

2.5 隱痿縮

이 병증 치료에는 모두 11가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中封 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 大赫 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足厥陰肝經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.9: 병증 <陰痿縮>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.10: 병증 <陰瘡瘍>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.13: 병증 <陰瘡瘍>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中封	3	16.349	大赫	2	17.389
大赫	2	17.389	中封	3	16.349
五樞	1	6.516	五樞	1	6.516
歸來	1	6.516	歸來	1	6.516
陰谷	1	3.830	陰谷	1	3.830
氣衝	1	3.541	氣衝	1	3.541
陰交	1	3.293	陰交	1	3.293
曲泉	1	2.634	曲泉	1	2.634
太衝	1	2.451	太衝	1	2.451
石門	1	2.351	石門	1	2.351
然谷	1	2.288	然谷	1	2.288

표 2.14: 병증 <陰痿縮>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足厥陰肝經	5	7.145
足少陰腎經	4	7.835
足陽明胃經	2	5.028
任脈	2	2.822
足少陽膽經	1	6.516

표 2.15: 병증 <陰痿縮>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	6	6.618
발	5	7.029
소퇴	2	3.232
옆구리	1	6.516

2.6 隱挺出

이 병증 치료에는 모두 6가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 照海 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 照海 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陰腎經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.11: 병증 <陰挺出>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.12: 병증 <陰挺出>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.16: 병증 <陰挺出>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
照海	2	10.483	照海	2	10.483
水泉	1	8.694	水泉	1	8.694
上髎	1	6.876	上髎	1	6.876
少府	1	6.213	少府	1	6.213
大敦	1	4.663	大敦	1	4.663
曲泉	1	3.910	曲泉	1	3.910

표 2.17: 병증 <陰挺出>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陰腎經	3	9.588
足厥陰肝經	2	4.287
足太陽膀胱經	1	6.876
手少陰心經	1	6.213

표 2.18: 병증 <陰挺出>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	4	7.947
등	1	6.876
손	1	6.213
소퇴	1	3.910

2.7 轉胞

이 병증 치료에는 모두 3가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 中極 혈(穴)이 가장 높게 평가

되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 2차례 사용되었다.




그림 2.13: 병증 <轉胞>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.14: 병증 <轉胞>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.19: 병증 <轉胞>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中極	1	5.916	中極	1	5.916
涌泉	1	5.459	涌泉	1	5.459
關元	1	5.090	關元	1	5.090

표 2.20: 병증 <轉胞>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	2	5.503
足少陰腎經	1	5.459

표 2.21: 병증 <轉胞>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	2	5.503
발	1	5.459

2.8 陰莖疼

이 병증 치료에는 모두 15가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 歸來 · 氣衝 · 行間 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 歸來 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經 · 足厥陰肝經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.571차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.15: 병증 <陰莖疼>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.16: 병증 <陰莖疼>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.22: 병증 <陰莖疼>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
歸來	2	14.779	歸來	2	14.779
氣衝	2	8.753	氣衝	2	8.753
行間	2	7.129	行間	2	7.129
會陰	1	6.022	會陰	1	6.022
橫骨	1	6.022	橫骨	1	6.022
水道	1	5.229	水道	1	5.229
志室	1	4.518	志室	1	4.518
少府	1	4.376	少府	1	4.376
陰谷	1	3.360	陰谷	1	3.360
陰陵泉	1	3.143	陰陵泉	1	3.143
大敦	1	2.891	大敦	1	2.891
列缺	1	2.778	列缺	1	2.778
曲泉	1	2.194	曲泉	1	2.194
太衝	1	2.018	太衝	1	2.018
腎俞	1	2.018	腎俞	1	2.018

표 2.23: 병증 <陰莖疼>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	5	9.587
足厥陰肝經	5	3.558
足少陰腎經	2	4.691
足太陽膀胱經	2	3.268
任脈	1	6.022
手少陰心經	1	4.376
足太陰脾經	1	3.143
手太陰肺經	1	2.778

표 2.24: 병증 <陰莖疼>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	6	8.696
발	4	4.013
소퇴	3	2.899
등	2	3.268
얼굴	1	6.022
손	1	4.376
하박	1	2.778

2.9 膀胱氣

이 병증 치료에는 모두 4가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 水道 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 水道 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 · 옆구리 부위이며 모두 2차례 사용되었다.




그림 2.17: 병증 <膀胱氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.18: 병증 <膀胱氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.25: 병증 <膀胱氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
水道	2	18.259	水道	2	18.259
五樞	1	8.557	五樞	1	8.557
小腸俞	1	5.585	小腸俞	1	5.585
章門	1	4.175	章門	1	4.175

표 2.26: 병증 <膀胱氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	2	18.259
足少陽膽經	1	8.557
足太陽膀胱經	1	5.585
足厥陰肝經	1	4.175

표 2.27: 병증 <膀胱氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	2	18.259
옆구리	2	6.366
등	1	5.585

2.10 陰汗

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 會陰 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 · 손 · 배 부위이며 모두 2차례 사용되었다.




그림 2.19: 병증 <陰汗>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.20: 병증 <陰汗>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.28: 병증 <陰汗>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
會陰	1	7.390	會陰	1	7.390
會陽	1	6.588	會陽	1	6.588
下髎	1	6.380	下髎	1	6.380
少府	1	5.720	少府	1	5.720
陰交	1	4.122	陰交	1	4.122
中極	1	3.796	中極	1	3.796
照海	1	3.439	照海	1	3.439
曲泉	1	3.439	曲泉	1	3.439
魚際	1	3.143	魚際	1	3.143

표 2.29: 병증 <陰汗>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	3	5.103
足太陽膀胱經	2	6.484
手少陰心經	1	5.720
足厥陰肝經	1	3.439
足少陰腎經	1	3.439
手太陰肺經	1	3.143

표 2.30: 병증 <陰汗>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	2	6.484
손	2	4.431
배	2	3.959
얼굴	1	7.390
발	1	3.439
소퇴	1	3.439

2.11 陰腫

이 병증 치료에는 모두 8가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 氣衝 · 曲泉 · 崑崙 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 氣衝 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.21: 병증 <陰腫>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.22: 병증 <陰腫>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.31: 병증 <陰腫>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
氣衝	2	10.656	氣衝	2	10.656
曲泉	2	8.738	曲泉	2	8.738
崑崙	2	8.270	崑崙	2	8.270
胞肓	1	6.992	胞肓	1	6.992
志室	1	5.472	志室	1	5.472
膀胱俞	1	3.864	膀胱俞	1	3.864
大敦	1	3.802	大敦	1	3.802
照海	1	3.069	照海	1	3.069

표 2.32: 병증 <陰腫>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	5	6.149
足厥陰肝經	3	6.270
足陽明胃經	2	10.656
足少陰腎經	1	3.069

표 2.33: 병증 <陰腫>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	4	5.047
등	3	5.443
배	2	10.656
소퇴	2	8.738

2.12 小腹痛

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.08차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 照海 · 石門 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 1차례 사용된 帶脈 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.857차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足厥陰肝經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.857차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 10차례 사용되었다.




그림 2.23: 병증 <小腹痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.24: 병증 <小腹痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.34: 병증 <小腹痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
照海	2	5.397	帶脈	1	5.585
石門	2	4.830	陰包	1	5.585
帶脈	1	5.585	照海	2	5.397
陰包	1	5.585	五樞	1	5.229
五樞	1	5.229	石門	2	4.830
中都	1	4.245	中都	1	4.245
蠡溝	1	3.748	蠡溝	1	3.748
丘墟	1	2.862	丘墟	1	2.862
承筋	1	2.778	承筋	1	2.778
承山	1	2.778	承山	1	2.778
水分	1	2.699	水分	1	2.699
神闕	1	2.623	神闕	1	2.623
小腸俞	1	2.415	小腸俞	1	2.415
下廉	1	2.290	下廉	1	2.290
大敦	1	2.175	大敦	1	2.175
中封	1	2.175	中封	1	2.175
商丘	1	2.121	商丘	1	2.121
中極	1	1.833	中極	1	1.833
復溜	1	1.670	復溜	1	1.670
曲泉	1	1.525	曲泉	1	1.525
涌泉	1	1.458	涌泉	1	1.458
太衝	1	1.364	太衝	1	1.364
腎俞	1	1.364	腎俞	1	1.364
太谿	1	1.335	太谿	1	1.335
肝俞	1	1.278	肝俞	1	1.278

표 2.35: 병증 <小腹痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
--------	---------	------------

足厥陰肝經	7	2.974
任脈	5	2.996
足少陰腎經	5	2.465
足太陽膀胱經	5	2.123
足少陽膽經	3	4.559
手陽明大腸經	1	2.290
足太陰脾經	1	2.121

표 2.36: 병증 <小腹痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	10	2.284
소퇴	5	3.015
배	5	2.996
등	3	1.686
옆구리	2	5.407
대퇴	1	5.585
하박	1	2.290

2.13 小腹脹滿

이 병증 치료에는 모두 13가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 胞肓 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.6차례 사용되었다. 가장 여러

2.13. 小腹脹滿

59

차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.25: 병증 <小腹脹滿>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.26: 병증 <小腹脹滿>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.37: 병증 <小腹脹滿>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
胞肓	1	6.662	胞肓	1	6.662
水道	1	5.865	水道	1	5.865
大巨	1	5.658	大巨	1	5.658
幽門	1	5.303	幽門	1	5.303
蠡溝	1	5.147	蠡溝	1	5.147
京門	1	4.745	京門	1	4.745
曲骨	1	4.223	曲骨	1	4.223
小腸俞	1	3.748	小腸俞	1	3.748
委中	1	3.748	委中	1	3.748
中封	1	3.489	中封	1	3.489
大敦	1	3.489	大敦	1	3.489
腎俞	1	2.582	腎俞	1	2.582
然谷	1	2.417	然谷	1	2.417

표 2.38: 병증 <小腹脹滿>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	4	4.185
足厥陰肝經	3	4.042
足陽明胃經	2	5.762
足少陰腎經	2	3.860
足少陽膽經	1	4.745
任脈	1	4.223

표 2.39: 병증 <小腹脹滿>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	4	5.262

등	3	4.331
발	3	3.132
소퇴	2	4.447
옆구리	1	4.745

2.14 瘰瘍

이 병증 치료에는 모두 39가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.923차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 大敦 · 太衝 · 石門 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 4차례 사용된 交信 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 9.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足厥陰肝經으로 모두 21차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 9.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 27차례 사용되었다.




그림 2.27: 병증 <瘻疮>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.28: 병증 <瘻疮>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.40: 병증 <瘻疝>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
大敦	5	16.1196	交信	4	19.0456
太衝	5	11.6539	大敦	5	16.1196
石門	5	11.1592	蠡溝	3	11.6775
交信	4	19.0456	太衝	5	11.6539
照海	4	8.4967	石門	5	11.1592
蠡溝	3	11.6775	五樞	2	9.1875
中封	3	6.9247	照海	4	8.4967
陰交	3	6.7598	合陽	2	7.6426
關元	3	3.8580	中都	2	7.2468
五樞	2	9.1875	大巨	2	7.2468
合陽	2	7.6426	中封	3	6.9247
中都	2	7.2468	陰交	3	6.7598
大巨	2	7.2468	神闕	2	4.1038
神闕	2	4.1038	關元	3	3.8580
氣衝	2	3.5897	肓俞	1	3.6234
天樞	2	2.4706	氣衝	2	3.5897
曲泉	2	2.0653	橫骨	1	3.2844
肝俞	2	1.6290	陰市	1	2.7603
中脘	2	1.2431	築賓	1	2.5503
肓俞	1	3.6234	金門	1	2.5503
橫骨	1	3.2844	天樞	2	2.4706
陰市	1	2.7603	衝門	1	2.3653
築賓	1	2.5503	次髎	1	2.3653
金門	1	2.5503	曲泉	2	2.0653
衝門	1	2.3653	少府	1	1.7948
次髎	1	2.3653	肩井	1	1.6825
少府	1	1.7948	地機	1	1.6825
肩井	1	1.6825	肝俞	2	1.6290
地機	1	1.6825	中脘	2	1.2431
曲骨	1	1.1633	曲骨	1	1.1633
丘墟	1	1.1633	丘墟	1	1.1633

陷谷	1	0.9172	陷谷	1	0.9172
氣海	1	0.8145	氣海	1	0.8145
三陰交	1	0.7228	三陰交	1	0.7228
商丘	1	0.6029	商丘	1	0.6029
行間	1	0.2939	行間	1	0.2939
太谿	1	0.1445	太谿	1	0.1445
巨闕	1	0.1320	巨闕	1	0.1320
然谷	1	0.0988	然谷	1	0.0988

표 2.41: 병증 <瘭疽>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足厥陰肝經	21	7.997
任脈	18	3.654
足少陰腎經	13	5.321
足陽明胃經	8	3.397
足太陽膀胱經	6	3.547
足少陽膽經	4	4.011
足太陰脾經	4	1.343
手少陰心經	1	1.795

표 2.42: 병증 <瘭疽>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	27	3.701
발	24	4.451
소퇴	16	6.579
등	3	1.997
옆구리	2	9.188
대퇴	1	2.760
손	1	1.795
상박	1	1.683

2.15 痘瘍

이 병증 치료에는 모두 13가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.077차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 四滿 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 四滿 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陰脾經 · 任脈으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.29: 병증 <痘瘍>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.30: 병증 <疤痕>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.43: 병증 <疤痕>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
四滿	2	11.439	四滿	2	11.439
府舍	1	6.516	府舍	1	6.516
衝門	1	5.514	衝門	1	5.514
地機	1	4.727	地機	1	4.727
丘墟	1	4.082	丘墟	1	4.082
氣海	1	3.608	氣海	1	3.608
陰陵泉	1	3.608	陰陵泉	1	3.608
中極	1	2.978	中極	1	2.978
間使	1	2.885	間使	1	2.885
天樞	1	2.885	天樞	1	2.885
太谿	1	2.417	太谿	1	2.417
石門	1	2.351	石門	1	2.351
關元	1	2.228	關元	1	2.228

표 2.44: 병증 <疝瘕>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	4	5.091
任脈	4	2.791
足少陰腎經	3	6.928
足少陽膽經	1	4.082
手厥陰心包經	1	2.885
足陽明胃經	1	2.885

표 2.45: 병증 <疝瘕>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	9	4.690
소퇴	2	4.168
발	2	3.250
하박	1	2.885

2.16 淋癰

이 병증 치료에는 모두 30가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 關元 혈(穴)로 모두 6차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 關元 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 9.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 18차례 사용되었다.




그림 2.31: 병증 <淋癃>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.32: 병증 <淋癃>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.46: 병증 <淋癃>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
關元	6	19.3673	關元	6	19.3673
曲骨	3	11.4891	曲骨	3	11.4891
大敦	3	9.3163	大敦	3	9.3163
復溜	3	7.6747	交信	2	8.5748
交信	2	8.5748	復溜	3	7.6747
長強	2	7.3998	長強	2	7.3998
小腸俞	2	5.2455	小腸俞	2	5.2455
陰陵泉	2	5.2455	陰陵泉	2	5.2455
照海	2	3.4260	水泉	1	4.8997
石門	2	2.9159	箕門	1	4.8997
然谷	2	2.8032	秩邊	1	4.4698
水泉	1	4.8997	照海	2	3.4260
箕門	1	4.8997	中髎	1	3.3599
秩邊	1	4.4698	次髎	1	3.1656
中髎	1	3.3599	懸鍾	1	2.9913
次髎	1	3.1656	石門	2	2.9159
懸鍾	1	2.9913	然谷	2	2.8032
委陽	1	2.6900	委陽	1	2.6900
志室	1	2.6900	志室	1	2.6900
大鐘	1	1.8621	大鐘	1	1.8621
至陰	1	1.8621	至陰	1	1.8621
神闕	1	1.6443	神闕	1	1.6443
氣衝	1	1.4016	氣衝	1	1.4016
中封	1	1.2472	中封	1	1.2472
太白	1	1.2002	太白	1	1.2002
中極	1	0.9549	中極	1	0.9549
行間	1	0.7897	行間	1	0.7897
曲泉	1	0.7040	曲泉	1	0.7040
涌泉	1	0.6517	涌泉	1	0.6517
太衝	1	0.5797	太衝	1	0.5797

표 2.47: 병증 <淋癃>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	13	7.274
足少陰腎經	12	4.270
足太陽膀胱經	8	3.355
足厥陰肝經	7	2.527
足太陰脾經	4	3.782
督脈	2	7.400
足少陽膽經	1	2.991
足陽明胃經	1	1.402

표 2.48: 병증 <淋癃>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	18	3.026
배	14	6.295
등	8	4.388
소퇴	7	4.041
대퇴	1	4.900

2.17 小便難

이 병증 치료에는 모두 33가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.424차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 曲骨 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 曲骨 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.7차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 18차례 사용되었다.




그림 2.33: 병증 <小便難>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.34: 병증 <小便難>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.49: 병증 <小便難>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
曲骨	4	17.6666	曲骨	4	17.6666
箕門	2	12.5892	箕門	2	12.5892
橫骨	2	10.9995	橫骨	2	10.9995
委陽	2	8.0192	委陽	2	8.0192
陰谷	2	5.7434	陰谷	2	5.7434
陰陵泉	2	5.3205	陰陵泉	2	5.3205
大敦	2	4.8322	大敦	2	4.8322
陰交	2	4.7212	陰交	2	4.7212
中極	2	4.1302	陰包	1	4.5102
行間	2	3.7161	會陰	1	4.1616
石門	2	2.9816	中極	2	4.1302
關元	2	2.7600	行間	2	3.7161
陰包	1	4.5102	承扶	1	3.6184

會陰	1	4.1616	水道	1	3.3989
承扶	1	3.6184	大巨	1	3.2042
水道	1	3.3989	石門	2	2.9816
大巨	1	3.2042	關元	2	2.7600
手五里	1	2.7277	手五里	1	2.7277
少府	1	2.5955	少府	1	2.5955
地機	1	2.4736	地機	1	2.4736
京門	1	2.3606	京門	1	2.3606
至陰	1	1.8971	至陰	1	1.8971
委中	1	1.4908	委中	1	1.4908
氣衝	1	1.4341	氣衝	1	1.4341
三陰交	1	1.3800	三陰交	1	1.3800
中封	1	1.2788	中封	1	1.2788
列缺	1	1.1858	列缺	1	1.1858
期門	1	0.9481	期門	1	0.9481
照海	1	0.7304	照海	1	0.7304
曲泉	1	0.7304	曲泉	1	0.7304
涌泉	1	0.6774	涌泉	1	0.6774
太衝	1	0.6043	太衝	1	0.6043
足三里	1	0.2762	足三里	1	0.2762

표 2.50: 병증 <小便難>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	13	6.070
足厥陰肝經	9	2.374
足太陰脾經	6	5.441
足少陰腎經	6	4.538
足太陽膀胱經	5	3.756
足陽明胃經	4	2.078
手陽明大腸經	1	2.728
手少陰心經	1	2.595
足少陽膽經	1	2.361
手太陰肺經	1	1.186

표 2.51: 병증 <小便難>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	18	5.224
소퇴	11	3.179
발	9	1.962
대퇴	4	6.906
얼굴	1	4.162
상박	1	2.728
손	1	2.595
옆구리	1	2.361
하박	1	1.186

2.18 小便五色

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 關元 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 關元 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.35: 병증 <小便五色>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.36: 병증 <小便五色>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.52: 병증 <小便五色>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
關元	5	16.1394	關元	5	16.1394
小腸俞	3	11.0997	小腸俞	3	11.0997
白環俞	2	8.9396	白環俞	2	8.9396
陽綱	2	8.3504	陽綱	2	8.3504
下脘	2	7.8436	下脘	2	7.8436
上廉	2	5.9010	上廉	2	5.9010
下廉	2	5.6425	下廉	2	5.6425
膀胱俞	2	5.5206	膀胱俞	2	5.5206
大陵	2	4.7774	秩邊	1	4.8208
照海	2	4.0295	大陵	2	4.7774
太谿	2	3.6211	魂門	1	4.1752
秩邊	1	4.8208	照海	2	4.0295
魂門	1	4.1752	太谿	2	3.6211
兌端	1	2.8846	兌端	1	2.8846
京門	1	2.6449	京門	1	2.6449
承漿	1	2.0148	承漿	1	2.0148
陰谷	1	1.9433	陰谷	1	1.9433
氣海	1	1.7487	氣海	1	1.7487
委中	1	1.7487	委中	1	1.7487
大敦	1	1.5271	大敦	1	1.5271
完骨	1	1.5271	完骨	1	1.5271
陰交	1	1.4773	陰交	1	1.4773
前谷	1	1.2553	前谷	1	1.2553
腎俞	1	0.8049	腎俞	1	0.8049
中脘	1	0.5463	中脘	1	0.5463

표 2.53: 병증 <小便五色>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
--------	---------	------------

足太陽膀胱經	13	5.683
任脈	11	4.962
足少陰腎經	5	3.198
手陽明大腸經	4	5.772
手厥陰心包經	2	4.777
足少陽膽經	2	2.086
督脈	1	2.885
足厥陰肝經	1	1.527
手太陽小腸經	1	1.255

표 2.54: 병증 <小便五色>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	12	6.244
배	10	5.551
발	5	3.059
하박	4	5.772
손	3	3.016
얼굴	2	2.450
소퇴	2	1.846
옆구리	1	2.645
머리	1	1.527

2.19 治夢遺失精

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中封 · 曲泉 · 腎俞 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 中封 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 10차례 사용되었다.




그림 2.37: 병증 <治夢遺失精>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.38: 병증 <治夢遺失精>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.55: 병증 <治夢遺失精>에 사용된 경혈들

경혈	사용빈도 기준		G-Score 기준		
	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中封	3	11.0737	中封	3	11.0737
曲泉	3	8.8852	志室	2	9.1451
腎俞	3	8.3259	曲泉	3	8.8852
志室	2	9.1451	腎俞	3	8.3259
至陰	2	7.3225	至陰	2	7.3225
三陰交	2	6.1271	三陰交	2	6.1271
中極	2	5.1536	大赫	1	5.5136
大赫	1	5.5136	中極	2	5.1536
膏肓	1	4.7266	膏肓	1	4.7266
承扶	1	4.1752	承扶	1	4.1752
蠡溝	1	3.2640	蠡溝	1	3.2640
漏谷	1	3.1277	漏谷	1	3.1277
地機	1	3.0017	地機	1	3.0017

京門	1	2.8846	京門	1	2.8846
曲骨	1	2.4005	曲骨	1	2.4005
大椎	1	2.0997	大椎	1	2.0997
陽陵泉	1	2.0997	陽陵泉	1	2.0997
陰陵泉	1	1.9697	陰陵泉	1	1.9697
三焦俞	1	1.8507	三焦俞	1	1.8507
列缺	1	1.6401	列缺	1	1.6401
脾俞	1	1.3017	脾俞	1	1.3017
行間	1	1.2303	行間	1	1.2303
太衝	1	0.9848	太衝	1	0.9848
章門	1	0.8575	章門	1	0.8575
然谷	1	0.8575	然谷	1	0.8575

표 2.56: 병증 <治夢遺失精>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	11	5.264
足厥陰肝經	10	4.383
足太陰脾經	5	3.557
任脈	3	3.777
足少陰腎經	2	3.186
足少陽膽經	2	2.492
督脈	1	2.100
手太陰肺經	1	1.640

표 2.57: 병증 <治夢遺失精>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	10	4.068
등	9	4.575
발	8	4.294
배	4	4.356
옆구리	2	1.871

대퇴	1	4.175
하박	1	1.640

2.20 大便不通

이 병증 치료에는 모두 16가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.562차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 石關 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 石關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陰腎經으로 모두 10차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 10차례 사용되었다.




그림 2.39: 병증 <大便不通>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.40: 병증 <大便不通>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.58: 병증 <大便不通>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
石關	3	18.519	石關	3	18.519
肓俞	2	14.200	肓俞	2	14.200
大鐘	2	8.597	大鐘	2	8.597
承山	2	8.419	承山	2	8.419
承筋	2	8.419	承筋	2	8.419
太衝	2	5.304	中注	1	7.542
太谿	2	5.235	太衝	2	5.304
石門	2	5.101	太谿	2	5.235
中注	1	7.542	石門	2	5.101
中髎	1	4.594	中髎	1	4.594
神闕	1	2.760	神闕	1	2.760
膀胱俞	1	2.365	膀胱俞	1	2.365
大敦	1	2.308	大敦	1	2.308
太白	1	2.253	太白	1	2.253
崑崙	1	1.453	崑崙	1	1.453
中脘	1	1.163	中脘	1	1.163

표 2.59: 병증 <大便不通>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陰腎經	10	10.818
足太陽膀胱經	7	5.050
任脈	4	3.008
足厥陰肝經	3	3.806
足太陰脾經	1	2.253

표 2.60: 병증 <大便不通>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	10	8.214
발	9	4.192
소퇴	4	8.419
등	2	3.479

2.21 大小便不通

이 병증 치료에는 모두 13가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.077차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 浮郄 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 浮郄 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.41: 병증 <大小便不通>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.42: 병증 <大小便不通>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.61: 병증 <大小便不通>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
浮郄	2	16.501	浮郄	2	16.501
中注	1	8.694	中注	1	8.694
會陰	1	6.516	會陰	1	6.516
承扶	1	5.950	承扶	1	5.950
水道	1	5.720	水道	1	5.720
交信	1	5.328	交信	1	5.328
白環俞	1	5.159	白環俞	1	5.159
長強	1	4.727	長強	1	4.727
豐隆	1	4.273	豐隆	1	4.273
大腸俞	1	4.175	大腸俞	1	4.175
小腸俞	1	3.608	小腸俞	1	3.608
膀胱俞	1	3.412	膀胱俞	1	3.412
太谿	1	2.417	太谿	1	2.417

표 2.62: 병증 <大小便不通>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	7	6.468
足少陰腎經	3	5.480
足陽明胃經	2	4.996
任脈	1	6.516
督脈	1	4.727

표 2.63: 병증 <大小便不通>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	5	4.216
대퇴	3	11.226

배	2	7.207
소퇴	2	4.800
얼굴	1	6.516
발	1	2.417

2.22 小便不禁

이 병증 치료에는 모두 22가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.409차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 階陵泉 · 大敦 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 階陵泉 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足厥陰肝經으로 모두 8차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 · 발 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.43: 병증 <小便不禁>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.44: 병증 <小便不禁>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.64: 병증 <小便不禁>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
陰陵泉	3	12.5460	陰陵泉	3	12.5460
大敦	3	11.7595	關門	2	12.0253
關門	2	12.0253	大敦	3	11.7595
陽陵泉	2	7.1242	陽陵泉	2	7.1242
神門	2	6.9779	神門	2	6.9779
委中	2	6.8375	委中	2	6.8375
太衝	2	4.5478	箕門	1	5.7509
箕門	1	5.7509	陰包	1	5.3152
陰包	1	5.3152	橫骨	1	4.9612
橫骨	1	4.9612	太衝	2	4.5478
少府	1	3.3513	少府	1	3.3513
通里	1	2.8911	通里	1	2.8911
承漿	1	2.4538	承漿	1	2.4538
陰谷	1	2.3793	陰谷	1	2.3793
衝陽	1	2.1133	衝陽	1	2.1133
膀胱俞	1	1.9965	膀胱俞	1	1.9965
中府	1	1.7886	中府	1	1.7886
復溜	1	1.4507	復溜	1	1.4507
行間	1	1.4143	行間	1	1.4143
曲泉	1	1.3112	曲泉	1	1.3112
涌泉	1	1.2472	涌泉	1	1.2472
關元	1	0.9747	關元	1	0.9747

표 2.65: 병증 <小便不禁>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足厥陰肝經	8	4.870
足太陰脾經	4	9.149
手少陰心經	4	4.407

足少陰腎經	4	2.510
足陽明胃經	3	7.069
足太陽膀胱經	3	4.417
足少陽膽經	2	7.124
任脈	2	1.714
手太陰肺經	1	1.789

표 2.66: 병증 <小便不禁>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	9	6.040
발	9	3.756
배	4	5.987
손	3	5.165
대퇴	2	5.533
하박	1	2.891
얼굴	1	2.454
등	1	1.996
가슴	1	1.789

2.23 大便不禁

이 병증 치료에는 모두 10가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 曲骨 · 石門 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 曲骨 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체

부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.45: 병증 <大便不禁>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.46: 병증 <大便不禁>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.67: 병증 <大便不禁>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
曲骨	2	11.439	曲骨	2	11.439
石門	2	7.797	石門	2	7.797
魂門	1	6.516	魂門	1	6.516
承扶	1	6.253	承扶	1	6.253
陽綱	1	5.159	陽綱	1	5.159
大腸俞	1	4.470	大腸俞	1	4.470
神門	1	3.970	神門	1	3.970
天樞	1	3.166	天樞	1	3.166
關元	1	2.496	關元	1	2.496
足三里	1	2.169	足三里	1	2.169

표 2.68: 병증 <大便不禁>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	5	7.244
足太陽膀胱經	4	5.599
足陽明胃經	2	2.667
手少陰心經	1	3.970

표 2.69: 병증 <大便不禁>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	6	6.224
등	3	5.381
대퇴	1	6.253
손	1	3.970
소퇴	1	2.169

2.24 泄瀉

이 병증 치료에는 모두 30가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 京門 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 京門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 18차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 19차례 사용되었다.




그림 2.47: 병증 <泄瀉>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.48: 병증 <泄瀉>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.70: 병증 <泄瀉>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
京門	3	13.8070	京門	3	13.8070
會陽	2	9.8604	會陽	2	9.8604
意舍	2	8.4469	意舍	2	8.4469
大腸俞	2	6.8242	大腸俞	2	6.8242
陰陵泉	2	5.7243	陰陵泉	2	5.7243
三焦俞	2	5.4671	三焦俞	2	5.4671
天樞	2	4.3387	腹結	1	5.1586
腎俞	2	3.5248	梁門	1	4.7266
章門	2	3.2225	氣穴	1	4.7266
然谷	2	3.2225	懸樞	1	4.3763
關元	2	3.1108	天樞	2	4.3387
腹結	1	5.1586	關門	1	4.0824
梁門	1	4.7266	中髎	1	3.6085
氣穴	1	4.7266	腎俞	2	3.5248
懸樞	1	4.3763	下髎	1	3.4121
關門	1	4.0824	脊中	1	3.4121
中髎	1	3.6085	章門	2	3.2225
下髎	1	3.4121	然谷	2	3.2225
脊中	1	3.4121	關元	2	3.1108
陽綱	1	2.7966	陽綱	1	2.7966
長強	1	2.6729	長強	1	2.6729
束骨	1	2.4513	束骨	1	2.4513
神闕	1	1.8621	神闕	1	1.8621
隱白	1	1.7948	隱白	1	1.7948
小腸俞	1	1.6696	小腸俞	1	1.6696
三間	1	1.6112	三間	1	1.6112
膀胱俞	1	1.5020	膀胱俞	1	1.5020
脾俞	1	1.0351	脾俞	1	1.0351
曲泉	1	0.8767	曲泉	1	0.8767
崑崙	1	0.7177	崑崙	1	0.7177

표 2.71: 병증 <泄瀉>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	18	3.947
足陽明胃經	4	4.383
足太陰脾經	4	4.226
足少陽膽經	3	13.807
足少陰腎經	3	3.975
督脈	3	3.487
任脈	3	2.486
足厥陰肝經	3	2.050
手陽明大腸經	1	1.611

표 2.72: 병증 <泄瀉>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	19	4.186
배	9	4.001
옆구리	5	8.515
발	5	2.047
소퇴	3	3.300
손	1	1.611

2.25 滯泄

이 병증 치료에는 모두 3가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 中髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 1차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 1차례 사용되었다.




그림 2.49: 병증 <飧泄>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.50: 병증 <飧泄>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.73: 병증 <飧泄>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中髎	1	8.767	中髎	1	8.767
上廉	1	6.588	上廉	1	6.588
陰陵泉	1	6.588	陰陵泉	1	6.588

표 2.74: 병증 <飧泄>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	1	8.767
手陽明大腸經	1	6.588
足太陰脾經	1	6.588

표 2.75: 병증 <飧泄>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	1	8.767
소퇴	1	6.588
하박	1	6.588

2.26 潡泄

이 병증 치료에는 모두 3가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 地機 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 地機 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陰脾經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.51: 병증 <溏泄>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.52: 병증 <溏泄>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.76: 병증 <溏泄>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
地機	2	17.114	地機	2	17.114
三陰交	1	5.881	三陰交	1	5.881
太衝	1	4.783	太衝	1	4.783

표 2.77: 병증 <溏泄>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	3	11.498
足厥陰肝經	1	4.783

표 2.78: 병증 <溏泄>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	3	11.498
발	1	4.783

2.27 痢

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.412차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 關元 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 關元 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 8차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.53: 병증 <痢>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.54: 병증 <痢>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.79: 병증 <痢>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
關元	3	9.684	關元	3	9.684
氣海	2	7.797	氣海	2	7.797
小腸俞	2	7.797	小腸俞	2	7.797
脾俞	2	6.240	脾俞	2	6.240
曲泉	2	5.821	曲泉	2	5.821
石門	2	5.245	大橫	1	5.815
大橫	1	5.815	五樞	1	5.459
五樞	1	5.459	石門	2	5.245
脊中	1	4.470	脊中	1	4.470
交信	1	4.287	交信	1	4.287
中膂俞	1	4.122	中膂俞	1	4.122
神闕	1	2.834	神闕	1	2.834
衝陽	1	2.558	衝陽	1	2.558

膀胱俞	1	2.437	膀胱俞	1	2.437
復溜	1	1.862	復溜	1	1.862
太衝	1	1.548	太衝	1	1.548
太谿	1	1.517	太谿	1	1.517

표 2.80: 병증 <痢>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	8	6.390
足太陽膀胱經	6	5.149
足厥陰肝經	3	3.684
足少陰腎經	3	2.555
足太陰脾經	1	5.815
足少陽膽經	1	5.459
督脈	1	4.470
足陽明胃經	1	2.558

표 2.81: 병증 <痢>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	9	6.275
등	7	5.013
발	4	1.871
소퇴	3	5.054
옆구리	1	5.459

2.28 便血

이 병증 치료에는 모두 10가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.1차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 太白 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 太白 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陰脾經 · 足太陽膀胱經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.55: 병증 <便血>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.56: 병증 <便血>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.82: 병증 <便血>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
太白	2	10.136	太白	2	10.136
腹哀	1	7.796	腹哀	1	7.796
會陽	1	6.193	會陽	1	6.193
下髎	1	5.986	下髎	1	5.986
幽門	1	5.629	幽門	1	5.629
小腸俞	1	4.063	小腸俞	1	4.063
下廉	1	3.928	下廉	1	3.928
勞宮	1	3.574	勞宮	1	3.574
復溜	1	3.236	復溜	1	3.236
太衝	1	2.881	太衝	1	2.881

표 2.83: 병증 <便血>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	3	8.966
足太陽膀胱經	3	5.414
足少陰腎經	2	4.432
手陽明大腸經	1	3.928
手厥陰心包經	1	3.574
足厥陰肝經	1	2.881

표 2.84: 병증 <便血>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	4	5.418
등	3	5.414
배	2	6.712
하박	1	3.928
손	1	3.574

2.29 痘

이 병증 치료에는 모두 24가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 承扶 · 長強 · 飛揚 · 支溝 · 商丘 · 天突 · 復溜 · 章門 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 承扶 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.57: 병증 <痔>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.58: 병증 <瘡>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.85: 병증 <瘡>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承扶	2	11.377	承扶	2	11.377
長強	2	8.940	長強	2	8.940
飛揚	2	7.484	飛揚	2	7.484
支溝	2	6.860	氣海俞	1	7.053
商丘	2	6.095	支溝	2	6.860
天突	2	5.983	商丘	2	6.095
復溜	2	5.117	天突	2	5.983
章門	2	4.119	秩邊	1	5.253
氣海俞	1	7.053	復溜	2	5.117
秩邊	1	5.253	會陰	1	4.900
會陰	1	4.900	會陽	1	4.122
會陽	1	4.122	章門	2	4.119
陽輔	1	3.047	陽輔	1	3.047

天窓	1	2.834	天窓	1	2.834
天池	1	2.736	天池	1	2.736
俠谿	1	2.558	俠谿	1	2.558
承山	1	2.476	承山	1	2.476
承筋	1	2.476	承筋	1	2.476
委中	1	2.121	委中	1	2.121
小腸俞	1	2.121	小腸俞	1	2.121
勞宮	1	1.690	勞宮	1	1.690
陽谷	1	1.517	陽谷	1	1.517
足臨泣	1	1.296	足臨泣	1	1.296
太衝	1	1.112	太衝	1	1.112

표 2.86: 병증 <痔>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	11	4.943
任脈	3	5.441
足厥陰肝經	3	2.615
足少陽膽經	3	2.301
督脈	2	8.940
手少陽三焦經	2	6.860
足太陰脾經	2	6.095
足少陰腎經	2	5.117
手厥陰心包經	2	2.213
手太陽小腸經	2	2.175

표 2.87: 병증 <痔>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	7	3.236
등	6	5.498
소퇴	6	3.521
하박	3	4.188

옆구리	3	3.428
대퇴	2	11.377
가슴	2	5.983
얼굴	1	4.900
목	1	2.834
손	1	1.690

2.30 腸風

이 병증 치료에는 모두 2가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 脊中 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 1가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 1가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 2차례 사용되었다.




그림 2.59: 병증 <腸風>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.60: 병증 <腸風>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.88: 병증 <腸風>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
脊中 長強	1 1	9.364 8.557	脊中 長強	1 1	9.364 8.557

표 2.89: 병증 <腸風>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	2	8.961

표 2.90: 병증 <腸風>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	2	8.961

2.31 腸澼

이 병증 치료에는 모두 15가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 會陽 · 束骨 · 足通谷 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 會陽 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러

차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.61: 병증 <腸澼>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.62: 병증 <腸澼>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.91: 병증 <腸澼>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
會陽	2	13.176	會陽	2	13.176
束骨	2	10.681	束骨	2	10.681
足通谷	2	8.892	足通谷	2	8.892
膺窓	1	5.720	膺窓	1	5.720
中都	1	5.025	中都	1	5.025
下髎	1	5.025	下髎	1	5.025
意舍	1	4.518	意舍	1	4.518
陽綱	1	4.376	陽綱	1	4.376
四滿	1	3.898	四滿	1	3.898
大腸俞	1	3.700	大腸俞	1	3.700
小腸俞	1	3.143	小腸俞	1	3.143
三焦俞	1	3.012	三焦俞	1	3.012
復溜	1	2.351	復溜	1	2.351
章門	1	1.862	章門	1	1.862
中脘	1	1.670	中脘	1	1.670

표 2.92: 병증 <腸澼>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	12	6.280
足厥陰肝經	2	3.443
足少陰腎經	2	3.125
足陽明胃經	1	5.720
任脈	1	1.670

표 2.93: 병증 <腸澼>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균

등	8	5.279
발	5	7.308
배	2	2.784
가슴	1	5.720
소퇴	1	5.025
옆구리	1	1.862

2.32 腸痛

이 병증 치료에는 모두 5가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 商曲 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.63: 병증 <腸痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.64: 병증 <腸痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.94: 병증 <腸痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
商曲	1	9.364	商曲	1	9.364
建里	1	7.985	建里	1	7.985
陷谷	1	5.735	陷谷	1	5.735
氣衝	1	5.514	氣衝	1	5.514
太白	1	5.253	太白	1	5.253

표 2.95: 병증 <腸痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	2	5.624
足少陰腎經	1	9.364
任脈	1	7.985
足太陰脾經	1	5.253

표 2.96: 병증 <腸痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	3	7.621
발	2	5.494

2.33 腸鳴

이 병증 치료에는 모두 29가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.552차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 承滿 · 三焦俞 · 天樞 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 承滿 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 13차례 사용되었다.




그림 2.65: 병증 <腸鳴>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.66: 병증 <腸鳴>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.97: 병증 <腸鳴>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承滿	3	16.1372	承滿	3	16.1372
三焦俞	3	10.0412	三焦俞	3	10.0412
天樞	3	8.2808	天樞	3	8.2808
漏谷	2	7.9032	漏谷	2	7.9032
陽綱	2	7.9032	陽綱	2	7.9032
大腸俞	2	6.5688	大腸俞	2	6.5688
神闕	2	5.9010	督俞	1	6.3802
胃俞	2	5.9010	神闕	2	5.9010
陷谷	2	5.7531	胃俞	2	5.9010
上廉	2	5.4760	陷谷	2	5.7531
三間	2	5.3459	上廉	2	5.4760
太白	2	4.8733	三間	2	5.3459
復溜	2	3.9393	太白	2	4.8733

督俞	1	6.3802	膺窓	1	3.9516
膺窓	1	3.9516	關門	1	3.9516
關門	1	3.9516	復溜	2	3.9393
陰都	1	3.6999	陰都	1	3.6999
下髎	1	3.2844	下髎	1	3.2844
不容	1	2.9505	不容	1	2.9505
溫溜	1	2.8058	溫溜	1	2.8058
京門	1	2.4366	京門	1	2.4366
公孫	1	2.2318	公孫	1	2.2318
水分	1	1.8185	水分	1	1.8185
三陰交	1	1.4472	三陰交	1	1.4472
商丘	1	1.2964	商丘	1	1.2964
陰交	1	1.2964	陰交	1	1.2964
太衝	1	0.6564	太衝	1	0.6564
章門	1	0.5463	章門	1	0.5463
足三里	1	0.3153	足三里	1	0.3153

표 2.98: 병증 <腸鳴>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	12	5.9057
足太陽膀胱經	11	6.6798
足太陰脾經	7	3.5504
手陽明大腸經	5	4.5426
任脈	4	3.0053
足少陰腎經	3	3.8196
足厥陰肝經	2	0.6014
足少陽膽經	1	2.4366

표 2.99: 병증 <腸鳴>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	13	5.505

등	11	6.680
발	9	3.125
소퇴	4	3.222
하박	3	4.141
손	2	5.346
옆구리	2	1.492
가슴	1	3.952

2.34 脫肛

이 병증 치료에는 모두 3가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 神闕 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 神闕 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.67: 병증 <脫肛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.68: 병증 <脫肛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.100: 병증 <脫肛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
神闕	2	15.246	神闕	2	15.246
橫骨	1	9.001	橫骨	1	9.001
百會	1	4.407	百會	1	4.407

표 2.101: 병증 <脫肛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	2	15.246
足少陰腎經	1	9.001
督脈	1	4.407

표 2.102: 병증 <脫肛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	3	12.124
머리	1	4.407

2.35 瘰亂轉筋

이 병증 치료에는 모두 40가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.45차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 承筋 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 承筋 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 26차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 19차례 사용되었다.




그림 2.69: 병증 <瘻亂轉筋>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.70: 병증 <癱亂轉筋>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.103: 병증 <癱亂轉筋>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承筋	5	21.7610	承筋	5	21.7610
僕參	4	17.6744	僕參	4	17.6744
金門	3	15.2713	金門	3	15.2713
承山	3	10.1661	承山	3	10.1661
足竅陰	2	5.8278	中瀆	1	5.8815
丘墟	2	5.4671	足竅陰	2	5.8278
委中	2	4.5808	丘墟	2	5.4671
陰陵泉	2	4.5808	委中	2	4.5808
解谿	2	4.2189	陰陵泉	2	4.5808
巨闕	2	2.3984	解谿	2	4.2189
肝俞	2	2.3434	浮郄	1	4.1084
中瀆	1	5.8815	脾關	1	4.1084
浮郄	1	4.1084	人迎	1	3.4751

髀關	1	4.1084	乳根	1	2.6504
人迎	1	3.4751	跗陽	1	2.6504
乳根	1	2.6504	懸鍾	1	2.6504
跗陽	1	2.6504	巨闕	2	2.3984
懸鍾	1	2.6504	委陽	1	2.3560
委陽	1	2.3560	肝俞	2	2.3434
大都	1	2.1094	大都	1	2.1094
陽輔	1	2.0002	陽輔	1	2.0002
公孫	1	1.8042	公孫	1	1.8042
至陰	1	1.5554	至陰	1	1.5554
關衝	1	1.4822	關衝	1	1.4822
胃俞	1	1.3478	胃俞	1	1.3478
神闕	1	1.3478	神闕	1	1.3478
京骨	1	1.3478	京骨	1	1.3478
支溝	1	1.2274	支溝	1	1.2274
三陰交	1	1.0684	三陰交	1	1.0684
太白	1	0.9310	太白	1	0.9310
尺澤	1	0.8893	尺澤	1	0.8893
中府	1	0.8494	中府	1	0.8494
膻中	1	0.8113	膻中	1	0.8113
心俞	1	0.6433	心俞	1	0.6433
太淵	1	0.5069	太淵	1	0.5069
曲泉	1	0.4827	曲泉	1	0.4827
曲池	1	0.4595	曲池	1	0.4595
涌泉	1	0.4373	涌泉	1	0.4373
魚際	1	0.3206	魚際	1	0.3206
中脘	1	0.1907	中脘	1	0.1907

표 2.104: 병증 <瘧亂轉筋>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	26	6.6005
足少陽膽經	7	4.3654
足太陰脾經	6	2.0988

足陽明胃經	5	3.6132
任脈	5	1.1871
手太陰肺經	4	0.6416
手少陽三焦經	2	1.3548
足厥陰肝經	1	0.4827
手陽明大腸經	1	0.4595
足少陰腎經	1	0.4373

표 2.105: 병증 <瘧亂轉筋>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	19	5.1495
소퇴	18	5.2297
등	4	1.4449
배	4	1.3123
대퇴	3	4.6995
가슴	3	1.4370
하박	3	0.8587
손	3	0.7699
목	1	3.4751

2.36 瘧亂吐瀉

이 병증 치료에는 모두 15가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.467차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中脘 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 中脘 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.71: 병증 <癰亂吐瀉>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.72: 병증 <癇亂吐瀉>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.106: 병증 <癇亂吐瀉>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中脘	3	9.707	中脘	3	9.707
太白	2	7.484	太白	2	7.484
上腕	2	7.148	上腕	2	7.148
期門	2	6.746	期門	2	6.746
天樞	2	6.652	天樞	2	6.652
巨闕	2	5.624	巨闕	2	5.624
人迎	1	5.328	人迎	1	5.328
陰郄	1	4.840	陰郄	1	4.840
關衝	1	3.150	關衝	1	3.150
隱白	1	2.917	隱白	1	2.917
支溝	1	2.846	支溝	1	2.846
尺澤	1	2.422	尺澤	1	2.422
勞宮	1	2.320	勞宮	1	2.320

太谿	1	1.655	太谿	1	1.655
足三里	1	1.196	足三里	1	1.196

표 2.107: 병증 <瘧亂吐瀉>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	7	7.493
足陽明胃經	4	4.392
足太陰脾經	3	5.201
足厥陰肝經	2	6.746
手少陽三焦經	2	2.998
手少陰心經	1	4.840
手太陰肺經	1	2.422
手厥陰心包經	1	2.320
足少陰腎經	1	1.655

표 2.108: 병증 <瘧亂吐瀉>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	11	7.175
발	4	4.019
하박	3	3.369
손	2	2.735
목	1	5.328
소퇴	1	1.196

2.37 嘔吐

이 병증 치료에는 모두 50가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.46차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中庭 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 中庭 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.083차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 18차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.636차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 17차례 사용되었다.




그림 2.73: 병증 <嘔吐>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.74: 병증 <嘔吐>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.109: 병증 <嘔吐>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中庭	4	17.3998	中庭	4	17.3998
膻中	3	6.4373	靈墟	2	10.8635
巨闕	3	4.3967	維道	2	9.9959
靈墟	2	10.8635	神藏	2	8.1907
維道	2	9.9959	築賓	2	7.7445
神藏	2	8.1907	率谷	2	6.9918
築賓	2	7.7445	幽門	2	6.6687
率谷	2	6.9918	膻中	3	6.4373
幽門	2	6.6687	大鐘	2	4.6547
大鐘	2	4.6547	巨闕	3	4.3967
胃俞	2	4.1955	胃俞	2	4.1955
隱白	2	4.0571	隱白	2	4.0571
三焦俞	2	3.5632	三焦俞	2	3.5632

商丘	2	3.2443	膈關	1	3.3343
勞宮	2	2.9607	商丘	2	3.2443
心俞	2	2.5513	魂門	1	3.0510
膈俞	2	2.0809	日月	1	3.0510
太谿	2	1.8013	勞宮	2	2.9607
中脘	2	1.3081	俞府	1	2.8089
膈關	1	3.3343	瘻脈	1	2.8089
魂門	1	3.0510	腰陽關	1	2.5982
日月	1	3.0510	心俞	2	2.5513
俞府	1	2.8089	玉堂	1	2.4125
瘻脈	1	2.8089	上髎	1	2.4125
腰陽關	1	2.5982	承光	1	2.4125
玉堂	1	2.4125	魄戶	1	2.0977
上髎	1	2.4125	膈俞	2	2.0809
承光	1	2.4125	天容	1	1.9626
魄戶	1	2.0977	意舍	1	1.9626
天容	1	1.9626	顱息	1	1.8393
意舍	1	1.9626	太谿	2	1.8013
顱息	1	1.8393	大都	1	1.7263
大都	1	1.7263	廉泉	1	1.5259
廉泉	1	1.5259	膽俞	1	1.4365
膽俞	1	1.4365	中脘	2	1.3081
雲門	1	1.2030	雲門	1	1.2030
少商	1	1.2030	少商	1	1.2030
陽陵泉	1	0.9541	陽陵泉	1	0.9541
少海	1	0.9541	少海	1	0.9541
曲澤	1	0.8501	曲澤	1	0.8501
足通谷	1	0.8501	足通谷	1	0.8501
太白	1	0.6350	太白	1	0.6350
上脘	1	0.5307	上脘	1	0.5307
肺俞	1	0.3883	肺俞	1	0.3883
閭使	1	0.3883	閭使	1	0.3883
腎俞	1	0.1769	腎俞	1	0.1769
太衝	1	0.1769	太衝	1	0.1769
石門	1	0.1374	石門	1	0.1374

魚際	1	0.1374	魚際	1	0.1374
章門	1	0.1146	章門	1	0.1146

표 2.110: 병증 <嘔吐>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	18	2.1795
任脈	16	4.2685
足少陰腎經	13	6.1046
足少陽膽經	6	5.2482
足太陰脾經	6	2.4157
手厥陰心包經	4	1.3997
手太陰肺經	3	0.8478
手少陽三焦經	2	2.3241
足厥陰肝經	2	0.1457
督脈	1	2.5982
手太陽小腸經	1	1.9626
手少陰心經	1	0.9541

표 2.111: 병증 <嘔吐>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	17	2.2961
가슴	14	7.0451
발	12	2.1432
배	10	2.6821
머리	5	3.5131
손	4	1.4337
옆구리	3	5.0552
소퇴	3	4.3493
하박	3	0.7309
목	1	1.9626

얼굴	1	1.5259
----	---	--------

2.38 乾嘔

이 병증 치료에는 모두 13가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.231차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 尺澤 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 尺澤 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.286차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陰肺經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.286차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.75: 병증 <乾嘔>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.76: 병증 <乾嘔>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.112: 병증 <乾嘔>에 사용된 경혈들

경혈	사용빈도 기준		G-Score 기준		
	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
尺澤	3	15.205	尺澤	3	15.205
間使	2	7.844	間使	2	7.844
俠白	1	7.053	俠白	1	7.053
極泉	1	5.253	極泉	1	5.253
幽門	1	4.900	幽門	1	4.900
膽俞	1	4.122	膽俞	1	4.122
承漿	1	3.659	承漿	1	3.659
隱白	1	3.503	隱白	1	3.503
足通谷	1	3.360	足通谷	1	3.360
中府	1	2.937	中府	1	2.937
膻中	1	2.885	膻中	1	2.885
巨闕	1	2.153	巨闕	1	2.153
中脘	1	1.862	中脘	1	1.862

표 2.113: 병증 <乾嘔>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陰肺經	5	8.398
任脈	4	2.640
手厥陰心包經	2	7.844
足太陽膀胱經	2	3.741
手少陰心經	1	5.253
足少陰腎經	1	4.900
足太陰脾經	1	3.503

표 2.114: 병증 <乾嘔>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	5	11.524
배	3	2.972
상박	2	6.153
발	2	3.431
가슴	2	2.911
등	1	4.122
얼굴	1	3.659

2.39 嘔

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.235차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 石關 · 蟲溝 · 陷谷 · 太淵 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 石關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례

치료에 사용된 경맥은 足厥陰肝經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 · 손 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.77: 병증 <噫>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.78: 병증 <噫>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.115: 병증 <噫>에 사용된 경혈들

경혈	사용빈도 기준		G-Score 기준		
	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
石關	2	11.439	石關	2	11.439
蠡溝	2	11.126	蠡溝	2	11.126
陷谷	2	8.597	陷谷	2	8.597
太淵	2	6.389	太淵	2	6.389
極泉	1	4.727	極泉	1	4.727
溫溜	1	4.223	溫溜	1	4.223
少商	1	3.322	少商	1	3.322
鳩尾	1	3.154	鳩尾	1	3.154
少海	1	3.002	少海	1	3.002
神門	1	2.930	神門	1	2.930
大敦	1	2.615	大敦	1	2.615
太白	1	2.558	太白	1	2.558
勞宮	1	2.401	勞宮	1	2.401

期門	1	2.213	期門	1	2.213
太谿	1	1.731	太谿	1	1.731
章門	1	1.611	章門	1	1.611
足三里	1	1.265	足三里	1	1.265

표 2.116: 병증 <噫>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足厥陰肝經	5	4.391
足少陰腎經	3	6.585
足陽明胃經	3	4.931
手太陰肺經	3	4.855
手少陰心經	3	3.553
手陽明大腸經	1	4.223
任脈	1	3.154
足太陰脾經	1	2.558
手厥陰心包經	1	2.401

표 2.117: 병증 <噫>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	5	3.875
손	5	3.760
배	4	5.602
소퇴	3	6.196
하박	2	3.613
상박	1	4.727
옆구리	1	1.611

2.40 傷寒嘔噦

이 병증 치료에는 모두 10가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.1차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 腎俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 腎俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手厥陰心包經 · 任脈으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 · 배 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.79: 병증 <傷寒嘔噦>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.80: 병증 <傷寒嘔噦>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.118: 병증 <傷寒嘔噦>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
腎俞	2	8.344	腎俞	2	8.344
大椎	1	4.210	大椎	1	4.210
曲澤	1	4.063	曲澤	1	4.063
商丘	1	3.742	商丘	1	3.742
勞宮	1	3.574	勞宮	1	3.574
間使	1	3.326	間使	1	3.326
巨闕	1	2.812	巨闕	1	2.812
關元	1	2.650	關元	1	2.650
百會	1	2.532	百會	1	2.532
中脘	1	2.504	中脘	1	2.504

표 2.119: 병증 <傷寒嘔噦>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手厥陰心包經	3	3.654
任脈	3	2.655
足太陽膀胱經	2	8.344
督脈	2	3.371
足太陰脾經	1	3.742

표 2.120: 병증 <傷寒嘔噦>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	3	6.277
배	3	2.655
하박	2	3.695
발	1	3.742
손	1	3.574
머리	1	2.532

2.41 噫

이 병증 치료에는 모두 11가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.182차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 庫房 · 石關 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 庫房 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陰腎經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.6차례 사용되었다. 가장 여러

차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.81: 병증 <呻>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.82: 병증 <呻>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.121: 병증 <唾>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
庫房	2	13.668	庫房	2	13.668
石關	2	13.325	石關	2	13.325
周榮	1	6.359	周榮	1	6.359
日月	1	6.359	日月	1	6.359
紫宮	1	5.472	紫宮	1	5.472
幽門	1	5.303	幽門	1	5.303
少商	1	4.223	少商	1	4.223
曲澤	1	3.748	曲澤	1	3.748
天井	1	3.373	天井	1	3.373
中府	1	3.317	中府	1	3.317
百會	1	2.240	百會	1	2.240

표 2.122: 병증 <唾>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陰腎經	3	9.314
足陽明胃經	2	13.668
手太陰肺經	2	3.771
足太陰脾經	1	6.359
足少陽膽經	1	6.359
任脈	1	5.472
手厥陰心包經	1	3.748
手少陽三焦經	1	3.373
督脈	1	2.240

표 2.123: 병증 <唾>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균

가슴	5	7.204
배	4	8.329
하박	2	3.560
손	1	4.223
머리	1	2.240

2.42 胃痛

이 병증 치료에는 모두 11가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 水分 · 胃俞 · 足三里 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 水分 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.83: 병증 <胃痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.84: 병증 <胃痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.124: 병증 <胃痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
水分	2	10.483	水分	2	10.483
胃俞	2	10.317	胃俞	2	10.317
足三里	2	6.255	足三里	2	6.255
懸鍾	1	5.328	懸鍾	1	5.328
下脘	1	4.602	下脘	1	4.602
下廉	1	3.475	下廉	1	3.475
心俞	1	2.885	心俞	1	2.885
太淵	1	2.673	太淵	1	2.673
膈俞	1	2.595	膈俞	1	2.595
腎俞	1	2.451	腎俞	1	2.451
魚際	1	2.351	魚際	1	2.351

표 2.125: 병증 <胃痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	5	4.562
任脈	3	7.543
足陽明胃經	2	6.255
手太陰肺經	2	2.512
足少陽膽經	1	5.328
手陽明大腸經	1	3.475

표 2.126: 병증 <胃痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	5	4.562
배	3	7.543
소퇴	3	5.792

손	2	2.512
하박	1	3.475

2.43 反胃

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中庭 · 足三里 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 中庭 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 · 등 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.85: 병증 <反胃>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.86: 병증 <反胃>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.127: 병증 <反胃>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中庭	2	13.376	中庭	2	13.376
足三里	2	7.148	足三里	2	7.148
意舍	1	5.472	意舍	1	5.472
下脘	1	5.068	下脘	1	5.068
胃俞	1	4.287	胃俞	1	4.287
中府	1	3.628	中府	1	3.628
膈俞	1	3.030	膈俞	1	3.030
章門	1	2.713	章門	1	2.713
中脘	1	2.504	中脘	1	2.504

표 2.128: 병증 <反胃>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	4	6.983
足太陽膀胱經	3	4.263
足陽明胃經	2	7.148
手太陰肺經	1	3.628
足厥陰肝經	1	2.713

표 2.129: 병증 <反胃>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	3	8.502
등	3	4.263
소퇴	2	7.148
배	2	3.786
옆구리	1	2.713

2.44 食不下

이 병증 치료에는 모두 37가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.541차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 三焦俞 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 三焦俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 7.125차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 21차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 8.143차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 22차례 사용되었다.




그림 2.87: 병증 <食不下>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.88: 병증 <食不下>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.130: 병증 <食不下>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
三焦俞	5	19.3012	三焦俞	5	19.3012
中庭	3	12.8190	中庭	3	12.8190
中脘	3	4.7491	腹哀	2	11.8313
腹哀	2	11.8313	胃倉	2	10.2484
胃倉	2	10.2484	周榮	2	9.6513
周榮	2	9.6513	志室	2	7.2920
志室	2	7.2920	陽綱	2	7.0150
陽綱	2	7.0150	下脘	2	6.5199
下脘	2	6.5199	大腸俞	2	5.7052
大腸俞	2	5.7052	中脘	3	4.7491
三陰交	2	4.3943	三陰交	2	4.3943
太白	2	4.0590	梁門	1	4.1415
中府	2	3.8554	太白	2	4.0590

天樞	2	3.3222	中府	2	3.8554
足三里	2	1.6682	懸樞	1	3.7963
梁門	1	4.1415	膈關	1	3.7963
懸樞	1	3.7963	魂門	1	3.5075
膈關	1	3.7963	天樞	2	3.3222
魂門	1	3.5075	承滿	1	2.8526
承滿	1	2.8526	紫宮	1	2.6815
紫宮	1	2.6815	意舍	1	2.3863
意舍	1	2.3863	公孫	1	1.8329
公孫	1	1.8329	膽俞	1	1.8329
膽俞	1	1.8329	足三里	2	1.6682
內庭	1	1.6611	內庭	1	1.6611
少商	1	1.5830	少商	1	1.5830
胃俞	1	1.3744	胃俞	1	1.3744
厲兑	1	1.1973	厲兑	1	1.1973
勞宮	1	0.8341	勞宮	1	0.8341
上脘	1	0.8341	上脘	1	0.8341
期門	1	0.6956	期門	1	0.6956
心俞	1	0.6644	心俞	1	0.6644
膈俞	1	0.4783	膈俞	1	0.4783
腎俞	1	0.3928	腎俞	1	0.3928
石門	1	0.3370	石門	1	0.3370
魚際	1	0.3370	魚際	1	0.3370
章門	1	0.3032	章門	1	0.3032

표 2.131: 병증 <食不下>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	21	4.9227
任脈	11	4.6567
足太陰脾經	9	6.3537
足陽明胃經	8	2.4738
手太陰肺經	4	1.9251
足厥陰肝經	2	0.4994

督脈	1	3.7963
手厥陰心包經	1	0.8341

표 2.132: 병증 <食不下>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	22	4.8422
배	14	3.9204
가슴	8	7.2518
발	5	2.1876
소퇴	4	3.0312
손	3	0.9180
옆구리	1	0.3032

2.45 不能食

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.143차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 胃俞 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 胃俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.286차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.89: 병증 <不能食>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.90: 병증 <不能食>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.133: 병증 <不能食>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
胃俞	3	17.066	胃俞	3	17.066
維道	1	6.612	維道	1	6.612
率谷	1	5.068	率谷	1	5.068
豐隆	1	4.019	豐隆	1	4.019
大腸俞	1	3.922	大腸俞	1	3.922
少商	1	3.830	少商	1	3.830
水分	1	3.659	水分	1	3.659
中極	1	2.736	中極	1	2.736
脾俞	1	2.601	脾俞	1	2.601
膈俞	1	2.361	膈俞	1	2.361
涌泉	1	2.324	涌泉	1	2.324
石門	1	2.121	石門	1	2.121
然谷	1	2.059	然谷	1	2.059
足三里	1	1.690	足三里	1	1.690

표 2.134: 병증 <不能食>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	6.487
任脈	3	2.839
足少陽膽經	2	5.840
足陽明胃經	2	2.854
足少陰腎經	2	2.192
手太陰肺經	1	3.830

표 2.135: 병증 <不能食>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균

등	6	6.487
배	3	2.839
소퇴	2	2.854
발	2	2.192
옆구리	1	6.612
머리	1	5.068
손	1	3.830

2.46 不嗜食

이 병증 치료에는 모두 23가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.217차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 懸鍾 · 內庭 · 水分 · 脾俞 · 然谷 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 懸鍾 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 8차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 · 등 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.91: 병증 <不嗜食>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.92: 병증 <不嗜食>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.136: 병증 <不嗜食>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
懸鍾	2	10.656	懸鍾	2	10.656
內庭	2	8.350	內庭	2	8.350
水分	2	7.820	水分	2	7.820
脾俞	2	5.680	脾俞	2	5.680
然谷	2	4.576	然谷	2	4.576
幽門	1	3.830	幽門	1	3.830
陽綱	1	3.541	陽綱	1	3.541
地機	1	3.412	地機	1	3.412
下脘	1	3.293	下脘	1	3.293
胃俞	1	2.558	胃俞	1	2.558
隱白	1	2.486	隱白	1	2.486
厲兌	1	2.351	厲兌	1	2.351
小腸俞	1	2.351	小腸俞	1	2.351
陰陵泉	1	2.351	陰陵泉	1	2.351
下廉	1	2.228	下廉	1	2.228
中封	1	2.113	中封	1	2.113
心俞	1	1.690	心俞	1	1.690
天樞	1	1.690	天樞	1	1.690
肺俞	1	1.690	肺俞	1	1.690
照海	1	1.468	照海	1	1.468
曲泉	1	1.468	曲泉	1	1.468
肝俞	1	1.223	肝俞	1	1.223
章門	1	1.170	章門	1	1.170

표 2.137: 병증 <不嗜食>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	8	2.676
足陽明胃經	4	4.130

足少陰腎經	4	3.291
任脈	3	5.556
足太陰脾經	3	2.750
足厥陰肝經	3	1.584
足少陽膽經	2	10.656
手陽明大腸經	1	2.228

표 2.138: 병증 <不嗜食>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	8	3.558
등	8	2.676
소퇴	5	4.472
배	5	4.158
하박	1	2.228
옆구리	1	1.170

2.47 食氣

이 병증 치료에는 모두 5가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 少商 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 1차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 1차례 사용되었다.




그림 2.93: 병증 <食氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.94: 병증 <食氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.139: 병증 <食氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
少商	1	6.077	少商	1	6.077
大杼	1	5.986	大杼	1	5.986
百會	1	3.982	百會	1	3.982
中脘	1	3.952	中脘	1	3.952
足三里	1	3.753	足三里	1	3.753

표 2.140: 병증 <食氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陰肺經	1	6.077
足太陽膀胱經	1	5.986
督脈	1	3.982
任脈	1	3.952
足陽明胃經	1	3.753

표 2.141: 병증 <食氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	1	6.077
등	1	5.986
머리	1	3.982
배	1	3.952
소퇴	1	3.753

2.48 食多

이 병증 치료에는 모두 4가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脾俞 · 腎俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 脾俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 1가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 1가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 6차례 사용되었다.




그림 2.95: 병증 <食多>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.96: 병증 <食多>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.142: 병증 <食多>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
脾俞	2	11.534	脾俞	2	11.534
腎俞	2	10.681	腎俞	2	10.681
大腸俞	1	5.815	大腸俞	1	5.815
胃俞	1	5.459	胃俞	1	5.459

표 2.143: 병증 <食多>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	8.372

표 2.144: 병증 <食多>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	6	8.372

2.49 瘰

이 병증 치료에는 모두 69가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.696차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 譙譙 · 偏歷 · 陷谷 · 液門 · 三間 · 列缺 · 前谷 · 陽谷 · 太谿 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 譙譙 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 14가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 8.357차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 17차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 13차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 · 발 부위이며 모두 31차례 사용되었다.




그림 2.97: 병증 <瘡>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.98: 병증 <瘡>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.145: 병증 <瘻>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
諳諳	3	6.6384	諳諳	3	6.6384
偏歷	3	6.6384	偏歷	3	6.6384
陷谷	3	5.7523	陰都	2	6.4242
液門	3	5.7523	陷谷	3	5.7523
三間	3	5.1923	液門	3	5.7523
列缺	3	4.4064	命門	2	5.6116
前谷	3	3.8798	三間	3	5.1923
陽谷	3	3.6440	腰俞	2	4.9623
太谿	3	2.4377	神道	2	4.4256
陰都	2	6.4242	列缺	3	4.4064
命門	2	5.6116	前谷	3	3.8798
腰俞	2	4.9623	陽谷	3	3.6440
神道	2	4.4256	商陽	2	3.2388
商陽	2	3.2388	內庭	2	3.2388
內庭	2	3.2388	陽池	1	3.2121
至陰	2	3.0837	至陰	2	3.0837
少澤	2	3.0837	少澤	2	3.0837
俠谿	2	3.0837	俠谿	2	3.0837
少商	2	3.0837	少商	2	3.0837
大杼	2	2.9376	大杼	2	2.9376
飛揚	2	2.9376	飛揚	2	2.9376
中渚	2	2.7998	中渚	2	2.7998
經渠	2	2.7998	經渠	2	2.7998
大椎	2	2.5462	大椎	2	2.5462
後谿	2	2.5462	後谿	2	2.5462
少海	2	2.5462	少海	2	2.5462
厲兌	2	2.3183	太谿	3	2.4377
衝陽	2	2.2128	厲兌	2	2.3183
上星	2	2.1125	衝陽	2	2.2128
腕骨	2	2.0168	上星	2	2.1125
合谷	2	1.9257	腕骨	2	2.0168

陽谿	2	1.9257	合谷	2	1.9257
商丘	2	1.8387	陽谿	2	1.9257
天樞	2	1.2660	商丘	2	1.8387
風池	2	1.2660	光明	1	1.7902
照海	2	0.9469	上髎	1	1.6194
崑崙	2	0.6964	白環俞	1	1.3348
百會	2	0.3927	天樞	2	1.2660
中脘	2	0.3686	風池	2	1.2660
陽池	1	3.2121	小海	1	1.2147
光明	1	1.7902	陶道	1	1.2147
上髎	1	1.6194	少府	1	1.1064
白環俞	1	1.3348	照海	2	0.9469
小海	1	1.2147	支正	1	0.9193
陶道	1	1.2147	束骨	1	0.8381
少府	1	1.1064	天府	1	0.8381
支正	1	0.9193	公孫	1	0.7637
束骨	1	0.8381	崑崙	2	0.6964
天府	1	0.8381	天池	1	0.6956
公孫	1	0.7637	丘墟	1	0.5754
天池	1	0.6956	大鐘	1	0.5754
丘墟	1	0.5754	京骨	1	0.4283
大鐘	1	0.5754	神庭	1	0.4283
京骨	1	0.4283	百會	2	0.3927
神庭	1	0.4283	中脘	2	0.3686
神門	1	0.3482	神門	1	0.3482
少衝	1	0.3482	少衝	1	0.3482
上廉	1	0.3127	上廉	1	0.3127
中封	1	0.1963	中封	1	0.1963
完骨	1	0.1963	完骨	1	0.1963
天井	1	0.1513	天井	1	0.1513
足三里	1	0.1268	足三里	1	0.1268
大陵	1	0.0824	大陵	1	0.0824
脾俞	1	0.0370	脾俞	1	0.0370
復溜	1	0.0288	復溜	1	0.0288
然谷	1	0.0133	然谷	1	0.0133

太淵	1	0.0108	太淵	1	0.0108
足臨泣	1	0.0108	足臨泣	1	0.0108
膈俞	1	0.0038	膈俞	1	0.0038

표 2.146: 병증 <瘧>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	17	1.8686
督脈	14	2.7117
手太陽小腸經	14	2.4721
手陽明大腸經	13	3.2056
足陽明胃經	12	2.4858
足少陰腎經	10	1.7377
手太陰肺經	9	2.2277
足少陽膽經	8	1.1537
手少陽三焦經	7	2.9788
手少陰心經	5	1.0872
足太陰脾經	3	1.3012
手厥陰心包經	2	0.3890
任脈	2	0.3686
足厥陰肝經	1	0.1963

표 2.147: 병증 <瘧>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	31	2.3855
발	31	1.5284
등	18	2.8483
하박	17	2.5147
머리	8	0.8791
배	6	2.6863
소퇴	4	1.6182
상박	1	0.8381

옆구리	1	0.6956
-----	---	--------

2.50 脾疼

이 병증 치료에는 모두 3가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 府舍 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 1가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 1차례 사용되었다.




그림 2.99: 병증 <脾疼>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.100: 병증 <脾疼>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.148: 병증 <脾疼>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
府舍	1	9.575	府舍	1	9.575
三陰交	1	6.447	三陰交	1	6.447
商丘	1	6.253	商丘	1	6.253

표 2.149: 병증 <脾疼>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	3	7.425

표 2.150: 병증 <脾疼>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	1	9.575
소퇴	1	6.447
발	1	6.253

2.51 心痛

이 병증 치료에는 모두 61가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 2.033차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中脘 혈(穴)로 모두 7차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 4차례 사용된 建里 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 9.538차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 34차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 13.78차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 37차례 사용되었다.




그림 2.101: 병증 <心痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.102: 병증 <心痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.151: 병증 <心痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中脘	7	11.8683	建里	4	17.6279
巨闕	6	10.3548	中脘	7	11.8683
然谷	5	6.7566	巨闕	6	10.3548
建里	4	17.6279	鳩尾	4	9.8152
鳩尾	4	9.8152	俠白	2	8.8140
行間	4	5.6571	然谷	5	6.7566
足臨泣	4	5.3782	鄰門	2	6.7026
太谿	4	4.5182	靈道	2	6.2109
曲澤	3	5.0864	陰郄	2	5.7821
天井	3	4.1367	行間	4	5.6571
膻中	3	3.8684	足臨泣	4	5.3782
上脘	3	3.8684	曲澤	3	5.0864
大陵	3	3.6197	太谿	4	4.5182
期門	3	3.3886	督俞	1	4.4070
心俞	3	3.2791	天井	3	4.1367
太淵	3	2.7843	大都	2	3.9931
膈俞	3	2.6081	中衝	2	3.9931
俠白	2	8.8140	膻中	3	3.8684
鄰門	2	6.7026	上脘	3	3.8684
靈道	2	6.2109	大陵	3	3.6197
陰郄	2	5.7821	期門	3	3.3886
大都	2	3.9931	心俞	3	3.2791
中衝	2	3.9931	腹結	1	3.1054
少衝	2	2.2591	外陵	1	3.1054
足通谷	2	2.1505	天泉	1	3.1054
太白	2	1.6828	太淵	3	2.7843
間使	2	1.1292	膈俞	3	2.6081
涌泉	2	0.7390	厥陰俞	1	2.3793
魚際	2	0.5221	少衝	2	2.2591
石門	2	0.5221	足通谷	2	2.1505
肝俞	2	0.5221	太白	2	1.6828

章門	2	0.4614	極泉	1	1.5271
督俞	1	4.4070	內關	1	1.3789
腹結	1	3.1054	幽門	1	1.2472
外陵	1	3.1054	不容	1	1.2472
天泉	1	3.1054	間使	2	1.1292
厥陰俞	1	2.3793	長強	1	0.9281
極泉	1	1.5271	下脘	1	0.8414
內關	1	1.3789	齦交	1	0.7625
幽門	1	1.2472	涌泉	2	0.7390
不容	1	1.2472	魚際	2	0.5221
長強	1	0.9281	石門	2	0.5221
下脘	1	0.8414	肝俞	2	0.5221
齦交	1	0.7625	雲門	1	0.5094
雲門	1	0.5094	章門	2	0.4614
神闕	1	0.3695	神闕	1	0.3695
京骨	1	0.3695	京骨	1	0.3695
支溝	1	0.2942	支溝	1	0.2942
神門	1	0.2942	神門	1	0.2942
氣海	1	0.2611	氣海	1	0.2611
大敦	1	0.1543	大敦	1	0.1543
合谷	1	0.1543	合谷	1	0.1543
商丘	1	0.1332	商丘	1	0.1332
尺澤	1	0.1140	尺澤	1	0.1140
天突	1	0.1140	天突	1	0.1140
水溝	1	0.0811	水溝	1	0.0811
關元	1	0.0456	關元	1	0.0456
復溜	1	0.0131	復溜	1	0.0131
崑崙	1	0.0097	崑崙	1	0.0097
太衝	1	0.0062	太衝	1	0.0062
腎俞	1	0.0062	腎俞	1	0.0062

표 2.152: 병증 <心痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
--------	---------	------------

任脈	34	4.9630
足太陽膀胱經	15	1.7479
手厥陰心包經	14	3.5736
足少陰腎經	13	2.6548
足厥陰肝經	11	1.9335
手太陰肺經	9	2.5488
手少陰心經	8	3.2147
足太陰脾經	6	2.2286
足少陽膽經	4	5.3782
手少陽三焦經	4	2.2154
督脈	3	0.5906
足陽明胃經	2	2.1763
手陽明大腸經	1	0.1543

표 2.153: 병증 <心痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	37	4.5112
발	31	2.2544
하박	17	3.4261
손	14	1.9467
등	12	2.0186
가슴	5	1.4973
상박	4	4.4822
옆구리	2	0.4614
얼굴	2	0.4218

2.52 心恍惚

이 병증 치료에는 모두 10가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 隅都 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.103: 병증 <心恍惚>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.104: 병증 <心恍惚>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.154: 병증 <心恍惚>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
陰都	1	6.612	陰都	1	6.612
神道	1	5.514	神道	1	5.514
腦戶	1	4.637	腦戶	1	4.637
衝陽	1	4.175	衝陽	1	4.175
天井	1	3.864	天井	1	3.864
心俞	1	3.503	心俞	1	3.503
天樞	1	3.503	天樞	1	3.503
太谿	1	3.019	太谿	1	3.019
巨闕	1	2.985	巨闕	1	2.985
百會	1	2.701	百會	1	2.701

표 2.155: 병증 <心恍惚>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	3	4.284
足少陰腎經	2	4.816
足陽明胃經	2	3.839
手少陽三焦經	1	3.864
足太陽膀胱經	1	3.503
任脈	1	2.985

표 2.156: 병증 <心恍惚>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	3	4.367
등	2	4.508
머리	2	3.669
발	2	3.597
하박	1	3.864

2.53 心驚恐

이 병증 치료에는 모두 48가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 廉兌 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 廉兌 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 14가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.143차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手少陰心經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.545차례 사용되었다. 가장

여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박·손 부위이며 모두 16차례 사용되었다.




그림 2.105: 병증 <心驚恐>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.106: 병증 <心驚恐>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.157: 병증 <心驚恐>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
厲兌	4	12.5710	厲兌	4	12.5710
少衝	3	8.0701	鄰門	2	8.7527
神門	3	8.0701	梁丘	2	8.2432
曲澤	3	7.8683	少衝	3	8.0701
鄰門	2	8.7527	神門	3	8.0701
梁丘	2	8.2432	曲澤	3	7.8683
陰鄰	2	7.7966	陰鄰	2	7.7966
大巨	2	7.3998	大巨	2	7.3998
少府	2	6.1523	少府	2	6.1523
大鐘	2	4.7027	大鐘	2	4.7027
神庭	2	4.2424	神庭	2	4.2424
液門	2	4.1038	液門	2	4.1038
天井	2	3.1901	大橫	1	3.6999
上腕	2	3.0039	天井	2	3.1901
大陵	2	2.8309	彧中	1	3.0762
間使	2	2.5928	上腕	2	3.0039
照海	2	2.1814	靈道	1	2.8337
巨闕	2	1.7871	天衝	1	2.8337
然谷	2	1.6407	瘻脈	1	2.8337
大橫	1	3.6999	大陵	2	2.8309
彧中	1	3.0762	間使	2	2.5928
靈道	1	2.8337	二間	1	2.2706
天衝	1	2.8337	內關	1	2.2706
瘻脈	1	2.8337	照海	2	2.1814
二間	1	2.2706	手五里	1	1.9857
內關	1	2.2706	蠡溝	1	1.9857
手五里	1	1.9857	神道	1	1.8621
蠡溝	1	1.9857	巨闕	2	1.7871
神道	1	1.8621	長強	1	1.7487
長強	1	1.7487	支正	1	1.6443
支正	1	1.6443	然谷	2	1.6407

腦空	1	1.4579	腦空	1	1.4579
通里	1	1.4579	通里	1	1.4579
鳩尾	1	1.0907	鳩尾	1	1.0907
京骨	1	1.0302	京骨	1	1.0302
陽陵泉	1	0.9732	陽陵泉	1	0.9732
氣海	1	0.8685	氣海	1	0.8685
足通谷	1	0.8685	足通谷	1	0.8685
風府	1	0.8685	風府	1	0.8685
三間	1	0.8203	三間	1	0.8203
下廉	1	0.7748	下廉	1	0.7748
解谿	1	0.7316	解谿	1	0.7316
合谷	1	0.6906	合谷	1	0.6906
陰交	1	0.6517	陰交	1	0.6517
行間	1	0.3314	行間	1	0.3314
魚際	1	0.1466	魚際	1	0.1466
章門	1	0.1230	章門	1	0.1230
百會	1	0.0671	百會	1	0.0671

표 2.158: 병증 <心驚恐>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手少陰心經	12	5.7301
手厥陰心包經	10	4.8631
足陽明胃經	9	7.2364
足少陰腎經	7	2.9003
任脈	7	1.4804
督脈	6	1.7578
手少陽三焦經	5	3.3758
手陽明大腸經	5	1.3084
足少陽膽經	3	1.7549
足厥陰肝經	3	0.8134
足太陽膀胱經	2	0.9493
足太陰脾經	1	3.6999
手太陽小腸經	1	1.6443

手太陰肺經	1	0.1466
-------	---	--------

표 2.159: 병증 <心驚恐>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	16	3.918
손	16	3.684
발	14	3.007
배	10	2.643
머리	7	2.051
대퇴	2	8.243
등	2	1.805
소퇴	2	1.480
가슴	1	3.076
상박	1	1.986
옆구리	1	0.123

2.54 心喜笑

이 병증 치료에는 모두 11가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 勞宮 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 勞宮 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手厥陰心包經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.107: 병증 <心喜笑>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.108: 병증 <心喜笑>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.160: 병증 <心喜笑>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
勞宮	3	15.640	勞宮	3	15.640
大陵	2	8.648	大陵	2	8.648
身柱	1	5.950	身柱	1	5.950
神門	1	3.679	神門	1	3.679
陽谿	1	3.351	陽谿	1	3.351
列缺	1	3.236	列缺	1	3.236
水溝	1	3.128	水溝	1	3.128
陽谷	1	2.930	陽谷	1	2.930
復溜	1	2.797	復溜	1	2.797
肝俞	1	2.351	肝俞	1	2.351
魚際	1	2.351	魚際	1	2.351

표 2.161: 병증 <心喜笑>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手厥陰心包經	5	12.144
督脈	2	4.539
手太陰肺經	2	2.794
手少陰心經	1	3.679
手陽明大腸經	1	3.351
手太陽小腸經	1	2.930
足少陰腎經	1	2.797
足太陽膀胱經	1	2.351

표 2.162: 병증 <心喜笑>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	8	6.734

등	2	4.151
하박	2	3.083
얼굴	1	3.128
발	1	2.797

2.55 心氣

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.294차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 百會 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 百會 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈 · 足太陽膀胱經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.109: 병증 <心氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.110: 병증 <心氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.163: 병증 <心氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
百會	4	15.207	百會	4	15.207
列缺	2	7.369	列缺	2	7.369
心俞	2	6.652	心俞	2	6.652
大橫	1	5.986	大橫	1	5.986
膏肓	1	5.629	膏肓	1	5.629
內關	1	4.454	內關	1	4.454
幽門	1	4.287	幽門	1	4.287
委陽	1	4.135	委陽	1	4.135
神道	1	3.994	神道	1	3.994
中衝	1	3.864	中衝	1	3.864
天府	1	3.628	天府	1	3.628
鳩尾	1	3.069	鳩尾	1	3.069
足通谷	1	2.778	足通谷	1	2.778
上腕	1	2.320	上腕	1	2.320
曲池	1	1.820	曲池	1	1.820
太谿	1	1.655	太谿	1	1.655
巨闕	1	1.625	巨闕	1	1.625

표 2.164: 병증 <心氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	5	9.601
足太陽膀胱經	5	4.798
手太陰肺經	3	5.498
任脈	3	2.338
手厥陰心包經	2	4.159
足少陰腎經	2	2.971
足太陰脾經	1	5.986
手陽明大腸經	1	1.820

표 2.165: 병증 <心氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	5	3.457
머리	4	15.207
등	4	5.425
하박	4	4.548
발	2	2.217
소퇴	1	4.135
손	1	3.864
상박	1	3.628

2.56 心憂悲

이 병증 치료에는 모두 24가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 神道 · 天井 · 勞宮 · 心俞 · 照海 · 百會 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 神道 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈 · 手厥陰心包經 · 手少陰心經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.111: 병증 <心憂悲>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.112: 병증 <心憂悲>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.166: 병증 <心憂悲>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
神道	2	9.453	神道	2	9.453
天井	2	6.218	天井	2	6.218
勞宮	2	6.003	勞宮	2	6.003
心俞	2	5.521	心俞	2	5.521
照海	2	5.023	大橫	1	5.379
百會	2	3.993	照海	2	5.023
大橫	1	5.379	日月	1	4.727
日月	1	4.727	靈道	1	4.470
靈道	1	4.470	百會	2	3.993
頰車	1	3.412	頰車	1	3.412
少府	1	3.412	少府	1	3.412
漏谷	1	3.412	漏谷	1	3.412
中衝	1	3.284	中衝	1	3.284
支正	1	3.166	支正	1	3.166
通里	1	2.950	通里	1	2.950
承漿	1	2.511	承漿	1	2.511
少衝	1	2.297	少衝	1	2.297
神門	1	2.297	神門	1	2.297
解谿	1	2.052	解谿	1	2.052
商丘	1	1.943	商丘	1	1.943
水溝	1	1.795	水溝	1	1.795
大陵	1	1.704	大陵	1	1.704
間使	1	1.579	間使	1	1.579
行間	1	1.465	行間	1	1.465

표 2.167: 병증 <心憂悲>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	5	5.080

手厥陰心包經	5	3.143
手少陰心經	5	3.085
足太陰脾經	3	3.578
手少陽三焦經	2	6.218
足太陽膀胱經	2	5.521
足少陰腎經	2	5.023
足陽明胃經	2	2.732
足少陽膽經	1	4.727
手太陽小腸經	1	3.166
任脈	1	2.511
足厥陰肝經	1	1.465

표 2.168: 병증 <心憂悲>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	7	3.166
하박	6	3.677
발	5	2.621
등	4	7.487
얼굴	3	2.573
배	2	5.053
머리	2	3.993
소퇴	1	3.412

2.57 數息

이 병증 치료에는 모두 6가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 公孫 · 行間 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 公孫 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례

치료에 사용된 경맥은 足太陰脾經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.113: 병증 <叙述>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.114: 병증 <歎息>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.169: 병증 <歎息>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
公孫	2	13.641	公孫	2	13.641
行間	2	10.226	行間	2	10.226
日月	1	7.317	日月	1	7.317
丘墟	1	5.159	丘墟	1	5.159
少衝	1	4.745	少衝	1	4.745
商丘	1	4.346	商丘	1	4.346

표 2.170: 병증 <歎息>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	3	8.993

足厥陰肝經	2	10.226
足少陽膽經	2	6.238
手少陰心經	1	4.745

표 2.171: 병증 <歎息>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	6	8.343
배	1	7.317
손	1	4.745

2.58 心煩悶

이 병증 치료에는 모두 29가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.414차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 巨闕 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 巨闕 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.154차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.857차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 · 배 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.115: 병증 <心煩悶>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.116: 병증 <心煩悶>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.172: 병증 <心煩悶>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
巨闕	4	11.7584	巨闕	4	11.7584
百會	3	6.4634	玉堂	2	9.5462
玉堂	2	9.5462	紫宮	2	9.1790
紫宮	2	9.1790	曲差	2	8.2564
曲差	2	8.2564	公孫	2	7.3072
公孫	2	7.3072	百會	3	6.4634
完骨	2	5.3149	完骨	2	5.3149
上腕	2	4.8855	上腕	2	4.8855
魚際	2	3.4172	陰都	1	3.8751
陰都	1	3.8751	承光	1	3.4569
承光	1	3.4569	魚際	2	3.4172
內關	1	3.2803	內關	1	3.2803
幽門	1	3.1203	幽門	1	3.1203
強間	1	2.9742	強間	1	2.9742
通里	1	2.3934	通里	1	2.3934
至陰	1	2.1271	至陰	1	2.1271
少澤	1	2.1271	少澤	1	2.1271
少商	1	2.1271	少商	1	2.1271
關衝	1	2.0481	關衝	1	2.0481
神門	1	1.7701	神門	1	1.7701
少衝	1	1.7701	少衝	1	1.7701
曲澤	1	1.7086	曲澤	1	1.7086
解谿	1	1.5399	解谿	1	1.5399
陽谿	1	1.4883	陽谿	1	1.4883
尺澤	1	1.3913	尺澤	1	1.3913
心俞	1	1.1047	心俞	1	1.1047
足臨泣	1	0.9392	足臨泣	1	0.9392
膈俞	1	0.8802	膈俞	1	0.8802
中脘	1	0.5184	中脘	1	0.5184

표 2.173: 병증 <心煩悶>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	11	7.178
足太陽膀胱經	6	3.165
督脈	4	4.719
手太陰肺經	4	2.312
足少陽膽經	3	3.127
手少陰心經	3	1.978
足太陰脾經	2	7.307
足少陰腎經	2	3.498
手厥陰心包經	2	2.494
手太陽小腸經	1	2.127
手少陽三焦經	1	2.048
足陽明胃經	1	1.540
手陽明大腸經	1	1.488

표 2.174: 병증 <心煩悶>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	9	5.2932
배	9	4.8316
손	8	2.1069
발	5	2.9784
가슴	4	9.3626
하박	4	2.1934
등	2	0.9924

2.59 膽虛

이 병증 치료에는 모두 2가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 三陰交 혈(穴)이 가장 높게

평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 1차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 1차례 사용되었다.




그림 2.117: 병증 <膽虛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.118: 병증 <膽虛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.175: 병증 <膽虛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
三陰交	1	7.248	三陰交	1	7.248
中府	1	6.933	中府	1	6.933

표 2.176: 병증 <膽虛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	1	7.248
手太陰肺經	1	6.933

표 2.177: 병증 <膽虛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	1	7.248
가슴	1	6.933

2.60 嗜臥

이 병증 치료에는 모두 15가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 三陽絡 · 二間 · 肾兌 · 照海 · 脾俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 三陽絡 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.857차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經 · 足少陰腎經 · 足太陽膀胱經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.119: 병증 <嗜臥>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.120: 병증 <嗜臥>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.178: 병증 <嗜臥>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
三陽絡	2	14.362	三陽絡	2	14.362
二閭	2	11.971	二閭	2	11.971
厲兌	2	8.489	厲兌	2	8.489
照海	2	6.488	照海	2	6.488
膈俞	2	6.409	膈俞	2	6.409
手五里	1	4.317	手五里	1	4.317
大鐘	1	3.412	大鐘	1	3.412
頤會	1	3.326	頤會	1	3.326
三間	1	2.885	三間	1	2.885
大敦	1	2.701	大敦	1	2.701
天井	1	2.590	天井	1	2.590
脾俞	1	2.211	脾俞	1	2.211
腎俞	1	1.843	腎俞	1	1.843
太谿	1	1.811	太谿	1	1.811
百會	1	1.527	百會	1	1.527

표 2.179: 병증 <嗜臥>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	4	6.391
足少陰腎經	4	3.903
足太陽膀胱經	4	3.487
手少陽三焦經	3	8.476
足陽明胃經	2	8.489
督脈	2	2.426
足厥陰肝經	1	2.701

표 2.180: 병증 <嗜臥>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	7	4.580
등	4	3.487
하박	3	8.476
손	3	7.428
머리	2	2.426
상박	1	4.317

2.61 不臥

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.15차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 神庭 · 隱白 · 太淵 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 神庭 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.875차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陰脾經 · 足太陽膀胱經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.121: 병증 <不臥>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.122: 병증 <不臥>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.181: 병증 <不臥>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
神庭	2	8.405	神庭	2	8.405
隱白	2	8.250	隱白	2	8.250
太淵	2	6.056	太淵	2	6.056
條口	1	5.542	條口	1	5.542
大巨	1	4.551	大巨	1	4.551
白環俞	1	4.203	白環俞	1	4.203
環跳	1	4.050	環跳	1	4.050
天府	1	3.545	天府	1	3.545
公孫	1	3.439	公孫	1	3.439
諺譴	1	3.154	諺譴	1	3.154
攢竹	1	2.988	攢竹	1	2.988
大椎	1	2.837	大椎	1	2.837
氣海	1	2.699	氣海	1	2.699
陰陵泉	1	2.699	陰陵泉	1	2.699
氣衝	1	2.634	氣衝	1	2.634
陰交	1	2.398	陰交	1	2.398
上脘	1	2.243	上脘	1	2.243
期門	1	2.058	期門	1	2.058
肺俞	1	2.015	肺俞	1	2.015
章門	1	1.468	章門	1	1.468

표 2.182: 병증 <不臥>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	4	4.796
足太陽膀胱經	4	3.090
督脈	3	5.621
手太陰肺經	3	4.801
足陽明胃經	3	4.242

任脈	3	2.446
足厥陰肝經	2	1.763
足少陽膽經	1	4.050

표 2.183: 병증 <不臥>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	6	2.764
등	4	3.052
발	3	5.844
머리	2	8.405
손	2	6.056
소퇴	2	4.120
대퇴	1	4.050
상박	1	3.545
얼굴	1	2.988
옆구리	1	1.468

2.62 夢魘

이 병증 치료에는 모두 2가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 天牖 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 1차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 1차례 사용되었다.




그림 2.123: 병증 <夢魘>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.124: 병증 <夢魘>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.184: 병증 <夢魘>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
天牖	1	7.985	天牖	1	7.985
商丘	1	7.053	商丘	1	7.053

표 2.185: 병증 <夢魘>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手少陽三焦經	1	7.985
足太陰脾經	1	7.053

표 2.186: 병증 <夢魘>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
목	1	7.985
발	1	7.053

2.63 癲邪

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.143차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 間使 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 間使 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手厥陰心包經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.778차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.125: 병증 <癲邪>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.126: 병증 <癲邪>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.187: 병증 <癲邪>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
間使	3	14.089	間使	3	14.089
溫溜	1	4.745	溫溜	1	4.745
天府	1	4.230	天府	1	4.230
僕參	1	4.230	僕參	1	4.230
天窓	1	4.122	天窓	1	4.122
承漿	1	3.659	承漿	1	3.659
攢竹	1	3.659	攢竹	1	3.659
風府	1	3.360	風府	1	3.360
陽谿	1	3.105	陽谿	1	3.105
尺澤	1	2.991	尺澤	1	2.991
勞宮	1	2.885	勞宮	1	2.885
水溝	1	2.885	水溝	1	2.885
心俞	1	2.645	心俞	1	2.645

足三里	1	1.690	足三里	1	1.690
-----	---	-------	-----	---	-------

표 2.188: 병증 <癲邪>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手厥陰心包經	4	8.487
足太陽膀胱經	3	3.511
手陽明大腸經	2	3.925
手太陰肺經	2	3.611
督脈	2	3.122
手太陽小腸經	1	4.122
任脈	1	3.659
足陽明胃經	1	1.690

표 2.189: 병증 <癲邪>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	5	7.275
얼굴	3	3.401
손	2	2.995
발	1	4.230
상박	1	4.230
목	1	4.122
머리	1	3.360
등	1	2.645
소퇴	1	1.690

2.64 癲狂

이 병증 치료에는 모두 64가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.469차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 陽谷 혈(穴)로 모두 6차례 사용되었다. 그러나 이와 달리

연관성(G-Score 기준) 측면에서는 4차례 사용된 筋縮 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 14가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.714차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 15차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 8.545차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 18차례 사용되었다.




그림 2.127: 병증 <癫狂>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.128: 병증 <癫狂>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.190: 병증 <癫狂>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
陽谷	6	16.3662	筋縮	4	16.6466
筋縮	4	16.6466	陽谷	6	16.3662
衝陽	4	10.3822	衝陽	4	10.3822
液門	3	6.8690	身柱	2	7.2368
間使	3	4.5309	液門	3	6.8690
身柱	2	7.2368	築賓	2	6.7978
築賓	2	6.7978	支正	2	4.7212
支正	2	4.7212	間使	3	4.5309
僕參	2	4.5108	僕參	2	4.5108
攢竹	2	3.4945	滑肉門	1	4.1616
京骨	2	3.3564	攢竹	2	3.4945
少海	2	3.2252	京骨	2	3.3564
神門	2	3.1004	少海	2	3.2252

風府	2	2.9816	神門	2	3.1004
下廉	2	2.7600	風府	2	2.9816
腕骨	2	2.6565	膏肓	1	2.8717
陽谿	2	2.5575	下廉	2	2.7600
水溝	2	2.2006	腕骨	2	2.6565
大陵	2	2.0425	日月	1	2.5955
巨闕	2	1.1191	陽谿	2	2.5575
滑肉門	1	4.1616	伏兔	1	2.3606
膏肓	1	2.8717	水溝	2	2.2006
日月	1	2.5955	光明	1	2.1572
伏兔	1	2.3606	陽交	1	2.1572
光明	1	2.1572	大陵	2	2.0425
陽交	1	2.1572	絡却	1	1.9786
絡却	1	1.9786	絲竹空	1	1.8201
絲竹空	1	1.8201	強間	1	1.5502
強間	1	1.5502	小海	1	1.5502
小海	1	1.5502	聽會	1	1.4341
聽會	1	1.4341	長強	1	1.3283
長強	1	1.3283	束骨	1	1.1422
束骨	1	1.1422	巨闕	2	1.1191
後頂	1	1.0600	後頂	1	1.0600
腦空	1	1.0600	腦空	1	1.0600
公孫	1	1.0600	公孫	1	1.0600
天窓	1	1.0600	天窓	1	1.0600
申脈	1	0.9840	申脈	1	0.9840
豐隆	1	0.9840	豐隆	1	0.9840
玉枕	1	0.9135	玉枕	1	0.9135
曲骨	1	0.8481	曲骨	1	0.8481
偏歷	1	0.8481	偏歷	1	0.8481
丘墟	1	0.8481	丘墟	1	0.8481
腦戶	1	0.7872	腦戶	1	0.7872
飛揚	1	0.7872	飛揚	1	0.7872
鳩尾	1	0.7304	鳩尾	1	0.7304
陰谷	1	0.6774	陰谷	1	0.6774
天柱	1	0.5382	天柱	1	0.5382

大敦	1	0.3904	大敦	1	0.3904
合谷	1	0.3904	合谷	1	0.3904
勞宮	1	0.2762	勞宮	1	0.2762
天樞	1	0.1698	天樞	1	0.1698
心俞	1	0.1698	心俞	1	0.1698
肺俞	1	0.1698	肺俞	1	0.1698
風池	1	0.1698	風池	1	0.1698
行間	1	0.1215	行間	1	0.1215
足臨泣	1	0.0948	足臨泣	1	0.0948
太淵	1	0.0948	太淵	1	0.0948
曲泉	1	0.0830	曲泉	1	0.0830
照海	1	0.0830	照海	1	0.0830
曲池	1	0.0721	曲池	1	0.0721
魚際	1	0.0193	魚際	1	0.0193
足三里	1	0.0143	足三里	1	0.0143
章門	1	0.0108	章門	1	0.0108

표 2.191: 병증 <癫狂>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	15	1.7431
督脈	14	4.2239
手太陽小腸經	12	5.2708
足陽明胃經	9	3.0121
足少陽膽經	8	1.3146
手陽明大腸經	7	1.3256
手厥陰心包經	6	2.2832
手少陽三焦經	4	4.3446
手少陰心經	4	3.1628
足少陰腎經	4	2.5194
任脈	4	0.8992
足厥陰肝經	4	0.1514
手太陰肺經	2	0.0571
足太陰脾經	1	1.0600

표 2.192: 병증 <癲狂>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	18	4.2592
발	16	2.0885
손	15	2.0008
등	10	4.7371
머리	10	1.2266
소퇴	9	1.7072
배	7	1.6041
얼굴	6	2.2373
대퇴	1	2.3606
목	1	1.0600
옆구리	1	0.0108

2.65 癲癇瘓癰

이 병증 치료에는 모두 39가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.282차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 身柱 · 少澤 · 崑崙 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 身柱 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.545차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈 · 足太陽膀胱經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.129: 병증 <癲癇瘻癰>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.130: 병증 <癰瘍瘻瘻>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.193: 병증 <癫癇瘓癰>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
身柱	3	16.8268	身柱	3	16.8268
少澤	3	11.2585	少澤	3	11.2585
崑崙	3	6.3479	命門	2	8.7832
命門	2	8.7832	五處	2	8.0881
五處	2	8.0881	聽會	2	7.5057
聽會	2	7.5057	崑崙	3	6.3479
上關	2	5.2346	上關	2	5.2346
天井	2	4.4005	天井	2	4.4005
屋翳	1	4.3916	屋翳	1	4.3916
帶脈	1	4.3916	帶脈	1	4.3916
瘼脈	1	3.5029	瘼脈	1	3.5029
聽宮	1	3.0907	聽宮	1	3.0907
絡却	1	3.0907	絡却	1	3.0907
跗陽	1	2.9172	跗陽	1	2.9172
委陽	1	2.6173	委陽	1	2.6173
強間	1	2.6173	強間	1	2.6173
小海	1	2.6173	小海	1	2.6173
巨髎	1	2.4862	巨髎	1	2.4862
顱息	1	2.4862	顱息	1	2.4862
齒門	1	2.2533	齒門	1	2.2533
後頂	1	2.0519	後頂	1	2.0519
翳風	1	1.9608	翳風	1	1.9608
腦戶	1	1.7189	腦戶	1	1.7189
大杼	1	1.7189	大杼	1	1.7189
承筋	1	1.7189	承筋	1	1.7189
前頂	1	1.6471	前頂	1	1.6471
攢竹	1	1.6471	攢竹	1	1.6471
大椎	1	1.5145	大椎	1	1.5145
風府	1	1.3947	風府	1	1.3947
曲澤	1	1.3947	曲澤	1	1.3947
委中	1	1.3947	委中	1	1.3947

解谿	1	1.2353	解谿	1	1.2353
腕骨	1	1.2353	腕骨	1	1.2353
陽谿	1	1.1868	陽谿	1	1.1868
商丘	1	1.1404	商丘	1	1.1404
陽谷	1	0.8643	陽谷	1	0.8643
照海	1	0.6538	照海	1	0.6538
曲池	1	0.6279	曲池	1	0.6279
巨闕	1	0.4901	巨闕	1	0.4901

표 2.194: 병증 <癲癇瘓癰>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	12	4.3120
足太陽膀胱經	12	3.2823
手太陽小腸經	7	3.8132
足少陽膽經	5	5.7106
手少陽三焦經	5	3.0876
足陽明胃經	3	2.7043
手陽明大腸經	2	0.9073
手厥陰心包經	1	1.3947
足太陰脾經	1	1.1404
足少陰腎經	1	0.6538
任脈	1	0.4901

표 2.195: 병증 <癲癇瘓癰>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	12	2.8011
등	7	7.2108
얼굴	7	3.9928
발	6	2.3443
하박	6	1.9810
손	5	4.5602

소퇴	4	2.1620
가슴	1	4.3916
옆구리	1	4.3916
배	1	0.4901

2.66 癲癇

이 병증 치료에는 모두 27가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.259차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 金門 · 僕參 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 金門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.091차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 10차례 사용되었다.




그림 2.131: 병증 <癫癇>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.132: 병증 <癫癇>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.196: 병증 <癫癇>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
金門	3	18.4020	金門	3	18.4020
僕參	3	14.6790	僕參	3	14.6790
脊中	2	10.2712	脊中	2	10.2712
筋縮	2	9.5651	筋縮	2	9.5651
小海	2	9.2566	小海	2	9.2566
懸釐	1	3.8074	懸釐	1	3.8074
絲竹空	1	3.6284	絲竹空	1	3.6284
強間	1	3.3175	強間	1	3.3175
束骨	1	2.8275	束骨	1	2.8275
後頂	1	2.7248	後頂	1	2.7248
曲骨	1	2.4513	曲骨	1	2.4513
攢竹	1	2.2926	攢竹	1	2.2926
陰谷	1	2.2191	陰谷	1	2.2191
神庭	1	2.2191	神庭	1	2.2191
少海	1	2.1491	少海	1	2.1491
神門	1	2.0823	神門	1	2.0823
足通谷	1	2.0184	足通谷	1	2.0184
天柱	1	2.0184	天柱	1	2.0184
商丘	1	1.7367	商丘	1	1.7367
天井	1	1.6868	天井	1	1.6868
列缺	1	1.6868	列缺	1	1.6868
水溝	1	1.5924	水溝	1	1.5924
心俞	1	1.3834	心俞	1	1.3834
肺俞	1	1.3834	肺俞	1	1.3834
行間	1	1.2736	行間	1	1.2736
百會	1	0.7625	百會	1	0.7625
中脘	1	0.7421	中脘	1	0.7421

표 2.197: 병증 <癲癇>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	12	5.626
督脈	9	4.350
手太陽小腸經	2	9.257
手少陽三焦經	2	2.658
手少陰心經	2	2.116
任脈	2	1.597
足少陽膽經	1	3.807
足少陰腎經	1	2.219
足太陰脾經	1	1.737
手太陰肺經	1	1.687
足厥陰肝經	1	1.274

표 2.198: 병증 <癲癇>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	10	6.823
등	6	5.651
머리	6	2.475
하박	5	3.695
얼굴	3	2.505
배	2	1.597
소퇴	1	2.219
손	1	2.082

2.67 癲疾

이 병증 치료에는 모두 46가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.283차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 申脈 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성

(G-Score 기준) 측면에서도 申脈 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.364차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.556차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 18차례 사용되었다.




그림 2.133: 병증 <癲疾>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.134: 병증 <癲疾>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.199: 병증 <癲疾>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
申脈	3	10.8902	申脈	3	10.8902
天衝	2	9.0041	天衝	2	9.0041
本神	2	6.8867	本神	2	6.8867
聽會	2	6.8867	聽會	2	6.8867
兌端	2	6.8867	兌端	2	6.8867
束骨	2	6.1705	束骨	2	6.1705
偏歷	2	5.4059	偏歷	2	5.4059
大迎	2	5.2400	大迎	2	5.2400
承漿	2	5.0824	承漿	2	5.0824
解谿	2	4.1607	滑肉門	1	5.0573
完骨	2	4.0497	解谿	2	4.1607
尺澤	2	3.8400	完骨	2	4.0497
滑肉門	1	5.0573	尺澤	2	3.8400

膕會	1	3.7315	膕會	1	3.7315
築賓	1	2.9810	築賓	1	2.9810
絡却	1	2.7905	絡却	1	2.7905
聽宮	1	2.7905	聽宮	1	2.7905
懸釐	1	2.7905	懸釐	1	2.7905
絲竹空	1	2.6200	絲竹空	1	2.6200
筋縮	1	2.4662	筋縮	1	2.4662
強間	1	2.3262	強間	1	2.3262
痘門	1	1.9714	痘門	1	1.9714
齦交	1	1.8704	齦交	1	1.8704
腦空	1	1.7762	腦空	1	1.7762
後頂	1	1.7762	後頂	1	1.7762
玉枕	1	1.6058	玉枕	1	1.6058
飛揚	1	1.4555	飛揚	1	1.4555
承山	1	1.4555	承山	1	1.4555
腦戶	1	1.4555	腦戶	1	1.4555
頤會	1	1.4555	頤會	1	1.4555
攢竹	1	1.3868	攢竹	1	1.3868
神庭	1	1.3218	神庭	1	1.3218
後谿	1	1.2604	後谿	1	1.2604
天柱	1	1.1468	天柱	1	1.1468
足通谷	1	1.1468	足通谷	1	1.1468
上星	1	1.0442	上星	1	1.0442
陽谿	1	0.9511	陽谿	1	0.9511
商丘	1	0.9078	商丘	1	0.9078
前谷	1	0.7182	前谷	1	0.7182
風池	1	0.6228	風池	1	0.6228
復溜	1	0.5656	復溜	1	0.5656
曲池	1	0.4414	曲池	1	0.4414
崑崙	1	0.3400	崑崙	1	0.3400
然谷	1	0.2725	然谷	1	0.2725
百會	1	0.1899	百會	1	0.1899
中脘	1	0.1781	中脘	1	0.1781

표 2.200: 병증 <癲疾>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	13	2.8388
督脈	12	2.0695
足少陽膽經	11	4.5738
足陽明胃經	5	4.8193
手陽明大腸經	4	2.2662
任脈	3	2.6302
手太陽小腸經	3	1.5897
足少陰腎經	3	1.2730
手太陰肺經	2	3.8400
手少陽三焦經	2	3.1757
足太陰脾經	1	0.9078

표 2.201: 병증 <癲疾>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	18	2.2080
얼굴	14	4.4056
발	12	3.0568
하박	5	3.2291
소퇴	3	1.9640
손	3	0.9766
배	2	2.6177
상박	1	3.7315
등	1	2.4662

2.68 驚癇

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.35차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 頸會 · 前頂 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성

(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 頸會 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.7차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.135: 병증 <驚癇>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.136: 병증 <驚癇>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.202: 병증 <驚癇>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
頸會	3	14.521	頸會	3	14.521
前頂	3	14.263	前頂	3	14.263
瘦脈	2	12.043	瘦脈	2	12.043
筋縮	2	10.459	筋縮	2	10.459
長強	2	9.594	長強	2	9.594
身柱	1	4.672	身柱	1	4.672
巨骨	1	4.446	巨骨	1	4.446
率谷	1	4.063	率谷	1	4.063
神道	1	3.608	神道	1	3.608
顱息	1	3.608	顱息	1	3.608
本神	1	3.608	本神	1	3.608
束骨	1	3.248	束骨	1	3.248
鳩尾	1	2.699	鳩尾	1	2.699

少衝	1	2.481	少衝	1	2.481
天柱	1	2.415	天柱	1	2.415
腕骨	1	2.232	腕骨	1	2.232
尺澤	1	2.069	尺澤	1	2.069
水溝	1	1.970	水溝	1	1.970
行間	1	1.632	行間	1	1.632
足臨泣	1	1.559	足臨泣	1	1.559

표 2.203: 병증 <驚癇>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	13	8.441
手少陽三焦經	3	7.826
足少陽膽經	3	3.077
足太陽膀胱經	2	2.831
手陽明大腸經	1	4.446
任脈	1	2.699
手少陰心經	1	2.481
手太陽小腸經	1	2.232
手太陰肺經	1	2.069
足厥陰肝經	1	1.632

표 2.204: 병증 <驚癇>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	11	8.486
등	6	7.083
발	3	2.146
얼굴	2	2.789
손	2	2.357
상박	1	4.446
배	1	2.699
하박	1	2.069

2.69 風癇

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.55차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脊中 · 鳩尾 · 神庭 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 脊中 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.875차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 脾脈으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.137: 병증 <風癇>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.138: 병증 <風癇>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.205: 병증 <風癇>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
脊中	3	18.325	脊中	3	18.325
鳩尾	3	13.466	鳩尾	3	13.466
神庭	3	13.221	神庭	3	13.221
前頂	2	7.436	前頂	2	7.436
大椎	2	7.124	大椎	2	7.124
涌泉	2	4.758	會宗	1	6.316
巨闕	2	4.415	眉衝	1	6.316
百會	2	3.883	涌泉	2	4.758
會宗	1	6.316	巨闕	2	4.415
眉衝	1	6.316	百會	2	3.883
絲竹空	1	3.802	絲竹空	1	3.802
強間	1	3.489	強間	1	3.489
僕參	1	2.995	僕參	1	2.995

神闕	1	2.379	神闕	1	2.379
神門	1	2.240	神門	1	2.240
風府	1	2.175	風府	1	2.175
完骨	1	1.942	完骨	1	1.942
天井	1	1.838	天井	1	1.838
勞宮	1	1.741	勞宮	1	1.741
上腕	1	1.741	上腕	1	1.741

표 2.206: 병증 <風癇>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	14	7.951
任脈	7	5.500
手少陽三焦經	3	3.985
足少陰腎經	2	4.758
足太陽膀胱經	2	4.655
手少陰心經	1	2.240
足少陽膽經	1	1.942
手厥陰心包經	1	1.741

표 2.207: 병증 <風癇>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	11	5.495
배	7	5.500
등	5	12.725
발	3	3.877
하박	2	4.077
손	2	1.991
얼굴	1	3.802

2.70 風勞

이 병증 치료에는 모두 10가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.1차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 膀胱俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 膀胱俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.139: 병증 <風勞>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.140: 병증 <風勞>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.208: 병증 <風勞>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
膀胱俞	2	10.387	膀胱俞	2	10.387
關元俞	1	9.175	關元俞	1	9.175
附分	1	6.688	附分	1	6.688
伏兎	1	6.425	伏兎	1	6.425
手五里	1	5.472	手五里	1	5.472
風門	1	4.454	風門	1	4.454
大杼	1	4.454	大杼	1	4.454
腦戶	1	4.454	腦戶	1	4.454
大椎	1	4.210	大椎	1	4.210
曲泉	1	3.069	曲泉	1	3.069

표 2.209: 병증 <風勞>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	7.032
督脈	2	4.332
足陽明胃經	1	6.425
手陽明大腸經	1	5.472
足厥陰肝經	1	3.069

표 2.210: 병증 <風勞>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	7	6.561
대퇴	1	6.425
상박	1	5.472
머리	1	4.454
소퇴	1	3.069

2.71 風瘡

이 병증 치료에는 모두 16가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.062차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 腰俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 腰俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈 · 足太陽膀胱經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 10차례 사용되었다.




그림 2.141: 병증 <風痺>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.142: 병증 <風痺>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.211: 병증 <風痙>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
腰俞	2	12.268	腰俞	2	12.268
天衝	1	5.570	天衝	1	5.570
上髎	1	5.136	上髎	1	5.136
中膂俞	1	4.783	中膂俞	1	4.783
顱息	1	4.486	顱息	1	4.486
長強	1	4.354	長強	1	4.354
痘門	1	4.230	痘門	1	4.230
大迎	1	3.628	大迎	1	3.628
大椎	1	3.390	大椎	1	3.390
上關	1	3.317	上關	1	3.317
膀胱俞	1	3.055	膀胱俞	1	3.055
脾俞	1	2.494	脾俞	1	2.494
腎俞	1	2.115	腎俞	1	2.115
肝俞	1	2.018	肝俞	1	2.018
魚際	1	2.018	魚際	1	2.018
百會	1	1.789	百會	1	1.789

표 2.212: 병증 <風痙>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	6	5.206
足太陽膀胱經	6	3.267
足少陽膽經	2	4.444
手少陽三焦經	1	4.486
足陽明胃經	1	3.628
手太陰肺經	1	2.018

표 2.213: 병증 <風痙>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	10	4.401
머리	4	4.019
얼굴	2	3.473
손	1	2.018

2.72 風眩

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 承光 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.143: 병증 <風眩>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.144: 병증 <風眩>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.214: 병증 <風眩>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承光	1	5.514	承光	1	5.514
頸厭	1	4.727	頸厭	1	4.727
後頂	1	4.376	後頂	1	4.376
申脈	1	4.273	申脈	1	4.273
天牖	1	4.175	天牖	1	4.175
玉枕	1	4.175	玉枕	1	4.175
頤會	1	3.994	頤會	1	3.994
前頂	1	3.910	前頂	1	3.910
攢竹	1	3.910	攢竹	1	3.910
神庭	1	3.830	神庭	1	3.830
上星	1	3.475	上星	1	3.475
完骨	1	3.351	完骨	1	3.351
陽谷	1	2.930	陽谷	1	2.930
足臨泣	1	2.673	足臨泣	1	2.673

표 2.215: 병증 <風眩>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	5	3.917
足太陽膀胱經	4	4.468
足少陽膽經	3	3.584
手少陽三焦經	1	4.175
手太陽小腸經	1	2.930

표 2.216: 병증 <風眩>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	9	4.150

발	2	3.473
목	1	4.175
얼굴	1	3.910
하박	1	2.930

2.73 風痺

이 병증 치료에는 모두 11가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.091차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 委中 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 委中 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 · 하박 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.145: 병증 <風痺>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.146: 병증 <風痺>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.217: 병증 <風痺>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
委中	2	10.459	委中	2	10.459
消潔	1	7.181	消潔	1	7.181
膝關	1	6.820	膝關	1	6.820
肩貞	1	6.022	肩貞	1	6.022
腰陽關	1	6.022	腰陽關	1	6.022
跗陽	1	5.629	跗陽	1	5.629
環跳	1	5.303	環跳	1	5.303
少海	1	4.044	少海	1	4.044
下廉	1	3.764	下廉	1	3.764
天井	1	3.522	天井	1	3.522
尺澤	1	3.522	尺澤	1	3.522

표 2.218: 병증 <風痺>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	3	8.043
手少陽三焦經	2	5.351
足厥陰肝經	1	6.820
手太陽小腸經	1	6.022
督脈	1	6.022
足少陽膽經	1	5.303
手少陰心經	1	4.044
手陽明大腸經	1	3.764
手太陰肺經	1	3.522

표 2.219: 병증 <風痺>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
----	---------	------------

소퇴	4	7.636
하박	4	3.713
상박	2	6.601
등	1	6.022
대퇴	1	5.303

2.74 中風

이 병증 치료에는 모두 60가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.983차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 百會 혈(穴)로 모두 13차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 百會 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 9.154차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 27차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 10.82차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 29차례 사용되었다.




그림 2.147: 병증 <中風>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.148: 병증 <中風>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.220: 병증 <中風>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
百會	13	37.1855	百會	13	37.1855
曲池	6	11.9558	肩髃	4	14.2628
肝俞	6	10.5745	曲池	6	11.9558
風池	5	9.7865	肝俞	6	10.5745
心俞	5	9.7865	風池	5	9.7865
足三里	5	5.4105	心俞	5	9.7865
肩髃	4	14.2628	大椎	4	9.5194
大椎	4	9.5194	風市	3	8.6992
風市	3	8.6992	足三里	5	5.4105
肺俞	3	3.4577	內關	2	5.2100
間使	3	3.4577	聽會	2	4.3674
照海	3	2.8631	頰車	2	4.3674
腎俞	3	2.4474	肩井	2	4.1321
內關	2	5.2100	肺俞	3	3.4577
聽會	2	4.3674	間使	3	3.4577
頰車	2	4.3674	大腸俞	2	3.1847
肩井	2	4.1321	照海	3	2.8631
大腸俞	2	3.1847	大橫	1	2.7753
液門	2	2.4955	液門	2	2.4955
解谿	2	1.9696	腎俞	3	2.4474
足臨泣	2	0.9577	解谿	2	1.9696
崑崙	2	0.6641	下關	1	1.7624
大橫	1	2.7753	曲鬚	1	1.7624
下關	1	1.7624	耳門	1	1.5924
曲鬚	1	1.7624	地倉	1	1.5924
耳門	1	1.5924	率谷	1	1.4424
地倉	1	1.5924	陶道	1	1.1896
率谷	1	1.4424	本神	1	1.0821
陶道	1	1.1896	曲差	1	1.0821
本神	1	1.0821	足臨泣	2	0.9577
曲差	1	1.0821	陽輔	1	0.8964

陽輔	1	0.8964	天府	1	0.8158
天府	1	0.8158	廉泉	1	0.8158
廉泉	1	0.8158	崑崙	2	0.6641
商陽	1	0.6128	商陽	1	0.6128
俠谿	1	0.5559	俠谿	1	0.5559
關衝	1	0.5035	關衝	1	0.5035
風門	1	0.5035	風門	1	0.5035
腦戶	1	0.5035	腦戶	1	0.5035
頤會	1	0.5035	頤會	1	0.5035
前頂	1	0.4552	前頂	1	0.4552
神庭	1	0.4108	神庭	1	0.4108
後谿	1	0.3698	後谿	1	0.3698
陽陵泉	1	0.3698	陽陵泉	1	0.3698
支溝	1	0.3321	支溝	1	0.3321
上關	1	0.3321	上關	1	0.3321
風府	1	0.2972	風府	1	0.2972
天柱	1	0.2972	天柱	1	0.2972
上星	1	0.2357	上星	1	0.2357
膀胱俞	1	0.2085	膀胱俞	1	0.2085
合谷	1	0.1836	合谷	1	0.1836
完骨	1	0.1836	完骨	1	0.1836
列缺	1	0.1399	列缺	1	0.1399
天井	1	0.1399	天井	1	0.1399
勞宮	1	0.1036	勞宮	1	0.1036
水溝	1	0.1036	水溝	1	0.1036
脾俞	1	0.0312	脾俞	1	0.0312
章門	1	0.0176	章門	1	0.0176
膈俞	1	0.0020	膈俞	1	0.0020
涌泉	1	0.0006	涌泉	1	0.0006

표 2.221: 병증 <中風>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	27	2.6866

督脈	25	5.0404
足少陽膽經	22	2.6590
手陽明大腸經	12	6.7537
足陽明胃經	11	3.0204
手厥陰心包經	6	2.9238
手少陽三焦經	6	1.0127
足少陰腎經	4	1.4319
手太陰肺經	2	0.4779
足太陰脾經	1	2.7753
任脈	1	0.8158
手太陽小腸經	1	0.3698
足厥陰肝經	1	0.0176

표 2.222: 병증 <中風>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	29	4.1651
등	28	3.7186
하박	14	3.5392
얼굴	11	1.7795
발	11	1.1685
상박	7	6.4036
소퇴	7	2.2256
손	7	0.7115
대퇴	3	8.6992
배	1	2.7753
옆구리	1	0.0176

2.75 中風不語

이 병증 치료에는 모두 15가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.267차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 百會 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성

(G-Score 기준) 측면에서도 百會 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.714차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.149: 병증 <中風不語>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.150: 병증 <中風不語>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.223: 병증 <中風不語>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
百會	3	10.612	百會	3	10.612
天窓	2	10.248	天窓	2	10.248
脾俞	2	7.105	脾俞	2	7.105
陽池	1	6.714	陽池	1	6.714
耳門	1	4.920	耳門	1	4.920
承泣	1	4.568	承泣	1	4.568
肩髃	1	4.415	肩髃	1	4.415
頰車	1	4.273	頰車	1	4.273
本神	1	4.273	本神	1	4.273
承漿	1	3.339	承漿	1	3.339
大椎	1	3.185	大椎	1	3.185
風府	1	3.044	風府	1	3.044
衝陽	1	2.978	衝陽	1	2.978

水溝	1	2.577	水溝	1	2.577
心俞	1	2.342	心俞	1	2.342

표 2.224: 병증 <中風不語>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	6	4.854
足太陽膀胱經	3	4.724
足陽明胃經	3	3.940
手太陽小腸經	2	10.248
手少陽三焦經	2	5.817
手陽明大腸經	1	4.415
足少陽膽經	1	4.273
任脈	1	3.339

표 2.225: 병증 <中風不語>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	6	3.992
머리	4	6.828
등	4	4.211
목	2	10.248
손	1	6.714
상박	1	4.415
발	1	2.978

2.76 偏風

이 병증 치료에는 모두 19가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.263차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 地倉 · 環跳 · 上廉 · 照海 · 曲池 혈(穴)로 모두

2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 地倉 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 · 하박 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.151: 병증 <偏風>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.152: 병증 <偏風>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.226: 병증 <偏風>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
地倉	2	11.630	地倉	2	11.630
環跳	2	10.605	環跳	2	10.605
上廉	2	7.797	上廉	2	7.797
照海	2	5.821	照海	2	5.821
曲池	2	5.743	曲池	2	5.743
迎香	1	4.672	迎香	1	4.672
下關	1	4.672	下關	1	4.672
肩髃	1	3.970	肩髃	1	3.970
承山	1	2.991	承山	1	2.991
承漿	1	2.911	承漿	1	2.911
陽陵泉	1	2.760	陽陵泉	1	2.760
上關	1	2.690	上關	1	2.690
委中	1	2.623	委中	1	2.623

衝陽	1	2.558	衝陽	1	2.558
下廉	1	2.496	下廉	1	2.496
完骨	1	2.379	完骨	1	2.379
列缺	1	2.271	列缺	1	2.271
崑崙	1	1.517	崑崙	1	1.517
百會	1	1.247	百會	1	1.247

표 2.227: 병증 <偏風>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	7	4.936
足少陽膽經	5	4.609
足陽明胃經	4	6.287
足太陽膀胱經	3	2.377
足少陰腎經	2	5.821
任脈	1	2.911
手太陰肺經	1	2.271
督脈	1	1.247

표 2.228: 병증 <偏風>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	6	5.315
하박	6	4.577
발	4	3.299
소퇴	3	2.792
대퇴	2	10.605
머리	2	1.813
상박	1	3.970

2.77 痰涎

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 足通谷 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 足通谷 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.727차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經 · 足少陽膽經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.153: 병증 <痰涎>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.154: 병증 <痰涎>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.229: 병증 <痰涎>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
足通谷	3	12.733	足通谷	3	12.733
絲竹空	2	10.387	絲竹空	2	10.387
本神	2	9.453	本神	2	9.453
兑端	2	9.453	兑端	2	9.453
或中	1	4.727	或中	1	4.727
率谷	1	3.864	率谷	1	3.864
庫房	1	3.864	庫房	1	3.864
不容	1	3.700	不容	1	3.700
溫溜	1	3.550	溫溜	1	3.550
顱息	1	3.412	顱息	1	3.412
浮白	1	3.166	浮白	1	3.166
廉泉	1	3.055	廉泉	1	3.055
膽俞	1	2.950	膽俞	1	2.950

雲門	1	2.673	雲門	1	2.673
陰谷	1	2.437	陰谷	1	2.437
少海	1	2.365	少海	1	2.365
少衝	1	2.297	少衝	1	2.297
上關	1	2.297	上關	1	2.297
下廉	1	2.109	下廉	1	2.109
商丘	1	1.943	商丘	1	1.943
上脘	1	1.795	上脘	1	1.795
復溜	1	1.502	復溜	1	1.502
膈俞	1	1.328	膈俞	1	1.328
巨闕	1	1.149	巨闕	1	1.149
然谷	1	1.070	然谷	1	1.070

표 2.230: 병증 <痰涎>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	5	5.671
足少陽膽經	5	4.695
足少陰腎經	4	2.434
手少陽三焦經	3	6.900
任脈	3	2.000
督脈	2	9.453
足陽明胃經	2	3.782
手陽明大腸經	2	2.830
手少陰心經	2	2.331
手太陰肺經	1	2.673
足太陰脾經	1	1.943

표 2.231: 병증 <痰涎>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	8	6.929
발	6	4.312

가슴	3	3.754
머리	3	3.480
하박	3	2.675
배	3	2.215
등	2	2.139
소퇴	1	2.437
손	1	2.297

2.78 唾血

이 병증 치료에는 모두 43가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.744차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 肝俞 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 4차례 사용된 神門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.769차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 16차례 사용되었다.




그림 2.155: 병증 <咳血>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.156: 병증 <咳血>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.232: 병증 <唾血>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
肝俞	5	11.1592	神門	4	12.5484
神門	4	12.5484	肝俞	5	11.1592
魚際	4	7.4190	鄰門	2	8.5966
膻中	3	6.2990	魚際	4	7.4190
大陵	3	6.0169	承滿	2	7.2468
太淵	3	5.0475	庫房	2	6.8912
鄰門	2	8.5966	不容	2	6.5688
承滿	2	7.2468	膻中	3	6.2990
庫房	2	6.8912	大陵	3	6.0169
不容	2	6.5688	太淵	3	5.0475
尺澤	2	3.0606	地五會	1	4.5938
上腕	2	2.8765	肩中俞	1	3.6234
勞宮	2	2.8765	屋翳	1	3.6234
天樞	2	2.4706	尺澤	2	3.0606
肺俞	2	2.4706	周榮	1	3.0017
心俞	2	2.4706	上腕	2	2.8765
行間	2	2.2582	勞宮	2	2.8765
太衝	2	1.7807	陰鄰	1	2.5503
太谿	2	1.7287	孔最	1	2.5503
巨闕	2	1.6781	巨骨	1	2.5503
然谷	2	1.5348	天樞	2	2.4706
中腕	2	1.2431	肺俞	2	2.4706
地五會	1	4.5938	心俞	2	2.4706
肩中俞	1	3.6234	缺盆	1	2.3653
屋翳	1	3.6234	行間	2	2.2582
周榮	1	3.0017	紫宮	1	2.2003
陰鄰	1	2.5503	手五里	1	1.9174
孔最	1	2.5503	太衝	2	1.7807
巨骨	1	2.5503	太谿	2	1.7287
缺盆	1	2.3653	巨闕	2	1.6781
紫宮	1	2.2003	然谷	2	1.5348

手五里	1	1.9174	中脘	2	1.2431
大鐘	1	1.1633	大鐘	1	1.1633
鳩尾	1	1.0327	鳩尾	1	1.0327
曲澤	1	0.8145	曲澤	1	0.8145
上星	1	0.7228	上星	1	0.7228
天突	1	0.5670	天突	1	0.5670
中府	1	0.5329	中府	1	0.5329
間使	1	0.3616	間使	1	0.3616
脾俞	1	0.3379	脾俞	1	0.3379
曲泉	1	0.2359	曲泉	1	0.2359
石門	1	0.1203	石門	1	0.1203
足三里	1	0.0114	足三里	1	0.0114

표 2.233: 병증 <咳血>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	13	2.0021
足陽明胃經	11	4.1682
手太陰肺經	11	3.7221
足太陽膀胱經	10	4.1095
手厥陰心包經	9	3.7332
手少陰心經	5	7.5494
足少陰腎經	5	1.4756
足厥陰肝經	5	1.4249
手陽明大腸經	2	2.2339
足少陽膽經	1	4.5938
手太陽小腸經	1	3.6234
足太陰脾經	1	3.0017
督脈	1	0.7228

표 2.234: 병증 <咳血>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
----	---------	------------

손	16	6.7817
배	14	2.9046
등	10	4.1095
가슴	10	3.3022
발	10	2.1766
하박	8	2.9890
상박	3	2.6971
소퇴	2	0.1236
목	1	2.3653
머리	1	0.7228

2.79 哮

이 병증 치료에는 모두 40가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.65차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 天突 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 3차례 사용된 神藏 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陰肺經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 21차례 사용되었다.




그림 2.157: 병증 <喘>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.158: 병증 <喘>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.235: 병증 <喘>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
天突	4	11.7417	神藏	3	15.2048
神藏	3	15.2048	俞府	3	15.2048
俞府	3	15.2048	華蓋	3	14.5206
華蓋	3	14.5206	魄戶	3	12.8622
魄戶	3	12.8622	天突	4	11.7417
天府	3	10.8852	天府	3	10.8852
經渠	3	9.2068	經渠	3	9.2068
或中	2	9.0864	或中	2	9.0864
扶突	2	8.1262	扶突	2	8.1262
天容	2	6.7456	天容	2	6.7456
曲澤	2	4.1378	水突	1	4.2874
三間	2	4.0149	曲澤	2	4.1378
中府	2	3.3736	三間	2	4.0149
大陵	2	3.1030	氣戶	1	3.8637
期門	2	2.9376	頭維	1	3.8637
肺俞	2	2.8589	中府	2	3.3736
崑崙	2	2.0801	人迎	1	3.2358
魚際	2	1.9742	大陵	2	3.1030
水突	1	4.2874	璣璣	1	2.9913
氣戶	1	3.8637	期門	2	2.9376
頭維	1	3.8637	肺俞	2	2.8589
人迎	1	3.2358	承滿	1	2.5902
璣璣	1	2.9913	不容	1	2.2706
承滿	1	2.5902	崑崙	2	2.0801
不容	1	2.2706	顱息	1	2.0074
顱息	1	2.0074	魚際	2	1.9742
浮白	1	1.7855	浮白	1	1.7855
廉泉	1	1.6868	廉泉	1	1.6868
商陽	1	1.4294	商陽	1	1.4294
諽諷	1	1.3544	諽諷	1	1.3544
少商	1	1.3544	少商	1	1.3544

大鐘	1	1.3544	大鐘	1	1.3544
雲門	1	1.3544	雲門	1	1.3544
神門	1	1.0400	神門	1	1.0400
上廉	1	0.9871	上廉	1	0.9871
解谿	1	0.8441	解谿	1	0.8441
膻中	1	0.6485	膻中	1	0.6485
太淵	1	0.3715	太淵	1	0.3715
足臨泣	1	0.3715	足臨泣	1	0.3715
腎俞	1	0.2565	腎俞	1	0.2565

표 2.236: 병증 <喘>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陰肺經	13	4.074
任脈	10	6.318
足少陰腎經	9	10.213
足太陽膀胱經	9	3.882
足陽明胃經	7	2.994
手陽明大腸經	6	3.639
手厥陰心包經	4	3.620
手太陽小腸經	2	6.746
足厥陰肝經	2	2.938
足少陽膽經	2	1.079
手少陽三焦經	1	2.007
手少陰心經	1	1.040

표 2.237: 병증 <喘>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	21	7.799
손	10	1.898
등	7	4.333
목	6	5.599

하박	6	4.777
발	5	1.163
배	4	2.599
상박	3	10.885
얼굴	2	2.775
머리	2	1.897

2.80 肺氣

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中府 · 肺俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 中府 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陰肺經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.159: 병증 <肺氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.160: 병증 <肺氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.238: 병증 <肺氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中府	2	9.902	中府	2	9.902
肺俞	2	9.274	肺俞	2	9.274
陰都	1	6.425	陰都	1	6.425
大椎	1	4.210	大椎	1	4.210
天突	1	3.684	天突	1	3.684
水溝	1	3.574	水溝	1	3.574
膻中	1	3.574	膻中	1	3.574
風池	1	3.326	風池	1	3.326
太淵	1	3.109	太淵	1	3.109

표 2.239: 병증 <肺氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陰肺經	3	6.505
足太陽膀胱經	2	9.274
督脈	2	3.892
任脈	2	3.629
足少陰腎經	1	6.425
足少陽膽經	1	3.326

표 2.240: 병증 <肺氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	4	5.720
등	3	6.742
배	1	6.425
얼굴	1	3.574
머리	1	3.326

2.81 咳嗽

이 병증 치료에는 모두 28가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.286차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 膽中 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 膽中 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈 · 手太陰肺經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.161: 병증 <咳嗽>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.162: 병증 <咳嗽>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.241: 병증 <咳嗽>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
膻中	3	10.2363	膻中	3	10.2363
廉泉	2	8.0130	廉泉	2	8.0130
少澤	2	7.2170	少澤	2	7.2170
肺俞	2	4.8733	肩中俞	1	5.0247
太淵	2	4.4637	肺俞	2	4.8733
太谿	2	3.9715	太淵	2	4.4637
魚際	2	3.8451	太谿	2	3.9715
肩中俞	1	5.0247	魚際	2	3.8451
缺盆	1	3.6999	缺盆	1	3.6999
庫房	1	3.5216	庫房	1	3.5216
天池	1	2.5269	天池	1	2.5269
風門	1	2.2706	風門	1	2.2706
大杼	1	2.2706	大杼	1	2.2706

經渠	1	2.1940	經渠	1	2.1940
陽陵泉	1	2.0519	陽陵泉	1	2.0519
神門	1	1.9857	神門	1	1.9857
解谿	1	1.7487	解谿	1	1.7487
太白	1	1.6443	太白	1	1.6443
列缺	1	1.5950	列缺	1	1.5950
天井	1	1.5950	天井	1	1.5950
天突	1	1.5950	天突	1	1.5950
尺澤	1	1.5950	尺澤	1	1.5950
前谷	1	1.4154	前谷	1	1.4154
心俞	1	1.2964	心俞	1	1.2964
涌泉	1	1.0302	涌泉	1	1.0302
太衝	1	0.9459	太衝	1	0.9459
巨闕	1	0.8935	巨闕	1	0.8935
足三里	1	0.5463	足三里	1	0.5463

표 2.242: 병증 <咳嗽>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	7	5.1845
手太陰肺經	7	2.7386
足太陽膀胱經	5	2.6777
手太陽小腸經	4	4.5524
足陽明胃經	4	2.3791
足少陰腎經	3	2.5008
手厥陰心包經	1	2.5269
足少陽膽經	1	2.0519
手少陰心經	1	1.9857
足太陰脾經	1	1.6443
手少陽三焦經	1	1.5950
足厥陰肝經	1	0.9459

표 2.243: 병증 <咳嗽>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	8	3.7854
발	6	1.8681
가슴	5	5.1177
등	5	2.6777
하박	4	1.7448
얼굴	2	8.0130
소퇴	2	1.2991
상박	1	5.0247
목	1	3.6999
옆구리	1	2.5269
배	1	0.8935

2.82 咳逆

이 병증 치료에는 모두 33가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 行間 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 天泉 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.818차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陰肺經으로 모두 10차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.163: 병증 <咳逆>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.164: 병증 <咳逆>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.244: 병증 <咳逆>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
行間	3	8.2629	天泉	2	13.0323
天泉	2	13.0323	行間	3	8.2629
浮白	2	7.6594	浮白	2	7.6594
少商	2	6.6434	少商	2	6.6434
大陵	2	4.6075	腹結	1	5.1586
太淵	2	3.9393	俠白	1	5.1586
章門	2	3.2225	神封	1	5.1586
足三里	2	2.5309	維道	1	4.7266
腹結	1	5.1586	大陵	2	4.6075
俠白	1	5.1586	太淵	2	3.9393
神封	1	5.1586	俞府	1	3.8297
維道	1	4.7266	孔最	1	3.6085
俞府	1	3.8297	章門	2	3.2225
孔最	1	3.6085	肩井	1	2.6729
肩井	1	2.6729	足三里	2	2.5309
足竅陰	1	2.2576	足竅陰	1	2.2576
雲門	1	2.0861	雲門	1	2.0861
風門	1	2.0074	風門	1	2.0074
經渠	1	1.9329	經渠	1	1.9329
陷谷	1	1.7948	陷谷	1	1.7948
支溝	1	1.7308	支溝	1	1.7308
太白	1	1.4016	太白	1	1.4016
天突	1	1.3544	天突	1	1.3544
中府	1	1.3091	中府	1	1.3091
膻中	1	1.2654	膻中	1	1.2654
前谷	1	1.1830	前谷	1	1.1830
肺俞	1	1.0701	肺俞	1	1.0701
足臨泣	1	0.9063	足臨泣	1	0.9063
曲泉	1	0.8767	曲泉	1	0.8767
太谿	1	0.7177	太谿	1	0.7177
肝俞	1	0.6709	肝俞	1	0.6709

魚際	1	0.6709	魚際	1	0.6709
然谷	1	0.6269	然谷	1	0.6269

표 2.245: 병증 <咳逆>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陰肺經	10	3.169
足厥陰肝經	6	4.121
足少陽膽經	6	3.645
手厥陰心包經	4	8.820
足少陰腎經	4	2.583
足陽明胃經	3	2.163
足太陽膀胱經	3	1.250
足太陰脾經	2	3.280
任脈	2	1.310
手少陽三焦經	1	1.731
手太陽小腸經	1	1.183

표 2.246: 병증 <咳逆>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	9	2.281
손	8	3.409
가슴	6	2.501
상박	4	6.955
옆구리	3	3.975
하박	3	2.424
소퇴	3	1.704
등	3	1.250
머리	2	7.659
배	1	5.159

2.83 咳逆上氣

이 병증 치료에는 모두 45가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.644차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 雲門 · 膽中 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 雲門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 19차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 29차례 사용되었다.




그림 2.165: 병증 <咳逆上氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.166: 병증 <咳逆上氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.247: 병증 <咳逆上氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
雲門	4	14.2291	雲門	4	14.2291
膻中	4	10.4965	庫房	3	12.7053
庫房	3	12.7053	魄戶	3	12.2086
魄戶	3	12.2086	膻中	4	10.4965
天突	3	6.6701	厥陰俞	2	9.2392
中府	3	6.5162	或中	2	8.6479
厥陰俞	2	9.2392	建里	2	8.1390
或中	2	8.6479	扶突	2	7.6932
建里	2	8.1390	氣舍	2	7.2970
扶突	2	7.6932	玉堂	2	7.2970
氣舍	2	7.2970	天突	3	6.6701
玉堂	2	7.2970	中府	3	6.5162
天容	2	6.3235	天容	2	6.3235

廉泉	2	5.3516	廉泉	2	5.3516
天池	2	4.9572	天池	2	4.9572
風門	2	4.4467	風門	2	4.4467
經渠	2	4.2942	經渠	2	4.2942
尺澤	2	3.1030	水突	1	4.0695
期門	2	2.5866	氣戶	1	3.6485
肺俞	2	2.5106	屋翳	1	3.6485
石門	2	1.6642	肩中俞	1	3.6485
水突	1	4.0695	天谿	1	3.3092
氣戶	1	3.6485	膏肓	1	3.3092
屋翳	1	3.6485	尺澤	2	3.1030
肩中俞	1	3.6485	周榮	1	3.0262
天谿	1	3.3092	神藏	1	2.7844
膏肓	1	3.3092	俞府	1	2.7844
周榮	1	3.0262	期門	2	2.5866
神藏	1	2.7844	華蓋	1	2.5741
俞府	1	2.7844	肺俞	2	2.5106
華蓋	1	2.5741	紫宮	1	2.2234
紫宮	1	2.2234	幽門	1	2.0746
幽門	1	2.0746	肩井	1	1.7042
肩井	1	1.7042	石門	2	1.6642
天府	1	1.5045	天府	1	1.5045
諽諽	1	1.1830	諽諽	1	1.1830
氣海	1	0.8321	氣海	1	0.8321
曲澤	1	0.8321	曲澤	1	0.8321
氣衝	1	0.7847	氣衝	1	0.7847
解谿	1	0.6973	解谿	1	0.6973
天井	1	0.5825	天井	1	0.5825
太衝	1	0.1671	太衝	1	0.1671
太谿	1	0.1536	太谿	1	0.1536
巨闕	1	0.1408	巨闕	1	0.1408
魚際	1	0.1287	魚際	1	0.1287

표 2.248: 병증 <咳逆上氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	19	4.5389
手太陰肺經	13	4.9626
足太陽膀胱經	11	5.4829
足陽明胃經	10	4.6930
足少陰腎經	6	3.2890
手太陽小腸經	3	4.9860
手厥陰心包經	3	2.8947
足厥陰肝經	3	1.3768
手陽明大腸經	2	7.6932
足太陰脾經	2	3.1677
足少陽膽經	1	1.7042
手少陽三焦經	1	0.5825

표 2.249: 병증 <咳逆上氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	29	6.0374
등	11	5.4829
배	10	2.3174
목	7	6.3458
하박	6	2.2030
상박	3	2.2857
발	3	0.3393
얼굴	2	5.3516
옆구리	2	4.9572
손	1	0.1287

2.84 少氣

이 병증 치료에는 모두 40가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.275차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 巨闕 · 肝俞 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 巨闕 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.923차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.636차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 13차례 사용되었다.




그림 2.167: 병증 <少氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.168: 병증 <少氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.250: 병증 <少氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
巨闕	4	10.1935	巨闕	4	10.1935
肝俞	4	10.0614	肝俞	4	10.0614
中脘	3	5.2872	風門	2	5.7627
風門	2	5.7627	中脘	3	5.2872
尺澤	2	4.3326	大包	1	4.7826
然谷	2	2.6181	尺澤	2	4.3326
大包	1	4.7826	膺窓	1	3.7156
膺窓	1	3.7156	伏兔	1	3.4660
伏兔	1	3.4660	華蓋	1	3.2478
華蓋	1	3.2478	然谷	2	2.6181
少府	1	2.4513	少府	1	2.4513
肩井	1	2.3308	肩井	1	2.3308
廉泉	1	2.1153	廉泉	1	2.1153

膽俞	1	2.0184	膽俞	1	2.0184
至陰	1	1.7624	至陰	1	1.7624
雲門	1	1.7624	雲門	1	1.7624
大鐘	1	1.7624	大鐘	1	1.7624
鳩尾	1	1.6153	鳩尾	1	1.6153
大椎	1	1.4834	大椎	1	1.4834
少衝	1	1.4224	少衝	1	1.4224
神門	1	1.4224	神門	1	1.4224
小腸俞	1	1.3644	小腸俞	1	1.3644
上廉	1	1.3644	上廉	1	1.3644
氣海	1	1.3644	氣海	1	1.3644
足通谷	1	1.3644	足通谷	1	1.3644
膀胱俞	1	1.2059	膀胱俞	1	1.2059
解谿	1	1.2059	解谿	1	1.2059
天井	1	1.0676	天井	1	1.0676
膻中	1	0.9848	膻中	1	0.9848
大陵	1	0.9085	大陵	1	0.9085
期門	1	0.8381	期門	1	0.8381
間使	1	0.8049	間使	1	0.8049
肺俞	1	0.8049	肺俞	1	0.8049
行間	1	0.7125	行間	1	0.7125
太淵	1	0.6564	太淵	1	0.6564
膈俞	1	0.6043	膈俞	1	0.6043
涌泉	1	0.5797	涌泉	1	0.5797
腎俞	1	0.5107	腎俞	1	0.5107
魚際	1	0.4487	魚際	1	0.4487
足三里	1	0.2085	足三里	1	0.2085

표 2.251: 병증 <少氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	14	2.5460
任脈	12	3.5441
手太陰肺經	5	1.8000

足陽明胃經	4	2.1490
足少陰腎經	4	1.6534
手少陰心經	3	1.7654
手厥陰心包經	2	0.8567
足厥陰肝經	2	0.7753
足太陰脾經	1	4.7826
足少陽膽經	1	2.3308
督脈	1	1.4834
手陽明大腸經	1	1.3644
手少陽三焦經	1	1.0676

표 2.252: 병증 <少氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	13	2.6462
배	10	3.8597
발	8	1.4293
손	6	1.2183
하박	5	1.8924
가슴	4	2.4277
옆구리	1	4.7826
대퇴	1	3.4660
상박	1	2.3308
얼굴	1	2.1153
소퇴	1	0.2085

2.85 賞豚氣

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 2.529차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 期門 혈(穴)로 모두 6차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 期門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 8.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 25차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 10.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 38차례 사용되었다.




그림 2.169: 병증 <賁豚氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.170: 병증 <貢豚氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.253: 병증 <貢豚氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
期門	6	25.072	期門	6	25.072
中極	5	19.410	中極	5	19.410
陰交	4	15.141	陰交	4	15.141
石門	4	11.279	歸來	2	11.347
關元	4	10.766	石門	4	11.279
章門	3	6.743	關元	4	10.766
歸來	2	11.347	四滿	2	7.129
四滿	2	7.129	章門	3	6.743
氣海	2	5.639	氣海	2	5.639
上脘	2	4.719	上脘	2	4.719
天樞	2	4.258	氣穴	1	4.681
中脘	2	2.779	天樞	2	4.258
氣穴	1	4.681	缺盆	1	3.369

缺盆	1	3.369	中脘	2	2.779
鳩尾	1	1.894	鳩尾	1	1.894
中府	1	1.274	中府	1	1.274
巨闕	1	0.665	巨闕	1	0.665

표 2.254: 병증 <費豚氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	25	8.033
足厥陰肝經	9	15.907
足陽明胃經	5	6.325
足少陰腎經	3	5.905
手太陰肺經	1	1.274

표 2.255: 병증 <費豚氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	38	8.913
옆구리	3	6.743
목	1	3.369
가슴	1	1.274

2.86 痊癒

이 병증 치료에는 모두 10가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.1차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脊俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 脊俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經 · 足太陰脾經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.171: 병증 <痰癥>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.172: 병증 <痃癖>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.256: 병증 <痃癖>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
膈俞	2	8.655	膈俞	2	8.655
府舍	1	6.992	府舍	1	6.992
不容	1	5.629	不容	1	5.629
漏谷	1	5.328	漏谷	1	5.328
下腕	1	5.068	下腕	1	5.068
三陰交	1	3.928	三陰交	1	3.928
脾俞	1	3.280	脾俞	1	3.280
太谿	1	2.846	太谿	1	2.846
中腕	1	2.504	中腕	1	2.504
足三里	1	2.320	足三里	1	2.320

표 2.257: 병증 <痃癖>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	3	5.968
足太陰脾經	3	5.416
足陽明胃經	2	3.974
任脈	2	3.786
足少陰腎經	1	2.846

표 2.258: 병증 <痃癖>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	4	5.048
등	3	5.968
소퇴	3	3.858
발	1	2.846

2.87 痰癖

이 병증 치료에는 모두 12가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 地機 · 氣海 · 天樞 · 關元 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 地機 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.173: 병증 <癥癥>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.174: 병증 <癥癥>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.259: 병증 <癪癥>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
地機	2	11.630	地機	2	11.630
氣海	2	9.345	氣海	2	9.345
天樞	2	7.844	天樞	2	7.844
關元	2	6.456	關元	2	6.456
不容	1	4.900	不容	1	4.900
陰陵泉	1	3.360	陰陵泉	1	3.360
三焦俞	1	3.228	三焦俞	1	3.228
膀胱俞	1	3.166	膀胱俞	1	3.166
中極	1	2.736	中極	1	2.736
曲泉	1	2.398	曲泉	1	2.398
太谿	1	2.186	太谿	1	2.186
章門	1	2.059	章門	1	2.059

표 2.260: 병증 <癪癥>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	5	6.179
足太陰脾經	3	7.495
足陽明胃經	3	6.372
足太陽膀胱經	2	3.197
足厥陰肝經	2	2.229
足少陰腎經	1	2.186

표 2.261: 병증 <癪癥>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	8	6.256
소퇴	4	5.796

등	2	3.197
발	1	2.186
옆구리	1	2.059

2.88 積聚

이 병증 치료에는 모두 19가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.579차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脾俞 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 商曲 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 · 등 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.175: 병증 <積聚>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.176: 병증 <積聚>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.262: 병증 <積聚>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
脾俞	3	10.371	商曲	2	14.362
商曲	2	14.362	懸樞	2	12.760
懸樞	2	12.760	衝門	2	10.758
衝門	2	10.758	脾俞	3	10.371
陰谷	2	7.400	陰谷	2	7.400
三焦俞	2	6.694	三焦俞	2	6.694
上脘	2	6.003	上脘	2	6.003
膈俞	2	4.947	府舍	1	5.025
章門	2	4.339	膈俞	2	4.947
中脘	2	3.939	章門	2	4.339
府舍	1	5.025	中脘	2	3.939
地機	1	3.284	地機	1	3.284
四滿	1	2.950	四滿	1	2.950
足通谷	1	2.232	足通谷	1	2.232
膀胱俞	1	2.052	膀胱俞	1	2.052
中極	1	1.661	中極	1	1.661
期門	1	1.619	期門	1	1.619
肺俞	1	1.579	肺俞	1	1.579
肝俞	1	1.122	肝俞	1	1.122

표 2.263: 병증 <積聚>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	11	4.142
足少陰腎經	5	8.237
任脈	5	3.868
足太陰脾經	4	6.356
足厥陰肝經	3	2.979
督脈	2	12.760

표 2.264: 병증 <積聚>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	12	5.790
등	12	5.646
소퇴	3	5.342
옆구리	2	4.339
발	1	2.232

2.89 積氣

이 병증 치료에는 모두 11가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.182차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 梁門 · 章門 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 梁門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.177: 병증 <積氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.178: 병증 <積氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.265: 병증 <積氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
梁門	2	16.795	梁門	2	16.795
章門	2	7.358	章門	2	7.358
懸樞	1	6.662	懸樞	1	6.662
關門	1	6.359	關門	1	6.359
不容	1	5.303	不容	1	5.303
氣海	1	3.748	氣海	1	3.748
解谿	1	3.550	解谿	1	3.550
陰交	1	3.430	陰交	1	3.430
膻中	1	3.264	膻中	1	3.264
期門	1	3.065	期門	1	3.065
足三里	1	2.033	足三里	1	2.033

표 2.266: 병증 <積氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	6	6.808
足厥陰肝經	3	5.212
任脈	3	3.480
督脈	1	6.662

표 2.267: 병증 <積氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	7	6.450
옆구리	2	7.358
등	1	6.662
발	1	3.550
가슴	1	3.264

2.90 腹痛

이 병증 치료에는 모두 39가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.128차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 外陵 · 育俞 · 鳩尾 · 上脘 · 天樞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 外陵 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 24차례 사용되었다.




그림 2.179: 병증 <腹痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.180: 병증 <腹痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.268: 병증 <腹痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
外陵	2	12.8490	外陵	2	12.8490
肓俞	2	11.9714	肓俞	2	11.9714
鳩尾	2	6.1379	鳩尾	2	6.1379
上脘	2	4.6389	腹哀	1	5.0683
天樞	2	4.1800	商曲	1	5.0683
腹哀	1	5.0683	上脘	2	4.6389
商曲	1	5.0683	天樞	2	4.1800
衝門	1	3.3259	衝門	1	3.3259
不容	1	2.9913	不容	1	2.9913
石關	1	2.9913	石關	1	2.9913
溫溜	1	2.8463	溫溜	1	2.8463
地機	1	2.5902	地機	1	2.5902
下脘	1	2.4761	下脘	1	2.4761
四滿	1	2.2706	四滿	1	2.2706
豐隆	1	2.1775	豐隆	1	2.1775
大杼	1	1.9294	大杼	1	1.9294
水分	1	1.8556	水分	1	1.8556
陰谷	1	1.7855	陰谷	1	1.7855
胃俞	1	1.7855	胃俞	1	1.7855
陷谷	1	1.7189	陷谷	1	1.7189
氣海	1	1.5950	氣海	1	1.5950
氣衝	1	1.5373	氣衝	1	1.5373
三焦俞	1	1.4822	三焦俞	1	1.4822
膀胱俞	1	1.4294	膀胱俞	1	1.4294
太白	1	1.3304	太白	1	1.3304
中極	1	1.0770	中極	1	1.0770
脾俞	1	0.9701	脾俞	1	0.9701
復溜	1	0.9369	復溜	1	0.9369
行間	1	0.9049	行間	1	0.9049
照海	1	0.8151	照海	1	0.8151
膈俞	1	0.7872	膈俞	1	0.7872

腎俞	1	0.6840	腎俞	1	0.6840
太谿	1	0.6602	太谿	1	0.6602
崑崙	1	0.6602	崑崙	1	0.6602
巨闕	1	0.6371	巨闕	1	0.6371
石門	1	0.6148	石門	1	0.6148
魚際	1	0.6148	魚際	1	0.6148
中脘	1	0.4418	中脘	1	0.4418
足三里	1	0.3363	足三里	1	0.3363

표 2.269: 병증 <腹痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	11	2.1638
足陽明胃經	9	3.6843
足少陰腎經	9	3.3124
足太陽膀胱經	8	1.2160
足太陰脾經	4	3.0787
手陽明大腸經	1	2.8463
足厥陰肝經	1	0.9049
手太陰肺經	1	0.6148

표 2.270: 병증 <腹痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	24	3.7751
등	7	1.2954
발	7	1.0038
소퇴	4	1.7224
하박	1	2.8463
손	1	0.6148

2.91 腹滿

이 병증 치료에는 모두 36가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 衝門 · 漏谷 · 巨闕 · 石門 · 中脘 · 足三里 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 衝門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陰脾經으로 모두 10차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 16차례 사용되었다.




그림 2.181: 병증 <腹滿>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.182: 병증 <腹滿>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.271: 병증 <腹滿>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
衝門	2	9.4533	衝門	2	9.4533
漏谷	2	8.1648	漏谷	2	8.1648
巨闕	2	3.3997	府舍	1	4.3763
石門	2	3.3392	陰市	1	3.8297
中脘	2	2.8518	陰都	1	3.8297
足三里	2	2.5309	神堂	1	3.6085
府舍	1	4.3763	聽宮	1	3.4121
陰市	1	3.8297	巨闕	2	3.3997
陰都	1	3.8297	石門	2	3.3392
神堂	1	3.6085	懸鍾	1	3.2358
聽宮	1	3.4121	石關	1	3.0762
懸鍾	1	3.2358	意舍	1	2.9304
石關	1	3.0762	中脘	2	2.8518

意舍	1	2.9304	地機	1	2.6729
地機	1	2.6729	大都	1	2.6729
大都	1	2.6729	足三里	2	2.5309
四滿	1	2.3514	四滿	1	2.3514
膽俞	1	2.3514	膽俞	1	2.3514
大鐘	1	2.0861	大鐘	1	2.0861
譾譙	1	2.0861	譾譙	1	2.0861
水分	1	1.9329	水分	1	1.9329
陷谷	1	1.7948	陷谷	1	1.7948
隱白	1	1.7948	隱白	1	1.7948
厲兌	1	1.6696	厲兌	1	1.6696
足通谷	1	1.6696	足通谷	1	1.6696
氣衝	1	1.6112	氣衝	1	1.6112
商丘	1	1.4016	商丘	1	1.4016
太白	1	1.4016	太白	1	1.4016
上脘	1	1.2654	上脘	1	1.2654
期門	1	1.1064	期門	1	1.1064
行間	1	0.9686	行間	1	0.9686
曲泉	1	0.8767	曲泉	1	0.8767
照海	1	0.8767	照海	1	0.8767
崑崙	1	0.7177	崑崙	1	0.7177
魚際	1	0.6709	魚際	1	0.6709
肝俞	1	0.6709	肝俞	1	0.6709

표 2.272: 병증 <腹滿>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	10	3.9923
任脈	8	2.5578
足太陽膀胱經	7	2.0049
足陽明胃經	6	2.2873
足少陰腎經	5	2.4440
足厥陰肝經	3	0.9839
手太陽小腸經	1	3.4121

足少陽膽經	1	3.2358
手太陰肺經	1	0.6709

표 2.273: 병증 <腹滿>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	16	3.2161
발	11	1.5504
소퇴	7	3.4962
등	5	2.3295
대퇴	1	3.8297
얼굴	1	3.4121
손	1	0.6709

2.92 腹脹

이 병증 치료에는 모두 54가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.426차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脾俞 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 3차례 사용된 大腸俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 8.556차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 24차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 22차례 사용되었다.




그림 2.183: 병증 <腹脹>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.184: 병증 <腹脹>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.274: 병증 <腹脹>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
脾俞	4	9.1066	大腸俞	3	9.1280
大腸俞	3	9.1280	脾俞	4	9.1066
隱白	3	7.9207	隱白	3	7.9207
上脘	3	6.1650	上脘	3	6.1650
膈俞	3	4.7120	京門	2	5.4262
中脘	3	3.3752	膈俞	3	4.7120
京門	2	5.4262	陰谷	2	4.0149
陰谷	2	4.0149	血海	1	3.9941
三焦俞	2	3.3895	三焦俞	2	3.3895
太白	2	3.0747	中脘	3	3.3752
商丘	2	3.0747	胃倉	1	3.2358
中極	2	2.5452	太白	2	3.0747
期門	2	2.4676	商丘	2	3.0747
天樞	2	2.3926	中極	2	2.5452
章門	2	1.4678	中髎	1	2.5039
足三里	2	0.9436	期門	2	2.4676
血海	1	3.9941	天樞	2	2.3926
胃倉	1	3.2358	絡却	1	2.3195
中髎	1	2.5039	承滿	1	2.3195
絡却	1	2.3195	懸鍾	1	2.1551
承滿	1	2.3195	中膂俞	1	2.0074
懸鍾	1	2.1551	意舍	1	1.8737
中膂俞	1	2.0074	手五里	1	1.8737
意舍	1	1.8737	陽綱	1	1.7518
手五里	1	1.8737	章門	2	1.4678
陽綱	1	1.7518	膽俞	1	1.3544
膽俞	1	1.3544	公孫	1	1.3544
公孫	1	1.3544	內庭	1	1.1963
內庭	1	1.1963	大鐘	1	1.1251
大鐘	1	1.1251	少商	1	1.1251
少商	1	1.1251	譴謗	1	1.1251

臆譴	1	1.1251	水分	1	0.9957
水分	1	0.9957	鳩尾	1	0.9957
鳩尾	1	0.9957	足三里	2	0.9436
胃俞	1	0.9369	胃俞	1	0.9369
陷谷	1	0.8816	陷谷	1	0.8816
陽陵泉	1	0.8816	陽陵泉	1	0.8816
厲兌	1	0.7803	厲兌	1	0.7803
氣海	1	0.7803	氣海	1	0.7803
陰陵泉	1	0.7803	陰陵泉	1	0.7803
氣衝	1	0.7339	氣衝	1	0.7339
三陰交	1	0.6900	三陰交	1	0.6900
解谿	1	0.6485	解谿	1	0.6485
大敦	1	0.6093	大敦	1	0.6093
尺澤	1	0.5369	尺澤	1	0.5369
中府	1	0.5035	中府	1	0.5035
曲泉	1	0.2147	曲泉	1	0.2147
腎俞	1	0.1399	腎俞	1	0.1399
太谿	1	0.1274	太谿	1	0.1274
崑崙	1	0.1274	崑崙	1	0.1274
巨闕	1	0.1156	巨闕	1	0.1156
肝俞	1	0.1046	肝俞	1	0.1046
石門	1	0.1046	石門	1	0.1046
關元	1	0.0669	關元	1	0.0669

표 2.275: 병증 <腹脹>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	24	2.7385
任脈	14	1.6827
足太陰脾經	11	2.9841
足陽明胃經	10	1.2371
足厥陰肝經	6	1.1898
足少陽膽經	4	2.8210
足少陰腎經	4	1.7558

手太陰肺經	3	0.7218
手陽明大腸經	1	1.8737

표 2.276: 병증 <腹脹>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	22	2.9550
배	20	1.7737
발	16	1.7434
소퇴	9	1.3829
옆구리	4	3.4470
대퇴	1	3.9941
머리	1	2.3195
상박	1	1.8737
손	1	1.1251
하박	1	0.5369
가슴	1	0.5035

2.93 心腹堅大

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.353차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 水分 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 育門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.286차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.185: 병증 <心腹堅大>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.186: 병증 <心腹堅大>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.277: 병증 <心腹堅大>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
水分	3	15.194	肓門	2	16.558
肓門	2	16.558	水分	3	15.194
下脘	2	9.964	下脘	2	9.964
衝陽	2	7.820	衝陽	2	7.820
期門	2	6.581	期門	2	6.581
次髎	1	4.551	次髎	1	4.551
石關	1	4.203	石關	1	4.203
志室	1	4.050	志室	1	4.050
地機	1	3.780	地機	1	3.780
丘墟	1	3.154	丘墟	1	3.154
陰陵泉	1	2.699	陰陵泉	1	2.699
膀胱俞	1	2.511	膀胱俞	1	2.511
解谿	1	2.511	解谿	1	2.511
上脘	1	2.243	上脘	1	2.243
天樞	1	2.015	天樞	1	2.015
石門	1	1.525	石門	1	1.525
足三里	1	1.131	足三里	1	1.131

표 2.278: 병증 <心腹堅大>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	7	7.231
足太陽膀胱經	5	6.918
足陽明胃經	5	3.369
足厥陰肝經	2	6.581
足太陰脾經	2	3.239
足少陰腎經	1	4.203
足少陽膽經	1	3.154

표 2.279: 병증 <心腹堅大>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	11	5.960
등	5	6.918
발	4	4.495
소퇴	3	2.537

2.94 鼓脹

이 병증 치료에는 모두 12가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.417차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 水分 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 水分 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 8차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.187: 병증 <鼓脹>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.188: 병증 <鼓脹>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.280: 병증 <鼓脹>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
水分	3	16.960	水分	3	16.960
公孫	2	10.681	公孫	2	10.681
中封	2	8.582	中封	2	8.582
中脘	2	5.931	中脘	2	5.931
四滿	1	4.006	四滿	1	4.006
神闕	1	3.466	神闕	1	3.466
三陰交	1	3.116	三陰交	1	3.116
太白	1	2.937	太白	1	2.937
上脘	1	2.775	上脘	1	2.775
復溜	1	2.451	復溜	1	2.451
石門	1	2.018	石門	1	2.018
章門	1	1.957	章門	1	1.957

표 2.281: 병증 <鼓脹>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	8	6.230
足太陰脾經	4	5.578
足厥陰肝經	3	5.270
足少陰腎經	2	3.229

표 2.282: 병증 <鼓脹>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	9	5.860
발	6	6.163
소퇴	1	3.116
옆구리	1	1.957

2.95 水腫

이 병증 치료에는 모두 50가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.62차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 陷谷 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 陷谷 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 7.364차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 23차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.231차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 23차례 사용되었다.




그림 2.189: 병증 <水腫>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.190: 병증 <水腫>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.283: 병증 <水腫>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
陷谷	5	17.3986	陷谷	5	17.3986
四滿	3	9.4283	屋翳	2	9.5936
豊隆	3	9.1316	四滿	3	9.4283
水分	3	8.0960	豊隆	3	9.1316
復溜	3	5.0089	胃倉	2	8.8920
腎俞	3	4.0931	水分	3	8.0960
石門	3	3.8332	復溜	3	5.0089
章門	3	3.6703	曲骨	2	4.2962
屋翳	2	9.5936	腎俞	3	4.0931
胃倉	2	8.8920	神闕	2	3.8451
曲骨	2	4.2962	陰谷	2	3.8451
神闕	2	3.8451	石門	3	3.8332
陰谷	2	3.8451	章門	3	3.6703

陰陵泉	2	3.4570	維道	1	3.4797
氣衝	2	3.3392	陰陵泉	2	3.4570
陰交	2	2.9159	氣衝	2	3.3392
列缺	2	2.8205	陰交	2	2.9159
水溝	2	2.6405	關門	1	2.8621
然谷	2	1.3418	列缺	2	2.8205
關元	2	1.2568	水溝	2	2.6405
足三里	2	0.8368	陰市	1	2.6228
維道	1	3.4797	建里	1	2.6228
關門	1	2.8621	氣舍	1	2.2318
陰市	1	2.6228	缺盆	1	2.2318
建里	1	2.6228	巨髎	1	1.6696
氣舍	1	2.2318	地機	1	1.5593
缺盆	1	2.2318	天府	1	1.3644
巨髎	1	1.6696	然谷	2	1.3418
地機	1	1.5593	公孫	1	1.2777
天府	1	1.3644	關元	2	1.2568
公孫	1	1.2777	頤會	1	0.9871
頤會	1	0.9871	腦戶	1	0.9871
腦戶	1	0.9871	前頂	1	0.9259
前頂	1	0.9259	足三里	2	0.8368
陽陵泉	1	0.8145	陽陵泉	1	0.8145
上廉	1	0.7159	上廉	1	0.7159
厲兌	1	0.7159	厲兌	1	0.7159
衝陽	1	0.6709	衝陽	1	0.6709
上星	1	0.6284	上星	1	0.6284
解谿	1	0.5883	解谿	1	0.5883
完骨	1	0.5504	完骨	1	0.5504
合谷	1	0.5504	合谷	1	0.5504
大敦	1	0.5504	大敦	1	0.5504
中府	1	0.4487	中府	1	0.4487
中極	1	0.3370	中極	1	0.3370
天樞	1	0.2897	天樞	1	0.2897
間使	1	0.2897	間使	1	0.2897
曲泉	1	0.1763	曲泉	1	0.1763

涌泉	1	0.1466	涌泉	1	0.1466
太衝	1	0.1084	太衝	1	0.1084

표 2.284: 병증 <水腫>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	23	3.8702
任脈	16	3.4003
足少陰腎經	11	3.9541
督脈	6	1.2338
足厥陰肝經	6	1.1263
足太陽膀胱經	5	6.4925
足太陰脾經	4	2.0980
手太陰肺經	4	1.5445
足少陽膽經	3	1.6149
手陽明大腸經	2	0.6332
手厥陰心包經	1	0.2897

표 2.285: 병증 <水腫>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	23	3.5935
발	17	2.7807
소퇴	12	2.8315
등	5	6.4925
머리	5	0.8158
옆구리	4	3.5750
하박	4	1.2754
가슴	3	5.0211
얼굴	3	2.1550
목	2	2.2318
대퇴	1	2.6228
상박	1	1.3644

손	1	0.5504
---	---	--------

2.96 膽痛

이 병증 치료에는 모두 18가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 神闕 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 神闕 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 21차례 사용되었다.




그림 2.191: 병증 <膽痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.192: 병증 <臍痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.286: 병증 <臍痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
神闕	4	21.211	神闕	4	21.211
天樞	3	11.312	天樞	3	11.312
水分	2	8.101	水分	2	8.101
石門	2	4.962	外陵	1	6.096
關元	2	4.712	腹結	1	6.096
外陵	1	6.096	關門	1	5.003
腹結	1	6.096	石門	2	4.962
關門	1	5.003	關元	2	4.712
蠡溝	1	3.818	蠡溝	1	3.818
下脘	1	3.430	下脘	1	3.430
四滿	1	3.212	四滿	1	3.212
上廉	1	2.481	上廉	1	2.481
氣海	1	2.481	氣海	1	2.481

中封	1	2.240	中封	1	2.240
陰交	1	2.186	陰交	1	2.186
中極	1	1.895	中極	1	1.895
曲泉	1	1.584	曲泉	1	1.584
然谷	1	1.280	然谷	1	1.280

표 2.287: 병증 <膽痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	14	6.122
足陽明胃經	5	7.471
足厥陰肝經	3	2.548
足少陰腎經	2	2.246
足太陰脾經	1	6.096
手陽明大腸經	1	2.481

표 2.288: 병증 <膽痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	21	6.207
소퇴	2	2.701
발	2	1.760
하박	1	2.481

2.97 膽痛

이 병증 치료에는 모두 3가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 玉堂 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 玉堂 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 1가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 4차례 사용되었다.




그림 2.193: 병증 <膿痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.194: 병증 <膽痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.289: 병증 <膽痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
玉堂	2	18.729	玉堂	2	18.729
天谿	1	9.001	天谿	1	9.001
紫宮	1	7.796	紫宮	1	7.796

표 2.290: 병증 <膽痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	3	13.262
足太陰脾經	1	9.001

표 2.291: 병증 <膺痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	4	11.84

2.98 胸滿

이 병증 치료에는 모두 64가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.578차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 期門 · 章門 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 食竇 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 7.769차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈 · 足太陽膀胱經으로 모두 16차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 9.182차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 32차례 사용되었다.




그림 2.195: 병증 <胸滿>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.196: 병증 <胸滿>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.292: 병증 <胸滿>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
期門	4	7.6034	食竇	2	10.7194
章門	4	5.2959	靈墟	2	9.6032
中庭	3	9.5971	中庭	3	9.5971
天池	3	7.9374	氣戶	2	8.7451
雲門	3	7.4059	天池	3	7.9374
涌泉	3	3.3778	期門	4	7.6034
食竇	2	10.7194	周榮	2	7.4682
靈墟	2	9.6032	雲門	3	7.4059
氣戶	2	8.7451	璣璣	2	6.9686
周榮	2	7.4682	神藏	2	6.9686
璣璣	2	6.9686	陽交	2	6.5320
神藏	2	6.9686	神堂	2	6.5320
陽交	2	6.5320	華蓋	2	6.5320
神堂	2	6.5320	庫房	2	5.7984
華蓋	2	6.5320	紫宮	2	5.7984
庫房	2	5.7984	章門	4	5.2959
紫宮	2	5.7984	天容	2	5.1992
天容	2	5.1992	商陽	2	3.7177
商陽	2	3.7177	俠谿	2	3.5571
俠谿	2	3.5571	天泉	1	3.4843
胃俞	2	3.1265	神封	1	3.4843
三間	2	2.6480	外丘	1	3.4843
陽谿	2	2.3444	涌泉	3	3.3778
肺俞	2	1.6355	胃俞	2	3.1265
太淵	2	1.3369	梁門	1	3.0726
足臨泣	2	1.3369	天髎	1	2.7424
膈俞	2	1.2320	膈關	1	2.7424
曲池	2	1.2320	三間	2	2.6480
巨闕	2	0.9586	魂門	1	2.4686
天泉	1	3.4843	膺窓	1	2.4686
神封	1	3.4843	或中	1	2.4686

外丘	1	3.4843	人迎	1	2.4686
梁門	1	3.0726	陽谿	2	2.3444
天髎	1	2.7424	俞府	1	2.2361
膈關	1	2.7424	玉堂	1	1.8588
魂門	1	2.4686	缺盆	1	1.8588
膺窓	1	2.4686	乳根	1	1.7027
或中	1	2.4686	肺俞	2	1.6355
人迎	1	2.4686	委陽	1	1.4377
俞府	1	2.2361	太淵	2	1.3369
玉堂	1	1.8588	足臨泣	2	1.3369
缺盆	1	1.8588	神道	1	1.3240
乳根	1	1.7027	膈俞	2	1.2320
委陽	1	1.4377	曲池	2	1.2320
神道	1	1.3240	浮白	1	1.1259
浮白	1	1.1259	膽俞	1	0.9594
膽俞	1	0.9594	巨闕	2	0.9586
大杼	1	0.6962	大杼	1	0.6962
鳩尾	1	0.6418	鳩尾	1	0.6418
陽陵泉	1	0.5440	陽陵泉	1	0.5440
陷谷	1	0.5440	陷谷	1	0.5440
上廉	1	0.4592	上廉	1	0.4592
足通谷	1	0.4592	足通谷	1	0.4592
中府	1	0.2397	中府	1	0.2397
膻中	1	0.2163	膻中	1	0.2163
上脘	1	0.2163	上脘	1	0.2163
前谷	1	0.1742	前谷	1	0.1742
間使	1	0.1218	間使	1	0.1218
心俞	1	0.1218	心俞	1	0.1218
曲泉	1	0.0494	曲泉	1	0.0494
足三里	1	0.0381	足三里	1	0.0381
石門	1	0.0048	石門	1	0.0048
肝俞	1	0.0048	肝俞	1	0.0048
然谷	1	0.0011	然谷	1	0.0011

표 2.293: 병증 <胸滿>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	16	3.279
足太陽膀胱經	16	1.785
足少陰腎經	11	4.020
足陽明胃經	11	2.966
足厥陰肝經	9	4.316
足少陽膽經	9	2.763
手陽明大腸經	9	2.080
手太陰肺經	6	2.994
手厥陰心包經	5	3.848
足太陰脾經	4	9.094
手太陽小腸經	3	2.687
手少陽三焦經	1	2.742
督脈	1	1.324

표 2.294: 병증 <胸滿>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	32	5.2779
등	15	1.8948
배	10	2.0829
발	10	1.5460
손	9	2.0442
옆구리	7	6.6166
소퇴	7	2.0143
목	4	3.1756
하박	4	0.6043
상박	2	3.1134
머리	1	1.1259

2.99 胸脇痛

이 병증 치료에는 모두 57가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.421차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 丘墟 · 中府 · 期門 · 肝俞 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 太包 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.231차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 15차례 사용되었다.




그림 2.197: 병증 <胸脇痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.198: 병증 <胸脇痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.295: 병증 <胸脇痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
丘墟	3	8.5864	大包	2	10.4585
中府	3	6.0553	丘墟	3	8.5864
期門	3	5.3705	華蓋	2	7.3532
肝俞	3	3.8332	乳根	2	6.6059
大包	2	10.4585	中府	3	6.0553
華蓋	2	7.3532	顱息	2	5.7243
乳根	2	6.6059	期門	3	5.3705
顱息	2	5.7243	膽俞	2	4.8298
膽俞	2	4.8298	足竅陰	2	4.6412
足竅陰	2	4.6412	豐隆	2	4.6412
豐隆	2	4.6412	雲門	2	4.2962
雲門	2	4.2962	肝俞	3	3.8332
少衝	2	3.5803	少衝	2	3.5803

腕骨	2	3.1186	天谿	1	3.1428
膻中	2	2.6405	腕骨	2	3.1186
陽谷	2	2.3183	魂門	1	2.8621
間使	2	2.2447	膻中	2	2.6405
太淵	2	1.9120	俞府	1	2.6228
足臨泣	2	1.9120	陽谷	2	2.3183
腎俞	2	1.5775	間使	2	2.2447
天谿	1	3.1428	玉堂	1	2.2318
魂門	1	2.8621	承滿	1	2.2318
俞府	1	2.6228	極泉	1	2.2318
玉堂	1	2.2318	紫宮	1	2.0689
承滿	1	2.2318	幽門	1	1.9226
極泉	1	2.2318	中膂俞	1	1.9226
紫宮	1	2.0689	太淵	2	1.9120
幽門	1	1.9226	足臨泣	2	1.9120
中膂俞	1	1.9226	志室	1	1.7902
志室	1	1.7902	環跳	1	1.7902
環跳	1	1.7902	本神	1	1.6696
本神	1	1.6696	腎俞	2	1.5775
陽輔	1	1.4579	陽輔	1	1.4579
浮白	1	1.4579	浮白	1	1.4579
廉泉	1	1.3644	廉泉	1	1.3644
至陰	1	1.0525	至陰	1	1.0525
少商	1	1.0525	少商	1	1.0525
少澤	1	1.0525	少澤	1	1.0525
經渠	1	0.9259	經渠	1	0.9259
隱白	1	0.8145	隱白	1	0.8145
支溝	1	0.7637	支溝	1	0.7637
上廉	1	0.7159	上廉	1	0.7159
下廉	1	0.6284	下廉	1	0.6284
太白	1	0.5146	太白	1	0.5146
天井	1	0.4807	天井	1	0.4807
尺澤	1	0.4807	尺澤	1	0.4807
大陵	1	0.3626	大陵	1	0.3626
肺俞	1	0.2897	肺俞	1	0.2897

脾俞	1	0.2680	脾俞	1	0.2680
膈俞	1	0.1610	膈俞	1	0.1610
太谿	1	0.0972	太谿	1	0.0972
巨闕	1	0.0868	巨闕	1	0.0868
魚際	1	0.0771	魚際	1	0.0771
章門	1	0.0597	章門	1	0.0597
關元	1	0.0449	關元	1	0.0449
中脘	1	0.0179	中脘	1	0.0179
足三里	1	0.0010	足三里	1	0.0010

표 2.296: 병증 <胸脇痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	14	1.8586
足少陽膽經	11	3.0736
手太陰肺經	11	2.1142
任脈	10	1.9760
足陽明胃經	6	3.3700
足太陰脾經	5	3.7326
手太陽小腸經	5	2.1631
足厥陰肝經	4	2.7151
手少陽三焦經	4	2.3229
手少陰心經	3	2.9061
足少陰腎經	3	1.5475
手厥陰心包經	3	1.3037
手陽明大腸經	2	0.6722

표 2.297: 병증 <胸脇痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	15	4.113
등	13	1.948
발	11	2.517

손	10	1.594
하박	10	1.070
배	8	1.612
소퇴	4	2.033
옆구리	3	5.259
머리	3	3.591
얼굴	2	1.517
상박	1	2.232
대퇴	1	1.790

2.100 脇痛

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.381차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 天突 · 臟中 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 廓陰俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.636차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 8차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.199: 병증 <膈痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.200: 병증 <膈痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.298: 병증 <膈痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
天突	3	11.783	厥陰俞	2	12.894
膻中	3	11.450	天突	3	11.783
厥陰俞	2	12.894	膻中	3	11.450
乳根	2	10.519	乳根	2	10.519
關衝	2	7.855	關衝	2	7.855
膈俞	2	5.067	食竇	1	6.447
食竇	1	6.447	膈俞	2	5.067
神堂	1	4.309	神堂	1	4.309
扶突	1	4.309	扶突	1	4.309
承滿	1	4.108	承滿	1	4.108
率谷	1	3.928	率谷	1	3.928
中庭	1	3.475	中庭	1	3.475
天池	1	2.914	天池	1	2.914
商陽	1	2.821	商陽	1	2.821
大鐘	1	2.734	大鐘	1	2.734
諽諽	1	2.734	諽諽	1	2.734
隱白	1	2.425	隱白	1	2.425
中府	1	1.899	中府	1	1.899
足臨泣	1	1.447	足臨泣	1	1.447
巨闕	1	1.199	巨闕	1	1.199
章門	1	1.119	章門	1	1.119

표 2.299: 병증 <膈痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	8	6.977
足太陽膀胱經	6	6.251
足陽明胃經	3	7.314
手少陽三焦經	2	7.855

足太陰脾經	2	4.436
手陽明大腸經	2	3.565
足少陽膽經	2	2.687
手厥陰心包經	1	2.914
足少陰腎經	1	2.734
手太陰肺經	1	1.899
足厥陰肝經	1	1.119

표 2.300: 병증 <膈痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	11	7.596
등	6	6.251
손	3	5.338
발	3	2.202
배	2	2.654
옆구리	2	2.016
목	1	4.309
머리	1	3.928

2.101 背痛

이 병증 치료에는 모두 26가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.192차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 魄戶 · 經渠 · 肺俞 · 膽俞 · 魚際 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 魄戶 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 18차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.875차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 16차례 사용되었다.




그림 2.201: 병증 <背痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.202: 병증 <背痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.301: 병증 <背痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
魄戶	2	9.922	魄戶	2	9.922
經渠	2	7.436	經渠	2	7.436
肺俞	2	5.403	肺俞	2	5.403
膈俞	2	4.832	秩邊	1	5.315
魚際	2	4.351	氣戶	1	5.315
秩邊	1	5.315	膈關	1	4.961
氣戶	1	5.315	膈俞	2	4.832
膈關	1	4.961	附分	1	4.663
附分	1	4.663	魚際	2	4.351
神堂	1	4.182	神堂	1	4.182
巨骨	1	4.182	巨骨	1	4.182
不容	1	3.638	不容	1	3.638
志室	1	3.489	志室	1	3.489

意舍	1	3.489	意舍	1	3.489
雲門	1	2.615	雲門	1	2.615
丘墟	1	2.615	丘墟	1	2.615
蹠蹠	1	2.615	蹠蹠	1	2.615
承筋	1	2.532	承筋	1	2.532
京骨	1	2.379	京骨	1	2.379
胃俞	1	2.379	胃俞	1	2.379
大椎	1	2.308	大椎	1	2.308
列缺	1	1.838	列缺	1	1.838
膻中	1	1.741	膻中	1	1.741
心俞	1	1.527	心俞	1	1.527
崑崙	1	1.129	崑崙	1	1.129
巨闕	1	1.102	巨闕	1	1.102

표 2.302: 병증 <背痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	18	3.921
手太陰肺經	6	4.060
足陽明胃經	2	4.477
任脈	2	1.422
手陽明大腸經	1	4.182
足少陽膽經	1	2.615
督脈	1	2.308

표 2.303: 병증 <背痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	16	4.237
하박	3	4.637
가슴	3	3.224
발	3	2.041
손	2	4.351

배	2	2.370
상박	1	4.182
소퇴	1	2.532

2.102 肩背酸痛

이 병증 치료에는 모두 42가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.452차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 巨骨 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 巨骨 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.083차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手少陽三焦經 · 手太陽小腸經 · 足太陽膀胱經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.1차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 상박 부위이며 모두 19차례 사용되었다.




그림 2.203: 병증 <肩背酸痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.204: 병증 <肩背酸痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.304: 병증 <肩背酸痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
巨骨	4	22.2095	巨骨	4	22.2095
肩髎	3	18.4213	肩髎	3	18.4213
青靈	3	18.4213	青靈	3	18.4213
肩外俞	2	10.6937	肩外俞	2	10.6937
養老	2	10.6937	養老	2	10.6937
天宗	2	9.9853	天宗	2	9.9853
天髎	2	9.9853	天髎	2	9.9853
神堂	2	8.4260	神堂	2	8.4260
諺諧	2	5.2870	諺諧	2	5.2870
關衝	2	5.1217	關衝	2	5.1217
支溝	2	4.5369	曲垣	1	4.9926
天柱	2	4.4068	支溝	2	4.5369
三焦俞	2	4.1626	居髎	1	4.4381
天井	2	3.7292	天柱	2	4.4068
章門	2	2.0933	三焦俞	2	4.1626
曲垣	1	4.9926	天井	2	3.7292
居髎	1	4.4381	附分	1	3.3814
附分	1	3.3814	水道	1	2.9205
水道	1	2.9205	肩貞	1	2.9205
肩貞	1	2.9205	缺盆	1	2.7306
缺盆	1	2.7306	神道	1	2.1411
神道	1	2.1411	章門	2	2.0933
肩井	1	2.0239	肩井	1	2.0239
京門	1	1.9157	京門	1	1.9157
浮白	1	1.9157	浮白	1	1.9157
天窓	1	1.7218	天窓	1	1.7218
商陽	1	1.5528	商陽	1	1.5528
天牖	1	1.5528	天牖	1	1.5528
雲門	1	1.4761	雲門	1	1.4761
大杼	1	1.4039	大杼	1	1.4039
大椎	1	1.2108	大椎	1	1.2108

後谿	1	1.2108	後谿	1	1.2108
腕骨	1	0.9504	腕骨	1	0.9504
尺澤	1	0.8223	尺澤	1	0.8223
列缺	1	0.8223	列缺	1	0.8223
天突	1	0.8223	天突	1	0.8223
中府	1	0.7834	中府	1	0.7834
前谷	1	0.6769	前谷	1	0.6769
曲池	1	0.4069	曲池	1	0.4069
膈俞	1	0.4069	膈俞	1	0.4069
涌泉	1	0.3856	涌泉	1	0.3856
肝俞	1	0.2751	肝俞	1	0.2751

표 2.305: 병증 <肩背酸痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手少陽三焦經	12	7.2245
手太陽小腸經	12	4.8717
足太陽膀胱經	12	3.4687
手陽明大腸經	6	8.0564
足少陽膽經	4	2.5734
手太陰肺經	4	0.9760
手少陰心經	3	18.4213
足陽明胃經	2	2.8256
足厥陰肝經	2	2.0933
督脈	2	1.6759
任脈	1	0.8223
足少陰腎經	1	0.3856

표 2.306: 병증 <肩背酸痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
상박	19	11.0726
등	12	2.9661

하박	9	3.5019
손	6	1.9025
옆구리	4	2.8157
머리	3	3.1612
목	3	2.0018
가슴	3	1.0273
배	1	2.9205
발	1	0.3856

2.103 肩痺痛

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 曲垣 · 天井 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 曲垣 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陽小腸經 · 手少陽三焦經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 상박 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.205: 병증 <肩痺痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.206: 병증 <肩痺痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.307: 병증 <肩痺痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
曲垣	2	19.496	曲垣	2	19.496
天井	2	10.017	天井	2	10.017
肩髎	1	7.353	肩髎	1	7.353
肩外俞	1	7.353	肩外俞	1	7.353
天髎	1	6.992	天髎	1	6.992
肩貞	1	6.193	肩貞	1	6.193
關衝	1	4.454	關衝	1	4.454
陽谷	1	3.373	陽谷	1	3.373
曲池	1	3.030	曲池	1	3.030

표 2.308: 병증 <肩痺痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陽小腸經	5	9.104
手少陽三焦經	5	7.204
手陽明大腸經	1	3.030

표 2.309: 병증 <肩痺痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
상박	6	9.477
하박	4	5.473
손	1	4.454

2.104 臂痛

이 병증 치료에는 모두 38가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.763차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 肩髃 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 肩髃 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.7차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陽小腸經으로 모두 21차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 20차례 사용되었다.




그림 2.207: 병증 <臂痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.208: 병증 <臂痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.310: 병증 <臂痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
肩髃	5	25.4410	肩髃	5	25.4410
前谷	4	10.8090	天宗	3	16.7976
天宗	3	16.7976	前谷	4	10.8090
後谿	3	8.6699	臂臑	2	9.0286
腕骨	3	7.6905	肘髎	2	9.0286
陽谷	3	6.3224	後谿	3	8.6699
曲池	3	5.3861	巨骨	2	8.0692
臂臑	2	9.0286	孔最	2	8.0692
肘髎	2	9.0286	腕骨	3	7.6905
巨骨	2	8.0692	聽宮	2	7.6706
孔最	2	8.0692	乳根	2	7.3123
聽宮	2	7.6706	陽谷	3	6.3224
乳根	2	7.3123	曲池	3	5.3861

足竅陰	2	5.3093	足竅陰	2	5.3093
液門	2	4.3489	液門	2	4.3489
少海	2	4.3489	少海	2	4.3489
陽谿	2	3.6259	居髎	1	4.2587
尺澤	2	3.4216	陽池	1	4.2587
太淵	2	2.4557	養老	1	3.8353
居髎	1	4.2587	肩髎	1	3.8353
陽池	1	4.2587	陽谿	2	3.6259
養老	1	3.8353	臑會	1	3.4936
肩髎	1	3.8353	尺澤	2	3.4216
臑會	1	3.4936	附分	1	3.2082
附分	1	3.2082	外關	1	2.9640
外關	1	2.9640	肩貞	1	2.7513
肩貞	1	2.7513	極泉	1	2.5635
極泉	1	2.5635	太淵	2	2.4557
手五里	1	2.1075	手五里	1	2.1075
支正	1	1.7609	支正	1	1.7609
中渚	1	1.1954	中渚	1	1.1954
經渠	1	1.1954	經渠	1	1.1954
神門	1	1.0189	神門	1	1.0189
合谷	1	0.7816	合谷	1	0.7816
列缺	1	0.7023	列缺	1	0.7023
間使	1	0.4779	間使	1	0.4779
章門	1	0.1713	章門	1	0.1713
足三里	1	0.0456	足三里	1	0.0456

표 2.311: 병증 <臂痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陽小腸經	21	7.3675
手陽明大腸經	18	7.9335
手太陰肺經	8	3.1688
手少陽三焦經	7	3.3493
手少陰心經	4	2.6438

足少陽膽經	3	4.7840
足陽明胃經	3	3.6789
足太陽膀胱經	1	3.2082
手厥陰心包經	1	0.4779
足厥陰肝經	1	0.1713

표 2.312: 병증 <臂痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	20	4.4854
상박	19	8.3116
하박	18	3.4985
얼굴	2	7.6706
가슴	2	7.3123
발	2	5.3093
옆구리	2	2.2150
등	1	3.2082
소퇴	1	0.0456

2.105 腋痛

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.529차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 少海 · 足臨泣 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 少海 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 9차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.209: 병증 <腋痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.210: 병증 <腋痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.313: 병증 <腋痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
少海	3	13.999	少海	3	13.999
足臨泣	3	10.650	足臨泣	3	10.650
委陽	2	10.294	委陽	2	10.294
陽輔	2	9.490	陽輔	2	9.490
申脈	2	8.829	申脈	2	8.829
天池	2	8.829	天池	2	8.829
丘墟	2	8.447	丘墟	2	8.447
地五會	1	6.662	地五會	1	6.662
會陽	1	4.518	會陽	1	4.518
少府	1	3.679	少府	1	3.679
膽俞	1	3.212	膽俞	1	3.212
譴謫	1	2.930	譴謫	1	2.930
俠谿	1	2.930	俠谿	1	2.930
承筋	1	2.846	承筋	1	2.846
支溝	1	2.548	支溝	1	2.548
大陵	1	1.940	大陵	1	1.940
間使	1	1.811	間使	1	1.811

표 2.314: 병증 <腋痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	9	7.636
足太陽膀胱經	8	5.439
手少陰心經	4	8.839
手厥陰心包經	4	4.193
手少陽三焦經	1	2.548

표 2.315: 병증 <腋痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	9	7.504
소퇴	5	7.543
하박	5	6.119
등	3	3.554
옆구리	2	8.829
손	2	2.809

2.106 腕勞

이 병증 치료에는 모두 8가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 外關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.211: 병증 <腕勞>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.212: 병증 <腕勞>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.316: 병증 <腕勞>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
外關	1	7.053	外關	1	7.053
通里	1	5.459	通里	1	5.459
偏歷	1	5.159	偏歷	1	5.159
後谿	1	4.821	後谿	1	4.821
腕骨	1	4.470	腕骨	1	4.470
陽谿	1	4.407	陽谿	1	4.407
列缺	1	4.287	列缺	1	4.287
曲池	1	3.618	曲池	1	3.618

표 2.317: 병증 <腕勞>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	3	4.395
手太陽小腸經	2	4.645
手少陽三焦經	1	7.053
手少陰心經	1	5.459
手太陰肺經	1	4.287

표 2.318: 병증 <腕勞>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	5	5.115
손	3	4.566

2.107 肘痛

이 병증 치료에는 모두 39가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.487차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 曲池 혈(穴)로 모두 6차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 曲池 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 15차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 9.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 24차례 사용되었다.




그림 2.213: 병증 <肘痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.214: 병증 <肘痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.319: 병증 <肘痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
曲池	6	19.6001	曲池	6	19.6001
肘髎	3	16.7395	肘髎	3	16.7395
魚際	3	5.4127	靈道	2	9.0698
靈道	2	9.0698	支正	2	6.4558
支正	2	6.4558	魚際	3	5.4127
關衝	2	5.3009	關衝	2	5.3009
中渚	2	5.1429	中渚	2	5.1429
後谿	2	4.8490	手三里	1	5.0904
腕骨	2	4.2189	後谿	2	4.8490
陽谿	2	4.1075	腕骨	2	4.2189
尺澤	2	3.8971	肩外俞	1	4.1084
天井	2	3.8971	陽谿	2	4.1075
足三里	2	1.6226	尺澤	2	3.8971

手三里	1	5.0904	天井	2	3.8971
肩外俞	1	4.1084	天髎	1	3.7636
天髎	1	3.7636	天宗	1	3.7636
天宗	1	3.7636	臑會	1	3.7636
臑會	1	3.7636	附分	1	3.4751
附分	1	3.4751	孔最	1	3.0121
孔最	1	3.0121	極泉	1	2.8212
極泉	1	2.8212	內關	1	2.6504
內關	1	2.6504	中臂俞	1	2.4962
中臂俞	1	2.4962	手五里	1	2.3560
手五里	1	2.3560	中衝	1	2.1094
中衝	1	2.1094	足竅陰	1	1.7159
足竅陰	1	1.7159	足三里	2	1.6226
譴譴	1	1.5554	譴譴	1	1.5554
偏歷	1	1.5554	偏歷	1	1.5554
液門	1	1.2860	液門	1	1.2860
少海	1	1.2860	少海	1	1.2860
支溝	1	1.2274	支溝	1	1.2274
衝陽	1	1.1188	衝陽	1	1.1188
下廉	1	1.0684	下廉	1	1.0684
列缺	1	0.8893	列缺	1	0.8893
前谷	1	0.7398	前谷	1	0.7398
大陵	1	0.7398	大陵	1	0.7398
陽谷	1	0.6741	陽谷	1	0.6741
間使	1	0.6433	間使	1	0.6433
太淵	1	0.5069	太淵	1	0.5069

표 2.320: 병증 <肘痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	15	7.217
手太陽小腸經	10	3.544
手少陽三焦經	10	3.483
手太陰肺經	8	2.744

手少陰心經	4	4.392
手厥陰心包經	4	1.536
足太陽膀胱經	3	2.509
足陽明胃經	3	1.371
足少陽膽經	1	1.716

표 2.321: 병증 <肘痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	24	4.068
손	18	3.128
상박	9	5.331
등	3	2.509
소퇴	2	1.623
발	2	1.417

2.108 手麻痺不仁

이 병증 치료에는 모두 22가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.318차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 勞宮 · 曲池 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 肘髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.215: 병증 <手麻痺不仁>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.216: 병증 <手麻痺不仁>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.322: 병증 <手麻痺不仁>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
勞宮	3	11.450	肘髎	2	12.287
曲池	3	9.800	勞宮	3	11.450
肘髎	2	12.287	曲池	3	9.800
天井	2	6.343	天井	2	6.343
列缺	2	6.343	列缺	2	6.343
臑會	1	5.090	臑會	1	5.090
附分	1	4.792	附分	1	4.792
外關	1	4.535	外關	1	4.535
肩貞	1	4.309	肩貞	1	4.309
白環俞	1	3.764	白環俞	1	3.764
中衝	1	3.347	中衝	1	3.347
內庭	1	2.821	內庭	1	2.821
少商	1	2.734	少商	1	2.734
經渠	1	2.571	經渠	1	2.571
支溝	1	2.356	支溝	1	2.356
少衝	1	2.356	少衝	1	2.356
上廉	1	2.290	上廉	1	2.290
腕骨	1	2.109	腕骨	1	2.109
中封	1	2.054	中封	1	2.054
陽谿	1	2.054	陽谿	1	2.054
間使	1	1.633	間使	1	1.633
太淵	1	1.447	太淵	1	1.447

표 2.323: 병증 <手麻痺不仁>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	7	6.608
手厥陰心包經	5	5.477
手少陽三焦經	5	4.581

手太陰肺經	5	3.274
足太陽膀胱經	2	4.278
手太陽小腸經	2	3.209
足陽明胃經	1	2.821
手少陰心經	1	2.356
足厥陰肝經	1	2.054

표 2.324: 병증 <手麻痺不仁>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	12	4.484
손	9	3.642
상박	4	7.229
등	2	4.278
발	2	2.438

2.109 手指攣

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.214차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中渚 · 腕骨 · 大陵 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 中渚 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.125차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陽小腸經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 10차례 사용되었다.




그림 2.217: 병증 <手指擊>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.218: 병증 <手指擊>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.325: 병증 <手指攀>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中渚	2	9.729	中渚	2	9.729
腕骨	2	8.707	腕骨	2	8.707
大陵	2	7.909	大陵	2	7.909
養老	1	6.493	養老	1	6.493
外關	1	5.570	外關	1	5.570
肩髃	1	4.628	肩髃	1	4.628
少府	1	4.486	少府	1	4.486
少商	1	3.716	少商	1	3.716
後谿	1	3.390	後谿	1	3.390
少衝	1	3.317	少衝	1	3.317
陰交	1	2.937	陰交	1	2.937
尺澤	1	2.881	尺澤	1	2.881
心俞	1	2.537	心俞	1	2.537
肝俞	1	2.018	肝俞	1	2.018

표 2.326: 병증 <手指攀>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陽小腸經	4	6.197
手少陽三焦經	3	7.650
手厥陰心包經	2	7.909
手少陰心經	2	3.902
手太陰肺經	2	3.299
足太陽膀胱經	2	2.278
手陽明大腸經	1	4.628
任脈	1	2.937

표 2.327: 병증 <手指攀>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	10	5.894
하박	3	4.981
등	2	2.278
상박	1	4.628
배	1	2.937

2.110 手熱

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.381차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中衝 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 中衝 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.417차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手厥陰心包經으로 모두 8차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 · 하박 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.219: 병증 <手熱>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.220: 병증 <手熱>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.328: 병증 <手熱>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中衝	3	16.335	中衝	3	16.335
經渠	2	7.688	經渠	2	7.688
少衝	2	7.227	少衝	2	7.227
列缺	2	6.343	列缺	2	6.343
間使	2	5.643	間使	2	5.643
太淵	2	5.221	肩外俞	1	5.445
太谿	2	4.712	太淵	2	5.221
肩外俞	1	5.445	太谿	2	4.712
內關	1	3.928	內關	1	3.928
大都	1	3.347	大都	1	3.347
豐隆	1	2.914	豐隆	1	2.914
內庭	1	2.821	內庭	1	2.821
少商	1	2.734	少商	1	2.734
譴謫	1	2.734	譴謫	1	2.734
陽陵泉	1	2.425	陽陵泉	1	2.425
曲澤	1	2.290	曲澤	1	2.290
勞宮	1	1.851	勞宮	1	1.851
行間	1	1.518	行間	1	1.518
曲池	1	1.380	曲池	1	1.380
巨闕	1	1.199	巨闕	1	1.199
章門	1	1.119	章門	1	1.119

표 2.329: 병증 <手熱>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手厥陰心包經	8	6.009
手太陰肺經	7	5.496
手少陰心經	2	7.227
足少陰腎經	2	4.712

足陽明胃經	2	2.868
足厥陰肝經	2	1.319
手太陽小腸經	1	5.445
足太陰脾經	1	3.347
足太陽膀胱經	1	2.734
足少陽膽經	1	2.425
手陽明大腸經	1	1.380
任脈	1	1.199

표 2.330: 병증 <手熱>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	9	6.673
하박	9	4.545
발	5	3.100
소퇴	2	2.669
상박	1	5.445
등	1	2.734
배	1	1.199
옆구리	1	1.119

2.111 足麻痺

이 병증 치료에는 모두 18가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 腰陽關 · 陽陵泉 · 膀胱俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 腰陽關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.221: 병증 <足麻痺>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.222: 병증 <足麻痺>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.331: 병증 <足麻痺>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
腰陽關	2	12.568	腰陽關	2	12.568
陽陵泉	2	8.597	陽陵泉	2	8.597
膀胱俞	2	7.903	膀胱俞	2	7.903
浮郄	1	6.077	浮郄	1	6.077
髀關	1	6.077	髀關	1	6.077
陽交	1	4.930	陽交	1	4.930
攢鼻	1	4.727	攢鼻	1	4.727
中都	1	4.727	中都	1	4.727
白環俞	1	4.376	白環俞	1	4.376
腰俞	1	4.376	腰俞	1	4.376
環跳	1	4.223	環跳	1	4.223
陽輔	1	3.830	陽輔	1	3.830
至陰	1	3.322	至陰	1	3.322

承筋	1	3.236	承筋	1	3.236
風府	1	2.862	風府	1	2.862
上廉	1	2.862	上廉	1	2.862
陰陵泉	1	2.862	陰陵泉	1	2.862
太谿	1	1.731	太谿	1	1.731

표 2.332: 병증 <足麻痺>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	4.983
足少陽膽經	5	5.395
督脈	4	6.602
足陽明胃經	2	5.402
足厥陰肝經	1	4.727
手陽明大腸經	1	2.862
足太陰脾經	1	2.862
足少陰腎經	1	1.731

표 2.333: 병증 <足麻痺>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	7	4.697
등	6	7.306
대퇴	4	5.276
발	2	2.526
머리	1	2.862
하박	1	2.862

2.112 足不能行

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.12차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 足三里 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 飛揚 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 9차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 13차례 사용되었다.




그림 2.223: 병증 <足不能行>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.224: 병증 <足不能行>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.334: 병증 <足不能行>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
足三里	3	7.825	飛揚	2	7.988
飛揚	2	7.988	足三里	3	7.825
合陽	1	4.376	合陽	1	4.376
中都	1	4.175	中都	1	4.175
大巨	1	4.175	大巨	1	4.175
跗陽	1	3.994	跗陽	1	3.994
漏谷	1	3.541	漏谷	1	3.541
浮白	1	3.293	浮白	1	3.293
京門	1	3.293	京門	1	3.293
僕參	1	3.181	僕參	1	3.181
申脈	1	2.978	申脈	1	2.978
豊隆	1	2.978	豊隆	1	2.978
承山	1	2.713	承山	1	2.713

支溝	1	2.417	支溝	1	2.417
上廉	1	2.351	上廉	1	2.351
天柱	1	2.351	天柱	1	2.351
衝陽	1	2.288	衝陽	1	2.288
下廉	1	2.228	下廉	1	2.228
三陰交	1	2.228	三陰交	1	2.228
完骨	1	2.113	完骨	1	2.113
脾俞	1	1.650	脾俞	1	1.650
復溜	1	1.611	復溜	1	1.611
行間	1	1.574	行間	1	1.574
曲泉	1	1.468	曲泉	1	1.468
然谷	1	1.170	然谷	1	1.170

표 2.335: 병증 <足不能行>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	9	3.654
足陽明胃經	6	4.316
足少陽膽經	3	2.900
足厥陰肝經	3	2.405
足太陰脾經	2	2.884
手陽明大腸經	2	2.289
足少陰腎經	2	1.391
手少陽三焦經	1	2.417

표 2.336: 병증 <足不能行>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	13	4.128
발	6	2.134
머리	3	2.586
하박	3	2.332
배	1	4.175

옆구리	1	3.293
등	1	1.650

2.113 足寒熱

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.095차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 至陰 · 然谷 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 至陰 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.286차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.225: 병증 <足寒熱>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.226: 병증 <足寒熱>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.337: 병증 <足寒熱>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
至陰	2	8.916	至陰	2	8.916
然谷	2	5.268	條口	1	5.542
條口	1	5.542	然谷	2	5.268
陰市	1	4.982	陰市	1	4.982
中都	1	4.551	中都	1	4.551
漏谷	1	3.910	漏谷	1	3.910
大都	1	3.780	大都	1	3.780
承山	1	3.069	承山	1	3.069
承筋	1	3.069	承筋	1	3.069
京骨	1	2.911	京骨	1	2.911
隱白	1	2.837	隱白	1	2.837
陽陵泉	1	2.837	陽陵泉	1	2.837
委中	1	2.699	委中	1	2.699
中封	1	2.454	中封	1	2.454
復溜	1	1.933	復溜	1	1.933
行間	1	1.894	行間	1	1.894
涌泉	1	1.713	涌泉	1	1.713
太衝	1	1.615	太衝	1	1.615
腎俞	1	1.615	腎俞	1	1.615
中脘	1	1.287	中脘	1	1.287
足三里	1	1.131	足三里	1	1.131

표 2.338: 병증 <足寒熱>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	7	3.713
足少陰腎經	4	2.971
足厥陰肝經	4	2.629
足陽明胃經	3	3.885

足太陰脾經	3	3.509
足少陽膽經	1	2.837
任脈	1	1.287

표 2.339: 병증 <足寒熱>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	12	3.332
소퇴	8	3.351
대퇴	1	4.982
등	1	1.615
배	1	1.287

2.114 足雜病

이 병증 치료에는 모두 37가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.378차례 사용되었고, 가장 여러 차례 사용된 것은 三陰交 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성(G-Score 기준) 측면에서도 三陰交 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.1차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 8.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 19차례 사용되었다.




그림 2.227: 병증 <足雜病>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.228: 병증 <足雜病>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.340: 병증 <足雜病>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
三陰交	4	14.5992	三陰交	4	14.5992
環跳	3	13.8848	環跳	3	13.8848
涌泉	3	6.6574	至陽	2	11.3928
崑崙	3	6.2468	涌泉	3	6.6574
然谷	3	5.8719	崑崙	3	6.2468
至陽	2	11.3928	丘墟	2	5.9314
丘墟	2	5.9314	然谷	3	5.8719
承筋	2	5.7627	承筋	2	5.7627
浮郄	1	4.3537	浮郄	1	4.3537
膝關	1	4.0065	膝關	1	4.0065
條口	1	4.0065	條口	1	4.0065
梁丘	1	3.4660	梁丘	1	3.4660
築賓	1	3.2478	築賓	1	3.2478
腰陽關	1	3.2478	腰陽關	1	3.2478
犢鼻	1	3.0546	犢鼻	1	3.0546
中都	1	3.0546	中都	1	3.0546
交信	1	2.8814	交信	1	2.8814
跗陽	1	2.8814	跗陽	1	2.8814
風市	1	2.4513	風市	1	2.4513
陽輔	1	2.2191	陽輔	1	2.2191
僕參	1	2.1153	僕參	1	2.1153
束骨	1	2.1153	束骨	1	2.1153
申脈	1	1.9277	申脈	1	1.9277
內庭	1	1.8426	內庭	1	1.8426
飛揚	1	1.6868	飛揚	1	1.6868
承山	1	1.6868	承山	1	1.6868
經渠	1	1.6153	經渠	1	1.6153
陰谷	1	1.5476	陰谷	1	1.5476
陽陵泉	1	1.4834	陽陵泉	1	1.4834
上廉	1	1.3644	上廉	1	1.3644
膀胱俞	1	1.2059	膀胱俞	1	1.2059

陰交	1	1.1117	陰交	1	1.1117
復溜	1	0.7421	復溜	1	0.7421
足臨泣	1	0.6564	足臨泣	1	0.6564
照海	1	0.6299	照海	1	0.6299
太衝	1	0.5107	太衝	1	0.5107
足三里	1	0.2085	足三里	1	0.2085

표 2.341: 병증 <足雜病>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	13	2.998
足少陰腎經	11	3.083
足少陽膽經	9	4.438
足陽明胃經	5	2.516
足太陰脾經	4	14.599
督脈	3	7.320
足厥陰肝經	3	2.524
手太陰肺經	1	1.615
手陽明大腸經	1	1.364
任脈	1	1.112

표 2.342: 병증 <足雜病>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	19	2.937
소퇴	18	3.519
대퇴	7	5.442
등	4	5.282
하박	2	1.490
배	1	1.112

2.115 脚氣

이 병증 치료에는 모두 23가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.565차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 足三里 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 4차례 사용된 上廉 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 대퇴·소퇴·발 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.229: 병증 <脚氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.230: 병증 <脚氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.343: 병증 <脚氣>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
足三里	5	15.3809	上廉	4	17.7840
上廉	4	17.7840	犢鼻	3	17.4453
犢鼻	3	17.4453	風市	3	15.4757
風市	3	15.4757	足三里	5	15.3809
伏兔	2	10.9173	伏兔	2	10.9173
下廉	2	6.0243	下廉	2	6.0243
梁丘	1	4.1216	梁丘	1	4.1216
肩井	1	2.9505	肩井	1	2.9505
束骨	1	2.7248	束骨	1	2.7248
承山	1	2.2706	承山	1	2.2706
陽陵泉	1	2.0519	陽陵泉	1	2.0519
風府	1	1.9226	風府	1	1.9226
陰陵泉	1	1.9226	陰陵泉	1	1.9226

衝陽	1	1.8621	衝陽	1	1.8621
三陰交	1	1.8042	三陰交	1	1.8042
解谿	1	1.7487	解谿	1	1.7487
太白	1	1.6443	太白	1	1.6443
復溜	1	1.2234	復溜	1	1.2234
涌泉	1	1.0302	涌泉	1	1.0302
太衝	1	0.9459	太衝	1	0.9459
崑崙	1	0.9193	崑崙	1	0.9193
然谷	1	0.8203	然谷	1	0.8203
百會	1	0.6906	百會	1	0.6906

표 2.344: 병증 <脚氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	13	8.5793
手陽明大腸經	6	11.9041
足少陽膽經	5	6.8260
足太陽膀胱經	3	1.9716
足太陰脾經	3	1.7904
足少陰腎經	3	1.0247
督脈	2	1.3066
足厥陰肝經	1	0.9459

표 2.345: 병증 <脚氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
대퇴	9	11.990
소퇴	9	4.686
발	9	1.435
하박	6	11.904
머리	2	1.307
상박	1	2.950

2.116 脚弱

이 병증 치료에는 모두 6가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 委中 · 足三里 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 委中 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.231: 병증 <脚弱>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.232: 병증 <脚弱>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.346: 병증 <脚弱>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
委中	2	12.043	委中	2	12.043
足三里	2	8.350	足三里	2	8.350
風市	1	5.950	風市	1	5.950
肩井	1	5.815	肩井	1	5.815
承山	1	5.068	承山	1	5.068
大椎	1	4.821	大椎	1	4.821

표 2.347: 병증 <脚弱>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	3	8.556

足陽明胃經	2	8.350
足少陽膽經	2	5.883
督脈	1	4.821

표 2.348: 병증 <脚弱>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	5	8.487
대퇴	1	5.950
상박	1	5.815
등	1	4.821

2.117 脚腫

이 병증 치료에는 모두 5가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 申脈 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.233: 병증 <脚腫>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.234: 병증 <脚腫>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.349: 병증 <脚腫>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
申脈	1	6.274	申脈	1	6.274
承山	1	5.986	承山	1	5.986
小腸俞	1	5.585	小腸俞	1	5.585
崑崙	1	4.317	崑崙	1	4.317
然谷	1	4.175	然谷	1	4.175

표 2.350: 병증 <脚腫>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	4	5.540
足少陰腎經	1	4.175

표 2.351: 병증 <脚腫>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	3	4.922
소퇴	1	5.986
등	1	5.585

2.118 四肢厥

이 병증 치료에는 모두 33가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.303차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 內庭 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 內庭 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.308차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 9차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.778차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.235: 병증 <四肢厥>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.236: 병증 <四肢厥>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.352: 병증 <四肢厥>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
內庭	3	12.3912	內庭	3	12.3912
大巨	2	9.3626	大巨	2	9.3626
跗陽	2	8.9960	跗陽	2	8.9960
小海	2	8.3572	小海	2	8.3572
大都	2	7.8142	大都	2	7.8142
天池	2	6.9274	天池	2	6.9274
支溝	2	5.7756	支溝	2	5.7756
太谿	2	3.3852	至陽	1	4.6813
章門	2	3.1475	三陽絡	1	4.3313
至陽	1	4.6813	日月	1	4.0377
三陽絡	1	4.3313	太谿	2	3.3852
日月	1	4.0377	極泉	1	3.3685
極泉	1	3.3685	乳根	1	3.1925

乳根	1	3.1925	章門	2	3.1475
手五里	1	2.8878	手五里	1	2.8878
豐隆	1	2.2170	豐隆	1	2.2170
俠谿	1	2.0462	俠谿	1	2.0462
少海	1	1.7563	少海	1	1.7563
厲兑	1	1.6318	厲兑	1	1.6318
三間	1	1.5738	三間	1	1.5738
三陰交	1	1.5183	三陰交	1	1.5183
列缺	1	1.3186	列缺	1	1.3186
尺澤	1	1.3186	尺澤	1	1.3186
天井	1	1.3186	天井	1	1.3186
前谷	1	1.1486	前谷	1	1.1486
間使	1	1.0368	間使	1	1.0368
脾俞	1	1.0021	脾俞	1	1.0021
行間	1	0.9362	行間	1	0.9362
曲泉	1	0.8454	曲泉	1	0.8454
照海	1	0.8454	照海	1	0.8454
膈俞	1	0.8171	膈俞	1	0.8171
腎俞	1	0.7125	腎俞	1	0.7125
足三里	1	0.3584	足三里	1	0.3584

표 2.353: 병증 <四肢厥>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	9	4.859
足太陽膀胱經	5	2.882
手少陽三焦經	4	3.808
足厥陰肝經	4	1.643
手太陽小腸經	3	4.753
足太陰脾經	3	4.666
手厥陰心包經	3	3.982
足少陰腎經	3	2.115
足少陽膽經	2	3.042
手少陰心經	2	2.562

手陽明大腸經	2	2.231
手太陰肺經	2	1.319
督脈	1	4.681

표 2.354: 병증 <四肢厥>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	11	4.150
하박	10	3.152
소퇴	6	2.787
옆구리	4	5.037
등	4	1.803
배	3	6.700
상박	2	3.128
손	2	1.361
가슴	1	3.192

2.119 尸厥

이 병증 치료에는 모두 31가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.258차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 僕參 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 僕參 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.545차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.9차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 13차례 사용되었다.




그림 2.237: 병증 <屍厥>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.238: 병증 <屍厥>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.355: 병증 <屍厥>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
僕參	3	13.8848	僕參	3	13.8848
金門	2	10.1476	金門	2	10.1476
天府	2	7.7102	天府	2	7.7102
隱白	2	6.2742	隱白	2	6.2742
大敦	2	5.4937	大敦	2	5.4937
中極	2	4.7726	中極	2	4.7726
百會	2	3.1343	魂門	1	4.2234
魂門	1	4.2234	口禾髎	1	3.7475
口禾髎	1	3.7475	絡却	1	3.5501
絡却	1	3.5501	極泉	1	3.5501
極泉	1	3.5501	百會	2	3.1343
委陽	1	3.0653	委陽	1	3.0653
通天	1	2.9304	通天	1	2.9304
豐隆	1	2.3863	豐隆	1	2.3863
內庭	1	2.2971	內庭	1	2.2971
玉枕	1	2.2971	玉枕	1	2.2971
大杼	1	2.1331	大杼	1	2.1331
攢竹	1	2.0575	攢竹	1	2.0575
神闕	1	1.9857	神闕	1	1.9857
厲兌	1	1.7902	厲兌	1	1.7902
衝陽	1	1.7308	衝陽	1	1.7308
三陰交	1	1.6739	三陰交	1	1.6739
列缺	1	1.4688	列缺	1	1.4688
中府	1	1.4224	中府	1	1.4224
水溝	1	1.3778	水溝	1	1.3778
勞宮	1	1.3778	勞宮	1	1.3778
期門	1	1.2147	期門	1	1.2147
間使	1	1.1773	間使	1	1.1773
肺俞	1	1.1773	肺俞	1	1.1773
太谿	1	0.8126	太谿	1	0.8126

中脘	1	0.5754	中脘	1	0.5754
----	---	--------	----	---	--------

표 2.356: 병증 <屍厥>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	13	4.5467
手太陰肺經	4	3.5338
任脈	4	2.4446
足陽明胃經	4	2.0511
足太陰脾經	3	3.9741
足厥陰肝經	3	3.3542
督脈	3	2.2561
手厥陰心包經	2	1.2776
手陽明大腸經	1	3.7475
手少陰心經	1	3.5501
足少陰腎經	1	0.8126

표 2.357: 병증 <屍厥>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	13	5.304
머리	5	2.978
배	5	2.137
상박	3	5.630
등	3	2.511
얼굴	3	2.394
소퇴	3	2.375
하박	2	1.323
가슴	1	1.422
손	1	1.378

2.120 脚膝痛

이 병증 치료에는 모두 29가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.345차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 承山 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 體關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.875차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 17차례 사용되었다.




그림 2.239: 병증 <脚膝痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.240: 병증 <脚膝痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.358: 병증 <脚膝痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承山	3	12.4045	髀關	2	12.4454
髀關	2	12.4454	承山	3	12.4045
梁丘	2	10.6054	梁丘	2	10.6054
犢鼻	2	9.7394	犢鼻	2	9.7394
風市	2	8.4469	風市	2	8.4469
承筋	2	6.7456	承筋	2	6.7456
京骨	2	6.4242	京骨	2	6.4242
解谿	2	5.6116	解谿	2	5.6116
曲泉	2	4.1151	膝關	1	4.5184
膝關	1	4.5184	條口	1	4.5184
條口	1	4.5184	曲泉	2	4.1151
腰陽關	1	3.7475	腰陽關	1	3.7475
光明	1	3.7475	光明	1	3.7475

懸鍾	1	3.3728	懸鍾	1	3.3728
跗陽	1	3.3728	跗陽	1	3.3728
蠡溝	1	3.0653	蠡溝	1	3.0653
丘墟	1	2.2128	丘墟	1	2.2128
陽陵泉	1	1.9174	陽陵泉	1	1.9174
上廉	1	1.7902	上廉	1	1.7902
委中	1	1.7902	委中	1	1.7902
三陰交	1	1.6739	三陰交	1	1.6739
膀胱俞	1	1.6194	膀胱俞	1	1.6194
中封	1	1.5672	中封	1	1.5672
商丘	1	1.5170	商丘	1	1.5170
太白	1	1.5170	太白	1	1.5170
復溜	1	1.1064	復溜	1	1.1064
腎俞	1	0.8381	腎俞	1	0.8381
崑崙	1	0.8126	崑崙	1	0.8126
足三里	1	0.4580	足三里	1	0.4580

표 2.359: 병증 <脚膝痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	12	4.251
足陽明胃經	10	7.230
足少陽膽經	6	3.939
足厥陰肝經	5	3.317
足太陰脾經	3	1.569
督脈	1	3.748
手陽明大腸經	1	1.790
足少陰腎經	1	1.106

표 2.360: 병증 <脚膝痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	17	3.977

발	10	2.596
대퇴	8	10.309
등	3	2.068
하박	1	1.790

2.121 膝痛

이 병증 치료에는 모두 27가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.185차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 膝關 · 腰陽關 · 合陽 · 獄鼻 · 足三里 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 膝關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 10차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 17차례 사용되었다.




그림 2.241: 병증 <膝痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.242: 병증 <膝痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.361: 병증 <膝痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
膝關	2	12.506	膝關	2	12.506
腰陽關	2	10.917	腰陽關	2	10.917
合陽	2	10.917	合陽	2	10.917
犢鼻	2	10.507	犢鼻	2	10.507
足三里	2	3.379	髀關	1	5.253
髀關	1	5.253	條口	1	4.900
條口	1	4.900	梁丘	1	4.346
梁丘	1	4.346	伏兔	1	4.346
伏兔	1	4.346	光明	1	4.122
光明	1	4.122	陽交	1	4.122
陽交	1	4.122	交信	1	3.742
交信	1	3.742	懸鍾	1	3.742
懸鍾	1	3.742	足三里	2	3.379
風市	1	3.293	風市	1	3.293
豐隆	1	2.736	豐隆	1	2.736
俠谿	1	2.558	俠谿	1	2.558
承山	1	2.476	承山	1	2.476
京骨	1	2.324	京骨	1	2.324
陰谷	1	2.324	陰谷	1	2.324
陽陵泉	1	2.253	陽陵泉	1	2.253
氣衝	1	2.059	氣衝	1	2.059
三陰交	1	2.000	三陰交	1	2.000
膀胱俞	1	1.943	膀胱俞	1	1.943
中封	1	1.889	中封	1	1.889
陰交	1	1.836	陰交	1	1.836
曲泉	1	1.263	曲泉	1	1.263
太衝	1	1.112	太衝	1	1.112

표 2.362: 병증 <膝痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	10	4.691
足少陽膽經	6	3.348
足太陽膀胱經	5	4.415
足厥陰肝經	5	4.192
督脈	2	10.917
足少陰腎經	2	3.033
足太陰脾經	1	2.000
任脈	1	1.836

표 2.363: 병증 <膝痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	17	4.320
대퇴	6	5.549
발	4	1.971
등	3	6.430
배	2	1.948

2.122 腰脚痛

이 병증 치료에는 모두 18가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 環跳 · 陽輔 · 承山 · 陽陵泉 · 下廉 · 崑崙 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 環跳 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 10차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.243: 병증 <腰脚痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.244: 병증 <腰脚痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.364: 병증 <腰脚痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
環跳	2	10.605	環跳	2	10.605
陽輔	2	9.799	陽輔	2	9.799
承山	2	8.575	承山	2	8.575
陽陵泉	2	8.088	陽陵泉	2	8.088
下廉	2	7.527	下廉	2	7.527
崑崙	2	5.380	崑崙	2	5.380
陰市	1	4.900	陰市	1	4.900
次髎	1	4.470	次髎	1	4.470
上髎	1	4.470	上髎	1	4.470
懸鍾	1	4.287	懸鍾	1	4.287
風市	1	3.830	風市	1	3.830
地機	1	3.700	地機	1	3.700
僕參	1	3.466	僕參	1	3.466

申脈	1	3.260	申脈	1	3.260
委中	1	2.623	委中	1	2.623
上廉	1	2.623	上廉	1	2.623
膀胱俞	1	2.437	膀胱俞	1	2.437
陰交	1	2.324	陰交	1	2.324

표 2.365: 병증 <腰脚痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	10	4.335
足少陽膽經	8	7.322
手陽明大腸經	3	5.075
足陽明胃經	1	4.900
足太陰脾經	1	3.700
任脈	1	2.324

표 2.366: 병증 <腰脚痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	9	6.179
대퇴	4	6.445
발	4	4.035
하박	3	5.075
등	3	3.792
배	1	2.324

2.123 腰痛

이 병증 치료에는 모두 43가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.465차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 階市 · 腰俞 · 陽輔 · 腎俞 혈(穴)로 모두 3차례

사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 階市 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 9차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 33차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.875차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 27차례 사용되었다.




그림 2.245: 병증 <腰痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.246: 병증 <腰痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.367: 병증 <腰痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
陰市	3	15.4757	陰市	3	15.4757
腰俞	3	13.1290	腰俞	3	13.1290
陽輔	3	11.4891	殷門	2	12.5683
腎俞	3	5.2872	陽輔	3	11.4891
殷門	2	12.5683	居髎	2	11.4392
居髎	2	11.4392	胞肓	2	9.8604
胞肓	2	9.8604	下髎	2	7.9032
下髎	2	7.9032	白環俞	2	7.2170
白環俞	2	7.2170	委陽	2	6.9183
委陽	2	6.9183	京門	2	6.1523
京門	2	6.1523	束骨	2	5.9314
束骨	2	5.9314	關元俞	1	5.7196
陰陵泉	2	4.2962	氣海俞	1	5.7196

膀胱俞	2	3.9393	腎俞	3	5.2872
肺俞	2	3.0039	陰陵泉	2	4.2962
涌泉	2	2.4469	陰包	1	3.9516
關元俞	1	5.7196	秩邊	1	3.9516
氣海俞	1	5.7196	膀胱俞	2	3.9393
陰包	1	3.9516	肺俞	2	3.0039
秩邊	1	3.9516	命門	1	2.6729
命門	1	2.6729	上髎	1	2.6729
上髎	1	2.6729	涌泉	2	2.4469
中膂俞	1	2.3514	中膂俞	1	2.3514
蠡溝	1	2.2128	蠡溝	1	2.2128
風市	1	2.0861	風市	1	2.0861
長強	1	1.9697	長強	1	1.9697
肩井	1	1.9697	肩井	1	1.9697
申脈	1	1.5830	申脈	1	1.5830
大腸俞	1	1.5020	大腸俞	1	1.5020
飛揚	1	1.3544	飛揚	1	1.3544
承筋	1	1.3544	承筋	1	1.3544
小腸俞	1	1.0525	小腸俞	1	1.0525
委中	1	1.0525	委中	1	1.0525
氣衝	1	1.0013	氣衝	1	1.0013
衝陽	1	1.0013	衝陽	1	1.0013
三焦俞	1	0.9526	三焦俞	1	0.9526
太白	1	0.8203	太白	1	0.8203
風池	1	0.5463	風池	1	0.5463
行間	1	0.4662	行間	1	0.4662
太衝	1	0.2972	太衝	1	0.2972
崑崙	1	0.2799	崑崙	1	0.2799
肝俞	1	0.2475	肝俞	1	0.2475
足三里	1	0.0730	足三里	1	0.0730

표 2.368: 병증 <腰痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
--------	---------	------------

足太陽膀胱經	33	4.018
足少陽膽經	10	5.614
足陽明胃經	6	4.388
督脈	5	5.924
足厥陰肝經	4	1.732
足太陰脾經	3	2.558
足少陰腎經	2	2.447

표 2.369: 병증 <腰痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	27	4.3973
소퇴	12	3.5938
발	10	1.6033
대퇴	7	8.5204
옆구리	4	8.7957
상박	1	1.9697
배	1	1.0013
머리	1	0.5463

2.124 腰脊痛

이 병증 치료에는 모두 28가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.607차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 白環俞 · 志室 · 委中 · 膀胱俞 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 白環俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 7.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 33차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 27차례 사용되었다.




그림 2.247: 병증 <腰脊痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.248: 병증 <腰脊痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.370: 병증 <腰脊痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
白環俞	3	15.0740	白環俞	3	15.0740
志室	3	14.6092	志室	3	14.6092
委中	3	10.4392	胞肓	2	11.1693
膀胱俞	3	9.8531	委中	3	10.4392
胞肓	2	11.1693	承扶	2	10.0494
承扶	2	10.0494	膀胱俞	3	9.8531
合陽	2	9.5936	合陽	2	9.5936
次髎	2	9.1875	次髎	2	9.1875
中脣俞	2	8.4890	中脣俞	2	8.4890
腰俞	2	8.4890	腰俞	2	8.4890
大鐘	2	6.3890	大鐘	2	6.3890
京骨	2	5.9010	京骨	2	5.9010
小腸俞	2	5.4760	殷門	1	5.5847

殷門	1	5.5847	小腸俞	2	5.4760
膈關	1	4.2445	膈關	1	4.2445
懸樞	1	4.2445	懸樞	1	4.2445
神堂	1	3.4797	神堂	1	3.4797
神道	1	2.6729	神道	1	2.6729
長強	1	2.5503	長強	1	2.5503
京門	1	2.4366	京門	1	2.4366
承筋	1	1.8920	承筋	1	1.8920
大杼	1	1.8920	大杼	1	1.8920
水分	1	1.8185	水分	1	1.8185
三焦俞	1	1.4472	三焦俞	1	1.4472
脾俞	1	0.9392	脾俞	1	0.9392
復溜	1	0.9063	復溜	1	0.9063
涌泉	1	0.7316	涌泉	1	0.7316
章門	1	0.5463	章門	1	0.5463

표 2.371: 병증 <腰脊痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	33	7.1845
督脈	5	4.4892
足少陰腎經	4	2.6756
足少陽膽經	1	2.4366
任脈	1	1.8185
足厥陰肝經	1	0.5463

표 2.372: 병증 <腰脊痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	27	6.489
소퇴	6	7.308
발	6	3.482
대퇴	3	7.817

옆구리	2	1.492
배	1	1.819

2.125 脊痛

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.19차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 大腸俞 · 脾俞 · 崑崙 · 章門 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 大腸俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 16차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 14차례 사용되었다.




그림 2.249: 병증 <脊痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.250: 병증 <脊痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.373: 병증 <脊痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
大腸俞	2	8.783	大腸俞	2	8.783
脾俞	2	6.091	脾俞	2	6.091
崑崙	2	5.235	氣穴	1	5.735
章門	2	4.972	至陽	1	5.735
氣穴	1	5.735	膈關	1	5.379
至陽	1	5.735	胃倉	1	5.379
膈關	1	5.379	崑崙	2	5.235
胃倉	1	5.379	章門	2	4.972
身柱	1	4.821	身柱	1	4.821
五處	1	4.044	五處	1	4.044
腰俞	1	4.044	腰俞	1	4.044
中膂俞	1	4.044	中膂俞	1	4.044
石關	1	4.044	石關	1	4.044
委陽	1	3.893	委陽	1	3.893
京門	1	3.503	京門	1	3.503
胃俞	1	2.760	胃俞	1	2.760
陰谷	1	2.760	陰谷	1	2.760
小腸俞	1	2.550	小腸俞	1	2.550
委中	1	2.550	委中	1	2.550
膀胱俞	1	2.365	膀胱俞	1	2.365
膈俞	1	1.613	膈俞	1	1.613

표 2.374: 병증 <脊痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	16	4.207
督脈	3	4.867
足少陰腎經	3	4.180
足厥陰肝經	2	4.972

足少陽膽經	1	3.503
-------	---	-------

표 2.375: 병증 <脊痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	14	4.464
옆구리	3	4.238
소퇴	3	3.068
발	2	5.235
배	2	4.890
머리	1	4.044

2.126 腰理

이 병증 치료에는 모두 4가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 次髎 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 次髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.251: 병증 <腠理>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.252: 병증 <腠理>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.376: 병증 <腠理>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
次髎	2	17.840	次髎	2	17.840
陽白	1	8.920	陽白	1	8.920
附分	1	8.250	附分	1	8.250
肝俞	1	4.245	肝俞	1	4.245

표 2.377: 병증 <腠理>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	4	10.11
足少陽膽經	1	8.92

표 2.378: 병증 <腠理>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	4	10.11
얼굴	1	8.92

2.127 骨疼

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.111차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脊俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 脊俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등·발 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.253: 병증 <骨疼>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.254: 병증 <骨疼>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.379: 병증 <骨疼>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
膈俞	2	9.020	膈俞	2	9.020
玉堂	1	6.173	玉堂	1	6.173
紫宮	1	5.986	紫宮	1	5.986
大杼	1	4.637	大杼	1	4.637
上關	1	4.317	上關	1	4.317
上廉	1	4.245	上廉	1	4.245
商丘	1	3.922	商丘	1	3.922
太白	1	3.922	太白	1	3.922
復溜	1	3.412	復溜	1	3.412

표 2.380: 병증 <骨疼>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	3	6.829
任脈	2	6.079
足太陰脾經	2	3.922
足少陽膽經	1	4.317
手陽明大腸經	1	4.245
足少陰腎經	1	3.412

표 2.381: 병증 <骨疼>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	3	6.829
발	3	3.752
가슴	2	6.079
얼굴	1	4.317
하박	1	4.245

2.128 耳鳴

이 병증 치료에는 모두 30가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 頷厭 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 頷厭 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陽小腸經으로 모두 12차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.429차례 사용되었다. 가장

여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 14차례 사용되었다.




그림 2.255: 병증 <耳鳴>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.256: 병증 <耳鳴>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.382: 병증 <耳鳴>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
頸厭	3	13.781	頸厭	3	13.781
肩貞	2	9.594	肩貞	2	9.594
聽宮	2	9.188	聽宮	2	9.188
絡却	2	9.188	絡却	2	9.188
耳門	2	9.188	耳門	2	9.188
聽會	2	7.903	聽會	2	7.903
商陽	2	6.569	商陽	2	6.569
偏歷	2	6.389	偏歷	2	6.389
中渚	2	6.056	中渚	2	6.056
上關	2	5.612	上關	2	5.612
腕骨	2	5.101	腕骨	2	5.101
陽谿	2	4.985	陽谿	2	4.985
前谷	2	4.370	耳和髎	1	4.594
百會	2	2.689	前谷	2	4.370
耳和髎	1	4.594	瘻脈	1	3.700
瘻脈	1	3.700	四白	1	3.480
四白	1	3.480	下關	1	3.480
下關	1	3.480	天容	1	2.806
天容	1	2.806	百會	2	2.689
顱息	1	2.673	顱息	1	2.673
浮白	1	2.437	浮白	1	2.437
天窓	1	2.232	天窓	1	2.232
足竅陰	1	2.139	足竅陰	1	2.139
翳風	1	2.139	翳風	1	2.139
俠谿	1	1.970	俠谿	1	1.970
關衝	1	1.892	關衝	1	1.892
液門	1	1.683	液門	1	1.683
後谿	1	1.683	後谿	1	1.683
大陵	1	1.083	大陵	1	1.083
陽谷	1	1.008	陽谷	1	1.008

표 2.383: 병증 <耳鳴>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陽小腸經	12	4.497
足少陽膽經	10	5.640
手少陽三焦經	10	3.990
手陽明大腸經	6	5.981
足太陽膀胱經	2	9.188
足陽明胃經	2	3.480
督脈	2	2.689
手厥陰心包經	1	1.083

표 2.384: 병증 <耳鳴>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	14	3.713
얼굴	11	6.206
머리	11	5.229
하박	3	3.699
상박	2	9.594
목	2	2.519
발	2	2.054

2.129 耳痛

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 痰脈 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례

치료에 사용된 경맥은 手少陽三焦經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.257: 병증 <耳痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.258: 병증 <耳痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.385: 병증 <耳痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
瘻脈	1	5.570	瘻脈	1	5.570
四白	1	5.340	四白	1	5.340
下關	1	5.340	下關	1	5.340
耳門	1	5.136	耳門	1	5.136
顱息	1	4.486	顱息	1	4.486
顎厭	1	4.354	顎厭	1	4.354
天窓	1	4.006	天窓	1	4.006
翳風	1	3.904	翳風	1	3.904
少商	1	3.716	少商	1	3.716
關衝	1	3.628	關衝	1	3.628
中渚	1	3.545	中渚	1	3.545
液門	1	3.390	液門	1	3.390
上關	1	3.317	上關	1	3.317

陽谿	1	2.995	陽谿	1	2.995
完骨	1	2.995	完骨	1	2.995
曲池	1	2.255	曲池	1	2.255
百會	1	1.789	百會	1	1.789

표 2.386: 병증 <耳痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手少陽三焦經	7	4.237
足少陽膽經	3	3.555
足陽明胃經	2	5.340
手陽明大腸經	2	2.625
手太陽小腸經	1	4.006
手太陰肺經	1	3.716
督脈	1	1.789

표 2.387: 병증 <耳痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	6	3.850
손	5	3.455
얼굴	4	4.784
목	1	4.006
하박	1	2.255

2.130 耳聾

이 병증 치료에는 모두 28가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 外關 · 天牖 · 上關 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 外關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.714차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手少陽三焦經으로 모두 18차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 · 머리 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.259: 병증 <耳聾>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.260: 병증 <耳聾>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.388: 병증 <耳聾>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
外關	3	18.1383	外關	3	18.1383
天牖	3	12.8046	會宗	2	14.3618
上關	3	11.3125	天牖	3	12.8046
會宗	2	14.3618	四瀆	2	12.3458
四瀆	2	12.3458	上關	3	11.3125
聽會	2	8.3504	聽會	2	8.3504
頸息	2	8.3504	頸息	2	8.3504
翳風	2	7.1972	翳風	2	7.1972
商陽	2	7.0057	商陽	2	7.0057
三陽絡	1	4.4698	三陽絡	1	4.4698
肩貞	1	3.6999	肩貞	1	3.6999
聽宮	1	3.5029	聽宮	1	3.5029
耳門	1	3.5029	耳門	1	3.5029

浮白	1	2.6449	浮白	1	2.6449
束骨	1	2.5373	束骨	1	2.5373
腦空	1	2.4366	腦空	1	2.4366
天窓	1	2.4366	天窓	1	2.4366
足竅陰	1	2.3422	足竅陰	1	2.3422
玉枕	1	2.2533	玉枕	1	2.2533
俠谿	1	2.1694	俠谿	1	2.1694
中渚	1	2.0148	中渚	1	2.0148
液門	1	1.8753	液門	1	1.8753
後谿	1	1.8753	後谿	1	1.8753
陽谷	1	1.1773	陽谷	1	1.1773
風池	1	1.1404	風池	1	1.1404
腎俞	1	0.8049	腎俞	1	0.8049
太谿	1	0.7797	太谿	1	0.7797
百會	1	0.5646	百會	1	0.5646

표 2.389: 병증 <耳聾>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手少陽三焦經	18	8.5061
足少陽膽經	10	4.3423
手太陽小腸經	5	2.5384
足太陽膀胱經	3	1.8651
手陽明大腸經	2	7.0057
足少陰腎經	1	0.7797
督脈	1	0.5646

표 2.390: 병증 <耳聾>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	9	10.0986
머리	9	3.5125
얼굴	7	6.6671

손	5	3.1928
목	4	7.6206
발	4	1.9571
상박	1	3.6999
등	1	0.8049

2.131 停耳

이 병증 치료에는 모두 5가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 下關 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.261: 병증 <停耳>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.262: 병증 <停耳>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.391: 병증 <停耳>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
下關	1	7.751	下關	1	7.751
聽宮	1	7.542	聽宮	1	7.542
耳門	1	7.542	耳門	1	7.542
上關	1	5.658	上關	1	5.658
風池	1	4.821	風池	1	4.821

표 2.392: 병증 <停耳>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	2	5.240
足陽明胃經	1	7.751
手太陽小腸經	1	7.542
手少陽三焦經	1	7.542

표 2.393: 병증 <停耳>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	4	7.123
머리	1	4.821

2.132 目痛

이 병증 치료에는 모두 38가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.447차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 玉枕 · 天柱 · 陽谷 · 崑崙 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 陽白 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.231차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.111차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 18차례 사용되었다.




그림 2.263: 병증 <目痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.264: 병증 <目痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.394: 병증 <目痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
玉枕	3	10.9965	陽白	2	11.0976
天柱	3	9.3274	玉枕	3	10.9965
陽谷	3	7.3466	天柱	3	9.3274
崑崙	3	5.8649	目窓	2	8.4190
陽白	2	11.0976	陶道	2	7.4260
目窓	2	8.4190	陽谷	3	7.3466
陶道	2	7.4260	崑崙	3	5.8649
腦戶	2	5.4908	腦戶	2	5.4908
上星	2	4.5173	上星	2	4.5173
前谷	2	3.6932	頭維	1	4.2095
風池	2	3.4378	前谷	2	3.6932
照海	2	2.9915	風池	2	3.4378
太衝	2	2.6728	四白	1	3.1091

頭維	1	4.2095	照海	2	2.9915
四白	1	3.1091	二間	1	2.7454
二間	1	2.7454	太衝	2	2.6728
齦交	1	1.9875	齦交	1	1.9875
天府	1	1.9875	天府	1	1.9875
腦空	1	1.8920	腦空	1	1.8920
後頂	1	1.8920	後頂	1	1.8920
通里	1	1.8920	通里	1	1.8920
天牖	1	1.7189	天牖	1	1.7189
俠谿	1	1.6401	俠谿	1	1.6401
諺諺	1	1.6401	諺諺	1	1.6401
飛揚	1	1.5659	飛揚	1	1.5659
大迎	1	1.5659	大迎	1	1.5659
風門	1	1.5659	風門	1	1.5659
承漿	1	1.4958	承漿	1	1.4958
風府	1	1.2503	風府	1	1.2503
衝陽	1	1.1963	衝陽	1	1.1963
三間	1	1.1963	三間	1	1.1963
下廉	1	1.1449	下廉	1	1.1449
陽谿	1	1.0491	陽谿	1	1.0491
水溝	1	0.8816	水溝	1	0.8816
大陵	1	0.8081	大陵	1	0.8081
心俞	1	0.7085	心俞	1	0.7085
曲泉	1	0.5418	曲泉	1	0.5418
百會	1	0.2456	百會	1	0.2456

표 2.395: 병증 <목痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	13	4.5242
督脈	11	2.9614
足少陽膽經	8	5.2973
手太陽小腸經	5	5.5199
足陽明胃經	4	2.5202

手陽明大腸經	4	1.5339
足厥陰肝經	3	1.6073
足少陰腎經	2	2.9915
手太陰肺經	1	1.9875
手少陰心經	1	1.8920
手少陽三焦經	1	1.7189
任脈	1	1.4958
手厥陰心包經	1	0.8081

표 2.396: 병증 <目痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	18	4.747
발	9	2.873
얼굴	8	3.478
손	6	1.898
하박	5	3.461
등	5	2.835
소퇴	2	1.054
상박	1	1.988
목	1	1.719

2.133 目上視

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.19차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 筋縮 · 承泣 · 攢竹 · 肝俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 筋縮 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.778차례 사용되었다. 가장 여러 차례

치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經 · 督脈으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.265: 병증 <目上視>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.266: 병증 <目上視>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.397: 병증 <目上視>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
筋縮	2	10.758	筋縮	2	10.758
承泣	2	10.758	承泣	2	10.758
攢竹	2	8.250	攢竹	2	8.250
肝俞	2	5.101	顴髎	1	5.735
顴髎	1	5.735	陽白	1	5.735
陽白	1	5.735	肝俞	2	5.101
地倉	1	4.392	地倉	1	4.392
絲竹空	1	4.210	絲竹空	1	4.210
本神	1	3.753	本神	1	3.753
大都	1	3.623	大都	1	3.623
申脈	1	3.185	申脈	1	3.185
玉枕	1	3.091	玉枕	1	3.091
俠谿	1	3.002	俠谿	1	3.002

顙會	1	2.917	顙會	1	2.917
前頂	1	2.837	前頂	1	2.837
神庭	1	2.760	神庭	1	2.760
三間	1	2.486	三間	1	2.486
上星	1	2.425	上星	1	2.425
前谷	1	2.006	前谷	1	2.006
足臨泣	1	1.683	足臨泣	1	1.683
曲泉	1	1.647	曲泉	1	1.647

표 2.398: 병증 <目上視>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	4.907
督脈	6	4.339
足少陽膽經	4	3.543
足陽明胃經	3	7.575
手太陽小腸經	2	3.870
手少陽三焦經	1	4.210
足太陰脾經	1	3.623
手陽明大腸經	1	2.486
足厥陰肝經	1	1.647

표 2.399: 병증 <目上視>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	9	6.119
머리	5	2.806
등	4	7.929
발	4	2.873
손	2	2.246
소퇴	1	1.647

2.134 目淚出

이 병증 치료에는 모두 19가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.526차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 承泣 · 行間 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 承泣 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 · 손 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.267: 병증 <目淚出>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.268: 병증 <目淚出>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.400: 병증 <目淚出>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承泣	3	17.6446	承泣	3	17.6446
行間	3	10.2941	睛明	2	11.7631
睛明	2	11.7631	行間	3	10.2941
神庭	2	7.5272	神庭	2	7.5272
腕骨	2	6.6941	腕骨	2	6.6941
前谷	2	5.9246	前谷	2	5.9246
心俞	2	5.6425	心俞	2	5.6425
風池	2	5.6425	風池	2	5.6425
頭維	1	5.4452	頭維	1	5.4452
齧交	1	3.1165	齧交	1	3.1165
天牖	1	2.8212	天牖	1	2.8212
俠谿	1	2.7336	俠谿	1	2.7336
液門	1	2.4245	液門	1	2.4245

後谿	1	2.4245	後谿	1	2.4245
天柱	1	2.2904	天柱	1	2.2904
足臨泣	1	1.4472	足臨泣	1	1.4472
肝俞	1	1.1717	肝俞	1	1.1717
魚際	1	1.1717	魚際	1	1.1717
百會	1	0.9747	百會	1	0.9747

표 2.401: 병증 <目淚出>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	5.217
手太陽小腸經	5	5.014
足陽明胃經	4	11.545
督脈	4	3.873
足少陽膽經	4	3.274
足厥陰肝經	3	10.294
手少陽三焦經	2	2.623
手太陰肺經	1	1.172

표 2.402: 병증 <目淚出>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	7	9.492
손	7	3.728
머리	6	4.109
발	5	4.825
등	3	3.407
목	1	2.821

2.135 目眩

이 병증 치료에는 모두 44가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.227차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 神庭 · 足臨泣 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 神庭 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 19차례 사용되었다.




그림 2.269: 병증 <目眩>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.270: 병증 <目眩>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.403: 병증 <目眩>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
神庭	3	10.0796	神庭	3	10.0796
足臨泣	3	6.6955	四白	2	8.8920
四白	2	8.8920	大都	2	6.9594
大都	2	6.9594	足臨泣	3	6.6955
束骨	2	6.4957	束骨	2	6.4957
前頂	2	5.3973	前頂	2	5.3973
天柱	2	4.8298	天柱	2	4.8298
涌泉	2	2.9159	瞳子髎	1	3.6085
瞳子髎	1	3.6085	目窓	1	2.9505
目窓	1	2.9505	涌泉	2	2.9159
率谷	1	2.7783	率谷	1	2.7783
絲竹空	1	2.7783	絲竹空	1	2.7783
五處	1	2.6228	五處	1	2.6228

承泣	1	2.6228	承泣	1	2.6228
陶道	1	2.4811	陶道	1	2.4811
本神	1	2.3514	本神	1	2.3514
頸厭	1	2.2318	頸厭	1	2.2318
支正	1	2.1212	支正	1	2.1212
天府	1	2.0184	天府	1	2.0184
腦空	1	1.9226	腦空	1	1.9226
通里	1	1.9226	通里	1	1.9226
後頂	1	1.9226	後頂	1	1.9226
翳風	1	1.8329	翳風	1	1.8329
顙會	1	1.5950	顙會	1	1.5950
大杼	1	1.5950	大杼	1	1.5950
飛揚	1	1.5950	飛揚	1	1.5950
風門	1	1.5950	風門	1	1.5950
攢竹	1	1.5246	攢竹	1	1.5246
承漿	1	1.5246	承漿	1	1.5246
中渚	1	1.5246	中渚	1	1.5246
上關	1	1.3348	上關	1	1.3348
風府	1	1.2777	風府	1	1.2777
足通谷	1	1.2777	足通谷	1	1.2777
上星	1	1.1717	上星	1	1.1717
三焦俞	1	1.1717	三焦俞	1	1.1717
大敦	1	1.0752	大敦	1	1.0752
水溝	1	0.9063	水溝	1	0.9063
前谷	1	0.8321	前谷	1	0.8321
肺俞	1	0.7316	肺俞	1	0.7316
風池	1	0.7316	風池	1	0.7316
崑崙	1	0.4283	崑崙	1	0.4283
肝俞	1	0.3897	肝俞	1	0.3897
魚際	1	0.3897	魚際	1	0.3897
百會	1	0.2611	百會	1	0.2611

표 2.404: 병증 <목眩>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	14	2.021
督脈	12	2.788
足少陽膽經	11	2.734
足陽明胃經	3	5.757
手少陽三焦經	3	2.045
足太陰脾經	2	6.959
足少陰腎經	2	2.916
手太陽小腸經	2	1.477
手太陰肺經	2	1.204
手少陰心經	1	1.923
任脈	1	1.525
足厥陰肝經	1	1.075

표 2.405: 병증 <目眩>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	19	2.7737
발	12	3.6925
얼굴	10	2.8381
등	6	1.3274
손	3	0.9155
하박	2	2.0219
상박	1	2.0184
소퇴	1	1.5950

2.136 目不明

이 병증 치료에는 모두 40가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.45차례 사용되었다.

가장 여러 차례 사용된 것은 足三里 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 3차례 사용된 後頂 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 22차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 14차례 사용되었다.




그림 2.271: 병증 <目不明>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.272: 병증 <目不明>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.406: 병증 <目不明>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
足三里	4	7.4027	後頂	3	11.2908
後頂	3	11.2908	肩中俞	2	10.8903
攢竹	3	9.9192	攢竹	3	9.9192
腎俞	3	5.6962	足三里	4	7.4027
崑崙	3	5.5995	頸厭	2	6.6941
肝俞	3	5.4127	腎俞	3	5.6962
肩中俞	2	10.8903	崑崙	3	5.5995
頸厭	2	6.6941	肝俞	3	5.4127
天柱	2	4.5808	天柱	2	4.5808
風池	2	3.2663	水泉	1	4.5349
復溜	2	3.1108	陽白	1	4.1084
水泉	1	4.5349	養老	1	4.1084
陽白	1	4.1084	頭維	1	4.1084

養老	1	4.1084	風池	2	3.2663
頭維	1	4.1084	睛明	1	3.2279
晴明	1	3.2279	復溜	2	3.1108
目窓	1	2.8212	目窓	1	2.8212
脊中	1	2.8212	脊中	1	2.8212
內關	1	2.6504	內關	1	2.6504
絲竹空	1	2.6504	絲竹空	1	2.6504
五處	1	2.4962	五處	1	2.4962
承泣	1	2.4962	承泣	1	2.4962
陶道	1	2.3560	陶道	1	2.3560
曲差	1	2.2276	曲差	1	2.2276
本神	1	2.2276	本神	1	2.2276
腦空	1	1.8042	腦空	1	1.8042
天牖	1	1.6332	天牖	1	1.6332
偏歷	1	1.5554	偏歷	1	1.5554
大杼	1	1.4822	大杼	1	1.4822
中渚	1	1.4131	中渚	1	1.4131
胃俞	1	1.3478	胃俞	1	1.3478
大椎	1	1.2860	大椎	1	1.2860
足通谷	1	1.1717	足通谷	1	1.1717
委中	1	1.1717	委中	1	1.1717
腕骨	1	1.0205	腕骨	1	1.0205
合谷	1	0.9747	合谷	1	0.9747
心俞	1	0.6433	心俞	1	0.6433
太淵	1	0.5069	太淵	1	0.5069
曲泉	1	0.4827	曲泉	1	0.4827
百會	1	0.2029	百會	1	0.2029

표 2.407: 병증 <目不明>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	22	3.4598
足少陽膽經	8	3.4870
督脈	7	3.5914

足陽明胃經	6	4.6691
手太陽小腸經	4	5.3397
足少陰腎經	3	3.8229
手少陽三焦經	3	1.8989
手陽明大腸經	2	1.2651
手厥陰心包經	1	2.6504
手太陰肺經	1	0.5069
足厥陰肝經	1	0.4827

표 2.408: 병증 <目不明>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	14	3.9316
등	12	2.6307
얼굴	9	4.1055
발	7	3.6042
소퇴	6	3.0191
손	4	0.9788
하박	3	2.7714
상박	2	10.8903
목	1	1.6332

2.137 目翳膜

이 병증 치료에는 모두 28가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.464차례 사용되었 다. 가장 여러 차례 사용된 것은 至陰 · 肝俞 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 至陰 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥 이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.125차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.273: 병증 <目翳膜>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.274: 병증 <目翳膜>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.409: 병증 <目翳膜>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
至陰	3	12.3846	至陰	3	12.3846
肝俞	3	7.1802	瞳子髎	2	10.9309
瞳子髎	2	10.9309	晴明	2	10.4108
睛明	2	10.4108	四白	2	9.9537
四白	2	9.9537	齧交	2	7.5218
齧交	2	7.5218	肝俞	3	7.1802
丘墟	2	6.7326	丘墟	2	6.7326
京骨	2	6.2405	京骨	2	6.2405
解谿	2	5.4320	解谿	2	5.4320
前谷	2	4.6912	前谷	2	4.6912
足臨泣	2	4.0204	角孫	1	4.1282
角孫	1	4.1282	足臨泣	2	4.0204
承光	1	3.4569	承光	1	3.4569

承泣	1	3.1203	承泣	1	3.1203
巨髎	1	2.8400	巨髎	1	2.8400
偏歷	1	2.1271	偏歷	1	2.1271
少澤	1	2.1271	少澤	1	2.1271
關衝	1	2.0481	關衝	1	2.0481
中渚	1	1.9732	中渚	1	1.9732
後谿	1	1.8345	後谿	1	1.8345
上關	1	1.7701	上關	1	1.7701
上星	1	1.5937	上星	1	1.5937
腕骨	1	1.5399	腕骨	1	1.5399
合谷	1	1.4883	合谷	1	1.4883
陽谿	1	1.4883	陽谿	1	1.4883
水溝	1	1.3017	水溝	1	1.3017
風池	1	1.1047	風池	1	1.1047
太淵	1	0.9392	太淵	1	0.9392

표 2.410: 병증 <目翳膜>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	11	7.9346
足少陽膽經	8	4.9117
足陽明胃經	6	5.3365
手太陽小腸經	5	2.5482
督脈	4	3.4724
手少陽三焦經	3	2.7165
手陽明大腸經	3	1.7013
手太陰肺經	1	0.9392

표 2.411: 병증 <目翳膜>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	12	5.981
발	11	6.962

손	10	2.014
머리	4	2.571
등	3	7.180
하박	1	2.127

2.138 目赤

이 병증 치료에는 모두 32가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.156차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 瞳子髎 · 目窓 · 陽谿 · 大陵 · 太淵 혈(穴)로 모두 2 차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 瞳子髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.083차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 10차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.111차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.275: 병증 <目赤>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.276: 병증 <目赤>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.412: 병증 <目赤>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
瞳子髎	2	11.3319	瞳子髎	2	11.3319
目窓	2	9.9432	目窓	2	9.9432
陽谿	2	5.6831	陽谿	2	5.6831
大陵	2	5.0513	大陵	2	5.0513
太淵	2	4.3695	青靈	1	4.9716
青靈	1	4.9716	太淵	2	4.3695
睛明	1	4.0695	睛明	1	4.0695
懸釐	1	3.6485	懸釐	1	3.6485
內關	1	3.4705	內關	1	3.4705
意舍	1	3.1617	意舍	1	3.1617
陽綱	1	3.0262	陽綱	1	3.0262
束骨	1	2.6758	束骨	1	2.6758
膽俞	1	2.5741	膽俞	1	2.5741
申脈	1	2.4786	申脈	1	2.4786
俠谿	1	2.3037	俠谿	1	2.3037
腦戶	1	2.2234	腦戶	1	2.2234
攢竹	1	2.1471	攢竹	1	2.1471
京骨	1	2.0746	京骨	1	2.0746
液門	1	2.0056	液門	1	2.0056
後谿	1	2.0056	後谿	1	2.0056
支溝	1	1.9398	支溝	1	1.9398
上星	1	1.7594	上星	1	1.7594
水溝	1	1.4591	水溝	1	1.4591
勞宮	1	1.4591	勞宮	1	1.4591
期門	1	1.2933	期門	1	1.2933
風池	1	1.2553	風池	1	1.2553
照海	1	1.0516	照海	1	1.0516
曲泉	1	1.0516	曲泉	1	1.0516
太衝	1	0.9085	太衝	1	0.9085
崑崙	1	0.8823	崑崙	1	0.8823
肝俞	1	0.8321	肝俞	1	0.8321

中脘	1	0.6376	中脘	1	0.6376
----	---	--------	----	---	--------

표 2.413: 병증 <目赤>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	10	2.3922
足少陽膽經	7	5.6965
手厥陰心包經	4	3.3270
督脈	3	1.8139
足厥陰肝經	3	1.0845
手陽明大腸經	2	5.6831
手太陰肺經	2	4.3695
手少陽三焦經	2	1.9727
手少陰心經	1	4.9716
手太陽小腸經	1	2.0056
足少陰腎經	1	1.0516
任脈	1	0.6376

표 2.414: 병증 <目赤>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	9	3.4290
발	7	1.7679
머리	6	3.7659
얼굴	5	4.7519
등	4	2.3985
하박	2	2.7052
배	2	0.9655
상박	1	4.9716
소퇴	1	1.0516

2.139 青盲

이 병증 치료에는 모두 12가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.417차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 瞳子髎 · 睛明 · 絡却 · 巨髎 · 商陽 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 瞳子髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.277: 병증 <青盲>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.278: 병증 <青盲>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.415: 병증 <青盲>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
瞳子髎	2	14.395	瞳子髎	2	14.395
睛明	2	13.867	睛明	2	13.867
絡却	2	12.986	絡却	2	12.986
巨髎	2	11.663	巨髎	2	11.663
商陽	2	10.271	商陽	2	10.271
承光	1	5.136	承光	1	5.136
中渚	1	3.545	中渚	1	3.545
上關	1	3.317	上關	1	3.317
合谷	1	2.995	合谷	1	2.995
期門	1	2.582	期門	1	2.582
太淵	1	2.331	太淵	1	2.331
肝俞	1	2.018	肝俞	1	2.018

표 2.416: 병증 <青盲>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	8.502
足少陽膽經	3	8.856
手陽明大腸經	3	6.633
足陽明胃經	2	11.663
手少陽三焦經	1	3.545
足厥陰肝經	1	2.582
手太陰肺經	1	2.331

표 2.417: 병증 <青盲>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	7	10.810
손	5	4.785
머리	3	9.061
배	1	2.582
등	1	2.018

2.140 口眼喎

이 병증 치료에는 모두 30가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.467차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 地倉 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 地倉 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 16차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체

부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 8.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 27차례 사용되었다.




그림 2.279: 병증 <口眼喎>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.280: 병증 <口眼喎>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.418: 병증 <口眼喎>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
地倉	4	23.9428	地倉	4	23.9428
顴髎	3	20.3523	顴髎	3	20.3523
巨髎	3	14.3100	巨髎	3	14.3100
承泣	2	8.5748	承泣	2	8.5748
頰車	2	7.9883	頰車	2	7.9883
承漿	2	6.1379	承漿	2	6.1379
上關	2	5.6926	上關	2	5.6926
完骨	2	5.0642	完骨	2	5.0642
列缺	2	4.8442	列缺	2	4.8442
水溝	2	4.6389	水溝	2	4.6389
耳和髎	1	4.6370	耳和髎	1	4.6370
下關	1	3.5216	下關	1	3.5216
四白	1	3.5216	四白	1	3.5216

迎香	1	3.5216	迎香	1	3.5216
承光	1	3.3259	承光	1	3.3259
二閻	1	3.1503	二閻	1	3.1503
溫溜	1	2.8463	溫溜	1	2.8463
強間	1	2.8463	強間	1	2.8463
通天	1	2.7131	通天	1	2.7131
聽會	1	2.7131	聽會	1	2.7131
齦交	1	2.3699	齦交	1	2.3699
翳風	1	2.1775	翳風	1	2.1775
內庭	1	2.0900	內庭	1	2.0900
偏歷	1	2.0074	偏歷	1	2.0074
大迎	1	1.9294	大迎	1	1.9294
足通谷	1	1.5950	足通谷	1	1.5950
衝陽	1	1.5373	衝陽	1	1.5373
風池	1	1.0044	風池	1	1.0044
行間	1	0.9049	行間	1	0.9049
太淵	1	0.8441	太淵	1	0.8441

표 2.419: 병증 <口眼喎>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	16	7.4906
足少陽膽經	6	3.6186
督脈	4	3.2850
手陽明大腸經	4	2.8814
手太陽小腸經	3	20.3523
手太陰肺經	3	2.8441
足太陽膀胱經	3	2.5447
任脈	2	6.1379
手少陽三焦經	2	3.4073
足厥陰肝經	1	0.9049

표 2.420: 병증 <口眼喎>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	27	7.590
머리	7	2.855
하박	4	3.233
발	4	1.532
손	2	1.997

2.141 口瘡瘻

이 병증 치료에는 모두 32가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.438차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 通里 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 通里 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手少陰心經 · 足陽明胃經 · 督脈으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 · 얼굴 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.281: 병증 <口瘡瘻>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.282: 병증 <口瘡痘>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.421: 병증 <口瘡瘻>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
通里	3	12.6078	通里	3	12.6078
靈道	2	9.9642	靈道	2	9.9642
頰車	2	7.8200	頰車	2	7.8200
齒門	2	7.3174	齒門	2	7.3174
廉泉	2	7.0906	廉泉	2	7.0906
天窓	2	6.8777	天窓	2	6.8777
翳風	2	6.6771	翳風	2	6.6771
大迎	2	6.1379	大迎	2	6.1379
支溝	2	5.5325	天鼎	1	5.5417
風府	2	5.3973	支溝	2	5.5325
足通谷	2	5.3973	風府	2	5.3973
合谷	2	4.9076	足通谷	2	5.3973
魚際	2	3.0492	合谷	2	4.9076
天鼎	1	5.5417	三陽絡	1	4.2026
三陽絡	1	4.2026	日月	1	3.9100
日月	1	3.9100	孔最	1	3.4388
孔最	1	3.4388	陰郄	1	3.4388
陰郄	1	3.4388	扶突	1	3.4388
扶突	1	3.4388	曲鬢	1	3.4388
曲鬢	1	3.4388	聽宮	1	3.2438
聽宮	1	3.2438	地倉	1	3.2438
地倉	1	3.2438	魚際	2	3.0492
承泣	1	2.9106	承泣	1	2.9106
腦戶	1	1.8556	腦戶	1	1.8556
承漿	1	1.7824	承漿	1	1.7824
陰谷	1	1.7130	陰谷	1	1.7130
天突	1	1.2176	天突	1	1.2176
水溝	1	1.1313	水溝	1	1.1313
間使	1	0.9429	間使	1	0.9429
心俞	1	0.9429	心俞	1	0.9429
復溜	1	0.8767	復溜	1	0.8767

然谷	1	0.5215	然谷	1	0.5215
----	---	--------	----	---	--------

표 2.422: 병증 <口瘡瘻>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手少陰心經	6	8.6703
足陽明胃經	6	5.0281
督脈	6	3.9254
手少陽三焦經	5	5.4708
手陽明大腸經	4	4.6294
任脈	4	3.3635
手太陽小腸經	3	5.0608
手太陰肺經	3	3.2440
足太陽膀胱經	3	3.1701
足少陰腎經	3	1.0371
足少陽膽經	2	3.6744
手厥陰心包經	1	0.9429

표 2.423: 병증 <口瘡瘻>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	11	5.7325
얼굴	11	4.1701
머리	8	4.9372
목	4	5.2861
손	4	3.9784
발	4	2.2652
배	1	3.9100
소퇴	1	1.7130
가슴	1	1.2176
등	1	0.9429

2.142 舌強

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.238차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 溫溜 · 廉泉 · 陰谷 · 天突 · 魚際 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 溫溜 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈 · 手陽明大腸經 · 足少陰腎經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.283: 병증 <舌强>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.284: 병증 <舌強>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.424: 병증 <舌強>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
溫溜	2	10.294	溫溜	2	10.294
廉泉	2	9.257	廉泉	2	9.257
陰谷	2	7.939	陰谷	2	7.939
天突	2	6.746	天突	2	6.746
魚際	2	4.962	滑肉門	1	6.662
滑肉門	1	6.662	魚際	2	4.962
築賓	1	4.518	築賓	1	4.518
二間	1	4.135	二間	1	4.135
中衝	1	3.550	中衝	1	3.550
瘡門	1	3.430	瘡門	1	3.430
足竅陰	1	3.113	足竅陰	1	3.113
飛揚	1	2.846	飛揚	1	2.846
關衝	1	2.846	關衝	1	2.846

大迎	1	2.846	大迎	1	2.846
少海	1	2.617	少海	1	2.617
風府	1	2.481	風府	1	2.481
解谿	1	2.297	解谿	1	2.297
陽谿	1	2.240	陽谿	1	2.240
陽谷	1	1.852	陽谷	1	1.852
行間	1	1.693	行間	1	1.693
然谷	1	1.280	然谷	1	1.280

표 2.425: 병증 <舌强>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	4	8.001
手陽明大腸經	4	5.556
足少陰腎經	4	4.579
足陽明胃經	3	3.935
手太陰肺經	2	4.962
督脈	2	2.955
手厥陰心包經	1	3.550
足少陽膽經	1	3.113
手少陽三焦經	1	2.846
足太陽膀胱經	1	2.846
手少陰心經	1	2.617
手太陽小腸經	1	1.852
足厥陰肝經	1	1.693

표 2.426: 병증 <舌强>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	6	3.547
소퇴	4	5.101
하박	4	4.921
발	4	2.096

얼굴	3	6.051
가슴	2	6.746
머리	2	2.955
배	1	6.662

2.143 口緩

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.143차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 鬱風 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 鬱風 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 · 얼굴 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.285: 병증 <口緩>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.286: 병증 <口緩>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.427: 병증 <口緩>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
翳風	3	16.060	翳風	3	16.060
大迎	2	8.575	大迎	2	8.575
下關	1	4.672	下關	1	4.672
地倉	1	4.470	地倉	1	4.470
漏谷	1	3.830	漏谷	1	3.830
齒門	1	3.579	齒門	1	3.579
通里	1	3.360	通里	1	3.360
內庭	1	3.166	內庭	1	3.166
經渠	1	2.911	經渠	1	2.911
上關	1	2.690	上關	1	2.690
足通谷	1	2.623	足通谷	1	2.623
風府	1	2.623	風府	1	2.623
氣衝	1	2.558	氣衝	1	2.558
衝陽	1	2.558	衝陽	1	2.558
三陰交	1	2.496	三陰交	1	2.496
合谷	1	2.379	合谷	1	2.379
水溝	1	2.169	水溝	1	2.169
風池	1	1.943	風池	1	1.943
脾俞	1	1.902	脾俞	1	1.902
太淵	1	1.749	太淵	1	1.749
崑崙	1	1.517	崑崙	1	1.517

표 2.428: 병증 <口緩>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	7	4.333
手少陽三焦經	3	16.060
督脈	3	2.790
足太陽膀胱經	3	2.014

足太陰脾經	2	3.163
手太陰肺經	2	2.330
足少陽膽經	2	2.317
手少陰心經	1	3.360
手陽明大腸經	1	2.379

표 2.429: 병증 <口緩>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	6	6.051
얼굴	6	4.515
발	4	2.466
소퇴	2	3.163
하박	2	3.135
손	2	2.064
배	1	2.558
등	1	1.902

2.144 齒齧

이 병증 치료에는 모두 24가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 耳門 · 三間 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 耳門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 9차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 · 머리 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.287: 병증 <齒齲>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.288: 병증 <齒齲>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.430: 병증 <齒齲>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
耳門	3	17.445	耳門	3	17.445
三間	3	11.489	三間	3	11.489
正營	2	11.439	正營	2	11.439
內庭	2	7.400	內庭	2	7.400
偏歷	2	7.217	偏歷	2	7.217
大迎	2	7.043	大迎	2	7.043
厲兌	2	6.285	厲兌	2	6.285
衝陽	2	6.152	衝陽	2	6.152
合谷	2	5.782	合谷	2	5.782
完骨	2	5.782	完骨	2	5.782
四瀆	1	5.025	四瀆	1	5.025
三陽絡	1	4.672	三陽絡	1	4.672
角孫	1	4.376	角孫	1	4.376
下關	1	3.898	下關	1	3.898
曲鬚	1	3.898	曲鬚	1	3.898
目窓	1	3.700	目窓	1	3.700
小海	1	3.212	小海	1	3.212
兌端	1	3.076	兌端	1	3.076
翳風	1	2.527	翳風	1	2.527
液門	1	2.052	液門	1	2.052
少海	1	2.052	少海	1	2.052
上關	1	1.986	上關	1	1.986
陽谷	1	1.335	陽谷	1	1.335
復溜	1	1.223	復溜	1	1.223

표 2.431: 병증 <齒齲>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	9	6.156

手少陽三焦經	8	6.016
手陽明大腸經	7	8.163
足少陽膽經	7	5.361
手太陽小腸經	2	2.273
督脈	1	3.076
手少陰心經	1	2.052
足少陰腎經	1	1.223

표 2.432: 병증 <齒齲>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	8	6.690
머리	8	5.287
발	7	5.265
하박	7	3.919
손	6	6.441

2.145 口舌乾苦

이 병증 치료에는 모두 22가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.545차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 曲澤 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 曲澤 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手厥陰心包經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.289: 병증 <口舌乾苦>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.290: 병증 <口舌乾苦>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.433: 병증 <口舌乾苦>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
曲澤	4	18.2228	曲澤	4	18.2228
少澤	3	13.4576	少澤	3	13.4576
膽俞	2	8.0130	膽俞	2	8.0130
商陽	2	7.6148	商陽	2	7.6148
大鐘	2	7.4312	大鐘	2	7.4312
少衝	2	6.6350	少衝	2	6.6350
三間	2	6.3618	三間	2	6.3618
勞宮	2	5.5506	勞宮	2	5.5506
章門	2	3.9146	章門	2	3.9146
不容	1	3.4660	不容	1	3.4660
兌端	1	3.1809	兌端	1	3.1809
足竅陰	1	2.6283	足竅陰	1	2.6283
關衝	1	2.3699	關衝	1	2.3699
陽陵泉	1	2.1491	陽陵泉	1	2.1491
小腸俞	1	2.0184	小腸俞	1	2.0184
下廉	1	1.8987	下廉	1	1.8987
尺澤	1	1.6868	尺澤	1	1.6868
肺俞	1	1.3834	肺俞	1	1.3834
復溜	1	1.3091	復溜	1	1.3091
太衝	1	1.0253	太衝	1	1.0253
太谿	1	0.9981	太谿	1	0.9981
肝俞	1	0.9459	肝俞	1	0.9459

표 2.434: 병증 <口舌乾苦>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手厥陰心包經	6	11.887
手陽明大腸經	5	5.292
足太陽膀胱經	5	3.090

足少陰腎經	4	3.246
手太陽小腸經	3	13.458
足厥陰肝經	3	2.470
手少陰心經	2	6.635
足少陽膽經	2	2.389
足陽明胃經	1	3.466
督脈	1	3.181
手少陽三焦經	1	2.370
手太陰肺經	1	1.687

표 2.435: 병증 <口舌乾苦>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	12	6.998
하박	6	7.269
발	6	2.678
등	5	3.090
옆구리	2	3.915
배	1	3.466
얼굴	1	3.181
소퇴	1	2.149

2.146 口齒疳瘡

이 병증 치료에는 모두 12가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.083차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 承漿 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 承漿 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.167차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.291: 병증 <口齒疳瘡>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.292: 병증 <口齒瘡瘍>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.436: 병증 <口齒瘡瘍>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承漿	2	10.771	承漿	2	10.771
耳和髎	1	7.022	耳和髎	1	7.022
角孫	1	6.359	角孫	1	6.359
天衝	1	6.096	天衝	1	6.096
下關	1	5.865	下關	1	5.865
聽會	1	5.003	聽會	1	5.003
頤車	1	5.003	頤車	1	5.003
翳風	1	4.415	翳風	1	4.415
上關	1	3.818	上關	1	3.818
完骨	1	3.489	完骨	1	3.489
水溝	1	3.264	水溝	1	3.264
勞宮	1	3.264	勞宮	1	3.264

표 2.437: 병증 <口齒疳瘡>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	4	4.602
手少陽三焦經	3	5.932
任脈	2	10.771
足陽明胃經	2	5.434
手厥陰心包經	1	3.264
督脈	1	3.264

표 2.438: 병증 <口齒疳瘡>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	8	5.821
머리	4	5.090
손	1	3.264

2.147 齒嚙

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.44차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 廉泉 · 鬱風 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 廉泉 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 15차례 사용되었다.




그림 2.293: 병증 <齒噤>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.294: 병증 <齒噤>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.439: 병증 <齒嚙>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
廉泉	3	14.3477	廉泉	3	14.3477
翳風	3	13.7049	翳風	3	13.7049
曲鬚	2	10.4585	曲鬚	2	10.4585
口禾髎	2	10.4585	口禾髎	2	10.4585
頬車	2	8.7527	頬車	2	8.7527
大迎	2	7.0432	大迎	2	7.0432
承漿	2	6.8777	承漿	2	6.8777
合谷	2	5.7821	合谷	2	5.7821
商丘	2	5.6674	商丘	2	5.6674
外關	1	4.1216	外關	1	4.1216
扶突	1	3.8983	扶突	1	3.8983
氣舍	1	3.6999	氣舍	1	3.6999
魄戶	1	3.3599	魄戶	1	3.3599
天容	1	3.2121	天容	1	3.2121
兌端	1	3.0762	兌端	1	3.0762
齶交	1	2.7248	齶交	1	2.7248
天窓	1	2.6228	天窓	1	2.6228
內庭	1	2.4366	內庭	1	2.4366
支溝	1	1.9857	支溝	1	1.9857
上關	1	1.9857	上關	1	1.9857
列缺	1	1.5950	列缺	1	1.5950
水溝	1	1.5020	水溝	1	1.5020
太淵	1	1.1224	太淵	1	1.1224
然谷	1	0.8203	然谷	1	0.8203
足三里	1	0.5463	足三里	1	0.5463

표 2.440: 병증 <齒嚙>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
--------	---------	------------

足陽明胃經	7	4.4957
任脈	5	10.6127
手陽明大腸經	5	6.7130
手少陽三焦經	5	6.6041
足少陽膽經	3	6.2221
督脈	3	2.4343
足太陰脾經	2	5.6674
手太陽小腸經	2	2.9174
手太陰肺經	2	1.3587
足太陽膀胱經	1	3.3599
足少陰腎經	1	0.8203

표 2.441: 병증 <齒嚙>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	15	6.3076
머리	5	12.0817
목	4	3.3583
발	4	2.9748
손	3	3.4522
하박	3	2.5675
등	1	3.3599
소퇴	1	0.5463

2.148 牙疼

이 병증 치료에는 모두 22가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.182차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 正營 · 商陽 · 大迎 · 陽谷 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 正營 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.714차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 · 얼굴 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.295: 병증 <牙疼>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.296: 병증 <牙疼>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.442: 병증 <牙疼>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
正營	2	12.717	正營	2	12.717
商陽	2	8.633	商陽	2	8.633
大迎	2	8.270	大迎	2	8.270
陽谷	2	6.131	手三里	1	6.662
手三里	1	6.662	陽谷	2	6.131
懸顱	1	5.658	懸顱	1	5.658
四瀆	1	5.658	四瀆	1	5.658
顴髎	1	5.658	顴髎	1	5.658
厥陰俞	1	5.303	厥陰俞	1	5.303
角孫	1	5.003	角孫	1	5.003
曲鬚	1	4.518	曲鬚	1	4.518
二間	1	4.135	二間	1	4.135
小海	1	3.818	小海	1	3.818

頰車	1	3.679	頰車	1	3.679
聽會	1	3.679	聽會	1	3.679
兌端	1	3.679	兌端	1	3.679
浮白	1	3.430	浮白	1	3.430
翳風	1	3.113	翳風	1	3.113
液門	1	2.617	液門	1	2.617
上關	1	2.548	上關	1	2.548
陽谿	1	2.240	陽谿	1	2.240
曲池	1	1.550	曲池	1	1.550

표 2.443: 병증 <牙疼>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	7	5.425
手陽明大腸經	6	4.644
手太陽小腸經	4	5.202
手少陽三焦經	4	4.098
足陽明胃經	3	5.974
足太陽膀胱經	1	5.303
督脈	1	3.679

표 2.444: 병증 <牙疼>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	7	5.740
얼굴	7	4.586
하박	6	4.764
손	5	4.406
등	1	5.303

2.149 鼻寒不利

이 병증 치료에는 모두 23가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.652차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 齈交 · 足臨泣 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 2차례 사용된 素髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 15차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 17차례 사용되었다.




그림 2.297: 병증 <鼻寒不利>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.298: 병증 <鼻寒不利>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.445: 병증 <鼻寒不利>에 사용된 경혈들

경혈	사용빈도 기준		G-Score 기준		
	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
離交	3	14.0349	素髎	2	14.5649
足臨泣	3	8.5578	離交	3	14.0349
素髎	2	14.5649	承靈	2	13.4272
承靈	2	13.4272	迎香	2	10.2484
迎香	2	10.2484	足臨泣	3	8.5578
通天	2	8.5460	通天	2	8.5460
顙會	2	6.8419	顙會	2	6.8419
風府	2	6.0877	風府	2	6.0877
厲兌	2	6.0877	厲兌	2	6.0877
上星	2	5.8278	眉衝	1	5.9156
水溝	2	5.1536	上星	2	5.8278
前谷	2	4.9572	水溝	2	5.1536
百會	2	3.2171	前谷	2	4.9572

眉衝	1	5.9156	口禾髎	1	3.7963
口禾髎	1	3.7963	承光	1	3.5986
承光	1	3.5986	百會	2	3.2171
曲差	1	2.9776	曲差	1	2.9776
玉枕	1	2.3422	玉枕	1	2.3422
天牖	1	2.3422	天牖	1	2.3422
至陰	1	2.2576	至陰	1	2.2576
京骨	1	2.0295	京骨	1	2.0295
天柱	1	1.8329	天柱	1	1.8329
中脘	1	0.6058	中脘	1	0.6058

표 2.446: 병증 <鼻寒不利>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	15	7.9611
足太陽膀胱經	9	3.6875
足少陽膽經	5	10.9925
手陽明大腸經	3	7.0224
足陽明胃經	2	6.0877
手太陽小腸經	2	4.9572
手少陽三焦經	1	2.3422
任脈	1	0.6058

표 2.447: 병증 <鼻寒不利>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	17	5.5104
얼굴	10	9.5596
발	7	4.7332
손	2	4.9572
목	1	2.3422
배	1	0.6058

2.150 鼻有息肉

이 병증 치료에는 모두 8가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.125차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 齈交 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 齌交 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.299: 병증 <鼻有息肉>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.300: 병증 <鼻有息肉>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.448: 병증 <鼻有息肉>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
齒交	2	13.401	齒交	2	13.401
素髎	1	8.767	素髎	1	8.767
口禾髎	1	6.588	口禾髎	1	6.588
迎香	1	6.588	迎香	1	6.588
巨髎	1	5.720	巨髎	1	5.720
曲差	1	5.720	曲差	1	5.720
腦空	1	5.229	腦空	1	5.229
上星	1	4.309	上星	1	4.309

표 2.449: 병증 <鼻有息肉>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	4	8.826
手陽明大腸經	2	6.588
足太陽膀胱經	1	5.720
足陽明胃經	1	5.720
足少陽膽經	1	5.229

표 2.450: 병증 <鼻有息肉>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	6	8.213
머리	3	5.086

2.151 鼻涕出

이 병증 치료에는 모두 22가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.273차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 風門 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 風門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.301: 병증 <鼻涕出>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.302: 병증 <鼻涕出>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.451: 병증 <鼻涕出>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
風門	5	28.818	風門	5	28.818
口禾髎	2	11.439	口禾髎	2	11.439
神庭	2	7.659	神庭	2	7.659
迎香	1	4.376	迎香	1	4.376
承光	1	4.175	承光	1	4.175
五處	1	3.830	五處	1	3.830
曲差	1	3.541	曲差	1	3.541
通天	1	3.541	通天	1	3.541
頷厭	1	3.412	頷厭	1	3.412
天牖	1	2.885	天牖	1	2.885
至陰	1	2.797	至陰	1	2.797
顙會	1	2.713	顙會	1	2.713
攢竹	1	2.634	攢竹	1	2.634
前頂	1	2.634	前頂	1	2.634
京骨	1	2.558	京骨	1	2.558
足通谷	1	2.351	足通谷	1	2.351
厲兌	1	2.351	厲兌	1	2.351
合谷	1	2.113	合谷	1	2.113
水溝	1	1.909	水溝	1	1.909
前谷	1	1.817	前谷	1	1.817
復溜	1	1.611	復溜	1	1.611
崑崙	1	1.280	崑崙	1	1.280

표 2.452: 병증 <鼻涕出>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	14	5.552
督脈	5	3.729
手陽明大腸經	4	5.976

足少陽膽經	1	3.412
手少陽三焦經	1	2.885
足陽明胃經	1	2.351
手太陽小腸經	1	1.817
足少陰腎經	1	1.611

표 2.453: 병증 <鼻涕出>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	9	3.938
발	6	2.158
등	5	28.818
얼굴	5	5.090
손	2	1.965
목	1	2.885

2.152 鼻痛

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.111차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 巨髎 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 巨髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經 · 足少陽膽經 · 督脈 · 任脈으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.303: 병증 <鼻痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.304: 병증 <鼻痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.454: 병증 <鼻痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
巨髎	2	13.752	巨髎	2	13.752
齧交	1	5.136	齧交	1	5.136
腦空	1	5.025	腦空	1	5.025
足竅陰	1	4.920	足竅陰	1	4.920
水分	1	4.551	水分	1	4.551
陰交	1	3.922	陰交	1	3.922
水溝	1	3.753	水溝	1	3.753
復溜	1	3.412	復溜	1	3.412
肝俞	1	2.950	肝俞	1	2.950

표 2.455: 병증 <鼻痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	2	13.752
足少陽膽經	2	4.972
督脈	2	4.444
任脈	2	4.237
足少陰腎經	1	3.412
足太陽膀胱經	1	2.950

표 2.456: 병증 <鼻痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	4	7.547
배	2	4.237
발	2	4.166
머리	1	5.025
등	1	2.950

2.153 鼻衄

이 병증 치료에는 모두 43가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.372차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 隱白 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 隱白 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 14가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.214차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 19차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.9차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 14차례 사용되었다.





그림 2.305: 병증 <鼻衄>에 사용된 경혈들 (경맥)



承靈	1	4.5021	陰郄	1	2.9810
郄門	1	3.4433	上髎	1	2.7905
迎香	1	2.9810	曲泉	2	2.7736
陰郄	1	2.9810	涌泉	2	2.6437
上髎	1	2.7905	二間	1	2.6200
二間	1	2.6200	崑崙	2	2.4041
曲差	1	2.1982	曲差	1	2.1982
巨髎	1	2.1982	巨髎	1	2.1982
通天	1	2.1982	通天	1	2.1982
瘡門	1	1.9714	瘡門	1	1.9714
天府	1	1.8704	天府	1	1.8704
腦空	1	1.7762	腦空	1	1.7762
申脈	1	1.6882	申脈	1	1.6882
天牖	1	1.6058	天牖	1	1.6058
承山	1	1.4555	承山	1	1.4555
承筋	1	1.4555	承筋	1	1.4555
飛揚	1	1.4555	飛揚	1	1.4555
攢竹	1	1.3868	攢竹	1	1.3868
神庭	1	1.3218	神庭	1	1.3218
委中	1	1.1468	委中	1	1.1468
足通谷	1	1.1468	足通谷	1	1.1468
厲兌	1	1.1468	厲兌	1	1.1468
三間	1	1.0942	三間	1	1.0942
合谷	1	0.9511	合谷	1	0.9511
勞宮	1	0.7890	勞宮	1	0.7890
水溝	1	0.7890	水溝	1	0.7890
前谷	1	0.7182	前谷	1	0.7182
風池	1	0.6228	風池	1	0.6228
太谿	1	0.3400	太谿	1	0.3400
中脘	1	0.1781	中脘	1	0.1781

표 2.458: 병증 <鼻衄>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
--------	---------	------------

足太陽膀胱經	19	2.8382
督脈	9	3.2945
手陽明大腸經	8	3.6009
足太陰脾經	4	14.6195
手太陽小腸經	3	2.7537
足少陽膽經	3	2.3004
足少陰腎經	3	1.4919
足厥陰肝經	2	2.7736
手厥陰心包經	2	2.1162
足陽明胃經	2	1.6725
手少陰心經	1	2.9810
手太陰肺經	1	1.8704
手少陽三焦經	1	1.6058
任脈	1	0.1781

표 2.459: 병증 <鼻衄>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	14	3.6152
머리	11	2.5987
얼굴	8	3.7991
손	7	1.8270
등	6	6.0892
소퇴	6	1.6574
하박	4	3.9434
상박	1	1.8704
목	1	1.6058
배	1	0.1781

2.154 咽喉腫痛

이 병증 치료에는 모두 24가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 水突 · 璞璣 · 天窓 · 中渚 · 風府 · 中封 · 太谿 · 然谷

혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 水突 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陰腎經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 11차례 사용되었다.




그림 2.307: 병증 <咽喉腫痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.308: 병증 <咽喉腫痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.460: 병증 <咽喉腫痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
水突	2	14.106	水突	2	14.106
璣璣	2	11.377	璣璣	2	11.377
天窓	2	8.243	天窓	2	8.243
中渚	2	7.317	中渚	2	7.317
風府	2	6.720	風府	2	6.720
中封	2	6.211	中封	2	6.211
太谿	2	4.372	膝關	1	4.900
然谷	2	4.119	人迎	1	4.602
膝關	1	4.900	太谿	2	4.372
人迎	1	4.602	然谷	2	4.119
氣舍	1	3.922	氣舍	1	3.922
膽俞	1	2.834	膽俞	1	2.834
內庭	1	2.645	內庭	1	2.645

大鐘	1	2.558	大鐘	1	2.558
液門	1	2.253	液門	1	2.253
支溝	1	2.186	支溝	1	2.186
尺澤	1	1.786	尺澤	1	1.786
天突	1	1.786	天突	1	1.786
勞宮	1	1.690	勞宮	1	1.690
前谷	1	1.600	前谷	1	1.600
間使	1	1.477	間使	1	1.477
行間	1	1.365	行間	1	1.365
照海	1	1.263	照海	1	1.263
涌泉	1	1.200	涌泉	1	1.200

표 2.461: 병증 <咽喉腫痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陰腎經	7	2.702
足陽明胃經	5	6.319
足厥陰肝經	4	4.159
手少陽三焦經	4	3.919
任脈	3	6.582
手太陽小腸經	3	4.922
督脈	2	6.720
手厥陰心包經	2	1.583
足太陽膀胱經	1	2.834
手太陰肺經	1	1.786

표 2.462: 병증 <咽喉腫痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	11	2.967
목	6	7.718
손	5	3.215
가슴	3	6.582

하박	3	1.816
머리	2	6.720
소퇴	1	4.900
등	1	2.834

2.155 喉咽鳴

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 天突 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 天突 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.309: 병증 <喉咽鳴>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.310: 병증 <喉咽鳴>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.463: 병증 <喉咽鳴>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
天突	3	12.862	天突	3	12.862
扶突	2	12.043	扶突	2	12.043
太谿	2	5.380	大包	1	6.253
大包	1	6.253	四瀆	1	5.815
四瀆	1	5.815	天谿	1	5.459
天谿	1	5.459	太谿	2	5.380
璫璣	1	4.900	璫璣	1	4.900
蠡溝	1	3.970	蠡溝	1	3.970
少府	1	3.830	少府	1	3.830
天池	1	3.260	天池	1	3.260
大鐘	1	3.076	大鐘	1	3.076
少商	1	3.076	少商	1	3.076
經渠	1	2.911	經渠	1	2.911
陽陵泉	1	2.760	陽陵泉	1	2.760
液門	1	2.760	液門	1	2.760
膻中	1	2.169	膻中	1	2.169
風池	1	1.943	風池	1	1.943
太衝	1	1.548	太衝	1	1.548
魚際	1	1.458	魚際	1	1.458
然谷	1	1.402	然谷	1	1.402

표 2.464: 병증 <喉咽鳴>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	5	6.644
足少陰腎經	4	3.286
手太陰肺經	3	2.482
手陽明大腸經	2	12.043
足太陰脾經	2	5.856

手少陽三焦經	2	4.288
足厥陰肝經	2	2.759
足少陽膽經	2	2.352
手少陰心經	1	3.830
手厥陰心包經	1	3.260

표 2.465: 병증 <喉咽鳴>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	6	6.348
발	5	2.851
손	4	2.781
목	2	12.043
옆구리	2	4.757
하박	2	4.363
소퇴	2	3.365
머리	1	1.943

2.156 咽喉乾

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.214차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 照海 · 太衝 · 魚際 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 照海 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足厥陰肝經 · 足少陰腎經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.311: 병증 <咽喉乾>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.312: 병증 <咽喉乾>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.466: 병증 <咽喉乾>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
照海	2	7.091	照海	2	7.091
太衝	2	6.707	太衝	2	6.707
魚際	2	6.496	魚際	2	6.496
極泉	1	5.136	極泉	1	5.136
少澤	1	3.716	少澤	1	3.716
偏歷	1	3.716	偏歷	1	3.716
神門	1	3.317	神門	1	3.317
少衝	1	3.317	少衝	1	3.317
中封	1	2.995	中封	1	2.995
天突	1	2.881	天突	1	2.881
復溜	1	2.451	復溜	1	2.451
行間	1	2.410	行間	1	2.410
太淵	1	2.331	太淵	1	2.331
太谿	1	2.082	太谿	1	2.082

표 2.467: 병증 <咽喉乾>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足厥陰肝經	4	4.037
足少陰腎經	4	3.875
手太陰肺經	3	4.413
手少陰心經	3	3.924
手太陽小腸經	1	3.716
手陽明大腸經	1	3.716
任脈	1	2.881

표 2.468: 병증 <咽喉乾>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	8	3.956
손	6	3.835
상박	1	5.136
하박	1	3.716
가슴	1	2.881

2.157 喉痺

이 병증 치료에는 모두 40가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.775차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脊俞 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 3차례 사용된 二間 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.455차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 16차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.889차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 17차례 사용되었다.




그림 2.313: 병증 <喉痺>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.314: 병증 <喉痺>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.469: 병증 <喉痺>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
膈俞	4	8.7245	二間	3	12.9424
二間	3	12.9424	天鼎	2	12.0984
雲門	3	9.3053	雲門	3	9.3053
然谷	3	4.2696	膈俞	4	8.7245
天鼎	2	12.0984	陽交	2	7.8495
陽交	2	7.8495	氣舍	2	7.4523
氣舍	2	7.4523	缺盆	2	7.4523
缺盆	2	7.4523	溫溜	2	6.4757
溫溜	2	6.4757	天容	2	6.4757
天容	2	6.4757	浮白	2	5.7179
浮白	2	5.7179	足竅陰	2	5.1033
足竅陰	2	5.1033	少澤	2	4.7515
少澤	2	4.7515	大杼	2	4.5897
大杼	2	4.5897	經渠	2	4.4361
經渠	2	4.4361	然谷	3	4.2696
厲兑	2	3.8918	厲兑	2	3.8918
完骨	2	3.4363	完骨	2	3.4363
陽谿	2	3.4363	陽谿	2	3.4363
合谷	2	3.4363	合谷	2	3.4363
天突	2	3.2347	天突	2	3.2347
中府	2	3.1396	中府	2	3.1396
大陵	2	2.8742	大陵	2	2.8742
前谷	2	2.8742	前谷	2	2.8742
曲池	2	2.1599	璣璣	1	2.8590
涌泉	2	2.1000	曲池	2	2.1599
足三里	2	1.1246	涌泉	2	2.1000
璣璣	1	2.8590	陽輔	1	1.6668
陽輔	1	1.6668	豐隆	1	1.3959
豐隆	1	1.3959	天牖	1	1.3176
天牖	1	1.3176	偏歷	1	1.2442
偏歷	1	1.2442	關衝	1	1.1755

關衝	1	1.1755	足三里	2	1.1246
鳩尾	1	1.1108	鳩尾	1	1.1108
中渚	1	1.1108	中渚	1	1.1108
神門	1	0.9384	神門	1	0.9384
三間	1	0.8387	三間	1	0.8387
下廉	1	0.7928	下廉	1	0.7928
尺澤	1	0.6315	尺澤	1	0.6315
風池	1	0.4166	風池	1	0.4166
肺俞	1	0.4166	肺俞	1	0.4166

표 2.470: 병증 <喉痺>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	16	4.8250
足少陽膽經	10	4.0317
足陽明胃經	9	4.2634
手太陰肺經	8	4.3781
足太陽膀胱經	7	4.5769
手太陽小腸經	6	4.7004
足少陰腎經	5	3.1848
任脈	4	2.4015
手少陽三焦經	3	1.2013
手厥陰心包經	2	2.8742
手少陰心經	1	0.9384

표 2.471: 병증 <喉痺>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	17	3.438
목	9	6.959
발	9	3.841
하박	9	2.623
가슴	8	4.635

등	7	4.577
소퇴	6	3.009
머리	5	3.190
배	1	1.111

2.158 脣頰腫痛

이 병증 치료에는 모두 31가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.226차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 兌端 · 大迎 · 腕骨 · 完骨 · 合谷 · 陽谷 · 足臨泣 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 兌端 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 9차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 얼굴 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.315: 병증 <脣頰腫痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.316: 병증 <脣頰腫痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.472: 병증 <脣頰腫痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
兌端	2	8.5460	兌端	2	8.5460
大迎	2	6.8419	大迎	2	6.8419
腕骨	2	5.7052	手三里	1	5.9156
完骨	2	5.5870	腕骨	2	5.7052
合谷	2	5.5870	完骨	2	5.5870
陽谷	2	4.7726	合谷	2	5.5870
足臨泣	2	4.2782	耳和髎	1	4.9200
手三里	1	5.9156	陽谷	2	4.7726
耳和髎	1	4.9200	足臨泣	2	4.2782
正營	1	4.2730	正營	1	4.2730
膺窓	1	4.2730	膺窓	1	4.2730
角孫	1	4.2730	角孫	1	4.2730
光明	1	3.7963	光明	1	3.7963
曲鬢	1	3.7963	曲鬢	1	3.7963
迎香	1	3.7963	迎香	1	3.7963
頰車	1	2.9776	頰車	1	2.9776
巨髎	1	2.9776	巨髎	1	2.9776
支正	1	2.7365	支正	1	2.7365
天窓	1	2.5269	天窓	1	2.5269
翳風	1	2.4318	翳風	1	2.4318
商陽	1	2.3422	商陽	1	2.3422
少商	1	2.2576	少商	1	2.2576
俠谿	1	2.2576	俠谿	1	2.2576
承漿	1	2.1016	承漿	1	2.1016
攢竹	1	2.1016	攢竹	1	2.1016
京骨	1	2.0295	京骨	1	2.0295
上關	1	1.8954	上關	1	1.8954
三間	1	1.7731	三間	1	1.7731
下廉	1	1.7159	下廉	1	1.7159
水溝	1	1.4178	水溝	1	1.4178

太衝	1	0.8726	太衝	1	0.8726
----	---	--------	----	---	--------

표 2.473: 병증 <脣頰腫痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	9	3.6977
手陽明大腸經	7	3.5217
手太陽小腸經	6	3.9353
足陽明胃經	5	4.2675
督脈	3	4.9819
手少陽三焦經	3	3.8749
足太陽膀胱經	2	2.0656
手太陰肺經	1	2.2576
任脈	1	2.1016
足厥陰肝經	1	0.8726

표 2.474: 병증 <脣頰腫痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
얼굴	12	3.758
손	7	3.533
머리	6	4.072
하박	5	3.785
발	5	2.360
가슴	1	4.273
소퇴	1	3.796
목	1	2.527

2.159 頸項強

이 병증 치료에는 모두 50가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.54차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 天柱 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성

(G-Score 기준) 측면에서도 天柱 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 8.556차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經 · 足太陽膀胱經으로 모두 18차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.7차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 33차례 사용되었다.




그림 2.317: 병증 <頸項強>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.318: 병증 <頸項強>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.475: 병증 <頸項強>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
天柱	4	12.0801	天柱	4	12.0801
強間	3	11.5285	強間	3	11.5285
通天	3	11.1102	通天	3	11.1102
風府	3	7.5116	外丘	2	10.6556
完骨	3	6.7879	消潔	2	9.7893
陽谷	3	5.6210	角孫	2	8.4961
外丘	2	10.6556	風府	3	7.5116
消潔	2	9.7893	完骨	3	6.7879
角孫	2	8.4961	天容	2	6.1778
天容	2	6.1778	本神	2	5.9077
本神	2	5.9077	頸厭	2	5.6581
頸厭	2	5.6581	陽谷	3	5.6210
瘡門	2	5.4262	瘡門	2	5.4262

齦交	2	5.2100	齦交	2	5.2100
後頂	2	5.0077	後頂	2	5.0077
玉枕	2	4.6389	玉枕	2	4.6389
後谿	2	3.8779	後谿	2	3.8779
腕骨	2	3.2802	腕骨	2	3.2802
前谷	2	2.6255	人迎	1	2.9539
風池	2	2.3926	臂臑	1	2.9539
人迎	1	2.9539	天衝	1	2.7131
臂臑	1	2.9539	前谷	2	2.6255
天衝	1	2.7131	曲鬢	1	2.5039
曲鬢	1	2.5039	風池	2	2.3926
氣舍	1	2.3195	氣舍	1	2.3195
魄戶	1	2.0074	魄戶	1	2.0074
小海	1	1.8737	小海	1	1.8737
陶道	1	1.8737	陶道	1	1.8737
頬車	1	1.7518	頬車	1	1.7518
曲差	1	1.7518	曲差	1	1.7518
肩井	1	1.6401	肩井	1	1.6401
支正	1	1.5373	支正	1	1.5373
浮白	1	1.5373	浮白	1	1.5373
腦空	1	1.3544	腦空	1	1.3544
足竅陰	1	1.2726	足竅陰	1	1.2726
天牖	1	1.1963	天牖	1	1.1963
丘墟	1	1.1251	丘墟	1	1.1251
少澤	1	1.1251	少澤	1	1.1251
大杼	1	1.0583	大杼	1	1.0583
大迎	1	1.0583	大迎	1	1.0583
風門	1	1.0583	風門	1	1.0583
飛揚	1	1.0583	飛揚	1	1.0583
攢竹	1	0.9957	攢竹	1	0.9957
京骨	1	0.9369	京骨	1	0.9369
大椎	1	0.8816	大椎	1	0.8816
足通谷	1	0.7803	足通谷	1	0.7803
天突	1	0.5369	天突	1	0.5369
天井	1	0.5369	天井	1	0.5369

涌泉	1	0.1822	涌泉	1	0.1822
崑崙	1	0.1274	崑崙	1	0.1274

표 2.476: 병증 <頸項強>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	18	3.6290
足太陽膀胱經	18	3.1336
督脈	14	5.3485
手太陽小腸經	14	3.2648
手少陽三焦經	6	5.0047
足陽明胃經	4	2.0209
手陽明大腸經	1	2.9539
任脈	1	0.5369
足少陰腎經	1	0.1822

표 2.477: 병증 <頸項強>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	33	5.6561
얼굴	7	2.9847
손	7	2.7272
하박	6	2.3922
발	6	0.7374
목	5	3.1619
등	5	1.3759
상박	4	4.7944
소퇴	3	5.8570
가슴	1	0.5369

2.160 頭風

이 병증 치료에는 모두 29가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.552차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 前頂 · 上星 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 前頂 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5.625차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 19차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 29차례 사용되었다.




그림 2.319: 병증 <頭風>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.320: 병증 <頭風>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.478: 병증 <頭風>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
前頂	4	17.3031	前頂	4	17.3031
上星	4	15.5410	上星	4	15.5410
五處	3	15.0740	五處	3	15.0740
後頂	3	12.7335	後頂	3	12.7335
顱會	3	11.5910	顱會	3	11.5910
百會	3	5.9896	天牖	2	6.5688
天牖	2	6.5688	百會	3	5.9896
神庭	2	5.9010	神庭	2	5.9010
眉衝	1	5.5847	眉衝	1	5.5847
耳和髎	1	4.5938	耳和髎	1	4.5938
瘦脈	1	3.6999	瘦脈	1	3.6999
承光	1	3.2844	承光	1	3.2844
絲竹空	1	3.1091	絲竹空	1	3.1091

跗陽	1	3.1091	跗陽	1	3.1091
頸厭	1	2.5503	頸厭	1	2.5503
通里	1	2.2318	通里	1	2.2318
腦空	1	2.2318	腦空	1	2.2318
俠谿	1	1.9697	俠谿	1	1.9697
關衝	1	1.8920	關衝	1	1.8920
風門	1	1.8920	風門	1	1.8920
攢竹	1	1.8185	攢竹	1	1.8185
天柱	1	1.5593	天柱	1	1.5593
下廉	1	1.4472	下廉	1	1.4472
完骨	1	1.3445	完骨	1	1.3445
合谷	1	1.3445	合谷	1	1.3445
陽谷	1	1.0084	陽谷	1	1.0084
腎俞	1	0.6564	腎俞	1	0.6564
崑崙	1	0.6330	崑崙	1	0.6330
關元	1	0.5069	關元	1	0.5069

표 2.479: 병증 <頭風>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	19	11.5099
足太陽膀胱經	11	3.7346
手少陽三焦經	6	3.9727
足少陽膽經	4	2.0241
手陽明大腸經	2	1.3959
手少陰心經	1	2.2318
手太陽小腸經	1	1.0084
任脈	1	0.5069

표 2.480: 병증 <頭風>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	29	7.4563

얼굴	3	3.1738
하박	3	1.5625
목	2	6.5688
손	2	1.6183
발	2	1.3013
등	2	1.2742
소퇴	1	3.1091
배	1	0.5069

2.161 頭痛

이 병증 치료에는 모두 73가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.205차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 懸釐 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 懸釐 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.769차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 21차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 8.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 35차례 사용되었다.




그림 2.321: 병증 <頭痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




표 2.481: 병증 <頭痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
懸釐	3	12.2601	懸釐	3	12.2601
天衝	2	7.4842	天衝	2	7.4842
命門	2	6.6518	命門	2	6.6518
強間	2	5.6926	強間	2	5.6926
通里	2	4.5413	通里	2	4.5413
腦空	2	4.5413	腦空	2	4.5413
豐隆	2	4.3551	豐隆	2	4.3551
大杼	2	3.8589	大杼	2	3.8589
腦戶	2	3.8589	腦戶	2	3.8589
解谿	2	2.8589	外丘	1	3.7421
完骨	2	2.7578	頭維	1	3.3259
崑崙	2	1.3203	青靈	1	3.3259
魚際	2	1.2295	消潔	1	3.3259
百會	2	0.9175	懸顱	1	3.3259
外丘	1	3.7421	解谿	2	2.8589
頭維	1	3.3259	完骨	2	2.7578
青靈	1	3.3259	正營	1	2.7131
消潔	1	3.3259	曲鬚	1	2.2706
懸顱	1	3.3259	四白	1	2.2706
正營	1	2.7131	孔最	1	2.2706
曲鬚	1	2.2706	承光	1	2.0900
四白	1	2.2706	目窓	1	2.0900
孔最	1	2.2706	絲竹空	1	1.9294
承光	1	2.0900	率谷	1	1.9294
目窓	1	2.0900	五處	1	1.7855
絲竹空	1	1.9294	溫溜	1	1.6555
率谷	1	1.9294	小海	1	1.6555
五處	1	1.7855	陶道	1	1.6555
溫溜	1	1.6555	曲差	1	1.5373
小海	1	1.6555	顱息	1	1.5373
陶道	1	1.6555	通天	1	1.5373

曲差	1	1.5373	本神	1	1.5373
顱息	1	1.5373	神道	1	1.5373
通天	1	1.5373	中衝	1	1.4294
本神	1	1.5373	頷厭	1	1.4294
神道	1	1.5373	痘門	1	1.3304
中衝	1	1.4294	崑崙	2	1.3203
頷厭	1	1.4294	魚際	2	1.2295
痘門	1	1.3304	膽俞	1	1.1550
膽俞	1	1.1550	後頂	1	1.1550
後頂	1	1.1550	天池	1	1.0770
天池	1	1.0770	足竅陰	1	1.0770
足竅陰	1	1.0770	玉枕	1	1.0044
玉枕	1	1.0044	少澤	1	0.9369
少澤	1	0.9369	譴諱	1	0.9369
譴諱	1	0.9369	至陰	1	0.9369
至陰	1	0.9369	百會	2	0.9175
顱會	1	0.8740	顱會	1	0.8740
飛揚	1	0.8740	飛揚	1	0.8740
承筋	1	0.8740	承筋	1	0.8740
中渚	1	0.8151	中渚	1	0.8151
前頂	1	0.8151	前頂	1	0.8151
神庭	1	0.7601	神庭	1	0.7601
京骨	1	0.7601	京骨	1	0.7601
後谿	1	0.7085	後谿	1	0.7085
陽陵泉	1	0.7085	陽陵泉	1	0.7085
少海	1	0.7085	少海	1	0.7085
氣海	1	0.6148	氣海	1	0.6148
天柱	1	0.6148	天柱	1	0.6148
風府	1	0.6148	風府	1	0.6148
足通谷	1	0.6148	足通谷	1	0.6148
三焦俞	1	0.5320	三焦俞	1	0.5320
陽谿	1	0.4588	陽谿	1	0.4588
合谷	1	0.4588	合谷	1	0.4588
太白	1	0.4253	太白	1	0.4253
水溝	1	0.3363	水溝	1	0.3363

大陵	1	0.2854	大陵	1	0.2854
前谷	1	0.2854	前谷	1	0.2854
風池	1	0.2197	風池	1	0.2197
足臨泣	1	0.1345	足臨泣	1	0.1345
曲泉	1	0.1206	曲泉	1	0.1206
石門	1	0.0405	石門	1	0.0405
關元	1	0.0179	關元	1	0.0179

표 2.482: 병증 <頭痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	21	3.0138
足太陽膀胱經	18	1.2770
督脈	17	2.0153
足陽明胃經	6	3.2026
手少陰心經	4	2.8586
手少陽三焦經	4	1.9020
手太陽小腸經	4	0.8966
手太陰肺經	3	1.7501
手厥陰心包經	3	0.9306
手陽明大腸經	3	0.8577
任脈	3	0.2244
足太陰脾經	1	0.4253
足厥陰肝經	1	0.1206

표 2.483: 병증 <頭痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	35	2.4869
발	10	1.0160
손	10	0.7342
등	9	2.3325
소퇴	7	1.7790

하박	6	2.1663
얼굴	5	1.8799
배	3	0.2244
상박	2	3.3259
옆구리	1	1.0770

2.162 腦痛

이 병증 치료에는 모두 11가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 承靈 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 9차례 사용되었다.




그림 2.323: 병증 <腦痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.324: 병증 <腦痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.484: 병증 <腦痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
承靈	1	7.796	承靈	1	7.796
率谷	1	5.799	率谷	1	5.799
強間	1	5.472	強間	1	5.472
瘡門	1	5.068	瘡門	1	5.068
腦空	1	4.840	腦空	1	4.840
玉枕	1	4.637	玉枕	1	4.637
少海	1	4.210	少海	1	4.210
天柱	1	4.063	天柱	1	4.063
上廉	1	4.063	上廉	1	4.063
上星	1	3.928	上星	1	3.928
風池	1	3.326	風池	1	3.326

표 2.485: 병증 <腦痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	4	5.440
督脈	3	4.823
足太陽膀胱經	2	4.350
手少陰心經	1	4.210
手陽明大腸經	1	4.063

표 2.486: 병증 <腦痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	9	4.992
하박	2	4.136

2.163 頭旋

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 腦戶 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 腦戶 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 11차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 14차례 사용되었다.




그림 2.325: 병증 <頭旋>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.326: 병증 <頭旋>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.487: 병증 <頭旋>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
腦戶	3	16.269	腦戶	3	16.269
跗陽	2	11.971	跗陽	2	11.971
玉枕	2	9.642	玉枕	2	9.642
天柱	2	8.489	天柱	2	8.489
百會	2	5.403	百會	2	5.403
絡却	1	4.821	絡却	1	4.821
目窓	1	4.821	目窓	1	4.821
率谷	1	4.637	率谷	1	4.637
陶道	1	4.317	陶道	1	4.317
通天	1	4.175	通天	1	4.175
瘡門	1	3.922	瘡門	1	3.922
申脈	1	3.599	申脈	1	3.599
至陰	1	3.412	至陰	1	3.412

腎俞	1	1.843	腎俞	1	1.843
----	---	-------	----	---	-------

표 2.488: 병증 <頭旋>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	11	5.994
督脈	7	7.478
足少陽膽經	2	4.729

표 2.489: 병증 <頭旋>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	14	6.909
소퇴	2	11.971
발	2	3.505
등	2	3.080

2.164 頭腫

이 병증 치료에는 모두 6가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 腦戶 · 完骨 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 腦戶 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.327: 병증 <頭腫>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.328: 병증 <頭腫>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.490: 병증 <頭腫>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
腦戶	2	12.849	腦戶	2	12.849
完骨	2	11.502	完骨	2	11.502
公孫	1	5.459	公孫	1	5.459
顱會	1	5.068	顱會	1	5.068
前頂	1	4.982	前頂	1	4.982
上星	1	4.535	上星	1	4.535

표 2.491: 병증 <頭腫>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
督脈	5	6.859
足少陽膽經	2	11.502
足太陰脾經	1	5.459

표 2.492: 병증 <頭腫>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	7	7.787
발	1	5.459

2.165 頂腫痛

이 병증 치료에는 모두 2가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 曲差 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 1차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 1가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 2차례 사용되었다.




그림 2.329: 병증 <頂腫痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.330: 병증 <頂腫痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.493: 병증 <頂腫痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
曲差	1	8.694	曲差	1	8.694
前頂	1	7.707	前頂	1	7.707

표 2.494: 병증 <頂腫痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	1	8.694
督脈	1	7.707

표 2.495: 병증 <頂腫痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	2	8.201

2.166 面腫

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 陷谷 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 陷谷 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 督脈으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.444차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 16차례 사용되었다.




그림 2.331: 병증 <面腫>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.332: 병증 <面腫>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.496: 병증 <面腫>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
陷谷	4	17.5664	陷谷	4	17.5664
頤會	3	12.2601	頤會	3	12.2601
前頂	3	12.0071	前頂	3	12.0071
上星	3	10.6983	上星	3	10.6983
天牖	2	7.0057	天牖	2	7.0057
腦戶	2	6.6518	腦戶	2	6.6518
厲兌	2	5.9010	厲兌	2	5.9010
解谿	2	5.5206	解谿	2	5.5206
水溝	2	4.9723	水溝	2	4.9723
風池	2	4.5065	風池	2	4.5065
迎香	1	3.6999	迎香	1	3.6999
陽交	1	3.6999	陽交	1	3.6999
目窓	1	3.5029	目窓	1	3.5029
溫溜	1	3.0191	溫溜	1	3.0191
巨髎	1	2.8846	巨髎	1	2.8846
公孫	1	2.4366	公孫	1	2.4366
豐隆	1	2.3422	豐隆	1	2.3422
大迎	1	2.0900	大迎	1	2.0900
承漿	1	2.0148	承漿	1	2.0148
陽陵泉	1	1.8753	陽陵泉	1	1.8753
合谷	1	1.5271	合谷	1	1.5271
完骨	1	1.5271	完骨	1	1.5271
中府	1	1.3834	中府	1	1.3834
天樞	1	1.1404	天樞	1	1.1404
百會	1	0.5646	百會	1	0.5646

표 2.497: 병증 <面腫>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
--------	---------	------------

督脈	14	7.859
足陽明胃經	12	5.349
足少陽膽經	6	3.022
手陽明大腸經	3	2.749
手少陽三焦經	2	7.006
足太陰脾經	1	2.437
任脈	1	2.015
手太陰肺經	1	1.383

표 2.498: 병증 <面腫>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	16	6.465
발	9	7.856
얼굴	6	3.132
소퇴	3	2.639
목	2	7.006
하박	1	3.019
손	1	1.527
가슴	1	1.383
배	1	1.140

2.167 面痛

이 병증 치료에는 모두 19가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.053차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脾俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 1차례 사용된 懸顱 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經 · 手少陽三焦經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.333: 병증 <面痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.334: 병증 <面痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.499: 병증 <面痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
腎俞	2	6.109	懸顱	1	6.173
懸顱	1	6.173	腎俞	2	6.109
懸釐	1	4.821	懸釐	1	4.821
內關	1	4.637	內關	1	4.637
齧交	1	3.807	齧交	1	3.807
天窓	1	3.700	天窓	1	3.700
玉枕	1	3.503	玉枕	1	3.503
開衝	1	3.326	開衝	1	3.326
腦戶	1	3.326	腦戶	1	3.326
中渚	1	3.244	中渚	1	3.244
攢竹	1	3.244	攢竹	1	3.244
液門	1	3.091	液門	1	3.091
支溝	1	3.019	支溝	1	3.019

氣海	1	2.950	氣海	1	2.950
解谿	1	2.760	解谿	1	2.760
天突	1	2.590	天突	1	2.590
間使	1	2.253	間使	1	2.253
行間	1	2.129	行間	1	2.129
太衝	1	1.843	太衝	1	1.843

표 2.500: 병증 <面痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	4	4.285
手少陽三焦經	4	3.170
足少陽膽經	2	5.497
督脈	2	3.567
手厥陰心包經	2	3.445
任脈	2	2.770
足厥陰肝經	2	1.986
手太陽小腸經	1	3.700
足陽明胃經	1	2.760

표 2.501: 병증 <面痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	4	4.456
하박	3	3.303
손	3	3.220
발	3	2.244
등	2	6.109
얼굴	2	3.526
목	1	3.700
배	1	2.950
가슴	1	2.590

2.168 傷寒

이 병증 치료에는 모두 36가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 涌泉 · 巨闕 · 中腕 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 涌泉 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 13가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.692차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.335: 병증 <傷寒>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.336: 병증 <傷寒>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.502: 병증 <傷寒>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
涌泉	3	6.9719	涌泉	3	6.9719
巨闕	3	6.4594	公孫	2	6.7197
中腕	3	5.5864	通里	2	6.7197
公孫	2	6.7197	巨闕	3	6.4594
通里	2	6.7197	中腕	3	5.5864
少衝	2	5.3801	少衝	2	5.3801
曲澤	2	5.2455	曲澤	2	5.2455
太淵	2	3.4975	天髎	1	4.1216
魚際	2	2.9159	太淵	2	3.4975
天髎	1	4.1216	魚際	2	2.9159
中衝	1	2.4366	中衝	1	2.4366
支正	1	2.3240	支正	1	2.3240
俠谿	1	1.8621	俠谿	1	1.8621

風門	1	1.7855	風門	1	1.7855
關衝	1	1.7855	關衝	1	1.7855
少海	1	1.5790	少海	1	1.5790
陷谷	1	1.5790	陷谷	1	1.5790
委中	1	1.4579	委中	1	1.4579
三間	1	1.4016	三間	1	1.4016
陽谿	1	1.2472	陽谿	1	1.2472
尺澤	1	1.1550	尺澤	1	1.1550
天井	1	1.1550	天井	1	1.1550
上腕	1	1.0701	上腕	1	1.0701
勞宮	1	1.0701	勞宮	1	1.0701
大陵	1	0.9918	大陵	1	0.9918
期門	1	0.9193	期門	1	0.9193
陽谷	1	0.9193	陽谷	1	0.9193
間使	1	0.8851	間使	1	0.8851
風池	1	0.8851	風池	1	0.8851
膈俞	1	0.6774	膈俞	1	0.6774
曲池	1	0.6774	曲池	1	0.6774
腎俞	1	0.5797	腎俞	1	0.5797
太衝	1	0.5797	太衝	1	0.5797
太谿	1	0.5572	太谿	1	0.5572
肝俞	1	0.5146	肝俞	1	0.5146
然谷	1	0.4746	然谷	1	0.4746

표 2.503: 병증 <傷寒>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	7	4.3720
手厥陰心包經	6	2.1258
手少陰心經	5	4.5596
足少陰腎經	5	2.6679
手太陰肺經	5	2.5228
足太陽膀胱經	5	1.0030
手少陽三焦經	3	2.3540

手陽明大腸經	3	1.1087
足太陰脾經	2	6.7197
手太陽小腸經	2	1.6217
足少陽膽經	2	1.3736
足厥陰肝經	2	0.7495
足陽明胃經	1	1.5790

표 2.504: 병증 <傷寒>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	12	2.3029
하박	11	2.2956
발	10	2.6778
배	8	3.5088
등	4	0.8893
상박	1	4.1216
소퇴	1	1.4579
머리	1	0.8851

2.169 黃疸

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.3차례 사용되었 다. 가장 여러 차례 사용된 것은 脾俞 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 脾俞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥 이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.714차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 9차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.25차례 사용되었다. 가장

여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 10차례 사용되었다.




그림 2.337: 병증 <黃疸>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.338: 병증 <黃疸>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.505: 병증 <黃疸>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
脾俞	5	23.487	脾俞	5	23.487
太衝	2	5.164	太衝	2	5.164
中脘	2	4.426	中脘	2	4.426
脊中	1	4.317	脊中	1	4.317
手五里	1	3.818	手五里	1	3.818
承漿	1	2.766	承漿	1	2.766
風府	1	2.481	風府	1	2.481
中封	1	2.240	中封	1	2.240
勞宮	1	2.033	勞宮	1	2.033
水溝	1	2.033	水溝	1	2.033
上脘	1	2.033	上脘	1	2.033
大陵	1	1.940	大陵	1	1.940
肺俞	1	1.811	肺俞	1	1.811
心俞	1	1.811	心俞	1	1.811
腎俞	1	1.422	腎俞	1	1.422
太谿	1	1.393	太谿	1	1.393
巨闕	1	1.363	巨闕	1	1.363
肝俞	1	1.335	肝俞	1	1.335
然谷	1	1.280	然谷	1	1.280
章門	1	1.280	章門	1	1.280

표 2.506: 병증 <黃疸>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	9	5.973
任脈	5	2.647
足厥陰肝經	4	2.895
督脈	3	2.944
手厥陰心包經	2	1.986

足少陰腎經	2	1.336
手陽明大腸經	1	3.818

표 2.507: 병증 <黃疸>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	10	5.697
발	5	2.519
배	4	2.607
얼굴	2	2.400
손	2	1.986
상박	1	3.818
머리	1	2.481
옆구리	1	1.280

2.170 傷寒頭痛

이 병증 치료에는 모두 17가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.059차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 魚際 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 그러나 이와 달리 연관성(G-Score 기준) 측면에서는 1차례 사용된 懸顱 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 12가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.571차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.339: 병증 <傷寒頭痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.340: 병증 <傷寒頭痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.508: 병증 <傷寒頭痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
魚際	2	6.285	懸顱	1	6.380
懸顱	1	6.380	魚際	2	6.285
懸釐	1	5.025	懸釐	1	5.025
溫溜	1	4.518	溫溜	1	4.518
神道	1	4.376	神道	1	4.376
支正	1	4.122	支正	1	4.122
通里	1	3.898	通里	1	3.898
天池	1	3.796	天池	1	3.796
少澤	1	3.608	少澤	1	3.608
中渚	1	3.439	中渚	1	3.439
鳩尾	1	3.439	鳩尾	1	3.439
液門	1	3.284	液門	1	3.284
三焦俞	1	3.012	三焦俞	1	3.012
太白	1	2.834	太白	1	2.834
風池	1	2.437	風池	1	2.437
涌泉	1	2.121	涌泉	1	2.121
關元	1	1.804	關元	1	1.804

표 2.509: 병증 <傷寒頭痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	3	4.614
手太陰肺經	2	6.285
手太陽小腸經	2	3.865
手少陽三焦經	2	3.362
任脈	2	2.622
手陽明大腸經	1	4.518
督脈	1	4.376
手少陰心經	1	3.898

手厥陰心包經	1	3.796
足太陽膀胱經	1	3.012
足太陰脾經	1	2.834
足少陰腎經	1	2.121

표 2.510: 병증 <傷寒頭痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	5	4.154
머리	3	4.614
하박	3	4.179
등	2	3.694
배	2	2.622
발	2	2.478
옆구리	1	3.796

2.171 傷寒寒熱

이 병증 치료에는 모두 16가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 肩貞 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 11가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.455차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陽小腸經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.341: 병증 <傷寒寒熱>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.342: 병증 <傷寒寒熱>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.511: 병증 <傷寒寒熱>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
肩貞	1	5.459	肩貞	1	5.459
肩井	1	4.470	肩井	1	4.470
支正	1	4.346	支正	1	4.346
關衝	1	3.742	關衝	1	3.742
少海	1	3.503	少海	1	3.503
大椎	1	3.503	大椎	1	3.503
後谿	1	3.503	後谿	1	3.503
曲澤	1	3.360	曲澤	1	3.360
三間	1	3.293	三間	1	3.293
衝陽	1	3.293	衝陽	1	3.293
商丘	1	3.047	商丘	1	3.047
天井	1	2.991	天井	1	2.991
列缺	1	2.991	列缺	1	2.991
中府	1	2.937	中府	1	2.937
曲池	1	2.361	曲池	1	2.361
膈俞	1	2.361	膈俞	1	2.361

표 2.512: 병증 <傷寒寒熱>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陽小腸經	3	4.436
手少陽三焦經	2	3.367
手太陰肺經	2	2.964
手陽明大腸經	2	2.827
足少陽膽經	1	4.470
手少陰心經	1	3.503
督脈	1	3.503
手厥陰心包經	1	3.360
足陽明胃經	1	3.293

足太陰脾經	1	3.047
足太陽膀胱經	1	2.361

표 2.513: 병증 <傷寒寒熱>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	6	3.259
손	3	3.513
상박	2	4.964
발	2	3.170
등	2	2.932
가슴	1	2.937

2.172 寒熱

이 병증 치료에는 모두 33가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.121차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 光明 · 腦空 · 肺俞 · 魚際 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 光明 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.7차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 13차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.111차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 13차례 사용되었다.




그림 2.343: 병증 <寒熱>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.344: 병증 <寒熱>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.514: 병증 <寒熱>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
光明	2	10.3520	光明	2	10.3520
腦空	2	7.6932	腦空	2	7.6932
肺俞	2	4.7774	至陽	1	4.9716
魚際	2	3.7540	肺俞	2	4.7774
至陽	1	4.9716	陰都	1	4.0695
陰都	1	4.0695	神堂	1	3.8466
神堂	1	3.8466	陰郄	1	3.8466
陰郄	1	3.8466	魚際	2	3.7540
陶道	1	3.1617	陶道	1	3.1617
陽綱	1	3.0262	陽綱	1	3.0262
顱息	1	3.0262	顱息	1	3.0262
曲差	1	3.0262	曲差	1	3.0262
神道	1	3.0262	神道	1	3.0262
浮白	1	2.7844	浮白	1	2.7844
痘門	1	2.7844	痘門	1	2.7844
膽俞	1	2.5741	膽俞	1	2.5741
天池	1	2.4786	天池	1	2.4786
玉枕	1	2.3887	玉枕	1	2.3887
飛揚	1	2.2234	飛揚	1	2.2234
少海	1	2.0056	少海	1	2.0056
少衝	1	1.9398	少衝	1	1.9398
小腸俞	1	1.8770	小腸俞	1	1.8770
三焦俞	1	1.7594	三焦俞	1	1.7594
太白	1	1.6004	太白	1	1.6004
天突	1	1.5515	天突	1	1.5515
風池	1	1.2553	風池	1	1.2553
脾俞	1	1.2186	脾俞	1	1.2186
復溜	1	1.1830	復溜	1	1.1830
足臨泣	1	1.0830	足臨泣	1	1.0830
膈俞	1	1.0213	膈俞	1	1.0213
涌泉	1	0.9918	涌泉	1	0.9918

腎俞	1	0.9085	腎俞	1	0.9085
中脘	1	0.6376	中脘	1	0.6376

표 2.515: 병증 <寒熱>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	13	2.387
足少陽膽經	7	4.634
督脈	4	3.486
手少陰心經	3	2.597
足少陰腎經	3	2.081
手太陰肺經	2	3.754
任脈	2	1.095
手少陽三焦經	1	3.026
手厥陰心包經	1	2.479
足太陰脾經	1	1.600

표 2.516: 병증 <寒熱>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	13	2.681
머리	8	3.280
발	4	1.214
소퇴	3	6.288
손	3	2.847
하박	2	2.926
배	2	2.354
옆구리	1	2.479
가슴	1	1.552

2.173 腹寒熱氣

이 병증 치료에는 모두 25가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.36차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 關元 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 關元 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.778차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 10차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 15차례 사용되었다.




그림 2.345: 병증 <腹寒熱氣>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.346: 병증 <腹寒熱氣>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.517: 병증 <腹寒熱氣>에 사용된 경혈들

경혈	사용빈도 기준		G-Score 기준		
	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
關元	3	7.7920	關元	3	7.7920
隱白	2	6.7803	隱白	2	6.7803
少衝	2	6.6350	少衝	2	6.6350
氣衝	2	6.3618	氣衝	2	6.3618
商丘	2	5.8742	商丘	2	5.8742
中極	2	5.2565	中極	2	5.2565
天樞	2	5.0746	天樞	2	5.0746
中脘	2	3.5248	陽交	1	4.0065
陽交	1	4.0065	會陽	1	4.0065
會陽	1	4.0065	衝門	1	3.8074
衝門	1	3.8074	中脘	2	3.5248
漏谷	1	3.1809	漏谷	1	3.1809
下脘	1	2.9371	下脘	1	2.9371

痙門	1	2.9371	痙門	1	2.9371
飛揚	1	2.3699	飛揚	1	2.3699
鳩尾	1	2.2926	鳩尾	1	2.2926
上關	1	2.0823	上關	1	2.0823
陰陵泉	1	2.0184	陰陵泉	1	2.0184
氣海	1	2.0184	氣海	1	2.0184
三間	1	1.9573	三間	1	1.9573
下廉	1	1.8987	下廉	1	1.8987
三陰交	1	1.8987	三陰交	1	1.8987
行間	1	1.2736	行間	1	1.2736
太衝	1	1.0253	太衝	1	1.0253
足三里	1	0.6128	足三里	1	0.6128

표 2.518: 병증 <腹寒熱氣>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	10	3.970
足太陰脾經	8	3.927
足陽明胃經	5	4.016
手少陰心經	2	6.635
足太陽膀胱經	2	3.188
足少陽膽經	2	3.044
手陽明大腸經	2	1.928
足厥陰肝經	2	1.149
督脈	1	2.937

표 2.519: 병증 <腹寒熱氣>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	15	4.341
발	6	3.738
소퇴	6	2.348
손	3	4.296

등	1	4.006
머리	1	2.937
얼굴	1	2.082
하박	1	1.899

2.174 身寒痺

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.095차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中封 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 中封 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.875차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經 · 足太陽膀胱經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 · 소퇴 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.347: 병증 <身寒痺>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.348: 병증 <身寒痺>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.520: 병증 <身寒痺>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中封	3	13.466	中封	3	13.466
中瀆	1	7.707	中瀆	1	7.707
條口	1	5.542	條口	1	5.542
腰陽關	1	4.754	腰陽關	1	4.754
合陽	1	4.754	合陽	1	4.754
下髎	1	4.551	下髎	1	4.551
懸鍾	1	4.369	懸鍾	1	4.369
筋縮	1	4.203	筋縮	1	4.203
環跳	1	4.050	環跳	1	4.050
漏谷	1	3.910	漏谷	1	3.910
風市	1	3.910	風市	1	3.910
豐隆	1	3.339	豐隆	1	3.339
京骨	1	2.911	京骨	1	2.911
委中	1	2.699	委中	1	2.699
下廉	1	2.571	下廉	1	2.571
商丘	1	2.398	商丘	1	2.398
列缺	1	2.345	列缺	1	2.345
足臨泣	1	1.819	足臨泣	1	1.819
膈俞	1	1.747	膈俞	1	1.747
曲池	1	1.747	曲池	1	1.747
魚際	1	1.525	魚際	1	1.525

표 2.521: 병증 <身寒痺>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	5	4.371
足太陽膀胱經	5	3.333
足厥陰肝經	3	13.466
督脈	2	4.479

足陽明胃經	2	4.440
足太陰脾經	2	3.154
手陽明大腸經	2	2.159
手太陰肺經	2	1.935

표 2.522: 병증 <身寒痺>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	6	5.148
소퇴	6	4.102
등	4	3.814
대퇴	3	5.223
하박	3	2.221
손	1	1.525

2.175 自汗

이 병증 치료에는 모두 28가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.214차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 缺盆 · 列缺 · 中府 · 復溜 · 照海 · 然谷 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 缺盆 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 9차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 12차례 사용되었다.




그림 2.349: 병증 <自汗>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.350: 병증 <自汗>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.523: 병증 <自汗>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
缺盆	2	10.2712	缺盆	2	10.2712
列缺	2	5.7627	列缺	2	5.7627
中府	2	5.6549	中府	2	5.6549
復溜	2	4.9027	復溜	2	4.9027
照海	2	4.5853	照海	2	4.5853
然谷	2	3.9146	正營	1	4.4859
正營	1	4.4859	然谷	2	3.9146
五處	1	3.4660	五處	1	3.4660
大都	1	3.0546	大都	1	3.0546
頸厭	1	3.0546	頸厭	1	3.0546
後頂	1	2.7248	後頂	1	2.7248
玉枕	1	2.5373	玉枕	1	2.5373
譴諱	1	2.4513	譴諱	1	2.4513
少商	1	2.4513	少商	1	2.4513
飛揚	1	2.3699	飛揚	1	2.3699
承漿	1	2.2926	承漿	1	2.2926
攢竹	1	2.2926	攢竹	1	2.2926
衝陽	1	1.9573	衝陽	1	1.9573
大敦	1	1.7886	大敦	1	1.7886
上腕	1	1.5924	上腕	1	1.5924
肺俞	1	1.3834	肺俞	1	1.3834
心俞	1	1.3834	心俞	1	1.3834
曲池	1	1.1422	曲池	1	1.1422
膈俞	1	1.1422	膈俞	1	1.1422
涌泉	1	1.1117	涌泉	1	1.1117
太谿	1	0.9981	太谿	1	0.9981
崑崙	1	0.9981	崑崙	1	0.9981
百會	1	0.7625	百會	1	0.7625

표 2.524: 병증 <自汗>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	9	2.003
足少陰腎經	8	3.103
手太陰肺經	5	4.623
足陽明胃經	3	6.114
足少陽膽經	2	3.770
任脈	2	1.942
督脈	2	1.744
足太陰脾經	1	3.055
足厥陰肝經	1	1.789
手陽明大腸經	1	1.142

표 2.525: 병증 <自汗>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	12	2.590
머리	6	2.838
등	4	1.590
하박	3	3.453
목	2	10.271
가슴	2	5.655
얼굴	2	2.293
손	1	2.451
소퇴	1	2.370
배	1	1.592

2.176 汗不出

이 병증 치료에는 모두 21가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.238차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 命門 · 少澤 · 偏歷 · 曲澤 · 魚際 혈(穴)로 모두

2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 命門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.714차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.351: 병증 <汗不出>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.352: 병증 <汗不出>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.526: 병증 <汗不出>에 사용된 경혈들

경혈	사용빈도 기준		G-Score 기준		
	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
命門	2	11.317	命門	2	11.317
少澤	2	8.447	少澤	2	8.447
偏歷	2	8.447	偏歷	2	8.447
曲澤	2	7.495	曲澤	2	7.495
魚際	2	4.962	魚際	2	4.962
中膂俞	1	3.970	中膂俞	1	3.970
陶道	1	3.818	陶道	1	3.818
曲差	1	3.679	曲差	1	3.679
痙門	1	3.430	痙門	1	3.430
膽俞	1	3.212	膽俞	1	3.212
足竅陰	1	3.113	足竅陰	1	3.113
至陰	1	2.930	至陰	1	2.930
俠谿	1	2.930	俠谿	1	2.930

上星	1	2.356	上星	1	2.356
上院	1	2.033	上院	1	2.033
肺俞	1	1.811	肺俞	1	1.811
心俞	1	1.811	心俞	1	1.811
復溜	1	1.731	復溜	1	1.731
太淵	1	1.619	太淵	1	1.619
曲泉	1	1.584	曲泉	1	1.584
崑崙	1	1.393	崑崙	1	1.393

표 2.527: 병증 <汗不出>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	7	2.686
督脈	5	5.230
手太陰肺經	3	3.291
手太陽小腸經	2	8.447
手陽明大腸經	2	8.447
手厥陰心包經	2	7.495
足少陽膽經	2	3.022
任脈	1	2.033
足少陰腎經	1	1.731
足厥陰肝經	1	1.584

표 2.528: 병증 <汗不出>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	7	4.323
손	5	5.010
발	5	2.419
하박	4	7.971
머리	3	3.155
배	1	2.033

소퇴 1 1.584

2.177 傷寒無汗

이 병증 치료에는 모두 49가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.367차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中衝 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 中衝 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 14가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 4.786차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 8.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 손 부위이며 모두 19차례 사용되었다.




그림 2.353: 병증 <傷寒無汗>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.354: 병증 <傷寒無汗>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.529: 병증 <傷寒無汗>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中衝	3	11.5059	中衝	3	11.5059
孔最	2	8.0692	孔最	2	8.0692
光明	2	8.0692	光明	2	8.0692
懸釐	2	7.6706	懸釐	2	7.6706
陶道	2	6.6899	陶道	2	6.6899
大都	2	6.1632	大都	2	6.1632
大杼	2	4.7916	大杼	2	4.7916
中渚	2	4.6367	中渚	2	4.6367
經渠	2	4.6367	經渠	2	4.6367
支溝	2	4.2149	陽池	1	4.2149
厲兌	2	4.0869	支溝	2	4.2149
腕骨	2	3.7341	厲兌	2	4.0869
勞宮	2	3.2320	懸顱	1	3.8353

前谷	2	3.0555	腕骨	2	3.7341
陽谷	2	2.8908	勞宮	2	3.2320
風池	2	2.8124	前谷	2	3.0555
膈俞	2	2.3276	陽谷	2	2.8908
陽池	1	4.2587	風池	2	2.8124
懸顱	1	3.8353	上髎	1	2.5635
上髎	1	2.5635	命門	1	2.5635
命門	1	2.5635	膈俞	2	2.3276
曲差	1	1.9822	曲差	1	1.9822
通里	1	1.5711	通里	1	1.5711
天池	1	1.4859	天池	1	1.4859
內庭	1	1.4062	內庭	1	1.4062
商陽	1	1.4062	商陽	1	1.4062
玉枕	1	1.4062	玉枕	1	1.4062
譴諱	1	1.3315	譴諱	1	1.3315
飛揚	1	1.2614	飛揚	1	1.2614
陷谷	1	1.0744	陷谷	1	1.0744
後谿	1	1.0744	後谿	1	1.0744
液門	1	1.0744	液門	1	1.0744
曲澤	1	0.9663	曲澤	1	0.9663
委中	1	0.9663	委中	1	0.9663
天柱	1	0.9663	天柱	1	0.9663
衝陽	1	0.9164	衝陽	1	0.9164
上星	1	0.8691	上星	1	0.8691
解谿	1	0.8242	解谿	1	0.8242
膀胱俞	1	0.8242	膀胱俞	1	0.8242
合谷	1	0.7816	合谷	1	0.7816
尺澤	1	0.7023	尺澤	1	0.7023
上腕	1	0.6304	上腕	1	0.6304
大陵	1	0.5651	大陵	1	0.5651
心俞	1	0.4779	心俞	1	0.4779
太淵	1	0.3568	太淵	1	0.3568
曲泉	1	0.3357	曲泉	1	0.3357
太谿	1	0.2279	太谿	1	0.2279
肝俞	1	0.1982	肝俞	1	0.1982

魚際	1	0.1982	魚際	1	0.1982
----	---	--------	----	---	--------

표 2.530: 병증 <傷寒無汗>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	14	1.5914
手厥陰心包經	8	3.5510
足少陽膽經	7	5.5969
手太陰肺經	7	2.7926
手太陽小腸經	7	2.6887
手少陽三焦經	6	3.5462
足陽明胃經	6	1.6616
督脈	4	3.3742
足太陰脾經	2	6.1632
手陽明大腸經	2	1.0939
手少陰心經	1	1.5711
任脈	1	0.6304
足厥陰肝經	1	0.3357
足少陰腎經	1	0.2279

표 2.531: 병증 <傷寒無汗>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
손	19	2.7600
등	12	2.4187
하박	11	3.2930
머리	9	2.7917
발	9	2.0999
소퇴	5	2.6581
옆구리	1	1.4859
배	1	0.6304

2.178 發背

이 병증 치료에는 모두 10가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 獗鼻 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.429차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陽膽經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 발 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.355: 병증 <發背>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.356: 병증 <發背>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.532: 병증 <發背>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
慍鼻	1	6.173	慍鼻	1	6.173
小海	1	5.658	小海	1	5.658
陽輔	1	5.253	陽輔	1	5.253
足竅陰	1	4.920	足竅陰	1	4.920
風門	1	4.637	風門	1	4.637
天突	1	3.864	天突	1	3.864
腫中	1	3.753	腫中	1	3.753
間使	1	3.503	間使	1	3.503
足臨泣	1	3.284	足臨泣	1	3.284
太衝	1	3.055	太衝	1	3.055

표 2.533: 병증 <發背>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陽膽經	3	4.486
任脈	2	3.808
足陽明胃經	1	6.173
手太陽小腸經	1	5.658
足太陽膀胱經	1	4.637
手厥陰心包經	1	3.503
足厥陰肝經	1	3.055

표 2.534: 병증 <發背>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
발	3	3.753
하박	2	4.581
가슴	2	3.808
대퇴	1	6.173
소퇴	1	5.253
등	1	4.637

2.179 瘰瘤

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.5차례 사용되었 다. 가장 여러 차례 사용된 것은 通天 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 通天 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 10가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.75차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 머리 부위이며 모두 8차례 사용되었다.




그림 2.357: 병증 <瘻瘤>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.358: 병증 <癰瘍>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.535: 병증 <癰瘍>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
通天	3	16.541	通天	3	16.541
膿會	2	12.760	膿會	2	12.760
臂臑	2	12.154	臂臑	2	12.154
氣舍	2	10.758	氣舍	2	10.758
天府	2	8.707	天府	2	8.707
三間	2	6.824	三間	2	6.824
膻中	2	6.003	膻中	2	6.003
風池	2	5.521	風池	2	5.521
肺俞	2	5.521	肺俞	2	5.521
消潔	1	5.379	消潔	1	5.379
五處	1	3.700	五處	1	3.700
浮白	1	3.166	浮白	1	3.166
天窓	1	2.950	天窓	1	2.950

雲門	1	2.673	雲門	1	2.673
腦戶	1	2.590	腦戶	1	2.590
大椎	1	2.365	大椎	1	2.365
氣衝	1	2.169	氣衝	1	2.169
衝陽	1	2.169	衝陽	1	2.169
中封	1	1.996	中封	1	1.996
天突	1	1.892	天突	1	1.892

표 2.536: 병증 <瘻瘤>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	6	8.587
手陽明大腸經	4	9.489
足陽明胃經	4	5.032
手少陽三焦經	3	9.070
手太陰肺經	3	5.690
足少陽膽經	3	4.343
任脈	3	3.948
督脈	2	2.478
手太陽小腸經	1	2.950
足厥陰肝經	1	1.996

표 2.537: 병증 <瘻瘤>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
머리	8	6.303
상박	7	9.750
가슴	4	3.523
목	3	6.854
등	3	3.943
손	2	6.824
발	2	2.083
배	1	2.169

2.180 瘰癧

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.357차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 手五里 혈(穴)로 모두 3차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 手五里 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 5차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.375차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 상박 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.359: 병증 <瘭瘭>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.360: 병증 <瘰癧>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.538: 병증 <瘰癧>에 사용된 경혈들

경혈	사용빈도 기준		G-Score 기준		
	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
手五里	3	19.667	手五里	3	19.667
臂臑	2	13.955	臂臑	2	13.955
大迎	2	9.472	大迎	2	9.472
少海	2	8.980	少海	2	8.980
人迎	1	5.614	人迎	1	5.614
極泉	1	4.920	極泉	1	4.920
肩井	1	4.141	肩井	1	4.141
陽輔	1	4.019	陽輔	1	4.019
天池	1	3.695	天池	1	3.695
天牖	1	3.599	天牖	1	3.599
鳩尾	1	3.339	鳩尾	1	3.339
支溝	1	3.113	支溝	1	3.113
足臨泣	1	2.139	足臨泣	1	2.139

章門	1	1.773	章門	1	1.773
----	---	-------	----	---	-------

표 2.539: 병증 <癰瘡>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	5	16.811
足陽明胃經	3	7.543
手少陰心經	3	6.950
足少陽膽經	3	3.433
手少陽三焦經	2	3.356
手厥陰心包經	1	3.695
任脈	1	3.339
足厥陰肝經	1	1.773

표 2.540: 병증 <癰瘡>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
상박	7	10.671
하박	3	6.046
얼굴	2	9.472
목	2	4.606
옆구리	2	2.734
소퇴	1	4.019
배	1	3.339
발	1	2.139

2.181 風疹

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 曲池 혈(穴)로 모두 4차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 曲池 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.714차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 6차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.361: 병증 <風疹>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.362: 병증 <風疹>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.541: 병증 <風疹>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
曲池	4	21.999	曲池	4	21.999
伏兎	1	6.253	伏兎	1	6.253
環跳	1	5.303	環跳	1	5.303
肩髃	1	5.303	肩髃	1	5.303
天窓	1	4.672	天窓	1	4.672
曲澤	1	3.898	曲澤	1	3.898
合谷	1	3.638	合谷	1	3.638
涌泉	1	2.834	涌泉	1	2.834
崑崙	1	2.690	崑崙	1	2.690

표 2.542: 병증 <風疹>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	6	10.313
足陽明胃經	1	6.253
足少陽膽經	1	5.303
手太陽小腸經	1	4.672
手厥陰心包經	1	3.898
足少陰腎經	1	2.834
足太陽膀胱經	1	2.690

표 2.543: 병증 <風疹>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	5	12.949
대퇴	2	5.778
발	2	2.762
상박	1	5.303
목	1	4.672
손	1	3.638

2.182 歷節風

이 병증 치료에는 모두 5가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.2차례 사용되었 다. 가장 여러 차례 사용된 것은 飛揚 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 飛揚 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경 맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 소퇴 · 머리 부위이며 모두 2차례 사용되었다.




그림 2.363: 병증 <歷節風>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.364: 병증 <歷節風>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.544: 병증 <歷節風>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
飛揚	2	13.985	飛揚	2	13.985
頸厭	1	6.380	頸厭	1	6.380
後頂	1	6.022	後頂	1	6.022
曲池	1	4.162	曲池	1	4.162
涌泉	1	4.122	涌泉	1	4.122

표 2.545: 병증 <歷節風>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	2	13.985
足少陽膽經	1	6.380
督脈	1	6.022

手陽明大腸經	1	4.162
足少陰腎經	1	4.122

표 2.546: 병증 <歷節風>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
소퇴	2	13.985
머리	2	6.201
하박	1	4.162
발	1	4.122

2.183 丁瘡

이 병증 치료에는 모두 5가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 小海 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手陽明大腸經으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 하박 · 발 부위이며 모두 2차례 사용되었다.




그림 2.365: 병증 <丁瘡>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.366: 병증 <丁瘡>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.547: 병증 <丁瘡>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
小海	1	7.022	小海	1	7.022
合谷	1	5.315	合谷	1	5.315
足臨泣	1	4.594	足臨泣	1	4.594
曲池	1	4.510	曲池	1	4.510
太衝	1	4.354	太衝	1	4.354

표 2.548: 병증 <丁瘡>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手陽明大腸經	2	4.913
手太陽小腸經	1	7.022
足少陽膽經	1	4.594
足厥陰肝經	1	4.354

표 2.549: 병증 <丁瘡>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	2	5.766
발	2	4.474
손	1	5.315

2.184 癬疥瘡

이 병증 치료에는 모두 8가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 支正 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 手太陽小腸經 · 手陽明大腸經으로 모두 3차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 4차례 사용되었다.




그림 2.367: 병증 <癰疥瘡>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.368: 병증 <癰疥瘡>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.550: 병증 <癰疥瘡>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
支正	1	5.689	支正	1	5.689
後谿	1	4.821	後谿	1	4.821
支溝	1	4.745	支溝	1	4.745
陽谿	1	4.407	陽谿	1	4.407
合谷	1	4.407	合谷	1	4.407
大陵	1	4.069	大陵	1	4.069
陽谷	1	3.970	陽谷	1	3.970
曲池	1	3.618	曲池	1	3.618

표 2.551: 병증 <癰疥瘡>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
手太陽小腸經	3	4.826
手陽明大腸經	3	4.144
手少陽三焦經	1	4.745
手厥陰心包經	1	4.069

표 2.552: 병증 <癬疥瘡>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
하박	4	4.505
손	4	4.426

2.185 蠕毒

내용 없음

2.186 犬傷

내용 없음

2.187 乳癰

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.222차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 神封 · 膽窓 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 神封 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足陽明胃經으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 6차례 사용되었다.




그림 2.369: 병증 <乳癰>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.370: 병증 <乳癰>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.553: 병증 <乳癰>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
神封	2	18.349	神封	2	18.349
膽窓	2	16.122	膽窓	2	16.122
天谿	1	6.992	天谿	1	6.992
乳根	1	5.799	乳根	1	5.799
俠谿	1	4.543	俠谿	1	4.543
下廉	1	3.928	下廉	1	3.928
足臨泣	1	3.109	足臨泣	1	3.109
魚際	1	2.778	魚際	1	2.778
足三里	1	2.320	足三里	1	2.320

표 2.554: 병증 <乳癰>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	4	8.080
足少陰腎經	2	18.349
足少陽膽經	2	3.826
足太陰脾經	1	6.992
手陽明大腸經	1	3.928
手太陰肺經	1	2.778

표 2.555: 병증 <乳癰>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	6	11.816
발	2	3.826
하박	1	3.928
손	1	2.778
소퇴	1	2.320

2.188 乳腫痛

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 地五會 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 7가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2차례 사용되었다. 가장 여러

차례 치료에 사용된 곳은 가슴 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.371: 병증 <乳腫痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.372: 병증 <乳腫痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.556: 병증 <乳腫痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
地五會	1	7.888	地五會	1	7.888
肓門	1	7.888	肓門	1	7.888
府舍	1	6.516	府舍	1	6.516
天谿	1	6.516	天谿	1	6.516
璣璣	1	5.950	璣璣	1	5.950
梁丘	1	5.950	梁丘	1	5.950
乳根	1	5.328	乳根	1	5.328
中庭	1	4.860	中庭	1	4.860
天牖	1	4.175	天牖	1	4.175
氣衝	1	3.541	氣衝	1	3.541
膻中	1	3.128	膻中	1	3.128
中極	1	2.978	中極	1	2.978
太淵	1	2.673	太淵	1	2.673
足臨泣	1	2.673	足臨泣	1	2.673

표 2.557: 병증 <乳腫痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	4	4.229
足陽明胃經	3	4.940
足太陰脾經	2	6.516
足少陽膽經	2	5.280
足太陽膀胱經	1	7.888
手少陽三焦經	1	4.175
手太陰肺經	1	2.673

표 2.558: 병증 <乳腫痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
가슴	5	5.156
배	3	4.345
발	2	5.280
등	1	7.888
대퇴	1	5.950
목	1	4.175
손	1	2.673

2.189 婦人無子

이 병증 치료에는 모두 20가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.8차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 關元 혈(穴)로 모두 8차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 關元 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 6차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 16차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.2차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 21차례 사용되었다.




그림 2.373: 병증 <婦人無子>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.374: 병증 <婦人無子>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.559: 병증 <婦人無子>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
關元	8	34.4739	關元	8	34.4739
中極	4	15.1854	陰廉	2	16.3887
涌泉	3	8.5012	中極	4	15.1854
陰廉	2	16.3887	涌泉	3	8.5012
四滿	2	7.7966	四滿	2	7.7966
石門	2	3.8451	歸來	1	4.6723
然谷	2	3.7243	中髎	1	3.8983
歸來	1	4.6723	築賓	1	3.8983
中髎	1	3.8983	石門	2	3.8451
築賓	1	3.8983	然谷	2	3.7243
次髎	1	3.6999	次髎	1	3.6999
上髎	1	3.6999	上髎	1	3.6999
石關	1	3.3599	石關	1	3.3599
申脈	1	2.5269	申脈	1	2.5269
神闕	1	2.1212	神闕	1	2.1212
氣衝	1	1.8621	氣衝	1	1.8621
商丘	1	1.6443	商丘	1	1.6443
陰交	1	1.6443	陰交	1	1.6443
曲泉	1	1.0907	曲泉	1	1.0907
崑崙	1	0.9193	崑崙	1	0.9193

표 2.560: 병증 <婦人無子>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	16	11.454
足少陰腎經	9	5.456
足太陽膀胱經	5	2.949
足厥陰肝經	3	8.740
足陽明胃經	2	3.267

足太陰脾經	1	1.644
-------	---	-------

표 2.561: 병증 <婦人無子>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	21	8.329
발	8	3.463
등	3	3.766
대퇴	2	16.389
소퇴	2	2.494

2.190 婦人血氣痛

이 병증 치료에는 모두 4가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.25차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 階交 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 階交 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈 · 足少陰腎經으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 2가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 3차례 사용되었다.




그림 2.375: 병증 <婦人血氣痛>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.376: 병증 <婦人血氣痛>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.562: 병증 <婦人血氣痛>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
陰交	2	13.225	陰交	2	13.225
四滿	1	6.380	四滿	1	6.380
申脈	1	6.274	申脈	1	6.274
涌泉	1	4.470	涌泉	1	4.470

표 2.563: 병증 <婦人血氣痛>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	2	13.225
足少陰腎經	2	5.425
足太陽膀胱經	1	6.274

표 2.564: 병증 <婦人血氣痛>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	3	9.803
발	2	5.372

2.191 血塊

이 병증 치료에는 모두 9가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.111차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 石門 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 石門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥

이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.667차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 4차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 5차례 사용되었다.




그림 2.377: 병증 <血塊>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.378: 병증 <血塊>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.565: 병증 <血塊>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
石門	2	8.489	石門	2	8.489
漏谷	1	5.514	漏谷	1	5.514
曲骨	1	4.727	曲骨	1	4.727
中府	1	3.807	中府	1	3.807
中極	1	3.599	中極	1	3.599
天樞	1	3.503	天樞	1	3.503
復溜	1	3.412	復溜	1	3.412
曲泉	1	3.244	曲泉	1	3.244
足三里	1	2.486	足三里	1	2.486

표 2.566: 병증 <血塊>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	4	5.605
足陽明胃經	2	2.994
足太陰脾經	1	5.514
手太陰肺經	1	3.807
足少陰腎經	1	3.412
足厥陰肝經	1	3.244

표 2.567: 병증 <血塊>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	5	5.079
소퇴	3	3.748
가슴	1	3.807
발	1	3.412

2.192 血崩

이 병증 치료에는 모두 16가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.875차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 石門 혈(穴)로 모두 5차례 사용되었다. 또한 연관성 (G-Score 기준) 측면에서도 石門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 任脈으로 모두 14차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 4가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 7.5차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 15차례 사용되었다.




그림 2.379: 병증 <血崩>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.380: 병증 <血崩>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.568: 병증 <血崩>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
石門	5	19.492	石門	5	19.492
關元	3	8.464	血海	2	14.362
血海	2	14.362	中都	2	10.758
中都	2	10.758	關元	3	8.464
陰谷	2	7.400	陰谷	2	7.400
氣海	2	6.959	氣海	2	6.959
三陰交	2	6.694	三陰交	2	6.694
陰交	2	6.331	陰交	2	6.331
中極	2	5.705	中極	2	5.705
太衝	2	4.662	太衝	2	4.662
合陽	1	4.245	合陽	1	4.245
交信	1	3.864	交信	1	3.864
大敦	1	1.996	大敦	1	1.996
天樞	1	1.579	天樞	1	1.579
照海	1	1.361	照海	1	1.361
然谷	1	1.070	然谷	1	1.070

표 2.569: 병증 <血崩>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
任脈	14	9.390
足厥陰肝經	5	5.805
足少陰腎經	5	3.424
足太陰脾經	4	10.528
足太陽膀胱經	1	4.245
足陽明胃經	1	1.579

표 2.570: 병증 <血崩>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	15	8.088
소퇴	8	6.592
발	5	2.272
대퇴	2	14.362

2.193 產後餘疾

이 병증 치료에는 모두 3가지 경혈이 사용되었다. 모든 경혈은 동일하게 1차례 사용되었다. 다만 연관성(G-Score 기준) 측면에서 보았을 때, 伏兎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 경맥이 사용되었다. 모든 경맥은 동일하게 1차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 이 병증 치료에는 모든 인체 부위가 동일하게 1차례 사용되었다.




그림 2.381: 병증 <産後餘疾>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.382: 병증 <産後餘疾>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.571: 병증 <產後餘疾>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
伏兎	1	9.001	伏兎	1	9.001
大杼	1	6.992	大杼	1	6.992
期門	1	5.865	期門	1	5.865

표 2.572: 병증 <產後餘疾>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足陽明胃經	1	9.001
足太陽膀胱經	1	6.992
足厥陰肝經	1	5.865

표 2.573: 병증 <產後餘疾>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
대퇴	1	9.001
등	1	6.992
배	1	5.865

2.194 難產

이 병증 치료에는 모두 5가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 衝門 · 氣衝 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성 (G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 衝門 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 경

맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 1.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陰脾經 · 足陽明胃經으로 모두 2차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 3가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 2.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 4차례 사용되었다.




그림 2.383: 병증 <難產>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.384: 병증 <難產>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.574: 병증 <難產>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
衝門	2	16.501	衝門	2	16.501
氣衝	2	12.425	氣衝	2	12.425
肩井	1	6.077	肩井	1	6.077
中封	1	4.663	中封	1	4.663
崑崙	1	3.679	崑崙	1	3.679

표 2.575: 병증 <難產>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陰脾經	2	16.501
足陽明胃經	2	12.425
足少陽膽經	1	6.077

足厥陰肝經	1	4.663
足太陽膀胱經	1	3.679

표 2.576: 병증 <難產>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	4	14.463
발	2	4.171
상박	1	6.077

2.195 月事

이 병증 치료에는 모두 24가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.333차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 帶脈 · 氣穴 · 四滿 · 陰交 · 中極 · 天樞 · 足臨泣 · 照海 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 帶脈 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 9가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 3.556차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足少陰腎經 · 任脈으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 8가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 배 부위이며 모두 14차례 사용되었다.




그림 2.385: 병증 <月事>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.386: 병증 <月事>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.577: 병증 <月事>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
帶脈	2	13.225	帶脈	2	13.225
氣穴	2	13.225	氣穴	2	13.225
四滿	2	8.243	四滿	2	8.243
陰交	2	6.095	陰交	2	6.095
中極	2	5.473	血海	1	5.689
天樞	2	5.290	水泉	1	5.689
足臨泣	2	4.873	中極	2	5.473
照海	2	4.796	天樞	2	5.290
血海	1	5.689	陰包	1	5.253
水泉	1	5.689	會陰	1	4.900
陰包	1	5.253	足臨泣	2	4.873
會陰	1	4.900	照海	2	4.796
水道	1	4.122	水道	1	4.122
下髎	1	3.922	下髎	1	3.922
腰俞	1	3.579	腰俞	1	3.579
俠谿	1	2.558	俠谿	1	2.558
隱白	1	2.253	隱白	1	2.253
氣海	1	2.121	氣海	1	2.121
氣衝	1	2.059	氣衝	1	2.059
三陰交	1	2.000	三陰交	1	2.000
閭使	1	1.477	閭使	1	1.477
行間	1	1.365	行間	1	1.365
太衝	1	1.112	太衝	1	1.112
關元	1	0.931	關元	1	0.931

표 2.578: 병증 <月事>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足少陰腎經	7	7.988

任脈	7	3.904
足少陽膽經	5	6.885
足陽明胃經	4	3.824
足太陰脾經	3	3.314
足厥陰肝經	3	2.577
足太陽膀胱經	1	3.922
督脈	1	3.579
手厥陰心包經	1	1.477

표 2.579: 병증 <月事>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
배	14	5.284
발	9	3.235
옆구리	2	13.225
대퇴	2	5.471
등	2	3.750
얼굴	1	4.900
소퇴	1	2.000
하박	1	1.477

2.196 赤白帶

이 병증 치료에는 모두 14가지 경혈이 사용되었다. 각 경혈은 평균 1.214차례 사용되었다. 가장 여러 차례 사용된 것은 中髎 · 曲骨 · 小腸俞 혈(穴)로 모두 2차례 사용되었다. 연관성(G-Score 기준)까지 고려했을 때 이 가운데 中髎 혈(穴)이 가장 높게 평가되었다.

경혈이 속한 경맥(혹은 경락)을 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 6가지 경맥이 사용되었다. 각 경맥은 이 병증 치료에 평균 2.833차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 경맥은 足太陽膀胱經으로 모두 7차례 사용되었다.

경혈이 위치한 인체 부위를 기준으로 보았을 때, 이 병증 치료에는 모두 5가지 인체 부위가 사용되었다. 각 인체 부위는 이 병증 치료에 평균 3.4차례 사용되었다. 가장 여러 차례 치료에 사용된 곳은 등·배 부위이며 모두 7차례 사용되었다.




그림 2.387: 병증 <赤白帶>에 사용된 경혈들 (경맥)




그림 2.388: 병증 <赤白帶>에 사용된 경혈들 (부위)

표 2.580: 병증 <赤白帶>에 사용된 경혈들

사용빈도 기준			G-Score 기준		
경혈	사용빈도(↓)	G-Score	경혈	사용빈도	G-Score(↓)
中髎	2	13.401	中髎	2	13.401
曲骨	2	10.082	曲骨	2	10.082
小腸俞	2	9.111	小腸俞	2	9.111
大赫	1	6.933	大赫	1	6.933
帶脈	1	6.493	帶脈	1	6.493
上髎	1	5.136	上髎	1	5.136
次髎	1	5.136	次髎	1	5.136
下髎	1	5.136	下髎	1	5.136
氣海	1	3.248	氣海	1	3.248
陰交	1	2.937	陰交	1	2.937
太白	1	2.937	太白	1	2.937
中極	1	2.628	中極	1	2.628
間使	1	2.537	間使	1	2.537

關元	1	1.899	關元	1	1.899
----	---	-------	----	---	-------

표 2.581: 병증 <赤白帶>에 사용된 경혈이 속한 경맥(경락)

경맥(경락)	사용빈도(↓)	G-Score 평균
足太陽膀胱經	7	7.584
任脈	6	4.159
足少陰腎經	1	6.933
足少陽膽經	1	6.493
足太陰脾經	1	2.937
手厥陰心包經	1	2.537

표 2.582: 병증 <赤白帶>에 사용된 경혈이 속한 인체 부위

부위	사용빈도(↓)	G-Score 평균
등	7	7.584
배	7	4.621
옆구리	1	6.493
발	1	2.937
하박	1	2.537



출판사항

서명: 한의학 고문헌 분석을 통해 본 병증과 경혈의 관계 1 (《침구자생경》 병증을 중심으로)

저자: 오준호

발행인: 이진용

발행처: 한국한의학연구원

발행일: 2024년 7월 31일

ISBN: 978-89-5970-567-2

주소: 대전시 유성구 유성대로 1672

대표전화: 042-868-9482


이 책의 저작권은 저작권자인 한국한의학연구원에 있습니다. 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물로서 이에 대한 무단 편집, 복제, 전재 및 배포를 금합니다.

COPYRIGHT© 2024 BY KOREA INSTITUTE OF ORIENTAL MEDICINE. ALL RIGHTS RESERVED.

감사의 글


이 책에는 나눔고딕, 함초롱바탕LVT, 함초롱돋움LVT 글꼴이 사용되었습니다.

이 책은 한국한의학연구원 주요사업 "AI 한의사 개발을 위한 임상 빅 데이터 수집 및 서비스 플랫폼 구축(KSN1923111)"의 지원을 받아 출간되었습니다.



비매품/무료

95510



9 788959 705672

ISBN 978-89-5970-567-2 (PDF)

