

Nome completo do paciente: _____

Data de nascimento: ____/____/____ Atendimento: _____ Hospital: _____

Responsável pela abertura da ficha: _____ Data: ____/____/____ Hora: _____

GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO DE SEPSE ADULTO

Marque com um X as opções dos critérios de alerta para SIRS.

Critérios sinais de SIRS	
☐	T.ax. > 37,8°
☐	T.ax. < 36,0°
☐	FC > 90 bpm
☐	FR > 20 rpm
Se exames disponíveis	
☐	Leucocitose > 12000/mm ³
☐	Leucopenia < 4000/mm ³
☐	> 10% de células jovens

Critérios de disfunção orgânica	
☐	Hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg);
☐	Oligúria (≤ 0,5 mL/kg/h) ou elevação da creatinina (> 2 mg/dL);
☐	Relação PaO ₂ /FiO ₂ < 300 ou necessidade de O ₂ para manter SpO ₂ > 90%;
☐	Contagem de plaquetas < 100.000/mm ³ ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias;
☐	Acidose metabólica inexplicável: déficit de bases ≤ 5,0 mEq/L e lactato acima do valor de referência;
☐	Rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium;
☐	Aumento significativo de bilirrubinas (> 2x o valor de referência).

Diante da suspeita clínica de sepse, cada segundo é crucial. Para garantir uma resposta mais eficaz, siga os passos listados no verso deste impresso.

Sua participação é fundamental no combate a essa doença. Contamos com seu comprometimento e cuidado para juntos fazermos a diferença na vida dos nossos pacientes.

Pense, pode ser sepse, pois tempo é vida!

