

Nome completo do paciente: _____

Data de nascimento: ____/____/____ Atendimento: _____ Hospital: _____

Responsável pela abertura da ficha: _____ Data: ____/____/____ Hora: _____

GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO DE SEPSE ADULTO

Marque com um X as opções dos critérios de alerta para SIRS.

Critérios sinais de SIRS	
	T.ax. > 38,3°
	T.ax. < 36,0°
	FC > 90 bpm
	FR > 20 rpm
Se exames disponíveis	
	Leucocitose > 12000/mm3
	Leucopenia < 4000/mm3
	> 10% de células jovens

Critérios de disfunção orgânica	
	Hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg);
	Oligúria ($\leq 0,5$ mL/kg/h) ou elevação da creatinina (> 2 mg/dL);
	Relação PaO ₂ /FiO ₂ < 300 ou necessidade de O ₂ para manter SpO ₂ > 90%;
	Contagem de plaquetas < 100.000/mm ³ ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias;
	Acidose metabólica inexplicável: déficit de bases $\leq 5,0$ mEq/L e lactato acima do valor de referência;
	Rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium;
	Aumento significativo de bilirrubinas (> 2x o valor de referência).

