

Résolution numérique de systèmes d'équations linéaires

Méthode de Jacobi



Les méthodes itératives

Les méthodes itératives pour la résolution d'un système de Cramer $AX = b$ de n équations à n inconnus consistent à construire une suite $(X^{(k)})_{k \geq 0}$ qui converge vers la solution du système. Plus précisément, on prouve que A peut être écrite sous la forme $A = M - N$, avec $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible et $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les suites générant les deux méthodes sont définies par

$$\begin{cases} X^{(0)} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \\ MX^{(k+1)} = NX^{(k)} + b \end{cases}$$

Les suites ainsi considérées, si elles sont convergentes, convergent nécessairement vers la solution du système.



La Méthode de Jacobi

La méthode itérative de Jacobi pour résoudre $(S) : AX = b$, consiste en premier lieu à décomposer A sous la forme:

$$A = D - E - F,$$

où D est une matrice diagonale, E est une matrice triangulaire inférieure et F est une matrice triangulaire supérieure.



La Méthode de Jacobi

La méthode itérative de Jacobi pour résoudre $(S) : AX = b$, consiste en premier lieu à décomposer A sous la forme:

$$A = D - E - F,$$

où D est une matrice diagonale, E est une matrice triangulaire inférieure et F est une matrice triangulaire supérieure.

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}}_D - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -a_{2,1} & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -a_{n,1} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}}_E - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & -a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_F$$

Considérons, par exemple, le cas où $n = 3$. On a

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} \\
 &= \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & a_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & a_{3,3} \end{pmatrix}}_D - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -a_{2,1} & 0 & 0 \\ -a_{3,1} & -a_{3,2} & 0 \end{pmatrix}}_E - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -a_{1,2} & -a_{1,3} \\ 0 & 0 & -a_{2,3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_F
 \end{aligned}$$

- Le système $(S) : AX = b$ est équivalent alors à

$$\begin{aligned}
 DX - (E + F)X &= b \\
 \iff DX &= (E + F)X + b
 \end{aligned}$$

- Soit $(X^{(k)})_{k \geq 0}$ la suite de vecteurs dans \mathbb{R}^3 définie par $X^{(k)} = \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix}$, vérifiant

$$\underbrace{D}_M X^{(k+1)} = \underbrace{(E + F)}_N X^{(k)} + b$$

Si A est à diagonale strictement dominante, alors les coefficients diagonaux de A sont non nuls. Par conséquent, M est inversible. Dans ce cas,

$$X^{(k+1)} = M^{-1} N X^{(k)} + M^{-1} b.$$

- Soit $(X^{(k)})_{k \geq 0}$ la suite de vecteurs dans \mathbb{R}^3 définie par $X^{(k)} = \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix}$, vérifiant

$$\underbrace{D}_M X^{(k+1)} = \underbrace{(E + F)}_N X^{(k)} + b$$

Si A est à diagonale strictement dominante, alors les coefficients diagonaux de A sont non nuls. Par conséquent, M est inversible. Dans ce cas,

$$X^{(k+1)} = M^{-1} N X^{(k)} + M^{-1} b.$$

Remarque

Si la suite $(X_k)_{k \geq 0}$ est convergente, alors

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} X^{(k)} = X,$$

avec X l'unique solution du système (S) .

- Les composantes du vecteur $X^{(k+1)}$ s'écrivent en fonction des composantes du vecteur $X^{(k)}$ comme suit:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & a_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & a_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a_{1,2} & -a_{1,3} \\ -a_{2,1} & 0 & -a_{2,3} \\ -a_{3,1} & -a_{3,2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Ainsi, on en déduit que

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1^{(k+1)} + a_{1,2}x_2^{(k)} + a_{1,3}x_3^{(k)} = b_1 \\ a_{2,1}x_1^{(k)} + a_{2,2}x_2^{(k+1)} + a_{2,3}x_3^{(k)} = b_2 \\ a_{3,1}x_1^{(k)} + a_{3,2}x_2^{(k)} + a_{3,3}x_3^{(k+1)} = b_3 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 - a_{1,2}x_2^{(k)} - a_{1,3}x_3^{(k)}}{a_{1,1}} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 - a_{2,1}x_1^{(k)} - a_{2,3}x_3^{(k)}}{a_{2,2}} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{b_3 - a_{3,1}x_1^{(k)} - a_{3,2}x_2^{(k)}}{a_{3,3}} \end{cases}$$

- Dans \mathbb{R}^n , les composantes $x_i^{(k+1)}$ ($i \in \{0, 1, \dots, n\}$) du vecteur $X^{(k+1)}$ s'écrivent en fonction des composantes $x_i^{(k)}$ du vecteur $X^{(k)}$ comme suit:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$



Convergence de la méthode de Jacobi

Question: Existe-il une condition sur la matrice A assurant la convergence de la suite $(X^{(k)})_{k \geq 0}$ est convergente?



Convergence de la méthode de Jacobi

Question: Existe-il une condition sur la matrice A assurant la convergence de la suite $(X^{(k)})_{k \geq 0}$ est convergente?

Théorème

Soit A une matrice à diagonale strictement dominante alors la méthode de Jacobi appliquée au système $(S) : AX = b$ est convergente vers la solution de (S) pour tout $X^{(0)} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.



Convergence de la méthode de Jacobi

Question: Existe-il une condition sur la matrice A assurant la convergence de la suite $(X^{(k)})_{k \geq 0}$ est convergente?

Théorème

Soit A une matrice à diagonale strictement dominante alors la méthode de Jacobi appliquée au système $(S) : AX = b$ est convergente vers la solution de (S) pour tout $X^{(0)} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Remarque

On peut considérer le critère d'arrêt suivant pour la méthode de Jacobi:

$$\|AX^{(k)} - b\| \leq \varepsilon, \text{ avec } \varepsilon \text{ très petit.}$$

On dit que ε est une tolérance.

Étude d'un exemple

On considère un système d'équations linéaires (S) , telle que;

$$(S) \Leftrightarrow AX = b$$

avec :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

- ① Montrer qu'il existe une unique solution de (S) dans \mathbb{R}^3 .
- ② Etudier la convergence de la méthode de Jacobi pour la résolution de (S) .
- ③ Donner le schéma itératif de la méthode de Jacobi associé à (S) .
- ④ Calculer les quatres premiers itérés par la méthode de Jacobi.



- Existence d'une unique solution de (S) dans \mathbb{R}^3 :

On a $\det(A) = 126 \neq 0 \Rightarrow \exists! X \in \mathbb{R}^3 / AX = b$.

- Etude de la convergence de la méthode de Jacobi pour la résolution de (S) :

On a:

$$\begin{cases} |a_{1,1}| > |a_{1,2}| + |a_{1,3}| \quad (\text{car } |5| > |2| + |-1|) \\ |a_{2,2}| > |a_{2,1}| + |a_{2,3}| \quad (\text{car } |6| > |1| + |-3|) \\ |a_{3,3}| > |a_{3,1}| + |a_{3,2}| \quad (\text{car } |4| > |2| + |1|) \end{cases}$$

$\Rightarrow A$ est une matrice à diagonale strictement dominante.

\Rightarrow La méthode de Jacobi est convergente.

- Schéma itératif associé à (S) avec la méthode de Jacobi:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

- Schéma itératif associé à (S) avec la méthode de Jacobi:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 - a_{1,2}x_2^{(k)} - a_{1,3}x_3^{(k)}}{a_{1,1}} = \frac{6 - 2x_2^{(k)} + x_3^{(k)}}{5} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 - a_{2,1}x_1^{(k)} - a_{2,3}x_3^{(k)}}{a_{2,2}} = \frac{4 - x_1^{(k)} + 3x_3^{(k)}}{6} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{b_3 - a_{3,1}x_1^{(k)} - a_{3,2}x_2^{(k)}}{a_{3,3}} = \frac{7 - 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}}{4} \end{cases}$$

- Application de la méthode de Jacobi avec 4 itérations:

Considérons par exemple un vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Application de la méthode de Jacobi avec 4 itérations:

Considérons par exemple un vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

► Itération 1 : $X^{(1)} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 2/3 \\ 7/4 \end{pmatrix}$

- Application de la méthode de Jacobi avec 4 itérations:

Considérons par exemple un vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

► Itération 1 : $X^{(1)} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 2/3 \\ 7/4 \end{pmatrix}$

► Itération 2 : $X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1,2833 \\ 1,3417 \\ 0,9833 \end{pmatrix}$

- Application de la méthode de Jacobi avec 4 itérations:

Considérons par exemple un vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

► Itération 1 : $X^{(1)} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 2/3 \\ 7/4 \end{pmatrix}$

► Itération 3 : $X^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,86 \\ 0,9444 \\ 0.7729 \end{pmatrix}$

► Itération 2 : $X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1,2833 \\ 1,3417 \\ 0,9833 \end{pmatrix}$

- Application de la méthode de Jacobi avec 4 itérations:

Considérons par exemple un vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

► Itération 1 : $X^{(1)} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 2/3 \\ 7/4 \end{pmatrix}$

► Itération 3 : $X^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,86 \\ 0,9444 \\ 0,7729 \end{pmatrix}$

► Itération 2 : $X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1,2833 \\ 1,3417 \\ 0,9833 \end{pmatrix}$

► Itération 4 : $X^{(4)} = \begin{pmatrix} 0,9768 \\ 0,9098 \\ 1,0839 \end{pmatrix}$