

Introduction to Differential Equations
Assignment # 11

Tian Xiaoyang
26001904581

P1.

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s)$$

$$(f * g)(t) = \mathcal{L}\{F(s)G(s)\}$$

$$\int_0^t \sin(t - \tau) \cos \tau d\tau$$

$$f(t) = \sin t, g(t) = \cos t$$

$$(f * g)(t) = \int_0^t \sin(t - \tau) \cos \tau d\tau$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \sin(t - \tau) \cos \tau d\tau\right\} = \mathcal{L}\{f(t) = \sin t\} \mathcal{L}\{g(t) = \cos t\}$$

$$\mathcal{L}\{f(t) = \sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1^2} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\mathcal{L}\{g(t) = \cos t\} = \frac{s}{s^2 + 1^2} = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\} = \frac{1}{s^2 + 1} \times \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{s}{(s^2 + 1)^2}$$

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t \sin(t - \tau) \cos \tau d\tau\right\} = \frac{s}{(s^2 + 1)^2}$$

P2.

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s^2+4)}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \times \frac{1}{s^2+4}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2}\right\} = te^{-t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4}\right\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+2^2} \times \frac{1}{2}\right\}$$

$$= \frac{1}{2} \sin 2t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = (f * g)(t)$$

$$(f * g)(t) \\ = \int_0^t (t - \tau) e^{-(t-\tau)} \frac{1}{2} \sin 2\tau \, d\tau$$

p3.

$$y'' + 2y' + 2y = \sin \alpha t; y(0) = 2, y'(0) = 0$$

$$\mathcal{L}\{y'' + 2y' + 2y = \sin \alpha t\}$$

$$(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) + 2(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) + 2sY(s) - 2y(0) + 2Y(s) = \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$$

$$Y(s)(s^2 + 2s + 2) = \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$$

$$Y(s) = \frac{\alpha}{(s^2 + \alpha^2)(s^2 + 2s + 2)}$$

$$\frac{\alpha}{(s^2 + \alpha^2)(s^2 + 2s + 2)}$$

$$= \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2} \times \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

$$= \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2} \times \frac{1}{(s+1)^2 + 1^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2} \times \frac{1}{(s+1)^2 + 1^2}\right\}$$

$$y(t) = \sin \alpha t e^{-t} \sin t$$

$$y(t) = \int_0^t \sin(\alpha(t - \tau)) e^{-\tau} \sin \tau \, d\tau$$

P4.

$$y'' + 4y' + 4y = g(t); y(0) = 2, y'(0) = -3$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4(sY(s) - y(0)) + 4Y(s) = G(s)$$

$$Y(s)(s^2 + 4s + 4) - 2s - (-3) - 4 \times 2 = G(s)$$

$$Y(s)(s^2 + 4s + 4) = G(s) + 2s + 5$$

$$Y(s) = \frac{G(s)}{s^2 + 4s + 4} + \frac{2s}{s^2 + 4s + 4} + \frac{5}{s^2 + 4s + 4}$$

$$\frac{5}{s^2 + 4s + 4} = \frac{5}{2} \times \frac{2}{(s+2)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{5 \times \frac{1}{(s+2)^2}\right\}$$

$$= 5te^{-2t}$$

$$\begin{aligned}\frac{2s}{s^2+4s+4} &= 2\frac{s}{(s+2)^2} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{2\frac{s}{(s+2)^2}\right\} \\ &= 2(1-2t)e^{-2t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{G(s)}{s^2+4s+4} &= \frac{G(s)}{(s+2)^2} = \frac{1}{(s+2)^2} G(s) \\ g(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2}\right\} \\ &= te^{-2t}\end{aligned}$$

$$y(t) = 5te^{-2t} + 2(1-2t)e^{-2t} + \int_0^t (t-\tau)e^{-2(t-\tau)}g(\tau)d\tau$$

P5.

$$u^{(4)} - u = 0; u(0) = 0, u'(0) = 1, u''(0) = 2, u'''(0) = 3$$

$$x_1 = u, x_2 = u', x_3 = u'', x_4 = u'''$$

$$x_1' = x_2, x_2' = x_3, x_3' = x_4$$

$$x_4' - x_1 = 0$$

$$x_4' = x_1$$

$$x_1(0) = 0, x_2(0) = 1, x_3(0) = 2, x_4(0) = 3$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \\ x_4(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$