

Introduction to Differential Equations
Assignment # 3

Tian Xiaoyang
26001904581

P1.

$$y' + p(t)y = g(t), y(t_0) = y_0$$

$$(t - 3)y' + (\ln t)y = 2t, y(1) = 2$$

$$y' + \frac{(\ln t)y}{(t-3)} = \frac{2t}{(t-3)}, y(1) = 2$$

$p(t)$ and $g(t)$ will not be continuous at $t = 3$

$p(t)$ and $g(t)$ will be continuous at $-\infty < t < 3, 3 < t < \infty$

$$y(1) = 2, t = 1$$

$-\infty < t < 3$ is the interval with certain solution

P2.

$$(4 - t^2)y' + 2ty = 3t^2, y(-3) = 1$$

$$y' + \frac{2ty}{(4-t^2)} = \frac{3t^2}{(4-t^2)}$$

$p(t)$ and $g(t)$ will not be continuous at $t = \pm 2$

$p(t)$ and $g(t)$ will not be continuous at $-\infty < t < -2, -2 < t <$

$$2, 2 < t < \infty$$

$$y(-3) = 1, t = -3$$

$$-3 < t < -2$$

P3.

For an equation to be exact $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

$$M = 3x^2 - 2xy + 2$$

$$N = 6y^2 - x^2 + 3$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\int M dx = x^3 - yx^2 + 2x + c(y)$$

$$\int N dy = 2y^3 - x^2y + 3y + c(x)$$

$$x^3 + 2y^3 - x^2y + 3y + 2x + 3y = c$$

P4.

$$(ye^{xy} \cos 2x - 2e^{xy} \sin 2x + 2x) + (xe^{xy} \cos 2x - 3)y'$$

$$M = ye^{xy} \cos 2x - 2e^{xy} \sin 2x + 2x$$

$$N = xe^{xy} \cos 2x - 3$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^{xy} \cos 2x - 2e^{xy} \sin 2x$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = xe^{xy} \cos 2x$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

P5.

$$y' + p(t)y = g(t), y(t_0) = y_0$$

$$(2x - y) + (2y - x)y' = 0, y(1) = 3$$

$$y'(2y - x) = -(2x - y)$$

$$y' = \frac{y-2x}{2y-x}$$

$$(2y - x)dy = (y - 2x)dx$$

$$\int (2y - x)dy = \int (y - 2x)dx$$

$$y^2 - xy = yx - x^2 + c$$

$$y^2 = 2xy - x^2 + c$$

$$3^2 = 2 \times 1 \times 3 - 1^2 + c$$

$$c = 4$$

$$y^2 = 2xy - x^2 + 4$$

$p(t)$ and $g(t)$ will not be continuous at $y = 2x$

