

Physics
Quiz # 11

Tian Xiaoyang
26001904581

P1.

(a)

P2.

(d)

P3.

(a)

P4.

P5.

a).

$$l_a = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5m$$

$$dl = l_a - l_o = 1m$$

$$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$$

$$1^2 \times 10 \times \frac{1}{2} = 5J$$

b).

$$l_a = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10m$$

$$dl = l_a - l_o = 6m$$

$$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$$

$$6^2 \times 10 \times \frac{1}{2} = 180J$$

c).

$$l_a = 5m$$

$$dl = l_a - l_o = 1m$$

$$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$$

$$1^2 \times 10 \times \frac{1}{2} = 5J$$

P6.

$$U_G = 2 \times 9.81 \times 1 \\ = 19.62J$$

the bead stops at position B; therefore, the velocity is zero, and the kinetic energy also becomes zero, all gravitational potential energy has converted into elastic potential energy.

$$l_o = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}m$$

$$l_B = 2m$$

$$dl = l_B - l_o = 0.586m$$

$$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$$

$$0.586^2 k \times \frac{1}{2} = 19.62J$$

$$k = 114.27N/m$$