
Block 1
0.34
0.41
0.25
MY_175_N (n=92 trials)
MY_66_LR (n=65 trials)
MY_175_L (n=115 trials)
MY_66_R (n=122 trials)
MY_66_N (n=37 trials)
MY_66_LL (n=198 trials)
MY_174_LR (n=130 trials)
MY_174_R (n=133 trials)
Proportion of Choices
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Best
Second
Third
Block 2
0.58
0.20
0.23
MY_175_N (n=35 trials)
MY_66_LR (n=186 trials)
MY_175_L (n=59 trials)
MY_66_R (n=37 trials)
MY_66_N (n=11 trials)
MY_66_LL (n=79 trials)
MY_174_LR (n=23 trials)
MY_174_R (n=120 trials)
Best
Second
Third
Block 3
0.46
0.18
0.36
MY_175_N (n=50 trials)
MY_66_LR (n=40 trials)
MY_175_L (n=22 trials)
MY_66_R (n=100 trials)
MY_66_N (n=53 trials)
MY_66_LL (n=90 trials)
MY_174_LR (n=126 trials)
MY_174_R (n=19 trials)
Best
Second
Third
Block 4
0.34
0.32
0.34
MY_175_N (n=111 trials)
MY_66_LR (n=104 trials)
MY_175_L (n=33 trials)
MY_66_R (n=52 trials)
MY_66_N (n=194 trials)
MY_66_LL (n=57 trials)
MY_174_LR (n=116 trials)
MY_174_R (n=232 trials)
Best
Second
Third
Block 5
0.51
0.26
0.23
MY_175_N (n=43 trials)
MY_66_LR (n=144 trials)
MY_175_L (n=46 trials)
MY_66_R (n=72 trials)
MY_66_N (n=25 trials)
MY_66_LL (n=114 trials)
MY_174_LR (n=120 trials)
MY_174_R (n=18 trials)
Best
Second
Third
Block 6
0.45
0.31
0.23
MY_175_N (n=47 trials)
MY_66_LR (n=96 trials)
MY_175_L (n=30 trials)
MY_66_R (n=80 trials)
MY_66_N (n=55 trials)
MY_66_LL (n=106 trials)
MY_174_LR (n=24 trials)
MY_174_R (n=25 trials)
Best
Second
Third
Block 7
0.44
0.28
0.29
MY_175_N (n=124 trials)
MY_66_LR (n=37 trials)
MY_175_L (n=81 trials)
MY_66_R (n=42 trials)
MY_66_N (n=32 trials)
MY_66_LL (n=35 trials)
MY_174_LR (n=38 trials)
MY_174_R (n=94 trials)
Proportion of Choices
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Best
Second
Third
Block 8
0.46
0.30
0.24
MY_175_N (n=43 trials)
MY_66_LR (n=24 trials)
MY_175_L (n=41 trials)
MY_66_R (n=45 trials)
MY_66_N (n=36 trials)
MY_66_LL (n=80 trials)
MY_174_LR (n=40 trials)
MY_174_R (n=82 trials)
Best
Second
Third
Block 9
0.59
0.19
0.22
MY_175_N (n=23 trials)
MY_66_LR (n=56 trials)
MY_175_L (n=16 trials)
MY_66_R (n=73 trials)
MY_66_N (n=60 trials)
MY_66_LL (n=65 trials)
MY_174_LR (n=3 trials)
MY_174_R (n=18 trials)
Best
Second
Third
Block 10
0.52
0.33
0.15
MY_175_N (n=26 trials)
MY_66_LR (n=21 trials)
MY_175_L (n=7 trials)
MY_66_N (n=79 trials)
Best
Second
Third
Block 11
0.80
0.00
0.20
MY_66_LR (n=42 trials)
MY_66_N (n=15 trials)
Best
Second
Third