Block 1
0.66 0.17 0.17
MY_175_N (n=34 trials)
MY_66_LR (n=11 trials)
MY_175_L (n=31 trials)
MY_66_R (n=16 trials)
MY_66_N (n=20 trials)
MY_66_LL (n=12 trials)
MY_174_LR (n=133 trials)
MY_174_R (n=33 trials)
Block 2
0.45 0.19 0.36
MY_175_N (n=37 trials)
MY_66_LR (n=44 trials)
MY_175_L (n=77 trials)
MY_66_R (n=41 trials)
MY_66_N (n=27 trials)
MY_66_LL (n=26 trials)
MY_174_LR (n=148 trials)
MY_174_R (n=78 trials)
Block 3
0.50 0.20 0.30
MY_175_N (n=19 trials)
MY_66_LR (n=22 trials)
MY_175_L (n=58 trials)
MY_66_R (n=48 trials)
MY_66_N (n=35 trials)
MY_66_LL (n=26 trials)
MY_174_LR (n=38 trials)
MY_174_R (n=37 trials)
Block 4
0.50 0.24 0.26
MY_175_N (n=36 trials)
MY_66_LR (n=27 trials)
MY_175_L (n=213 trials)
MY_66_R (n=17 trials)
MY_66_N (n=77 trials)
MY_66_LL (n=175 trials)
MY_174_LR (n=56 trials)
MY_174_R (n=88 trials)
Block 5
0.47 0.28 0.25
MY_175_N (n=39 trials)
MY_66_LR (n=34 trials)
MY_175_L (n=75 trials)
MY_66_R (n=37 trials)
MY_66_N (n=29 trials)
MY_66_LL (n=28 trials)
MY_174_LR (n=206 trials)
MY_174_R (n=43 trials)
Block 6
0.58 0.23 0.19
MY_175_N (n=15 trials)
MY_66_LR (n=40 trials)
MY_175_L (n=78 trials)
MY_66_R (n=16 trials)
MY_66_N (n=19 trials)
MY_66_LL (n=179 trials)
MY_174_LR (n=34 trials)
MY_174_R (n=43 trials)
Block 7
0.58 0.22 0.20
MY_175_N (n=23 trials)
MY_66_LR (n=68 trials)
MY_175_L (n=29 trials)
MY_66_R (n=18 trials)
MY_66_N (n=33 trials)
MY_66_LL (n=17 trials)
MY_174_LR (n=57 trials)
MY_174_R (n=23 trials)
Block 8
0.57 0.26 0.17
MY_175_N (n=19 trials)
MY_66_LR (n=28 trials)
MY_175_L (n=58 trials)
MY_66_R (n=15 trials)
MY_66_N (n=20 trials)
MY_66_LL (n=10 trials)
MY_174_LR (n=108 trials)
MY_174_R (n=17 trials)
Block 9
0.47 0.35 0.18
MY_175_N (n=39 trials)
MY_66_LR (n=38 trials)
MY_175_L (n=67 trials)
MY_66_R (n=22 trials)
MY_66_N (n=101 trials)
MY_174_LR (n=228 trials)
MY_174_R (n=31 trials)
Block 10
0.58 0.25 0.17
MY_175_N (n=28 trials)
MY_175_L (n=5 trials)
MY_66_R (n=40 trials)
MY_66_N (n=22 trials)
MY_174_LR (n=27 trials)
MY_174_R (n=27 trials)
Block 11
0.67 0.05 0.27
MY_175_N (n=21 trials)
MY_66_R (n=12 trials)
MY_66_N (n=3 trials)
MY_174_LR (n=50 trials)
MY_174_R (n=19 trials)
Block 12
0.60 0.05 0.35
MY_175_N (n=13 trials)
MY_174_R (n=20 trials)
Block 13
0.48 0.19 0.33
MY_174_R (n=48 trials)
Proportion of Choices
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Best
Second
Third