
Block 1
0.56
0.28
0.16
MY_175_N (n=30 trials)
MY_66_LR (n=35 trials)
MY_175_L (n=33 trials)
MY_66_R (n=34 trials)
MY_66_N (n=30 trials)
MY_66_LL (n=8 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 2
0.45
0.32
0.23
MY_175_N (n=40 trials)
MY_66_LR (n=33 trials)
MY_175_L (n=63 trials)
MY_66_R (n=32 trials)
MY_66_N (n=30 trials)
MY_174_LR (n=30 trials)
MY_174_R (n=35 trials)
Block 3
0.35
0.35
0.30
MY_175_N (n=40 trials)
MY_66_LR (n=30 trials)
MY_175_L (n=34 trials)
MY_66_R (n=33 trials)
MY_66_N (n=35 trials)
MY_174_LR (n=30 trials)
MY_174_R (n=30 trials)
Block 4
0.46
0.42
0.12
MY_175_N (n=38 trials)
MY_66_LR (n=33 trials)
MY_175_L (n=30 trials)
MY_66_R (n=33 trials)
MY_66_N (n=32 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
MY_174_R (n=29 trials)
Block 5
0.35
0.28
0.37
MY_175_N (n=32 trials)
MY_66_LR (n=30 trials)
MY_175_L (n=38 trials)
MY_66_R (n=30 trials)
MY_66_N (n=31 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
MY_174_R (n=34 trials)
Block 6
0.45
0.35
0.20
MY_175_N (n=69 trials)
MY_66_LR (n=4 trials)
MY_175_L (n=35 trials)
MY_66_R (n=33 trials)
MY_66_N (n=33 trials)
MY_174_LR (n=40 trials)
MY_174_R (n=30 trials)
Block 7
0.32
0.48
0.20
MY_175_N (n=31 trials)
MY_175_L (n=35 trials)
MY_66_R (n=35 trials)
MY_66_N (n=33 trials)
MY_174_LR (n=42 trials)
MY_174_R (n=33 trials)
Block 8
0.47
0.20
0.33
MY_175_N (n=30 trials)
MY_175_L (n=35 trials)
MY_66_R (n=31 trials)
MY_66_N (n=7 trials)
MY_174_LR (n=44 trials)
MY_174_R (n=34 trials)
Block 9
0.37
0.40
0.23
MY_175_N (n=37 trials)
MY_175_L (n=35 trials)
MY_66_R (n=34 trials)
MY_174_LR (n=40 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 10
0.38
0.38
0.24
MY_175_N (n=30 trials)
MY_175_L (n=35 trials)
MY_66_R (n=30 trials)
MY_174_LR (n=45 trials)
MY_174_R (n=16 trials)
Block 11
0.19
0.52
0.29
MY_175_N (n=20 trials)
MY_175_L (n=33 trials)
MY_66_R (n=34 trials)
MY_174_LR (n=43 trials)
Block 12
0.27
0.33
0.39
MY_175_L (n=1 trials)
MY_66_R (n=33 trials)
MY_174_LR (n=16 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third