
Block 1
0.53
0.37
0.09
MY_175_N (n=30 trials)
MY_175_L (n=35 trials)
MY_66_R (n=32 trials)
MY_174_LR (n=60 trials)
MY_174_R (n=34 trials)
Block 2
0.46
0.23
0.31
MY_175_N (n=32 trials)
MY_175_L (n=37 trials)
MY_66_R (n=8 trials)
MY_174_LR (n=32 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 3
0.55
0.31
0.14
MY_175_N (n=35 trials)
MY_175_L (n=33 trials)
MY_174_LR (n=35 trials)
MY_174_R (n=35 trials)
Block 4
0.55
0.19
0.27
MY_175_N (n=32 trials)
MY_175_L (n=41 trials)
MY_174_LR (n=34 trials)
MY_174_R (n=33 trials)
Block 5
0.35
0.38
0.26
MY_175_N (n=31 trials)
MY_175_L (n=31 trials)
MY_174_LR (n=32 trials)
MY_174_R (n=31 trials)
Block 6
0.53
0.29
0.18
MY_175_N (n=30 trials)
MY_175_L (n=34 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
MY_174_R (n=35 trials)
Block 7
0.63
0.14
0.23
MY_175_L (n=32 trials)
MY_174_LR (n=33 trials)
MY_174_R (n=35 trials)
Block 8
0.40
0.37
0.23
MY_175_L (n=35 trials)
MY_174_LR (n=34 trials)
MY_174_R (n=34 trials)
Block 9
0.54
0.17
0.29
MY_175_L (n=30 trials)
MY_174_LR (n=35 trials)
MY_174_R (n=34 trials)
Block 10
0.68
0.19
0.13
MY_175_L (n=31 trials)
MY_174_LR (n=30 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 11
0.48
0.32
0.20
MY_175_L (n=33 trials)
MY_174_LR (n=31 trials)
MY_174_R (n=32 trials)
Block 12
0.44
0.44
0.12
MY_175_L (n=34 trials)
MY_174_LR (n=29 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third