Block 1
0.57
0.21
0.22
RT_64_N (n=43 trials)
RT_65_N (n=18 trials)
RT_177_R (n=23 trials)
RT_64_R (n=33 trials)
RT_176_R (n=66 trials)
RT_177_LR (n=13 trials)
RT_176_LR (n=50 trials)
RT_65_LR (n=85 trials)
RT_177_N (n=15 trials)
RT_64_LR (n=11 trials)
RT_176_L (n=82 trials)
RT_177_L (n=116 trials)
Block 2
0.40
0.24
0.36
RT_64_N (n=38 trials)
RT_65_N (n=17 trials)
RT_177_R (n=107 trials)
RT_64_R (n=512 trials)
RT_176_R (n=33 trials)
RT_177_LR (n=47 trials)
RT_176_LR (n=43 trials)
RT_65_LR (n=27 trials)
RT_177_N (n=102 trials)
RT_176_L (n=30 trials)
RT_177_L (n=46 trials)
Block 3
0.49
0.18
0.33
RT_64_N (n=147 trials)
RT_65_N (n=42 trials)
RT_177_R (n=29 trials)
RT_64_R (n=28 trials)
RT_176_R (n=21 trials)
RT_177_LR (n=23 trials)
RT_176_LR (n=46 trials)
RT_65_LR (n=86 trials)
RT_177_N (n=32 trials)
RT_176_L (n=89 trials)
RT_177_L (n=106 trials)
Block 4
0.49
0.24
0.27
RT_64_N (n=36 trials)
RT_65_N (n=138 trials)
RT_177_R (n=75 trials)
RT_64_R (n=68 trials)
RT_176_R (n=100 trials)
RT_177_LR (n=26 trials)
RT_176_LR (n=15 trials)
RT_65_LR (n=109 trials)
RT_177_N (n=34 trials)
RT_177_L (n=48 trials)
Block 5
0.48
0.22
0.30
RT_64_N (n=45 trials)
RT_65_N (n=115 trials)
RT_177_R (n=45 trials)
RT_64_R (n=51 trials)
RT_176_R (n=2 trials)
RT_177_LR (n=58 trials)
RT_176_LR (n=40 trials)
RT_65_LR (n=36 trials)
RT_177_N (n=28 trials)
RT_177_L (n=56 trials)
Block 6
0.52
0.13
0.35
RT_64_N (n=35 trials)
RT_65_N (n=31 trials)
RT_177_R (n=30 trials)
RT_64_R (n=12 trials)
RT_177_LR (n=16 trials)
RT_176_LR (n=100 trials)
RT_65_LR (n=39 trials)
RT_177_N (n=24 trials)
RT_177_L (n=49 trials)
Block 7
0.50
0.29
0.21
RT_64_N (n=37 trials)
RT_65_N (n=147 trials)
RT_177_R (n=26 trials)
RT_177_LR (n=20 trials)
RT_176_LR (n=62 trials)
RT_65_LR (n=27 trials)
RT_177_N (n=39 trials)
RT_177_L (n=76 trials)
Block 8
0.43
0.28
0.29
RT_64_N (n=42 trials)
RT_65_N (n=130 trials)
RT_177_R (n=65 trials)
RT_177_LR (n=16 trials)
RT_176_LR (n=63 trials)
RT_65_LR (n=49 trials)
RT_177_N (n=38 trials)
Block 9
0.47
0.35
0.17
RT_64_N (n=26 trials)
RT_65_N (n=89 trials)
RT_176_LR (n=50 trials)
RT_65_LR (n=81 trials)
RT_177_N (n=52 trials)
Block 10
0.48
0.35
0.17
RT_64_N (n=41 trials)
RT_65_N (n=53 trials)
RT_176_LR (n=61 trials)
RT_65_LR (n=131 trials)
RT_177_N (n=60 trials)
Block 11
0.54
0.28
0.18
RT_64_N (n=32 trials)
RT_65_N (n=90 trials)
RT_176_LR (n=29 trials)
RT_65_LR (n=33 trials)
RT_177_N (n=23 trials)
Block 12
0.46
0.27
0.27
RT_65_N (n=6 trials)
RT_176_LR (n=26 trials)
RT_65_LR (n=66 trials)
RT_177_N (n=65 trials)
Block 13
0.37
0.41
0.23
RT_176_LR (n=71 trials)
Block 14
0.59
0.37
0.03
RT_176_LR (n=59 trials)
Proportion of Choices
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Best
Second
Third