

kabın içinde iyice karıştırılarak hayvanlara verilmelidir.) Buzağılardaki adi ishal, buzağı sepsisemi ve mantari hastalıklar, temiz olmayan ahırlar, iyi dezenfekte edilmemiş göbek kordonu, ağız sütünün zamanında ve gerektiği kadar verilmemesinden kaynaklanır.

Sütten kesimden sonra buzağılara buzağı büyütme yemi verilir. Buzağı başına yarım ile iki kilo arasında kesif yem ve iyi kaliteli kuru ot verilir.

Ayrıca önlerinde devamlı temiz su bulundurulur. Altı aylık oluncaya kadar buzağılara verilebilecek kesif yem için (50 kilogramlık bir karışım) örnek yem reçetesi;

(12 kg arpa kırmısı + 12,5 kg buğday kırmısı + 10 kg yulaf kırmısı + 5 kg ayçiçeği tohum küspesi + 10 kg soya fasulyesi küspesi + 1 kg mineral karması ve tuz + 1 kg vitamin karması), temiz bir kabın içinde iyice karıştırılarak hayvanlara verilmelidir.



SAĞLIKLI BUZAĞI İÇİN

Ağız sütü doğumdan sonraki 1-2 saat içinde, en az 3 kg buzağıya mutlaka içirilmelidir.

Buzağılara verilen süt buzağının vücut ağırlığının 1/10 (onda birini) geçmemelidir.



Ayrıntılı Bilgi için;

İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.
Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tel: 0 256 211 30 00
www.aydintarim.gov.tr



BUZAĞILARIN BAKIM VE BESLENMESİ



GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

0 256 211 30 00

www.aydintarim.gov.tr

BUZAĞILARIN BAKIM VE BESLENMESİ



Buzağının beslenmesi ana karnında başlar. Anası iyi şekilde beslenmeyen yavrusu da iyi beslenmemiş olur. Doğuma 2 ay kala gebe hayvan doğum bölmesine veya ayrı bir bölmeye alınmalıdır. Buzağının temiz, sıcak ve sağlıklı bir ortamda doğması gerekir.

Doğumdan sonra inek buzağısını yalayıp kurutması gerekir. Eğer bu inek tarafından yapılmazsa bakıcı tarafından temiz kuru bir bezle buzağı temizlenip kurutulmalıdır.

Buzağının rahat nefes alması için özellikle ağız ve burun bölgesi temizlenmeli ve gerekirse suni teneffüs yaptırılmalıdır.

Göbek kordonu 7-8 cm den kesilmeli tentürdiyotla dezenfekte edildikten sonra 3-4 cm den bağlanmalıdır.

Buzağı bölümüne alınıp ağız sütü içirilmelidir. Şayet buzağı anasından emzirilecekse memeler sabunlu su ile iyice yıkandıktan sonra emmesi sağlanmalıdır. Buzağının sağlıklı beslenebilmesi için sütün sağılarak içirilmesi en uygunu olup; verilen süt miktarı da kontrollü olmaktadır. Ayrıca anadan gelebilecek bulaşmalarda önlenmiş olur.

Sütten kesmedeki güçlükler ortadan kalkar ve genç ineklerin sağıma kolay alışmaları sağlanmış olur.

Ağız sütü denilen kolostrum doğumdan sonraki 1-2 saat içinde buzağıya mutlaka içirilmelidir.

1. gün doğumdan hemen sonra en az 3 kg civarında kolostrum verilmelidir. İkinci öğün ise 12 saat sonra verilmelidir.

2-3. günler Ağız sütü ve su verilmelidir.

Ağız sütü içen buzağı, sağlam yapılı ve sağlıklı gelişir. Ağız sütü 7-8 gün buzağının tüm temel besin madde ihtiyacını karşılar. Ağız sütü normal süte göre kuru maddesi 2 kat, protein oranı 5,5 kat, mineral madde oranı 2 kat fazla fakat süt şekeri yarı yarıya daha azdır.

Ağız sütü buzağıyı ilk günler ishal yaparak bağırsaklarını temizler.

Buzağının Hastalıklara karşı direncini artırır. Bir çok bağışıklık maddeleri ve A, D ve E vitamini bakımından zengindir.

Buzağılara verilen süt buzağının vücut ağırlığının 1/10 (onda birini) geçmemelidir.

Buzağıya verilen süt 36 dereceye kadar ısıtılıp ondan sonra verilmelidir.



Süt içirilen kaplar ve emzikler kullanıldıktan sonra iyice yıkanıp temizlenmelidir.

Aşırı süt içirilmesi ishale sebep olabileceğinden ishal görüldüğünde süt verilmeyip sadece ılık temiz su verilmelidir.

Buzağı besisi, 4-27. günler;

İlk hafta ağız sütü, ikinci hafta tam yağlı süt ve üçüncü haftadan sonra süt ikame yemi veya buzağı başlangıç yemi ve su şeklinde yapılır. İlk haftadan itibaren hayvanın önüne kaliteli kuru ot konularak alışması sağlanmalıdır.

Sütten kesmede ise, 28-35. günler;

Sağlıklı bir buzağıya günde 700-900 gram buzağı başlangıç yemi verilmelidir. Su daima yanında bulundurulmalıdır. İlerleyen günlerde yem tüketimi arzulanan seviyeye geldiğinde buzağıya verilen süt veya süt ikame yemi % 25-50 azaltılmalıdır.

36-56. günler;

Günlük buzağı başlangıç yem tüketimi 1 kg. olduğunda ve canlı ağırlığı arzulanan düzeye geldiğinde süt veya süt ikame yemi kesilmelidir. Buzağı 4-6 haftalık yaşta önce sütten kesilmemeli, en uygunu 2 - 3 aylık yaşta sütten kesmedir.

Süt içme döneminde buzağılara verilebilecek kesif yem için; (50 kilogramlık bir karışım) rasyon örneği ;

(9,5 kg arpa kırmısı + 10 kg buğday kırmısı + 10 kg yulaf kırmısı + 10 kg mısır kırmısı + 10 kg soya fasulyesi küspesi + 1 kg mineral karması ve tuz + 1 kg vitamin karması, temiz bir

