

KURGUSAL ÖRNEK — Divit denemesi için yazıldı. Yazar, kitap, yayınevi ve veriler uydurmadır; gerçek bir yayın değildir.

Kitap bölümü — Harmanlı, T. (Ed.), Kuru Tarımda Güncel Yaklaşımlar, Akçaova Üniversitesi Yayınları, Akçaova, 2020, s. 101–124

Bozkır Koşullarında İlkbahar Yağışının Buğday Verim Unsurlarına Etkisi

Serap EKİNCİ

Akçaova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Akçaova

Giriş

Kuru tarım alanlarında buğday verimini belirleyen en önemli etmen toplam yağıştan çok yağışın mevsim içindeki dağılımıdır. Özellikle başaklanma ile tane dolumu arasındaki dönemde düşen yağış, verim unsurlarının oluşumunda belirleyici olmaktadır.

Değerlendirme

Akçaova Tarımsal Araştırma İstasyonu’nda 2009-2018 döneminde yürütülen çeşit denemelerinin verileri birlikte değerlendirildiğinde, nisan-mayıs aylarında düşen yağış ile bin tane ağırlığı arasında olumlu ve önemli bir ilişki bulunmuştur ($r = 0,71$; $P < 0,01$). Aynı dönem yağışı ile başakta tane sayısı arasındaki ilişki ise önemsiz kalmıştır ($r = 0,18$).

Mart ayı yağışının kardeş sayısı üzerine etkisi yıllara göre değişkenlik göstermiştir. Nisan-mayıs yağışının uzun yıllar ortalamasının altında kaldığı yıllarda bin tane ağırlığı ortalama 4,2 g azalmıştır.

Sonuç

Bozkır koşullarında ilkbahar yağışı, özellikle tane dolumu üzerinden verime yansımaktadır. Bu dönemde yaşanan kuraklığın etkisini azaltacak erkenci çeşitlerin tercih edilmesi önerilmektedir.