

Akçaova Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): 45–58, 2019

Akçaova Kuru Koşullarında Azot Dozu ve Uygulama Zamanının Ekmeklik Buğdayda Tane Verimine Etkisi

Hikmet BOZDOĞANLI¹, Serap EKİNCİ¹

¹ Akçaova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Akçaova

Özet

Bu çalışma, Akçaova kuru koşullarında farklı azot dozları (0, 4, 8, 12, 16 ve 20 kg N/da) ile iki uygulama zamanının (ekimle tamamı; ekimle yarısı + kardeşlenme sonunda yarısı) ekmeklik buğdayın (*Triticum aestivum* L.) tane verimine etkisini belirlemek amacıyla 2015-2016 ve 2016-2017 yetiştirme dönemlerinde yürütülmüştür. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. En yüksek tane verimi 16 kg N/da dozunda 468,3 kg/da olarak elde edilmiştir. 12 kg N/da'nın üzerindeki dozlarda verim artışı istatistiki olarak önemsiz kalmıştır. Azotun bölünerek uygulanması tane verimini tek seferde uygulamaya göre %6,4 artırmıştır.

Anahtar kelimeler: Ekmeklik buğday, azot, kuru tarım, tane verimi

Giriş

Ülkemizde buğday ekim alanlarının büyük bölümü yağışa dayalı koşullarda bulunmaktadır. Bu alanlarda azotlu gübrelemenin verime katkısı yağış miktarı ve dağılımı ile sınırlanmaktadır. Akçaova yöresinde üreticilerin önemli bir kısmı azotu ekimle birlikte tek seferde vermekte, dozu ise çoğunlukla deneyime göre belirlemektedir.

Materyal ve Yöntem

Araştırma Akçaova Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Deneme alanı toprakları killi-tınlı bünyeli, hafif alkali (pH 7,9), organik maddece fakir (%1,2) ve kireçlidir. Materyal olarak ‘Yaylabeyi’ ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Ekim, ekim ayının ikinci yarısında 500 tohum/m² normu ile yapılmıştır. Parsel boyutu 1,2 m × 5 m = 6 m²’dir.

Bulgular ve Tartışma

İki yıllık ortalamalara göre tane verimi 0 kg N/da dozunda 251,6 kg/da iken 16 kg N/da dozunda 468,3 kg/da’ya yükselmiştir. 20 kg N/da dozunda verim 461,9 kg/da olarak belirlenmiştir. 12 kg N/da’nın üzerindeki dozlarda verim artışı istatistiki olarak önemsiz kalmış, 12, 16 ve 20 kg N/da dozları aynı grupta yer almıştır (Duncan, P<0,05).

Azotun yarısının ekimle, kalan yarısının kardeşlenme sonunda verilmesi tane verimini tek seferde uygulamaya göre ortalama %6,4 artırmıştır. Bu artış özellikle ilkbahar yağışının uzun yıllar ortalamasının üzerinde olduğu ikinci yılda belirgin olmuştur.

Sonuç

Akaova kuru kořullarında ekmeklik buğday için 12 kg N/da dozunun yeterli olduėu, bu dozun ekimle ve kardeřlenme sonunda iki eřit parada verilmesinin uygun olacaėı sonucuna varılmıřtır.