

Yayla Tarımı Dergisi, 14(1): 12–25, 2021

Kuru Tarım Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Azot Kullanım Etkinliği

Levent KUŞDEMİR¹, Hikmet BOZDOĞANLI¹, Aysel GÜRSEL²

¹ Akçaova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Akçaova ² Akçaova Tarımsal Araştırma İstasyonu, Akçaova

Özet

Çalışmada dört ekmeklik buğday çeşidinde (*Triticum aestivum* L.) beş azot dozunun (0, 4, 8, 12 ve 16 kg N/da) tane verimi, tane protein oranı ve azot kullanım etkinliği üzerine etkileri iki yıl süreyle incelenmiştir. Artan azot dozlarıyla tane protein oranı %11,2'den %13,6'ya yükselmiş, azot kullanım etkinliği ise 4 kg N/da dozunda 21,4 kg tane/kg N iken 16 kg N/da dozunda 12,8 kg tane/kg N'ye düşmüştür. Çeşitler arasında azot kullanım etkinliği bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Buğday, azot kullanım etkinliği, protein, kuru tarım

Materyal ve Yöntem

Deneme 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında Akçaova Tarımsal Araştırma İstasyonu arazisinde tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ana parsellere çeşitler, alt parsellere azot dozları yerleştirilmiştir. Azot kullanım etkinliği, gübreli parseldeki tane veriminden gübresiz parseldeki tane veriminin çıkarılıp uygulanan azot miktarına bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Tane protein oranı azot dozu arttıkça doğrusal olarak artmış ve 0 kg N/da dozunda %11,2 olan değer 16 kg N/da dozunda %13,6'ya ulaşmıştır. Azot kullanım etkinliği ise artan dozla azalmıştır; en yüksek değer 4 kg N/da dozunda (21,4 kg tane/kg N), en düşük değer 16 kg N/da dozunda (12,8 kg tane/kg N) elde edilmiştir.

Kuru koşullarda yüksek azot dozlarının verimden çok kaliteye yansıdığı görülmektedir. Bu nedenle ekmeklik kalite hedeflenmedikçe yüksek dozların ekonomik olmadığı düşünülmektedir.

Sonuç

Kuru koşullarda azot kullanım etkinliği artan dozla azalmakta, protein oranı ise artmaktadır. Çeşit seçiminde azot kullanım etkinliğinin de dikkate alınması önerilmektedir.