附录一

云阳县晚熟脐橙周年管理工作历

月份	物候期	果园管理主要内容及方法
1月	（小寒－大寒）休眠期，花芽分化期	1、及时喷药封园。喷药时应注意整树喷雾均匀、彻底，树冠内外、主干、主枝、骨干枝、各级分枝，都要喷雾到位，消灭越冬栖息的成虫、幼虫和虫卵。药剂选用：①30%松脂酸钠100～200倍，②99%绿颖300倍+73%炔螨特2000倍。2、越冬防冻：晚熟品种加强果园防冻（灌水、薰烟、树冠盖膜等）。
2月	（立春－雨水）花芽分化期	1、继续做好清园和封园工作。清理果园排水沟。2、加强虫情监测和物候观察。3、萌芽前或萌芽初期依树体大小株施配方肥5－10公斤。4、视果实成熟情况开始采果。
3月	（惊蛰－春分）春梢萌芽期，抽梢期	1、继续施用配方肥或撒施尿素，清理果园排水沟。2、花前复剪。3、下旬用唑螨酯或乙螨唑或（螺螨酯+阿维菌素）+溴菌腈或咪鲜胺全树喷雾。在地面喷毒死蜱预防花蕾蛆。4、开始采果。
4月	（清明－谷雨）花蕾期、开花期	1、对结果树和拟结果幼树于主干上用2毫米环剥刀环剥1圈并用地膜或微膜捆扎紧。2、有蓟马和附线螨为害花和幼果的用药防治，花期多雨应注意防治花瓣灰霉病。3、对缺肥树在树盘上撒施尿素补肥。4、花谢80%时喷 BA+GA 脐橙专用保果剂，15－20天后依座果情况再选择性补喷1次。5、中下旬防治恶性叶甲，药剂选用菊酯类。6、继续树盘除草。7、采果。
5月	（立夏－小满）花期、生理落果期	1、病虫害防治：用99%矿物油200～300倍+杀螨剂+毒死蜱或菊酯类+800倍安泰生或大生，全园喷雾预防和防治红蜘蛛，锈壁虱，蚧类，粉虱，天牛和凤蝶。开始挂瓶诱杀或喷药防治大实蝇，

		防治溃疡病。2、结果树注意抹除早夏梢，幼树在夏梢5—7叶摘心。3、注意排水，树盘除草。4、采果。
6月	（芒种—夏至）生理落果期、夏梢抽发期	1、该月高温多湿，注意排涝，结果树要控制夏梢生长，幼树施促梢肥。下旬至7月上旬开始刈割果园杂草树盘覆盖。 2、病虫害防治：①锈壁虱进入快速增殖期，当全园出现个别铜皮果或5%叶有锈螨时，就应开始防治，上年发生严重的应重点防治，特别是高温干旱期更应随时注意，可以选用杀螨药剂组合或代森锰锌防治。②天牛可通过捕捉成虫、削除虫卵和幼虫，当钩不出幼虫时，用蘸过80%敌敌畏乳油的棉花塞住洞口，外封粘泥，达到熏死的目的。③剪除蛎类为害枝梢并带出果园烧毁，或在蛎类第一、二代孵化期，用矿物油加毒死蜱防治。
7月	（小暑—大暑）果实生长发育期、生理落果结束期	1、施肥：春季施肥不足的结果树在第2次生理落果前足量施入配方肥，也可施入配比为有机质30%以上，氮、磷、钾适度的硫酸钾型有机无机复混肥作为壮果促梢肥。2、疏果：摘除畸形果、病虫果、小果及特大果，。3、病虫害防治：必喷丙森锌（安泰生）或代森锰锌（大生）一次。①防止因日灼诱发树脂病。树干涂白。②继续注意防控锈壁虱。③夏季修剪改善树冠的通风透光，保留新梢要注意防治潜叶蛾，等芽长半粒米长时只对新梢喷5%吡虫啉或1.8%阿维菌素或5%啶虫脒，间隔7—10再喷一次，视情况可喷第三次，各次交叉用药。选择傍晚进行喷雾为好。新梢上有蚜虫时开始用药，只喷新梢，药物与潜叶蛾同。④继续捕杀、毒杀天牛及用杀虫灯诱蛾。蚱蝉以诱杀、人工捕杀为主，并剪除产卵枝集中烧毁。4、挂果少、树势强的可在下旬放出早秋梢。5、继续果园杀草覆盖。

8月	（立秋－处暑）秋梢发生期、果实膨大期	1、树势中等的可在上中旬放出早秋梢，树势弱的在下旬放出。2、继续防治锈壁虱，潜叶蛾、粉虱，蚜虫等。喷药时，可在其中加入0.2%磷酸二氢钾。3、进入伏旱后注意抗旱，采用穴灌抗旱可节约用水。
9月	（白露－秋分）根系生长期、秋梢成熟期、果实膨大期	1、病虫防治：可喷丙森锌（安泰生）或代森锰锌（大生）一次。根据情况防治柑桔红蜘蛛，此虫繁殖的第二次高峰发生期，选用杀螨剂即可防治。2、继续抗旱保墒。3、开始诱杀吸果夜蛾，摘除、捡拾未熟先黄和落地果，集中处置。
10月	（寒露－霜降）果实膨大期	1、病虫害防治：①继续防治红蜘蛛②防治吸果夜蛾，可用灯光诱杀，或糖酒醋液诱杀，每亩放置4－5个钵，高度与树冠中上部相近，每天清晨捞出死蛾，隔4－5天换药1次。2、10月初结果树施基础配方肥，中、晚熟品种分别情况补充N、Zn、K等不同元素，以满足花芽分化及果实生长和越冬的需要。下旬用98%的2,4—D 1克对水50公斤+0.2%硫酸锌（晚熟可用硝酸锌）+25%胨鲜胺800－1000倍喷施防冬季落果。3、下旬杀草，清除园内杂草杂树，树盘覆盖。4、摘除、捡拾未熟先黄和落地果，集中处置。
11月	（立冬－小雪）果实成熟期	1、月初继续杀草覆盖，改善树冠下部及内膛光照。 2、病虫害防治：①防除螨类和蚧类等越冬栖息的成虫、幼虫和虫卵，做到均匀、全面、彻底。②防治吸果夜蛾，用灯光诱杀，隔15－25天1次，采收前25天禁用农药。继续捡拾落地果，集中处置。③下旬晚熟柑橘再次用98%的2,4—D 1克对水40公斤+ 0.2%硝酸锌喷施防冬季落果。
12月	（大雪－冬至）果实成熟期、花芽分化期	1、根据市场需要中熟品种可开始采果上市，采用两剪下树法采果。2、晚熟柑橘：入冬前，根据果园情况可再用98%的2,4—D 1克对水50公斤喷施保果。