

2.3.1 Consumentensurplus — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een museum gebruikt het vraagmodel $P = 30 - Q$. P is euro per kaartje; Q is het aantal kaartjes. Het model geldt voor $0 \leq Q \leq 30$. Alle andere omstandigheden blijven gelijk. De gegeven prijs is € 10. Er zijn genoeg kaartjes: alle gevraagde kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

1. Gegeven prijs gebruiken


Vul $P = 10$ in: $10 = 30 - Q$, dus $Q_d = 20$ kaartjes. Controle: $30 - 20 = 10$. De letter d staat hier voor de gevraagde hoeveelheid. Dit is geen berekend marktevenwicht: we gebruiken alleen de vraaglijn en een gegeven prijs.

2. Vraaglijn en prijslijn tekenen

Teken Q horizontaal van 0 tot 30 en P verticaal van 0 tot 30. Schrijf de eenheden erbij. Bij $Q = 0$ is $P = 30$. Bij $P = 0$ volgt $0 = 30 - Q$, dus $Q = 30$. Verbind $(0, 30)$ en $(30, 0)$. Trek vervolgens de horizontale lijn $P = 10$. Het snijpunt is $(20, 10)$; de verticale hulplijn komt bij $Q = 20$.

3. Consumentensurplus aanwijzen

De hoogste betalingsbereidheid ligt bovenaan de vraaglijn. De kopers betalen ieder € 10. Arceer daarom de driehoek tussen de vraaglijn en $P = 10$, vanaf $Q = 0$ tot $Q = 20$.



Museum: de vraaglijn loopt door (0, 30) en (30, 0). Bij de gegeven prijs 10 worden 20 kaartjes verkocht. De gearceerde driehoek boven de prijslijn is het consumentensurplus.

4. Oppervlakte berekenen

De basis is 20 kaartjes. De loodrechte hoogte is $30 - 10 = 20$ euro per kaartje, niet de prijs 10.

$$CS = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} = \frac{1}{2} \times 20 \times (30 - 10) = \text{€ } 200.$$

Waarom: kaartjes $\times$ euro per kaartje geeft euro. De driehoek telt in dit model alle verschillen tussen betalingsbereidheid en betaalde prijs op.

5. Uitkomst interpreteren

De kopers van de 20 verkochte kaartjes hebben samen € 200 voordeel ten opzichte van hun betalingsbereidheid. Ze krijgen dat bedrag niet uitgekeerd. Het is ook niet € 200 per bezoeker.

Samenvatting §2.3.1

- Per gekocht kaartje is consumentensurplus: betalingsbereidheid min betaalde prijs.
- Tel alleen werkelijk gekochte kaartjes mee. Bij een continue vraaglijn stelt de oppervlakte deze optelling voor.
- Een gegeven prijs levert Q_d op; zonder verdere informatie bereken je geen marktevenwicht.
- Bij een lineaire vraaglijn en volledige verkoop aan de hoogste vragers: $CS = \frac{1}{2} \times \text{verkochte hoeveelheid} \times (\text{hoogste betalingsbereidheid} - \text{prijs})$, in euro.
- CS is voordeel van de kopers als groep, geen uitbetaling. In §2.3.2 bekijken we ook de verkoperskant.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.


Opgave 1 — Ophalen

- a) Voor een filmavond geldt $P = 24 - Q$, met P in euro per kaartje en Q in kaartjes. Het model geldt van $Q = 0$ tot $Q = 24$. Bereken Q bij $P = 8$ en bepaal beide snijpunten met de assen.
- b) Welke grootheid hoort horizontaal, welke verticaal? Leg uit wat het punt $(16, 8)$ in deze grafiek betekent.
- c) Een driehoek heeft een basis van 8 cm en een loodrechte hoogte van 6 cm. Bereken de oppervlakte met eenheid.

Opgave 2 — Begripscheck

- a) Noor koopt een kaartje voor € 9. Haar betalingsbereidheid is € 15. Hoe groot is haar consumentensurplus?

Voor een aquarium geldt $P = 24 - 0,5Q$, met P in euro per kaartje en Q in kaartjes ($0 \leq Q \leq 48$). Bij de gegeven prijs € 8 worden alle 32 gevraagde kaartjes verkocht aan de hoogste vragers. Alle andere omstandigheden blijven gelijk.



Aquarium: de vraaglijn en de gegeven prijslijn zijn getekend. Het snijpunt is (32, 8). Het consumentensurplus is nog niet gearceerd.

- b) Wijs het consumentensurplus aan. Bereken het met de juiste basis en hoogte.
- c) Sem zegt: “Dat bedrag krijgt iedere bezoeker terug.” Leg uit wat het bedrag wél betekent.


Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 — Tuintour

Voor een tuintour geldt $P = 30 - 0,5Q$, met P in euro per kaartje en Q in kaartjes ($0 \leq Q \leq 60$). De prijs is € 10. Alle gevraagde kaartjes worden aan de hoogste vragers verkocht; capaciteit is voldoende. Andere omstandigheden blijven gelijk.

De grafiek geeft de prijslijn, gevraagde hoeveelheid, basis en hoogte al. De arcering laat zien welk voordeel je berekent.




Tuintour: de gegeven prijs is 10 en de gevraagde hoeveelheid 40. De gearceerde driehoek heeft een horizontale basis van 40 kaartjes en een loodrechte hoogte van 20 euro per kaartje.

- Vul aan: $10 = 30 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = \dots \rightarrow Q_d = \dots$ kaartjes. Controleer met de vraagfunctie.
- Vul aan: $CS = \frac{1}{2} \times \dots \times (\dots - \dots) = \text{€ } \dots$
- Maak af: “De kopers van de ... verkochte kaartjes hebben samen € ... voordeel, doordat hun gezamenlijke ... hoger is dan hun gezamenlijke”

Opgave 4 — Klimkennismaking

Voor een klimkennismaking geldt $P = 24 - 0,5Q$, met P in euro per kaartje en Q in kaartjes ($0 \leq Q \leq 48$). Bij de gegeven prijs € 12 worden alle gevraagde kaartjes verkocht aan de hoogste vragers. Er is genoeg plaats; overige omstandigheden blijven gelijk.



Klimkennismaking: alleen de assen en de vraaglijn staan klaar. De prijslijn en het surplusgebied voeg je zelf toe.

- Bereken Q_d bij $P = 12$. Voeg de prijslijn en het snijpunt toe.
- Arceer en benoem het consumentensurplus. Bepaal zelf de basis en de loodrechte hoogte en bereken het bedrag.
- Geef een zin over de betekenis voor de kopers als groep.

Opgave 5 — Bordspelmiddag

Voor een bordspelmiddag geldt $P = 20 - 0,5Q$, met P in euro per kaartje en Q in kaartjes ($0 \leq Q \leq 40$). De gegeven prijs is € 5. Alle gevraagde kaartjes gaan naar de hoogste vragers; capaciteit is voldoende. Overige omstandigheden blijven gelijk.

Bereken de gevraagde hoeveelheid. Maak zelf de grafiek, arceer het consumentensurplus, bereken het en leg de betekenis voor de kopers uit.

Korte controle achteraf: hoeveelheid → benoemde assen en snijpunten → gebied → oppervlakte met eenheid → koperbetekenis.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 — Skateclinic

Voor een skateclinic geldt $P = 36 - 0,5Q$. P is euro per kaartje en Q is het aantal kaartjes ($0 \leq Q \leq 72$). De gegeven prijs is € 12. Alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid verkocht. Er is voldoende capaciteit; overige omstandigheden blijven gelijk.

- a) Bereken de gevraagde hoeveelheid.
- b) Teken de vraaglijn en prijslijn in één assenstelsel. Benoem beide assen met eenheid en noteer alle snijpunten.
- c) Arceer en benoem het consumentensurplus.
- d) Bereken het consumentensurplus en noteer de eenheid.
- e) Leg uit wat dit bedrag voor de kopers als groep betekent en waarom je hier geen marktevenwicht hebt berekend.

Opgave 7 — Taalcafé

Voor één middag in een taalcafé loopt een rechte vraaglijn door $(Q = 0, P = 28)$ en $(Q = 56, P = 0)$. P is euro per kaartje en Q is het aantal kaartjes. Het model geldt tussen deze snijpunten. De gegeven prijs is € 14. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht aan de hoogste vragers; er is voldoende plaats. Overige omstandigheden blijven gelijk.

- a) Teken de vraaglijn en prijslijn met benoemde assen en eenheden. Noteer de drie snijpunten en de gevraagde hoeveelheid.
- b) Arceer en benoem het consumentensurplus. Bereken het bedrag met eenheid.
- c) Ilias berekent $28 \times € 14 = € 392$ en noemt dit consumentensurplus. Beoordeel zijn antwoord. Leg uit welk bedrag hij berekent en wat jouw surplusbedrag voor de kopers betekent.

Doeloefening

Opgave 8

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie $P=50-0,5Q$. P is de prijs in euro per kaartje en Q het aantal gevraagde kaartjes. De gegeven marktprijs is €20. Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar; alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

- a) **(2 punten)** Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P=€20$. Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.
- b) **(3 punten)** Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel. Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje). Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.
- c) **(2 punten)** Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.
- d) **(3 punten)** Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.
- e) **(2 punten)** Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 — Een lagere prijs, andere kopers

Vier mensen willen hoogstens één workshopplaats. Hun betalingsbereidheid is € 18, € 14, € 10 en € 6. Eerst worden precies drie plaatsen voor € 10 verkocht aan de mensen met betalingsbereidheid € 18, € 14 en € 10.

Later is de prijs € 6. Opnieuw worden precies drie plaatsen verkocht, nu aan de mensen met betalingsbereidheid € 14, € 10 en € 6.

Een leerling zegt: “De lagere prijs bewijst dat het consumentensurplus van de kopers als groep groter is.” Beoordeel die uitspraak voor deze twee situaties. Benoem welke voorwaarde uit het eerder gebruikte model is veranderd.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 — Vraag en coördinaten

Voor een foto-expositie geldt $P = 18 - 0,5Q$, met P in euro per kaartje en Q in kaartjes ($0 \leq Q \leq 36$). Bereken Q bij $P = 6$. Noteer het bijbehorende punt als (Q, P) en leg de betekenis uit.

Opgave 11 — Welke aankopen tellen mee?

Drie mensen overwegen ieder één routekaart van € 9. Hun betalingsbereidheid is € 12, € 9 en € 5. Er zijn genoeg kaarten. Wie minstens de prijs wil betalen, koopt. Hoeveel kaarten worden verkocht en hoe groot is het gezamenlijke consumentensurplus?