

## KULLANMA TALİMATI

### ADRENALİN 0,25 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti

Kas, damar, kalp, soluk borusu içine veya deri altına uygulanır.

Steril.

Her 1 mL'lik ampul;

- **Etkin madde:** 0,25 mg adrenalin (0,25 mg adrenalin baz + %10 eksez doza ekivalan miktarda 0,495 mg adrenalin bitartarat)
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum klorür, sodyum metabisülfid ve enjeksiyonluk su içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. ADRENALİN nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. ADRENALİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. ADRENALİN nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. ADRENALİN'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. ADRENALİN nedir ve ne için kullanılır?

ADRENALİN bir ampulde 0,25 mg adrenalin içeren 10 ve 100 ampullük kutularda takdim edilmektedir. Ampuller steril, berrak, renksiz çözelti içermektedir. Adrenalin aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Kalp durması ve kardiyopulmoner reanimasyon

Suni solunum, açık veya kapalı kalp kompresyonu fayda vermezse damardan sodyum bikarbonat verildikten sonra ADRENALİN damar içinde, kalp içine veya soluk borusuna verilebilir.

- Anafilaktik şok (kan basıncı düşüklüğünün eşlik ettiği aşırı duyarlılık reaksiyonu) ve akut (ani gelişen) alerjik reaksiyonlar

Anjiyoödem (alerji sonucu derinin kaşıntısız şişmesi ve kızarması), ilaç ve serum reaksiyonları, böcek sokmaları ve diğer alerjenlere karşı histaminin fizyolojik antagonisti olarak kullanılır. Şok varsa deri altından verilmez. Ayrıca şoktaki hastaya damar yoluyla H1 reseptör antagonisti (klorfeniramin) de verilmelidir.

- Akut (ani gelişen) astım ataklarında ve bronkospazm (bronş ve bronşçukların kasılması) Deri altına verilir.

- Deri ve mukozalarda kapiller (yüzeysel) kanamaları durdurma Çözelti şeklinde bölgesel verilir.

- Lokal anesteziklerin (bölgesel anestezi sağlayan ilaçlar) etki süresini uzatma Diş hekimleri tarafından vazokonstriktör (damar büzücü) olarak ilave edilir.

## 2. ADRENALİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### ADRENALİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Adrenaline veya ADRENALİN'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerji durumlarında
- Koroner yetmezlikte (kalbi besleyen kan damarlarının kalbe yeterince kan taşıyamaması durumu),
- Dar açılı glokomda (ani bulanık görme, ağrı ve kırmızılığa neden olan bir göz hastalığı),
- Organik kalp hastalıklarında ve kalp dilatasyonunda (kalp büyümesi),

- Diyabette (şeker hastalığı),
- Feokromasitoma (adrenal bezde bir tümör) varsa,
- Subaortik stenoza (kalpte sağ karıncık çıkım yolunda daralma),
- Hipovolemik şokta (kan hacmindeki azalmaya bağlı olarak kalbin vücuda yeterli kanı pompalayamaması durumu) (anafilaktik şok hariç),
- Organik beyin hasarında (beynin kendi yapısından kaynaklanan hastalıklar)
- Serebrovasküler hastalıklarda (beyin damarlarıyla ilgili hastalıklar),
- Lokal anesteziyle karıştırıldığında parmaklarda, kulakta, burunda ve genital bölgelerde kullanılmamalıdır.
- Kalbi aritmilere (ritim bozukluğu) karşı duyarlı hale getirebilecek yüksek dozda başka ilaçlar (örn. kardiyak glikozidler) alan hastalarda kullanılmamalıdır.
- Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında noradrenalinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.
- Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) durumlarında böyle hastalar noradrenalinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.
- Fenotiyazınların neden olduğu dolaşım kollapsı veya hipotansiyonu önlemek için kullanılmamalıdır; ADRENALİN'in baskılayıcı etkilerinin tersine çevrilmesi, kan basıncının daha da düşmesine (hipotansiyon) neden olabilir.
- Siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü noradrenalin kalp kaslarının uyarılabilirliğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

Adrenalin plasentaya geçer. Doğumsal kusur sıklığında hafif bir artış olduğuna ilişkin bulgular yer almaktadır. Adrenalin doğum sırasında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde doğumun ikinci devresinin uzamasına neden olabilir.

Tekrarlanan ADRENALİN enjeksiyonları, enjeksiyon bölgesinde damar büzüşmesi sonucu doku ölümüne neden olabilir. Uzuvlarda, böbreklerde ve karaciğerde de doku ölümü görülebilir. Doku ölümü riskinden dolayı kalçaya kas içi ADRENALİN enjeksiyonlarından kaçınılmalıdır.

#### **ADRENALİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Aşağıdaki durumlarda ilacı dikkatli kullanınız;

- Şoktaysanız veya çok kan kaybetmişseniz,

- Herhangi bir kalp hastalığınız veya astım veya amfizem (akciğerlerdeki hava keseciklerinin gerilip genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan nefes darlığı belirtisini gösteren hastalık) gibi uzun süredir devam eden göğüs hastalığınız varsa,
- Düşük kan potasyum seviyelerine veya yüksek kan kalsiyum seviyelerine sahipseniz,
- Glokomdan (gözde artan basınç) muzdaripseniz,
- Genel anestezi altında ameliyat olacaksanız,
- Şeker hastasıysanız,
- Tiroid beziniz aşırı faaliyet gösteriyorsa,
- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Serebrovasküler hastalığınız (beyin damarlarıyla ilgili hastalıklar) varsa,
- Organik beyin hasarında (beynin kendi yapısından kaynaklanan hastalıklar),
- Damar sertliğiniz varsa,
- Organik kalp hastalığınız varsa,
- Kalp dilatasyonunda (kalp büyümesi),
- Koroner yetmezliğiniz varsa (kalbi besleyen kan damarlarının kalbe yeterince kan taşıyamaması durumu),
- Obstrüktif kardiyomiopati (kalbin sol karıncık kasının kalınlaşması ve sertleşmesi)
- Yüksek tansiyona sahipseniz,
- Aritminiz (ritim bozukluğunuz) varsa,
- Omurilik zedelenmesi geçirdiyseniz ve kan basıncınızın kontrolsüz olmasına neden olan otonom sinir sisteminin (vücutta istemsiz çalışan sinir sistemi) aşırı çalışmasından şikayetçiyseniz,
- Prostat büyümesinden muzdaripseniz veya idrar yapmada zorluk çekiyorsanız,
- Herhangi bir psikolojik rahatsızlığınız varsa.

Adrenalin yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kazara damar içi enjeksiyon tansiyon yükselmesi nedeniyle beyin kanamasına neden olabilir.

ADRENALİN uygulamasından sonra damar büzülmesine bağlı olarak solgunluk oluşabilir. Bu durum devam eden kardiyovasküler (kalp damarlarıyla ilgili) veya anafilaksi (ani gelişen nefes

darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme) olarak yanlış yorumlanabilir ve adrenalin doz aşımı riskini artırabilir. Bu, özellikle 2-3 adrenalin dozunu takiben solgun kalabilen küçük çocuklarda endişe vericidir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

### **ADRENALİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Adrenalin hamilelik sırasında yalnızca potansiyel yararları fetüs üzerindeki olası risklerine ağır basıyorsa kullanılmalıdır.

Adrenalin plasentaya geçer. Doğumsal kusur sıklığında hafif bir artış olduğuna ilişkin bulgular yer almaktadır. Adrenalin doğum sırasında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde doğumun ikinci devresinin uzamasına neden olabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ADRENALİN anne sütüne geçer. ADRENALİN enjeksiyonu yapılan annelerde emzirmeden kaçınılmalıdır.

ADRENALİN emzirme döneminde sadece doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü durumlarda kullanılmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

ADRENALİN uygulamasından etkileniyorsanız araç veya makine kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanma yeteneğiniz anafilaktik reaksiyondan ve ayrıca ADRENALİN’e olası yan etkilerinden etkilenebilir.

## **ADRENALİN'in ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum iermez”.Sodyum metabisülfid ierdiğinden dolayı nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Adrenalin ile etkileşime girebileceğinden dolayı özellikle aşağıdaki ilaçlar önemlidir:

- Yüksek kan basıncını veya kalp rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örneğin propranolol, fentolamin, guanetidin),
- Kan basıncını artıran adrenalin gibi diğer ilaçlar (örneğin ergot alkaloidleri veya oksitosin),
- Kortikosteroidler (astım veya artrit gibi vücudunuzdaki iltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar),
- Aminofilin ve teofilin (astım veya KOAH gibi bronşların kasılarak daraldığı hastalıklarda bronşları gevşeterek açan ilaçlar),
- Potasyum atılımını artıran diüretikler,
- Halojenli hidrokarbon genel anestezikleri,
- Öksürük veya soğuk algınlığı ilaçları,
- Antihistaminikler (alerji tedavisi için kullanılan ilaçlar),
- Depresyon veya diğer psikiyatrik hastalıklar için kullanılan ilaçlar (örneğin; monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler), trisiklik antidepressanlar (örneğin imipramin), fenotiyazinler),
- Yetersiz çalışan tiroid bezini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
- Parkinson hastalığını tedavi eden ilaçlar (örneğin levodopa veya entakapon),
- Şeker hastalarında kan şekerinin kontrolünü sağlayan ilaçlar (insülin veya oral hipoglisemik ajanlar)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ADRENALİN nasıl kullanılır?**

ADRENALİN doktorunuz ya da bir sađlık personeli tarafından uygulanacađından ařađıdaki b6l6m hekiminize veya sađlık personeline y6neliktir.

**Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

Bronkospazm ve hipersensitivite reaksiyonları durumlarında dozaj:

Akut anafilaksi, ađır astım ve alerjik reaksiyonlarda b6y6kler iin mutat bařlangı dozu 0,1-0,5 mg (0,4-2 mL) ADRENALİN olup, subk6tan veya intram6sk6ler yolla verilir. Alerji nedeni deri altına veya kas iine yapılan bir ila ise absorbsiyonu geciktirmek ve azaltmak iin ADRENALİN enjeksiyonu aynı yerlere yapılabilir. ADRENALİN'in bařlangı dozları k66k olmalıdır, gerekirse bunlar arttırılabilir. Ancak bir defada verilen doz 1 mg'ı gememelidir.

Anafilaktik řokta subk6tan dozlar 10-15 dakikalık aralıklarla tekrarlanabilir. Ađır astım krizlerinde ise subk6tan dozlar hastanın cevabına g6re 20 dakika ile 4 saat aralıklarla tekrarlanabilir.

Kronik obstr6ktif akciđer hastalıđında 0,3 mg (1,2 mL) adrenalin 20 dakika ara ile 3 kez verilir ve her 2 saatte bir bu řema tekrarlanabilir.

Ađır anafilaktik řokta ilacın dolařıma girmesini sađlamak iin intraven6z yol kullanılmalıdır. Bunun iin 0,1-0,2 mg (0,4-0,8 mL) ADRENALİN 8-10 kısım enjeksiyonluk su ile dil6e edilir ve yavař olarak intraven6z enjeksiyonla verilir. Gerekirse bu her 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir.

Kalp durması durumunda dozaj:

B6y6klerde kalp reanimasyonu iin 0,5-1 mg (2-4 mL) ADRENALİN dil6e edilerek intraven6z veya intrakardiyak yolla enjekte edilir. Kalp masajını engellemek iin intraven6z yol tercih edilir. 1-2 mg (4-8 mL) ADRENALİN 10 ml steril distile suya katılarak endotrakeal t6p aracılıđıyla trakeaya instile edilir ya da ilk intraven6z enjeksiyondan sonra 0,3 mg (1,2 mL) ADRENALİN subk6tan olarak yapılır veya intraven6z inf6zyon řeklinde 1-4  g/dk hızıyla verilir.

**Diđer uygulama řekilleri ve dozajları:**

Lokal hemostatik olarak 1:50.000 (% 0,002) - 1:1.000 (% 0,1) konsantrasyonunda adrenalin 6zelteleri ıslak pansuman veya sprey řeklinde deri, mukoza ve doku y6zeylerine uygulanır. Adrenalin lokal anestetik 6zeltilere 1:500.000-1:50.000 oranında katılır. En sık kullanılan

konsantrasyon 1:200.000'dir.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

ADRENALİN tercihen subkütan olarak enjekte edilir. Kas içine de yapılabilir, ancak gluteus kasları kullanılmamalıdır (Bu bölge derisinde anaerob mikroorganizmalar kolonize olabilir ve ADRENALİN'in vazokonstriktör etkisi hipoksiye neden olarak *Clostridium welchii* enfeksiyonunun oluşmasını hızlandırabilir.).

Acil durumlarda ADRENALİN dilüe edilerek çok yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde verilebilir. Kalp durması halinde dilüe adrenalin çözeltisi intrakardiyak enjeksiyon veya endotrakeal instilasyonla verilebilir. Kalbe enjekte edildiğinde kalp masajı da uygulanmalıdır. Bu şekilde ilacın koroner sirkülasyona katılması sağlanır. Adrenalin aerosol, vaporizör, IPPB cihazına oral inhalasyon şeklinde verilebilir.

Bu amaçla kullanılan adrenalin çözeltileri daha konsantre olup bunları sistemik olarak enjekte etmekten kaçınılmalıdır. ADRENALİN dilüe edilerek lokal olarak deri, mukoza ve doku yüzeylerine uygulanabilir. Bunun için ıslak pansuman veya sprey şekilleri kullanılır.

Adrenalin dozu adrenalin tuzları içindeki adrenalin miktarı ile ifade edilir.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

Bronkospazm ve hipersensitivite reaksiyonları durumlarında dozaj:

Ağır astım ve anafilaksi vakalarında çocuklara subkütan olarak 0,01 mg/kg (0,04 mL/kg) veya 0,3 mg/m<sup>2</sup> (1,2 mL/m<sup>2</sup>) ADRENALİN yapılır. Bir defalık pediatrik doz 0,5 mg (2 mL)'i geçmemelidir. Hastanın durumuna ve alınan cevaba göre dozlar 20 dakika ile 4 saatlik aralıklarla tekrarlanabilir.

Kalp durması durumunda dozaj:

Çocuklarda 0,005-0,01 mg/kg ADRENALİN intrakardiyak olarak enjekte edilir veya 0,01 mg/kg ADRENALİN intravenöz olarak verilir. Bu amaçla 1:10.000 konsantrasyonda hazır ampul kullanılmalıdır. Bu şekilde dilüsyon hatalarından kaçınılmış olunur.

2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. 12 yaşın altındaki çocuklarda acil durumlar dışında kullanılması önerilmemektedir.



ADRENALİN uygulamasından sonra damar b z lmesine baėlı olarak solgunluk oluřabilir. Bu durum devam eden kardiyovask ler (kalp damarlarıyla ilgili) veya anafilaksi (ani geliřen nefes darlıėı, ciltte d k nt  y zde ve/veya dilde řiřme) olarak yanlış yorumlanabilir ve adrenalin doz ařımı riskini artırabilir. Bu,  zellikle 2-3 adrenalin dozunu takiben solgun kalabilen k   k  ocuklarda endiře vericidir.

#### **Yařlılarda kullanımı:**

Yetiřkinler i in  nerilen doz dikkatle uygulanır.

#### ** zel kullanım durumları:**

##### **B brek yetmezliėi:**

Veri bulunmamaktadır.

##### **Karaciėer yetmezliėi:**

Veri bulunmamaktadır.

*Eėer ADRENAL N'in etkisinin  ok g  l  veya zayıf olduėuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ADRENAL N kullandıysanız:**

 lacınız bir saėlık personeli tarafından uygulanacaėından kullanmanız gerekenden daha fazla ADRENAL N kullanımı beklenmez. Ancak size fazla doz uygulandıėını d ř n yorsanız, m mk n olan en kısa zamanda saėlık personelini bilgilendirmeniz gerekir.

Doz ařıldıėında hipertansiyon ve akciėer  demi g r lebilir. Ge ici bradikardiye ve ardından tařikardiye (kalp  arpıntısı) neden olur ve potansiyel olarak  l mle sonu lanabilecek kardiyak aritmilere (d zensiz kalp atıřı) neden olabilir.  zellikle yařlı hastalarda serebrovask ler (beyin damarlarıyla ilgili) veya diėer kanamalar ve hemipleji (fel ) meydana gelebilir. Akciėer  demi meydana gelebilir. B brek yetmezliėi, metabolik asidoz ve soėuk beyaz deri de g r lebilir.

Adrenalin v cutta hızla etkisiz hale geldiėinden akut toksisitenin tedavisi esas olarak destekleyicidir. Adrenalinin baskılayıcı etkileri, 5-10 mg fentolamin mesilat gibi hızlı etkili bir alfa-adrenoresept r bloke edici ajanın hemen intraven z enjeksiyonu ve ardından 2,5-5 mg propranolol gibi bir beta-adrenoresept r bloke edici ajan ile giderilebilir. Aritmiler oluřursa propranolol enjeksiyonu ile giderilebilir.

*ADRENAL N'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız, bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.*

#### **ADRENAL N'i kullanmayı unutursanız**

İlacınız bir sađlık personeli tarafından uygulanacađından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiř olabileceđini dűřünüyorsanız, sađlık personeli bilgilendirmeniz gerekmektedir.

*Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.*

#### **ADRENALİN ile tedavi sonlandırıldıđında oluřabilecek etkiler**

ADRENALİN ile tedavi sonlandırıldıđında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Yan etkiler řu řekilde sınıflandırılır:

ok yaygın (10 hastanın en az birinde grlebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla grlebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla grlebilir)

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla grlebilir)

ok seyrek (10.000 hastanın birinden az grlebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

**Ařađıdakilerden biri olursa, ADRENALİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz.**

- Ani geliřen nefes darlıđı, ciltte dknt, yzde ve/veya dilde řiřme (anafilaksi) muhtemelen řiddetli bronkospazm (bronř ve bronřcukların kasılarak daralması) ile birlikte
- Ařırı duyarlılık reaksiyonları
- Alerjik reaksiyon

Bunlar ok ciddi yan etkilerdir.

Eđer bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin ADRENALİN'e karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu ok ciddi yan etkiler olduka seyrek grlr.

#### **Bilinmiyor:**

Hipokalemi (potasyum eksikliđi), metabolik asidoz

Düşük dozlarda bile meydana gelebilen insülin sekresyonunun (salınımının) engellenmesi ve hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği), glukoneogenez, glikoliz, lipoliz (yağların ayrışması) ve ketogenez yağ asitlerinin yıkılması sonucu keton cisimlerinin açığa çıkması) gibi bazı biyokimyasal etkiler

Kaygı, korku, konfüzyon (kafa karışıklığı), sinirlilik, uykusuzluk, huzursuzluk,

Baş ağrısı, baş dönmesi, tremor (titreme),

Parkinson sendromlu hastalarda rijidite (kasların sertleşmesi) ve tremor (titreme)

Olağan dozlarda ADRENALİN'in subkütan (deri altı) olarak uygulanmasından sonra bile hipertansiyon kaynaklı subaraknoid kanama (bir tür beyin kanaması) hemipleji (felç) meydana gelmiştir.

Kalp aritmisi (düzensiz kalp atışı) kaynaklı taşikardi (kalp çarpıntısı)

Organik kalp hastalığı olan veya kalbi aritmilere (düzensiz kalp atışı) karşı duyarlı hale getiren başka ilaçlar alan hastalarda fibrilasyon dahil potansiyel olarak ölümcül ventriküler aritmilere (karıncıklardan kaynaklanan tamamen düzensiz ve yetersiz kasılmalardan oluşan bir ritim bozukluğu) neden olabilir.

Miyokardiyal iskemi (kalbe giden kan akışının azalması sonucu kalbin yeterli oksijen almaması), miyokard enfarktüs (kalp krizi) bildirilmiştir.

Adrenalin ile tedavi edilen hastalarda nadir olarak stres kardiyo miyopatisi görülmüştür.

Hipertansiyon (beyin kanaması riski olan)

Düşük dozlarda bile meydana gelebilen soğuk ekstremiteler (uzuvlar)

Bağırsak dokusu ölümü

Nefes darlığı, akciğer ödemi

Ağız kuruluğu, iştah azalması, mide bulantısı, kusma, hipersalivasyon (aşırı tükürük salgılanması)

İdrar yapamama, idrar retansiyonu (idrar yaptıktan sonra idrar torbasında önemli miktarda artık idrar kalması durumu)

Terleme, halsizlik, solgunluk,

Tekrarlanan ADRENALİN enjeksiyonları, enjeksiyon bölgesinde damar daralması sonucu nekroza neden olabilir. Ekstremitelerde, böbreklerde ve karaciğerde de doku ölümü oluşabilir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. ADRENALİN’in saklanması**

*ADRENALİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADRENALİN’i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat Sahibi:***

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3

06520 Balgat-ANKARA

#### ***Üretim Yeri:***

Mefar İlaç Sanayii A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20

34906 Kurtköy –Pendik/İstanbul

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*