

## KULLANMA TALİMATI

**Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatı'nın tümünü dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için CANEPHRON® UNO'yu yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.
- Eğer semptomlarınız kötüleşir ya da düzelmezse bir doktora görünmelisiniz.

### **Bu kullanma talimatında:**

1. CANEPHRON® UNO nedir ve ne için kullanılır
2. CANEPHRON® UNO'yu kullanmaya başlamadan önce
3. CANEPHRON® UNO nasıl kullanılmalı
4. Olası yan etkileri
5. CANEPHRON® UNO'nun saklanması
6. Diğer bilgiler

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **CANEPHRON® UNO Kaplı Tablet**

**Ağız yolu ile alınır.**

#### **Etkin madde:**

Bir kaplı tablet 36 mg Kırmızı kantaron toprak üstü kısımları (Centaurei herba), 36 mg Selamotu kökü (Levistici radix), 36 mg Biberiye yaprağı (Rosmarini folium) içerir.

**Yardımcı maddeler:** Sukroz, laktoz monohidrat (buzağı sütünden elde edilen laktoz), sıvı glukoz (kuru madde), kalsiyum karbonat, dekstrin, magnezyum stearat (bitkisel), mısır nişastası, montan glikol mumu, povidon 25, povidon 30, işlenmemiş hint yağı, şellak (*Kerria lacca*), susuz kolloidal silika, talk, boyalar: kırmızı demir oksit (E172), riboflavin (E101), titanyum dioksit (E171).

#### **Ruhsat sahibi:**

Bionorica İlaç Ticaret A.Ş.  
Kavacık Mahallesi Ruhi Esmer Sk.  
Nart Plaza Apt. No:1/1  
34810 Beykoz/İstanbul

#### **Lisansör:**

Bionorica SE  
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt, Almanya

#### **Üretici:**

Rottendorf Pharma GmbH  
Ostenfelder Strasse 51-61  
59320 Ennigerloh, Almanya

## **1. CANEPHRON® UNO Nedir ve Ne İin Kullanılır**

CANEPHRON® UNO, komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonlarının hafif semptomlarında endikedir. Ayrıca bbrek taşı oluřunun nlenmesinde idrar miktarını artırarak tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

CANEPHRON® UNO, przsz yzeyli, turuncu renkli, yuvarlak, bikonveks kaplı tabletlerdir.

CANEPHRON® UNO, alminyum folyo ile kapatılmıř bir PVC/PVDC folyo blisterde ve kullanma talimatı ile birlikte kartondan yapılmıř kutular iinde sunulmaktadır.

Her bir blisterde 15 kaplı tablet vardır. Ambalaj boyutu 30 kaplı tablettir.

Yardımcı maddeler arasında buzağı stnden elde edilmiř laktoz monohidrat ve *Kerria lacca*'dan elde edilmiř řellak bulunmaktadır.

## **2. CANEPHRON® UNO'yu Kullanmaya Bařlamadan nce**

**CANEPHRON® UNO'nun bebeklere, ocuklara veya yetiřkinlere ynelik olduėuna dair bilgi**

CANEPHRON® UNO 18 yařının altındaki ocuklarda kullanılmamalıdır.

**Ařağıdaki durumlarda CANEPHRON® UNO'yu kullanmayınız:**

Eėer;

- Bu tıbbi rnn etkin maddelerine, Apiaceae (Maydanozgiller) familyasındaki diėer bitkilere (rn.; anason, rezene), anetol (anason, rezene gibi uucu yaėların bir bileřeni) veya yukarıda listelenmiř olan yardımcı maddelerin herhangi birine karřı ařırı duyarlılıėınız varsa,
- Kalp ve bbrek fonksiyon bozukluėu, bbrek iltihabı ve aktif mide lseri durumunda. ,
- Safra kanalı tıkanıklıėı, kolanjit, karaciėer hastalıėı, safra tařı ve tıbbi gzetim veya tavsiye gerektiren diėer safra bozuklukları varsa.

**Ařağıdaki durumlarda CANEPHRON® UNO'yu zellikle dikkatle kullanınız:**

Eėer inat ateř, kramp, idrarda kan, idrar yapma bozukluėu, aėrılı idrar yapma veya akut idrara ıkma zorluėu grlrse hemen doktorunuza danıřınız.

**CANEPHRON® UNO'nun etkisine tesir edebilecek besinlerle ve ieceklerle birlikte kullanılması**

CANEPHRON® UNO'nun yiyecek ve ieceklerle birlikte alınması ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

## **Gebelik**

*Bu tıbbi rn almadan nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.*

*Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Yeterli veri olmadıėı iin CANEPHRON® UNO hamilelerde kullanılmamalıdır.

## **Emzirme**

*Bu tıbbi rn almadan nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.*

Yeterli veri mevcut olmadığından, CANEPHRON® UNO emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

#### **Araç ve makine kullanıma:**

Yeterli veri bulunmamaktadır.

#### **CANEPHRON® UNO'nun bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün glukoz, sukroz ve laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

#### **CANEPHRON® UNO ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak**

CANEPHRON® UNO diüretiklerle (idrar söktürücü ilaçlar), antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ve antihipertansiflerle (tansiyon düşürücü ilaçlar) etkileşir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

#### **3. CANEPHRON® UNO Nasıl Kullanılmalı**

CANEPHRON® UNO'yu kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmediği takdirde, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde günlük doz günde 3 defa 1 kaplı tablettir.

Lütfen günde 3 kez (sabah, öğlen, akşam) tek doz CANEPHRON® UNO alınız. CANEPHRON® UNO bütün olarak (çiğnenmeden) yutulmalıdır ve en iyi alma şekli bir miktar sıvı (örneğin bir bardak su) ile almaktır. Tedavi aşamasında bol sıvı alımı tedaviyi destekler.

Eğer CANEPHRON® UNO'nun etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

CANEPHRON® UNO, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Böbrek/karaciğer fonksiyon bozukluğu durumunda özel dozaj önerileri için yeterli veri yoktur.

Semptomların herhangi bir zamanda kötüleşmesi veya 3 gün sonra devam etmesi durumunda doktora başvurulmalıdır.

CANEPHRON® UNO, doktor tavsiyesi olmadan 4 haftadan fazla kullanılmamalıdır.

**Eğer kullanmanız gerekenden fazla CANEPHRON® UNO kullanırsanız:** CANEPHRON® UNO'yu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bugüne kadar herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

**Eğer CANEPHRON® UNO'yu kullanmayı unutursanız:**

*Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.*

**CANEPHRON® UNO ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler:**

CANEPHRON® UNO ile tedavinin sonlandırılması genellikle zararsızdır.

CANEPHRON® UNO ile tedavi kesildiğinde beklenmeyen bir etki ile karşılaşırsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

**4. Olası Yan Etkileri**

Tüm ilaçlar gibi CANEPHRON® UNO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Çok yaygın ( $\geq 1/10$ )

Yaygın ( $\geq 1/100$  ila  $< 1/10$ )

Yaygın olmayan ( $\geq 1/1,000$  ila  $< 1/100$ )

Seyrek ( $\geq 1/10,000$  ila  $< 1/1,000$ )

Çok seyrek ( $< 1/10,000$ )

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

**Mide-bağırsak bozuklukları**

Yaygın ( $\geq 1/100$  ila  $< 1/10$ ): Mide-bağırsak bozuklukları (örn. bulantı, karın ağrısı, ishal).

**Bağışıklık sistemi bozuklukları**

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor): aşırı duyarlılık/alerjik reaksiyonlar.

*Eğer kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. CANEPHRON® UNO’nun Saklanması**

CANEPHRON® UNO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CANEPHRON® UNO’yu kullanmayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANEPHRON® UNO'yu kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### **6. Diğer Bilgiler**

##### **Ruhsat sahibi:**

Bionorica İlaç Ticaret A.Ş.  
Kavacık Mahallesi Ruhi Esmer Sk.  
Nart Plaza Apt. No:1/1  
34810 Beykoz/İstanbul

Tel: 0216 227 41 45

Faks: 0216 693 15 46

e-mail: info@bionorica.com.tr

##### **Lisansör:**

Bionorica SE  
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt, Almanya

##### **Üretim yeri:**

Rottendorf Pharma GmbH  
Ostenfelder Strasse 51-61  
59320 Ennigerloh, ALMANYA

#### **7. Bu Kullanma Talimatının Son Onay (Tarihi)**

*Bu kullanma talimatı 04.10.2024'te onaylanmıştır.*

#### **8. CANEPHRON® UNO'nun Sadece Eczanelerde Satılacağına Dair Uyarı SADECE ECZANELERDE SATILIR.**