KULLANMA TALİMATI

ÇİNKO OKSİT merhem

Haricen kullanılır.

• Etkin madde : Her 1g merhem 150 mg çinko oksit içerir.

• Yardımcı maddeler: Vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de ÇİNKO OKSİT'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duvabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

- 1. ÇİNKO OKSİT nedir ve ne için kullanılır?
- 2. CİNKO OKSİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
- 3. ÇİNKO OKSİT nasıl kullanılır?
- 4. Olası van etkiler nelerdir?
- 5. ÇİNKO OKSİT'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ÇİNKO OKSİT nedir ve ne için kullanılır?

- ÇİNKO OKSİT 20 mg'lık alüminyüm tüpde karton ambalajda sunulur.Beyaz , homojen krem kıvamındadır.
- ÇİNKO OKSİT etkin madde olarak çinko oksit içerir.
- ÇİNKO OKSİT Çocuk bezi dermatiti(pişik), deri tahrişleri, harici ülserler (yatak yarası, şeker hastalığı), güneş yanıkları, enfekte olmamış yara ve yanıklar ile meme başı çatlakları gibi deri lezyonlarının iyileştirilmesinin hızlandırılması ve derinin korunmasında kullanılır.

2.CİNKO OKSİT 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CİNKO OKSİT 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer içeriğinde bulunan maddelere karşı allerji durumunuz varsa ÇİNKO OKSİT'i kullanmayınız.

ÇİNKO OKSİT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

- -Haricen kullanılır.
- -Göz ile temasdan sakınınız.
- -Kullandıkdan sonra ellerinizi yıkayınız.

CİNKO OKSİT 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

ÇÎNKO OKSÎT haricen kullanılır. Bu sebeple ÇÎNKO OKSÎT i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileliğinizin esnasında gerekli olmadığı sürece ÇİNKO OKSİT kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Emzirme döneminde doktorunuza danışmadan ÇİNKO OKSİT kullanmayınız. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

ÇİNKO OKSİT in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

CİNKO OKSİT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler

Herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ÇİNKO OKSİT'in herhangi bir ilaçla etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ÇİNKO OKSİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!

Çocuk bezi dermatiti(pişik) ve basit deri tahrişleri ile cilt kızarıklıklarında günde üç defa, gerekiyorsa daha fazla uygulanır

Uygulama yolu ve metodu:

ÇİNKO OKSİT haricen kullanılır. Yaranın iyice temizlenmesinden ve pansumanından sonra, etkilenmiş yüzeye ince bir tabaka halinde uygulanır. Yüzeysel, enfekte olmamış yaralar ve yanıklarda, eğer gerekli ise, gazlı bezle kapatılarak tabaka halinde tatbik edilir.

Çocuklarda kullanım:

Cocuklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Yaslılarda kullanım:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Özel kullanım durumları:

Eğer ÇİNKO OKSİT 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ÇİNKO OKSİT kullandıysanız:

ÇİNKO OKSİT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Etkin maddenin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir. Ancak kaza ile yutulması durumunda hastanın belirtilerine yönelik uygun tedavi uygulanmalıdır. Böyle bir durumda lütfen doktorunuza başvurunuz. Özel bir panzehiri yoktur.

ÇİNKO OKSİT 'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.

CİNKO OKSİT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ÇİNKO OKSİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ÇİNKO OKSİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın(10 hastanın en az 1'inde görülebilir); yaygın(10 hastanın 1'den az fakat 100 hastanın 1'inden fazlasında görülebilir);

yaygın olmayan(100 hastanın 1'den az fakat 1000 hastanın 1'inden fazlasında görülebilir) seyrek (0 hastanın 1'den az fakat 10000 hastanın 1'inden fazlasında görülebilir); çok seyrek(10000 hastanın en az 1'inde görülebilir), bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları: Seyrek de olsa aşırı duyarlılık (kızarıklık, kaşıntı, ciltde hassasiyet gibi) reaksiyonlar

Aşağıdakilerden biri olursa, ÇİNKO OKSİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

soluk almada güçlük ,ani ve şiddetli deri döküntüsü

Bunların hepsi çok ciddi,ancak seyrek görülen yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÇİNKO OKSİT'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık,
- İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı,
- İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

6. ÇİNKO OKSİT' in saklanması

ÇİNKO OKSİT 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklavınız.

Bu ilacı, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta ve kapağı kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ÇİNKO OKSİT 'i kullanmayınız

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri <u>www.tick.gov.tr</u> sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 8000 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arıyarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakda olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Ruhsat sahibi : Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14

Pendik/İstanbul

Üretim yeri : Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14

Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı .../... tarihinde onaylanmıştır.