

KULLANMA TALİMATI

BATTICON® Pomad

Deriye uygulanır.

- **Etkin Madde:** 100 g krem 10 g povidon-iyot 30/06 içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Sodyum hidrojenkarbonat, polietilen glikol, polietilen glikol 4000, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BATTICON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BATTICON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BATTICON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BATTICON'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BATTICON nedir ve ne için kullanılır?

- BATTICON deriye uygulanan ve ~~antiseptik olarak~~ **mikroplardan arındırma amacıyla** kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
- 20 g ve 70 g'lık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır.

- BATTICON küçük kesikler ve sıyrıklarda, küçük cerrahi işlemlerde ve küçük yanıklarda enfeksiyonunun yerel tedavisi veya önlenmesinde kullanılan geniş etki alanına sahip bir ~~antiseptiktir~~ **mikroptan arındırıcı maddedir**. Mantar kaynaklı ve bakteri kaynaklı deri enfeksiyonlarının tedavisinde, dokunun kanlanması bozulduğu bası ve kan akımının durduğu ~~staz yaralarındaki~~ **bölgelerde kanın göllenmesi nedeniyle oluşan yaralardaki** enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

2. BATTICON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BATTICON aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- İyoda karşı hassasiyetiniz varsa,
- 2 yaşın altındaki çocuklarda,
- Tiroid bozukluğunuz (özellikle nodüler kolloidal guatr, endemik guatr ve Hashimoto tiroiditi) varsa düzenli kullanımında

BATTICON ‘u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Hamileyseniz,
- ~~Dekompoze~~ **Vücudun kan dolaşım dengesini kuramadığı** kalp yetmezliğiniz varsa,
- Böbrek yetmezliğiniz varsa zarar görmüş deride düzenli uygulama sırasında
- Lityum tedavisi görüyorsanız düzenli kullanımından kaçınınız
- Uzun süreli kullanımda tiroid fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BATTICON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında düzenli kullanımından kaçınılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

BATTICON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BATTICON'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Civalı bileşiklerle birlikte BATTICON kullanılmaz, çünkü ~~kostik~~-yakıcı bileşiklerin oluşma riski vardır.

BATTICON'un içeriğindeki iyodun hasarlı veya sağlam deriden emilimi tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir. Dışkıda gizli kan veya idrarda kan arama amacıyla yapılan testler povidon iodür ile ~~kontamine~~-bulaşma olursa yanlış pozitif sonuç verebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BATTICON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Enfeksiyon tedavisi için maksimum 14 gün günde bir veya iki kez uygulanır.

Enfeksiyonun önlenmesi için gerektiği sürece haftada bir veya iki kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Etkilenmiş bölge temizlenmiş ve kurutulmuş olmalıdır. BATTICON'u etkilenmiş bölgeye uygulayınız. Üzeri bandaj ile kapatılabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaz

Yaşlılarda kullanım:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları**Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer BATTICON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BATTICON kullandıysanız:

BATTICON'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BATTICON'u kullanmayı unutursanız:

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. *Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BATTICON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Sıklığı bilinmiyor :

~~Lokal deri reaksiyonları, geniş yaralara ve şiddetli yanıklara uygulanması durumunda metabolik asidoz, hipernatremi ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilir.~~

Deride yerel kızarıklık; geniş yaralara ve şiddetli yanıklara uygulanması durumunda bulantı, kusma, normale göre daha hızlı ve derin soluk alma, yorgunluk, halsizlik, ödeme neden olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BATTICON'un Saklanması

*BATTICON'u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BATTICON'u kullanmayınız.
Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BATTICON'u kullanmayınız.*

Ruhsat Sahibi: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 – SAMSUN

Tel : (0362) 431 60 45

(0362) 431 60 46

Fax : (0362) 431 96 72

Üretim Yeri: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 – SAMSUN

Tel : (0362) 431 60 45

(0362) 431 60 46

Fax : (0362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı en son 'de onaylanmıştır.