

## MOWNIT laboratorium 10

### Równania różniczkowe zwyczajne - część 2

#### Zadanie 1

Dynamika układu drapieżca-ofiara opisana jest modelem Lotki–Volterry:

$$x' = x(\alpha_1 - \beta_1 y)$$

$$y' = y(-\alpha_2 + \beta_2 x)$$

gdzie:

$x(t)$  – gęstość ofiar (np. liczba zajęcy na jednostkę powierzchni) w zależności od czasu

$y(t)$  – gęstość drapieżców (np. liczba rysi na jednostkę powierzchni) w zależności od czasu

$\alpha_1$  – współczynnik przyrostu ofiar (np. zajęcy) w izolowanym środowisku

$\alpha_2$  – współczynnik ubywania drapieżców (np. rysi) w izolowanym środowisku

$\beta_1$  – współczynnik intensywności kontaktów między drapieżcami a ofiarami, kończących się upolowaniem ofiary

$\beta_2$  – współczynnik opisujący wpływ obecności ofiar na współczynnik przyrostu drapieżców

Wartości początkowe:  $x(0) = 20$

$y(0) = 20$

Parametry:  $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0.5, \beta_1 = 0.1, \beta_2 = 0.02$

Rozwiąż powyższy układ równań metodami:

- jawną Eulera

$$y_{k+1} = y_k + h_k + f(t_k, y_k)$$

- niejawną Eulera

$$y_{k+1} = y_k + h_k f(t_{k+1}, y_{k+1})$$

- półjawną Eulera

$$x_{n+1} = x_n + h_n f(x_n, y_{n+1})$$

$$y_{n+1} = y_n + h_n g(x_n, y_{n+1})$$

- Rungego–Kutty czwartego rzędu (RK4)

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h_k}{6}(k_1 + 2k_2 + 3k_3 + k_4), \text{ gdzie}$$

$$k_1 = f(t_k, y_k)$$


$$k_2 = f\left(t_k + \frac{h_k}{2}, y_k + \frac{h_k k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = f\left(t_k + \frac{h_k}{2}, y_k + \frac{h_k k_2}{2}\right)$$


$$k_4 = f(t_k + h_k, y_k + h_k k_3)$$

a)


Na wspólnym rysunku narysuj wykresy liczebności obu populacji w zależności od czasu. Na osobnym rysunku narysuj portret fazowy układu, tj. wykres trajektorii punktu  $(x(t), y(t))$  w funkcji czasu. Podaj jego fizyczną interpretację.




Rysunek 1: Wykres zależności gęstości obu populacji od czasu



Rysunek 2: Wykres gęstości populacji drapieżników od czasu



Rysunek 3: Wykres gęstości populacji ofiar od czasu



Rysunek 4: Wykres trajektorii punktu  $(x(t), y(t))$

Fizyczna interpretacja: w przypadku metody półjawną oraz metody Rungego – Kutty, gęstości populacji są stałym cyklu, czyli poziom populacji jest stabilny (z dokładnością do tego cyklu). W przypadku pozostałych metod nie obserwujemy stałego cyklu, co oznacza że populacja będzie się jeszcze zmieniała.

**b)**

Dla jakich warunków początkowych liczebności populacji nie ulegają zmianie? Znajdź punkty stacjonarne powyższego układu, rozwiązując układ równań:

$$\begin{cases} x' = x(\alpha_1 - \beta_1 y) = 0 \\ y' = y(-\alpha_2 + \beta_2 x) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = \frac{\alpha_2}{\beta_2} \\ y = \frac{\alpha_1}{\beta_1} \end{cases}$$


$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = 25 \\ y = 10 \end{cases}$$

**c)**

Czy zachowany jest niezmiennik:

$$H(x, y) = \beta_2 x + \beta_1 y - \alpha_2 \ln(x) - \alpha_1 \ln(y)$$

Na wspólnym rysunku przedstaw wykresy tego niezmiennika znalezione przez każdą metodę numeryczną.



Rysunek 5: Wykresy niezmiennika  $H(x, y)$  w funkcji czasu dla każdej metody

d)

Wiemy, że na przestrzeni lat populacja rys i zajęcy kształtowała się wg danych przedstawionych w pliku LynxHare.txt. Wybierz jedną z powyższych metod numerycznych i oszacuj prawdziwe wartości współczynników  $\theta = [\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2]$ . W tym celu wykonaj minimalizację funkcji kosztu. Jako funkcję kosztu wykorzystaj sumę kwadratów reszt (ang. residual sum of squares):

$$L(\theta) = \sum_{i=0}^T (l_i - \hat{l}_i)^2 + (h_i - \hat{h}_i)^2$$

gdzie  $l_i$  oznacza prawdziwą liczbę rys,  $\hat{l}_i$  oznacza liczbę rys wyznaczonych metodą numeryczną, a  $h_i$  oznacza prawdziwą liczbę zajęcy,  $\hat{h}_i$  oznacza liczbę zajęcy wyznaczonych metodą numeryczną. Ponieważ nie znamy gradientu  $\nabla_{\theta} L(\theta)$ , do minimalizacji wykorzystaj metodę Nelder-Meada, która nie wymaga informacji o gradiencie.

Powtórz obliczenia, tym razem jako funkcję kosztu wykorzystując:

$$L(\theta) = -\sum_{i=0}^T l_i \ln(\hat{l}_i) - \sum_{i=0}^T h_i \ln(\hat{h}_i) + \sum_{i=0}^T \hat{l}_i + \sum_{i=0}^T \hat{h}_i$$

## Wyniki

- Dla pierwszej funkcji kosztu:

$$\alpha_1 \approx 0.2093, \alpha_2 \approx 2.2933, \beta_1 \approx 0.0054, \beta_2 \approx 0.0844$$

- Dla drugiej funkcji kosztu:

$$\alpha_1 \approx 0.1303, \alpha_2 \approx 3.715, \beta_1 \approx 0.0033, \beta_2 \approx 0.1300$$

## **Wnioski**

Dzisiejsze laboratorium pokazało jak można praktycznie wykorzystać numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych, w tym przypadku do modelowania dynamiki zmian populacji zwierząt, wykorzystując model Lotki–Volterry. Pokazało też różnice w dokładności obu metod poprzez porównanie wartości niezmienników wyliczonych dla każdej z nich.

## **Źródła**

- plik lab9-intro.pdf na teams (było to wprowadzenie do lab9 i 10)