

RELATÓRIO SEMANAL EL NIÑO

Sala de Situação do Centro Integrado de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Mato Grosso (CIEVS-MT)
· Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde (ARARAS MT)

Semana Epidemiológica 34/2026 · 17 a 23 de agosto de 2026

Atualizado em 21/08/2026 às 08h43

Padrão de referência: Painel El Niño 2026–2027, boletim mensal n.º 02 (2026-07) · trimestre agosto–setembro–outubro (ASO)/2026 (INMET; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); CEMADEN; Serviço Geológico do Brasil (SGB); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC); Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), 2026).

Dados operacionais: ARARAS MT · referência 21/08/2026.

Fontes climáticas oficiais consultadas incluem o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

Indicadores climáticos de referência: temperatura máxima (T_{máx}), umidade relativa (UR) e material particulado fino com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 µm (PM_{2,5}).

Base normativa: Portaria n.º 0590/2026/GBSES, que institui a Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026–2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT, 2026).

A projeção operacional de aproximadamente 7 dias não substitui a previsão climática sazonal. Os produtos possuem objetivos e horizontes temporais distintos.

1. Resumo executivo

Dimensão	Situação atual	Tendência ~7 dias	Cobertura	Leitura
El Niño	Ativo	persistência	—	Forte, com alta probabilidade de muito forte (anomalia Temperatura da Superfície do Mar (TSM) > 2,0 °C) na primavera/verão 2026
Calor	Atenção moderada	agravamento disseminado	142 de 142 (100,0%)	32,9 °C
Umidade	Atenção	tendência não calculável	142 de 142 (100,0%)	54%
Fogo	Focos detectados em 118 de 142 municípios	agravamento disseminado	não caracterizada por esta estrutura da base	53.679 focos (7 dias)
Qualidade do ar	Atenção localizada — 13 de 142 (9,2%) municípios $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	agravamento disseminado	142 de 142 (100,0%)	11,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Recursos hídricos	Sinais heterogêneos no recorte disponível	tendência não calculável	10 de 142 (7,0%)	Interpretação limitada pela cobertura parcial.
Municípios em risco integrado elevado	43 de 142 (30,3%)	agravamento disseminado	142 de 142 (100,0%)	Projeção ~7 dias: 136 de 142 (95,8%) nas classes vermelha ou roxa

Nota: referências operacionais — Painel El Niño/National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); Tmáx e UR medianas municipais; focos INPE (7 dias); PM_{2,5} mediano; situação hidrológica municipal; classificação ARARAS.

Destaques da rodada

- 43 de 142 (30,3%) — municípios nas classes vermelha ou roxa.
- 38,5 °C — maior Tmáx municipal (Novo Santo Antônio).
- 53.679 focos — acumulado de sete dias.
- 13 de 142 (9,2%) — municípios com PM_{2,5} $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- 136 municípios — permanecem nas classes vermelha ou roxa na projeção de sete dias.

Preparação assistencial induzida pelo clima: quando há convergência de calor, baixa umidade e fumaça, avaliar capacidade assistencial, comunicação de risco e cobertura de estoques relacionados aos agravos esperados — sem substituir decisão da gestão.

- Cenário: El Niño confirmado (NOAA, 11/06/2026) · intensidade Forte, com alta probabilidade de muito forte (anomalia TSM > 2,0 °C) na primavera/verão 2026
- Território MT: 43 de 142 (30,3%) nas classes vermelha ou roxa

- Onde priorizar: consultar mapas e municípios prioritários (seções 6 e 11)

2. Cenário El Niño

No dia 11 de junho de 2026, a NOAA decretou o estabelecimento de condições de El Niño no Pacífico Equatorial. Nas semanas anteriores ao boletim, os desvios de TSM atingiram 1,4 °C na região Niño 3.4, 1,8 °C no Niño 3 e 3,0 °C no Niño 1+2. Os padrões atmosféricos (ventos de oeste em baixos níveis, Índice de Oscilação Sul (SOI) negativo) são consistentes com a resposta típica de El Niño.

Indicador	Observado	Referência
El Niño—Oscilação Sul (ENSO)	El Niño confirmado (NOAA, 11/06/2026)	classificação oficial da fonte
Niño 3.4	1,4 °C (semanas anteriores ao boletim)	limiares NOAA / Painel El Niño

As médias mensais de Niño 3.4 vêm positivas desde março de 2026. A APEC Climate Center (APCC) indica 100% de probabilidade de manutenção de El Niño forte até o final de 2026. A NOAA indica 81% de probabilidade de atingir a categoria muito forte no trimestre outubro–novembro–dezembro.

Fonte: Painel El Niño 2026–2027, boletim n.º 02, 2026-07.

3. Cenário sazonal — Brasil → Amazônia Legal → Mato Grosso

A previsão Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/INPE, INMET e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) para ASO/2026 indica precipitação abaixo da faixa normal no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste) e acima da normal no Sul, podendo estender-se ao sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A temperatura fica acima da normal em praticamente todo o País, favorecendo ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas.

- Chuva (Brasil): Abaixo da média no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste); acima da média no Sul. PREVISÃO OFICIAL
- Temperatura (Brasil): Acima da média em praticamente todo o país — ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas. PREVISÃO OFICIAL

Amazônia Legal e Mato Grosso

ASO marca o fim da estação seca e o início irregular da transição chuvosa na Amazônia Legal. Os menores acumulados concentram-se no centro-sul, especialmente em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, centro-sul de Rondônia e sul do Pará (agosto frequentemente < 20 mm). O CENSIPAM indica chuvas abaixo da média no centro-norte da Amazônia Legal; no extremo sul de Mato Grosso há sinal de precipitação acima da média histórica, ainda na estiagem — pancadas irregulares intercaladas por períodos secos. O El Niño tende a atrasar a estação chuvosa no sul da Amazônia e a manter temperatura acima da média.

- Chuva em MT: Centro-norte do Brasil abaixo da média. Extremo sul de MT com sinal de chuva acima da climatologia, ainda na estiagem (pancadas irregulares; agosto/setembro com climatologia baixa).
- Temperatura em MT: Acima da média na Amazônia Legal — atraso da estação chuvosa no sul da Amazônia.

4. Mato Grosso — Situação atual OBSERVADO

Municípios no recorte: 142

Níveis: classes vermelha e roxa 43 · laranja 47 · amarelo 50 · detalhe amarela: 50; laranja: 47; vermelha: 24; roxa: 19; verde: 2

Tabela 1 – Indicadores climáticos e ambientais selecionados, Mato Grosso, SE 34/2026

Indicador	Observado	Unidade	Referência/parâmetro	Cobertura
Temperatura máxima mediana	32,9	°C	calor seco se $T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ (operacional)	142 de 142 (100,0%)
Umidade relativa mediana	54	%	$UR \leq 30\%$ (parâmetro operacional ARARAS)	142 de 142 (100,0%)
PM2,5 mediano	11,9	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ = atenção sanitária desta rodada	142 de 142 (100,0%)
Índice Universal de Temperatura Térmica (UTCI) proxy mediano	31,8	°C	conforto térmico (proxy)	142 de 142 (100,0%)

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT. Rodada 21/08/2026 às 08h43. Data de referência: 21/08/2026.

Temperatura máxima mediana: 32,9 °C. Cobertura: 142 de 142 (100,0%) municípios com dado válido. Extremo municipal: 38,5 °C em Novo Santo Antônio. Percentil 90 da rodada: 36,6 °C (distribuição desta rodada, não climatologia histórica). Parâmetro operacional de apoio: $T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$, combinada a umidade $\leq 30\%$, define calor seco nesta rodada. Limitação: a rodada não dispõe de climatologia municipal validada para comparação histórica deste indicador.

Umidade relativa mediana estadual: 54%. Municípios com $UR \leq 30\%$: 2 de 142 (1,4%). Cobertura: 142 de 142 (100,0%). O limiar de 30% é parâmetro operacional do ARARAS para desconforto, ressecamento de vias aéreas e risco de fogo; não substitui o aviso oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

PM2,5 mediano: 11,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. P90 da rodada: 24,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. 13 de 142 (9,2%) apresentaram PM2,5 igual ou superior a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (parâmetro operacional de atenção sanitária do painel, alinhado a faixas de qualidade do ar). Cobertura espacial: 142 de 142 (100,0%). Interpretação sanitária: exposição à fumaça/partículas finas, com atenção a agravos respiratórios — associação temporal, sem inferência causal.

Interpretação da situação climática atual

Nesta rodada, 43 de 142 (30,3%) municípios estão nas classes vermelha ou roxa. A leitura integrada deve considerar, em conjunto, temperatura, umidade, qualidade do ar e hidrologia, sem tratar correlação espacial como causalidade.

5. Mato Grosso — Projeção operacional (~7 dias)


A projeção operacional do ARARAS MT estima a classificação municipal para aproximadamente sete dias, permitindo comparação com a situação atual.

Distribuição projetada: roxa: 127; vermelha: 9; laranja: 4; amarela: 2


6. Mapa atual × mapa ~7 dias

Mapa 1 – Classificação integrada de risco em Mato Grosso, 17 a 23 de agosto de 2026 (atual e ~7 dias)

(a)




(b)



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 21/08/2026 às 08h43.

Nota: as duas faces usam a mesma escala de classes (verde a roxo) para comparação visual direta.

Mapa 2 – Variação projetada da classificação de risco em aproximadamente sete dias



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 21/08/2026 às 08h43.

Municípios com dados comparáveis: 141 de 142 (99,3%).

- Melhora: 1 de 141 (0,7%)
- Estabilidade: 22 de 141 (15,6%)
- Aumento de 1 nível: 28 de 141 (19,9%)
- Aumento de 2 ou mais níveis: 90 de 141 (63,8%)
- Sem pareamento válido: 1

Na projeção de aproximadamente sete dias, entre 141 municípios com dados comparáveis: melhora em 1 de 141 (0,7%); estabilidade em 22 de 141 (15,6%); aumento de 1 nível em 28 de 141 (19,9%); aumento

de 2 ou mais níveis em 90 de 141 (63,8%). Em 1 município (1 de 142 (0,7%)) não houve pareamento válido entre situação atual e projeção nesta rodada.

Determinantes do agravamento projetado

A projeção operacional de aproximadamente sete dias eleva o território de 43 de 142 (30,3%) para 136 de 142 (95,8%) municípios nas classes vermelha ou roxa, com 118 de 141 (83,7%) municípios comparáveis em elevação de classe.

Determinante	Municípios afetados (entre os que agravam)	Contribuição para a projeção	Tendência
Temperatura máxima prevista (T _{máx} máx. 7d ≥ 37 °C)	66	moderada	^
Temperatura extrema prevista (T _{máx} máx. 7d ≥ 40 °C)	4	baixa	^
Estresse térmico previsto (UTCI máx. 7d ≥ 36)	51	moderada	^
Risco cumulativo de calor (máx. 7d ≥ 7)	119	alta	^
Dias com onda de calor prevista no horizonte	119	alta	^
Umidade relativa atual ≤ 30% (contexto nos que agravam)	1	baixa	v
PM _{2,5} atual ≥ 25 µg/m ³ (contexto nos que agravam)	9	baixa	→
Focos de calor (7 dias) nos que agravam	100	alta	→

A classificação projetada deriva da regra operacional ARARAS aplicada aos extremos previstos na janela de sete dias (Tmáx, UTCI, risco cumulativo e dias de onda de calor), fonte openmeteo_forecast_7d. Os demais indicadores (umidade, PM2,5, fogo) descrevem o contexto atual dos municípios que sobem de classe e não entram diretamente no score de predição nesta versão.

Situação atual OBSERVADO

- Amarelo: 50 municípios
- Laranja: 47 municípios
- Vermelho: 24 municípios
- Roxo: 19 municípios

Projeção ~7 dias PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS

- Amarelo: 2 municípios
- Laranja: 4 municípios
- Vermelho: 9 municípios
- Roxo: 127 municípios

Mudança esperada

- Aumento de 2+ níveis: 90 municípios
- Aumento de 1 nível: 28 municípios
- Estabilidade: 22 municípios
- Melhora: 1 município

Legenda: Situação favorável — monitoramento de rotina. · Atenção — acompanhar evolução e reforçar comunicação. · Alerta — preparação proporcional e articulação regional. · Alerta elevado — revisar capacidade assistencial e estoques. · Situação excepcional — mobilização plena e validação pela gestão.

7. Alertas meteorológicos e ambientais — Mato Grosso

Parâmetro climático oficial para a semana SE 34/2026 (17 a 23 de agosto de 2026).

Recorte territorial: Estado de Mato Grosso. Alertas do INMET listam apenas trechos que abrangem MT; Mato Grosso do Sul (MS) é excluído.

Situação climática de referência (avisos vigentes): 1 aviso INMET com validade contendo o horário de emissão deste relatório (INMET, 2026).

Projeção operacional (avisos futuros na semana): 3 avisos com início posterior à data de referência — leitura de tendência imediata PREVISÃO OFICIAL (INMET, 2026).

CEMADEN: nenhum alerta aberto em MT na consulta (CEMADEN, 2026).

Síntese integrada de alertas: classificação municipal disponível (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) — avisos vigentes

Fenômeno	Severidade	Início da validade	Fim da validade	Área em Mato Grosso
Baixa Umidade	Perigo potencial	21/08/2026 às 00h00	21/08/2026 às 23h59	Centro-Sul Mato-grossense; Nordeste Mato-grossense; Norte Mato-grossense; Sudeste Mato-grossense; Pantaneais Sul Mato-grossense; Sudoeste Mato-grossense

Consulta: 21/08/2026 às 08h47. Fonte: feed Alert-AS / portal INMET (INMET, 2026).

INMET — avisos futuros na semana (previsão oficial)

Fenômeno	Severidade	Início da validade	Fim da validade	Área em Mato Grosso
Baixa Umidade	Perigo	21/08/2026 às 11h00	21/08/2026 às 18h00	Nordeste Mato-grossense; Norte Mato-grossense; Sudeste Mato-grossense; Centro-Sul Mato-grossense; Pantaneais Sul Mato-grossense
Baixa Umidade	Perigo potencial	22/08/2026 às 11h01	22/08/2026 às 21h00	Centro-Sul Mato-grossense; Nordeste Mato-grossense; Norte Mato-grossense; Sudeste Mato-grossense; Pantaneais Sul Mato-grossense; Sudoeste Mato-grossense
Baixa Umidade	Perigo	22/08/2026 às 11h00	22/08/2026 às 18h00	Centro-Sul Mato-grossense; Nordeste Mato-grossense; Norte Mato-grossense; Sudeste Mato-grossense; Pantaneais Sul Mato-grossense; Sudoeste Mato-grossense

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)

Nenhum alerta aberto do CEMADEN para Mato Grosso nesta consulta.

Fonte: Painel CEMADEN (CEMADEN, 2026). Consulta: 21/08/2026 às 08h47.

Síntese integrada de alertas meteorológicos e ambientais

- Municípios no recorte: 142
- Distribuição da classificação integrada: amarela: 50; laranja: 47; roxa: 19; verde: 2; vermelha: 24

Fontes integradas: INMET, CEMADEN, saturação do solo, risco hidrológico e classificação ARARAS (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).

8. Recursos hídricos / seca / estiagem

Em junho de 2026 a área com seca no Centro-Oeste era quase três vezes menor que em junho de 2023 (22%; predominância de seca fraca). Mato Grosso ficou livre de seca na atualização de junho/2026 do Monitor de Secas. Isso não anula o risco de fogo no ASO nem a seca na bacia do Paraguai.

- Limitação dos dados. A cobertura hidrológica desta rodada corresponde a 10 de 142 (7,0%); os resultados não devem ser extrapolados para todo o estado. Distribuição hidrológica no recorte disponível: ver tabela abaixo. Os sinais de baixa disponibilidade hídrica local não equivalem automaticamente à classificação do Monitor de Secas (produto distinto, com outra escala e competência temporal). Índice de saturação do solo: mediana 13/100 (escala normalizada 0–100 a partir de umidade volumétrica Open-Meteo; parâmetro entre ponto de murcha 0,05 e saturação de referência 0,42 m³/m³). 13 pontos em escala de 0 a 100; sem faixa de interpretação institucional validada nesta rodada.
- Situação hidro no recorte disponível: Sinal hidrológico de baixa disponibilidade (nível baixo): 6; Risco elevado de inundação: 4
- Precipitação mediana no dia de referência operacional: 0,0 mm · municípios sem chuva nesse dia: 142 de 142 (100,0%)

Limitação dos dados hidrológicos

Limitação dos dados. A leitura hidrológica desta rodada está restrita aos municípios com observação válida; os resultados não devem ser extrapolados para todo o estado. Sinais hidrológicos locais de baixa disponibilidade não substituem a classificação do Monitor de Secas.

9. Fogo e qualidade do ar

A previsão de risco de fogo para ASO intensifica o alerta alto no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, e na maior parte da Região Norte. Para a Amazônia Legal, o análogo CENSIPAM 2023/2024 aponta queimadas intensas em Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e na região AMACRO.

- 53.679 focos de calor registrados no acumulado de sete dias (fonte INPE integrada ao ARARAS). Focos detectados em 118 de 142 municípios. Cobertura espacial: não caracterizada por esta estrutura da base (linhas apenas para municípios com detecção). Maior valor municipal: 8.849 focos em Colniza.
- Índice de Qualidade do Ar (IQA) (classes, ordem operacional): verde: 118; amarela: 11; laranja: 12; vermelha: 0; roxa: 1; cinza: 0
- PM_{2,5} mediano: 11,9 µg/m³. P90 da rodada: 24,4 µg/m³. 13 de 142 (9,2%) apresentaram PM_{2,5} igual ou superior a 25 µg/m³ (parâmetro operacional de atenção sanitária do painel, alinhado a faixas de qualidade do ar). Cobertura espacial: 142 de 142 (100,0%). Interpretação sanitária: exposição à fumaça/partículas finas, com atenção a agravos respiratórios — associação temporal, sem inferência causal.

Implicações para a saúde — fogo e ar

A combinação de focos de calor e material particulado fino reforça a vigilância de agravos respiratórios nos municípios prioritários.

10. Impactos potenciais à saúde

Associação temporal/espacial — não implica causalidade.

Evento	Exposição	Agravos a monitorar	Indicadores disponíveis
Seca e estiagem	Baixa umidade	Desidratação e irritações ocular e respiratória	UR, T _{máx} e atendimentos
Incêndios e fumaça	PM _{2,5}	Agravamento de doenças respiratórias	PM _{2,5} , Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e internações
Calor extremo	Estresse térmico	Desidratação e agravos relacionados ao calor	T _{máx} , UTCI e atendimentos
Chuva intensa	Inundações	Doença Diarreica Aguda (DDA), leptospirose e traumas	Chuva, alertas e notificações
Tempestades	Ventos fortes e descargas atmosféricas	Traumas	Avisos do INMET

Monitoramento epidemiológico — dados observados

- Respiratórios/fumaça: 13 de 142 (9,2%) com PM_{2,5} ≥ 25 µg/m³ em 21/08/2026.
- Calor/desidratação: 2 municípios em condição combinada de calor seco (T_{máx} ≥ 37 °C e UR ≤ 30%).
- Arboviroses: 143 casos em 7 dias no recorte com dado (ausência não é zero).
- Hidrorelacionados: 10 municípios com sinal hidrológico de alerta no recorte disponível.

Epidemiologia operacional (janela 7 dias)

- Intoxicação exógena (sinal de fumaça): 0 notificações; 0 com sinal de fumaça.
- Internações hospitalares: dados não estavam disponíveis para esta rodada.

Leitura epidemiológica

Associação temporal e espacial não implica causalidade. Sinais assistenciais e de notificação devem ser lidos com a defasagem das fontes e com a cobertura de cada indicador.

11. Municípios e regionais prioritários

Regionais de saúde

Regional	Amarelo+	Laranja+	Verm.+Roxa	Tend. ~7d	Tmáx med.
Água Boa	8	8	8	subindo: 6; estável: 2	36,7 °C
Porto Alegre do Norte	7	7	6	subindo: 5; estável: 2	36,4 °C
São Félix do Araguaia	5	5	5	subindo: 3; estável: 2	37,5 °C
Sinop	15	15	4	subindo: 11; estável: 4	34,3 °C
Barra do Garças	10	7	4	subindo: 9; descendo: 1	33,9 °C
Colíder	6	6	3	subindo: 5; estável: 1	34,5 °C
Alta Floresta	6	6	3	subindo: 5; estável: 1	33,8 °C
Juína	7	7	3	subindo: 7	32,8 °C
Baixada Cuiabana	11	4	2	subindo: 9; estável: 2	30,5 °C
Rondonópolis	19	5	2	subindo: 16; estável: 3	29,8 °C
Peixoto de Azevedo	5	5	1	subindo: 5	34,2 °C
Tangará da Serra	10	2	1	subindo: 9; estável: 1	30,6 °C

Municípios prioritários para resposta e preparação

Município	Regional	Atual	~7 dias	Tmáx	UR	PM2,5	Focos 7d
Sinop	Sinop	Roxa	Roxa	35,1 °C	43%	17,4 µg/m ³	227
Sorriso	Sinop	Roxa	Roxa	35,4 °C	43%	8,7 µg/m ³	103
Lucas do Rio Verde	Sinop	Roxa	Roxa	34,3 °C	44%	10,1 µg/m ³	225

Município	Regional	Atual	~7 dias	Tmáx	UR	PM2,5	Focos 7d
Alta Floresta	Alta Floresta	Roxa	Roxa	34,3 °C	51%	9,6 µg/m³	58
Cuiabá	Baixada Cuiabana	Roxa	Roxa	30,5 °C	56%	11,9 µg/m³	104
Barra do Garças	Barra do Garças	Roxa	Vermelha	31,7 °C	49%	14,7 µg/m³	2.056
Cáceres	Cáceres	Roxa	Roxa	28,5 °C	58%	9,8 µg/m³	207
Nova Mutum	Sinop	Roxa	Roxa	33,3 °C	47%	10,0 µg/m³	116
Primavera do Leste	Rondonópolis	Roxa	Roxa	31,5 °C	53%	13,2 µg/m³	13
Porto Alegre do Norte	Porto Alegre do Norte	Roxa	Roxa	37,9 °C	35%	38,6 µg/m³	121
Tangará da Serra	Tangará da Serra	Roxa	Roxa	27,3 °C	65%	9,2 µg/m³	385
Rondonópolis	Rondonópolis	Roxa	Roxa	31,3 °C	50%	14,4 µg/m³	52
Várzea Grande	Baixada Cuiabana	Roxa	Roxa	30,6 °C	50%	11,2 µg/m³	94
Marcelândia	Colíder	Roxa	Roxa	34,0 °C	67%	78,5 µg/m³	1.463
Luciara	São Félix do Araguaia	Roxa	Roxa	38,1 °C	34%	32,9 µg/m³	329

Índice de prioridade de preparação clima-saúde

Município	Regional	Classe atual	Prioridade de preparação (0–100)	Faixa	Principal determinante
Barra do Garças	Barra do Garças	Roxa	56,3	Alta	pressão assistencial
Cáceres	Cáceres	Roxa	55,8	Alta	pressão assistencial
Sinop	Sinop	Roxa	55,8	Alta	pressão assistencial

Município	Regional	Classe atual	Prioridade de preparação (0–100)	Faixa	Principal determinante
Cuiabá	Baixada Cuiabana	Roxa	55,6	Alta	pressão assistencial
Sorriso	Sinop	Roxa	54,1	Moderada	pressão assistencial
Alta Floresta	Alta Floresta	Roxa	53,8	Moderada	pressão assistencial
Tangará da Serra	Tangará da Serra	Roxa	53,8	Moderada	pressão assistencial
Marcelândia	Colíder	Roxa	52,3	Moderada	pressão assistencial
Lucas do Rio Verde	Sinop	Roxa	52,2	Moderada	pressão assistencial
Porto Alegre do Norte	Porto Alegre do Norte	Roxa	51,6	Moderada	pressão assistencial
Várzea Grande	Baixada Cuiabana	Roxa	51,4	Moderada	pressão assistencial
Rondonópolis	Rondonópolis	Roxa	50,6	Moderada	pressão assistencial
Nova Mutum	Sinop	Roxa	50,3	Moderada	pressão assistencial
Ribeirão Cascalheira	Água Boa	Vermelha	49,4	Moderada	pressão assistencial
Primavera do Leste	Rondonópolis	Roxa	49,3	Moderada	pressão assistencial

O índice de prioridade de preparação (0–100) expressa a necessidade de preparação clima–saúde (maior valor = maior urgência). Combina pressão assistencial, exposição/vulnerabilidade e prioridade operacional do painel quando disponíveis. A classe climática atual é apresentada apenas como contexto territorial e não entra no score para evitar saturação em municípios na classe roxa.


11b. Síntese territorial da semana

- Regionais com maior concentração nas classes vermelha e roxa: Água Boa, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, Sinop, Barra do Garças.
- Maior T_{máx} municipal: Novo Santo Antônio (38,5 °C).
- Maior PM_{2,5} municipal: Marcelândia.
- Maior acumulado de focos (7 dias): Colniza.
- Persistência: estabilidade de classe em 22 de 141 (15,6%).

- Melhora projetada: 1 de 141 (0,7%).
- Limitação dos dados. Cobertura hidrológica: 10 de 142 (7,0%).

Cobertura de focos: não caracterizada por esta estrutura da base.

Mapa 3 – Classificação de risco climático, aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas em Mato Grosso



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e Fundação Cultural Palmares. Rodada de 21/08/2026 às 08h43.

Nota: para comunidades sem coordenadas geográficas validadas, a representação cartográfica ocorre no nível municipal e não corresponde à localização exata da comunidade. Comunidade certificada não equivale a território titulado.

Municípios com aldeias indígenas em classes vermelha ou roxa

Município	N.º de aldeias	Risco atual	Projeção ~7 dias	Principal exposição
Campinápolis	75	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Gaúcha do Norte	60	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Querência	54	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Aripuanã	41	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Tangará da Serra	37	Roxa	Roxa	risco climático elevado
Nova Nazaré	28	Roxa	Roxa	risco climático elevado, fumaça/PM2,5, calor extremo
Barra do Garças	24	Roxa	Vermelha	risco climático elevado
Canarana	19	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Marcelândia	13	Roxa	Roxa	risco climático elevado, fumaça/PM2,5
São Félix do Araguaia	13	Vermelha	Roxa	risco climático elevado, calor extremo
São José do Xingu	9	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Alto Boa Vista	8	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Ribeirão Cascalheira	5	Vermelha	Roxa	risco climático elevado, calor extremo
Santa Terezinha	5	Vermelha	Roxa	risco climático elevado, fumaça/PM2,5
Água Boa	5	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Rondonópolis	4	Roxa	Roxa	risco climático elevado
Porto Alegre do Norte	3	Roxa	Roxa	risco climático elevado, fumaça/PM2,5, calor extremo
Confresa	2	Vermelha	Roxa	risco climático elevado, calor extremo
Cotriguaçu	2	Vermelha	Roxa	risco climático elevado
Luciara	2	Roxa	Roxa	risco climático elevado, fumaça/PM2,5, calor extremo

Os quantitativos correspondem a aldeias georreferenciadas associadas ao município e não representam estimativa populacional.

Comunidades quilombolas certificadas em áreas de risco

Comunidade	Município	Risco atual	Projeção ~7 dias	Principal exposição
ABOLIÇÃO	Cuiabá	Roxa	Roxa	risco climático elevado
AGUASSÚ	Cuiabá	Roxa	Roxa	risco climático elevado
CAXIPÓ AÇÚ	Cuiabá	Roxa	Roxa	risco climático elevado
SÃO GERÔNIMO	Cuiabá	Roxa	Roxa	risco climático elevado
CHAPADINHA	Cáceres	Roxa	Roxa	risco climático elevado
EXÚ	Cáceres	Roxa	Roxa	risco climático elevado
MONJOLO	Cáceres	Roxa	Roxa	risco climático elevado
PITA CANUDOS	Cáceres	Roxa	Roxa	risco climático elevado
PONTA DO MORRO	Cáceres	Roxa	Roxa	risco climático elevado
SANTANA	Cáceres	Roxa	Roxa	risco climático elevado
SÃO GONÇALO	Cáceres	Roxa	Roxa	risco climático elevado
CAPÃO DO NEGRO CRISTO REI	Várzea Grande	Roxa	Roxa	risco climático elevado
COLONIA UNIÃO CAPÃO DE NEGRO URBANO, BAIRRO MANGA	Várzea Grande	Roxa	Roxa	risco climático elevado

Comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares não equivale necessariamente a território delimitado ou titulado.

Populações prioritárias

População/território	Exposição predominante	Evidência territorial	Ação prioritária
Crianças e idosos	Calor e fumaça	PM _{2,5} ≥ 25 µg/m ³ : 13 de 142 (9,2%)	Atenção básica e comunicação de risco
Gestantes e puérperas	Calor / desidratação	Critério de calor seco municipal quando T _{máx} ≥ 37 °C e UR ≤ 30%	Continuidade do cuidado
Pessoas com doenças crônicas	Calor e qualidade do ar	Sobreposição com classes vermelha e roxa	APS e regulação
Pessoas com deficiência	Calor e qualidade do ar	Sobreposição com classes vermelha e roxa	APS, assistência social e redes de cuidado
Trabalhadores expostos	Calor, sol, fumaça	Cenário estadual de exposição externa	VISAT/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e gestão de pessoas
Povos indígenas	Território e clima	Aldeias cruzadas com classificação de risco ARARAS	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e SMS
Comunidades quilombolas	Território e clima	Comunidades certificadas (Palmares); certificação ≠ titulação	SMS e organizações locais
Populações do campo, floresta e águas	Estiagem, fogo, água	Portaria n.º 0590/2026/GBSES	Articulação intersetorial
População em situação de rua	Calor e fumaça	Sem quantitativo nesta rodada	Rede municipal e socioassistencial
Pessoas privadas de liberdade	Calor e fumaça	Sem quantitativo nesta rodada	Sistema prisional e atenção à saúde

12. Medidor de trajetória INDICADOR DERIVADO

Score de trajetória: 53,3/100 (faixa: atenção moderada). Escala: 0 = nenhum município nas classes vermelha e roxa e sem reforço de tendência/PM_{2,5}/UR; 100 = saturação dos componentes (proporção crítica, municípios em agravamento, PM_{2,5} e UR). Referencial crítico: 99 municípios (70,0% do estado). Situação atual: 43 municípios (30,3% do estado). Diferença em relação ao referencial: 56 municípios (39,7 pontos percentuais) abaixo. Tempo até o referencial: não estimável com robustez nesta rodada (exige pelo menos três rodadas temporais válidas, tendência positiva consistente e denominadores comparáveis). Confronto metodológico: a trajetória extrapolada não publica tempo estimado (ETA) robusto nesta emissão; o modelo de projeção ~7 dias estima 136 de 142 (95,8%) municípios nas classes vermelha ou roxa. A convergência entre os dois produtos reforça a necessidade de acompanhamento antecipado.

Cenário: SECA / ESTIAGEM

Campo	Conteúdo
Situação observada	10 municípios com sinal hidrológico de alerta no recorte disponível.
CrITÉRIOS/indicadores	Situação hidrológica municipal, saturação do solo, precipitação acumulada, Monitor de Secas.
Possíveis repercussões em saúde	Desidratação, irritação ocular/respiratória, agravamento de doenças crônicas em contexto de calor associado.
Populações potencialmente mais vulneráveis	Crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, trabalhadores expostos ao ar livre.

Ações recomendadas ao município

- Vigilância em Saúde: Monitorar notificações de desidratação, arboviroses e qualidade da água; reforçar comunicação de risco.
- Atenção Primária: Identificar população vulnerável; orientar hidratação e sinais de alerta.
- Urgência e Emergência: Revisar fluxo de atendimento por desidratação e insolação.
- Assistência Farmacêutica: Avaliar estoques de soluções de reidratação oral e insumos de suporte — conforme RENAME/PCDT aplicáveis.
- Gestão: Articular com Defesa Civil, saneamento e abastecimento de água.

Ações recomendadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT)

- Consolidar municípios em estiagem; apoiar regionais; monitorar disponibilidade estratégica de insumos.

Referências técnicas: Ministério da Saúde — RENAME; protocolos estaduais de vigilância em desastres.

Cenário: ONDA DE CALOR / CALOR EXTREMO

Campo	Conteúdo
Situação observada	2 municípios em condição combinada de calor seco ($T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ e $UR \leq 30\%$).
CrITÉRIOS/indicadores	$T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ com $UR \leq 30\%$, UTCI proxy, onda de calor P95, projeção ~7 dias.
Possíveis repercussões em saúde	Exaustão pelo calor, desidratação, agravamento cardiovascular e respiratório.
Populações potencialmente mais vulneráveis	Idosos, crianças, trabalhadores expostos, moradores de habitações sem proteção térmica.

Ações recomendadas ao município

- Vigilância em Saúde: Monitorar atendimentos e internações por calor/desidratação.
- Atenção Primária: Campanhas de hidratação e horários seguros de atividade.
- Urgência e Emergência: Avaliar capacidade assistencial e necessidade de contingenciamento conforme evolução da demanda.
- Assistência Farmacêutica: Avaliar soluções, materiais de suporte e insumos previstos em protocolos oficiais.
- Gestão: Articulação com assistência social e comunicação municipal.

Ações recomendadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT)

- Priorizar municípios nas classes vermelha e roxa; apoiar regionais com maior carga térmica.

Referências técnicas: OMS/OPAS orientações de saúde em calor; MS — vigilância de agravos relacionados ao clima.

Cenário: INCÊNDIOS FLORESTAIS E FUMAÇA / QUALIDADE DO AR

Campo	Conteúdo
Situação observada	13 de 142 (9,2%) municípios com PM _{2,5} ≥ 25 µg/m ³ .
CrITÉRIOS/indicadores	PM _{2,5} , focos INPE, IQA, internações respiratórias quando disponíveis.
Possíveis repercussões em saúde	Exacerbação de asma, DPOC, SRAG; irritação ocular e respiratória.
Populações potencialmente mais vulneráveis	Crianças, idosos, gestantes, portadores de doenças respiratórias.

Ações recomendadas ao município

- Vigilância em Saúde: Monitorar SRAG, internações respiratórias e intoxicação exógena.
- Atenção Primária: Orientar medidas de redução da exposição e proteção respiratória conforme protocolos oficiais vigentes.
- Urgência e Emergência: Avaliar disponibilidade de suporte ventilatório e capacidade de resposta conforme demanda.
- Assistência Farmacêutica: Avaliar estoques de broncodilatadores e insumos respiratórios conforme protocolos oficiais.
- Gestão: Articulação com meio ambiente e Defesa Civil.

Ações recomendadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT)

- Consolidar municípios com PM_{2,5} elevado; comunicação de risco estadual.

Referências técnicas: MS — vigilância de SRAG; SINAN intoxicação exógena.

Cenário: CHUVA INTENSA / ENXURRADAS / INUNDAÇÕES

Campo	Conteúdo
Situação observada	10 municípios com sinal hidrológico de alerta no recorte disponível.
Crêterios/indicadores	Precipitação acumulada, alertas INMET/CEMADEN, situação hidro de inundação.
Possíveis repercussões em saúde	Doenças relacionadas à água, traumas, DDA.
Populações potencialmente mais vulneráveis	Moradores em áreas de risco, crianças, população ribeirinha.

Ações recomendadas ao município

- Vigilância em Saúde: Monitorar DDA, leptospirose e notificações pós-evento.
- Atenção Primária: Orientar higiene e segurança hídrica.
- Urgência e Emergência: Preparar fluxo para traumas e hipotermia.
- Assistência Farmacêutica: Avaliar insumos de suporte conforme protocolos oficiais.
- Gestão: Articulação com Defesa Civil e saneamento.

Ações recomendadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT)

- Apoiar municípios com alerta hidro; consolidar notificações regionais.

Referências técnicas: MS — vigilância de agravos relacionados a desastres; CEMADEN.

14. Preparação assistencial e farmacêutica

Avaliar capacidade e autonomia de insumos da Assistência Farmacêutica (SAF) conforme protocolos oficiais (RENAME, PCDT, notas técnicas MS/SES), orientando redução de exposição conforme protocolos vigentes. Não prescreve medicamentos.

Estoques estratégicos SES — autonomia de insumos

Atenção — última atualização da base de estoque: 18/06/2026 às 00h00.

Os valores devem ser confirmados no sistema oficial antes de qualquer decisão operacional.

Status atual: NÃO AVALIÁVEL POR DEFASAGEM (carga com 64 dias; limite institucional 14 dias).

Última informação disponível: 18/06/2026 às 00h00 — dado desatualizado para avaliação da situação corrente (SES-MT, 2026). Cobertura cadastral na carga: 12 municípios · 4 itens. 48 registros que apresentavam autonomia crítica na última carga disponível e requerem validação no sistema oficial. Não se classifica ruptura atual nem ranking operacional com esta carga.

Última situação registrada — sujeita a validação

Exibidos 20 de 48 registros da última carga.

Município	Insumo	Autonomia (carga)	Status	Estoque	Consumo médio/d
Alta Floresta	Copo descartável	0,0 d	histórica (não atual)	0	910
Alta Floresta	Equipo macro	0,0 d	histórica (não atual)	0	342
Alta Floresta	SRO	0,0 d	histórica (não atual)	0	390
Alta Floresta	Soro fisiológico 0,9%	0,0 d	histórica (não atual)	0	366
Barra do Garças	Copo descartável	0,0 d	histórica (não atual)	0	910
Barra do Garças	Equipo macro	0,0 d	histórica (não atual)	0	342
Barra do Garças	SRO	0,0 d	histórica (não atual)	0	390
Barra do Garças	Soro fisiológico 0,9%	0,0 d	histórica (não atual)	0	366
Cuiabá	Copo descartável	0,0 d	histórica (não atual)	0	3.150
Cuiabá	Equipo macro	0,0 d	histórica (não atual)	0	594
Cuiabá	SRO	0,0 d	histórica (não atual)	0	810
Cuiabá	Soro fisiológico 0,9%	0,0 d	histórica (não atual)	0	702
Cáceres	Copo descartável	0,0 d	histórica (não atual)	0	1.020
Cáceres	Equipo macro	0,0 d	histórica (não atual)	0	354
Cáceres	SRO	0,0 d	histórica (não atual)	0	410
Cáceres	Soro fisiológico 0,9%	0,0 d	histórica (não atual)	0	382

Município	Insumo	Autonomia (carga)	Status	Estoque	Consumo médio/d
Lucas do Rio Verde	Copo descartável	0,0 d	histórica (não atual)	0	938
Lucas do Rio Verde	Equipo macro	0,0 d	histórica (não atual)	0	345
Lucas do Rio Verde	SRO	0,0 d	histórica (não atual)	0	395
Lucas do Rio Verde	Soro fisiológico 0,9%	0,0 d	histórica (não atual)	0	370

Matriz clima × saúde × estoque × ação

Calor extremo

- Nível atual: classes vermelha e roxa
- Impactos potenciais: desidratação e agravamento cardiorrespiratório
- Insumos a revisar: soluções de reidratação oral e insumos de suporte conforme protocolos
- Ação municipal: avaliar capacidade assistencial e comunicação de risco
- Ação SES-MT: apoiar regionais prioritárias

Fumaça e qualidade do ar

- Situação: 13 de 142 (9,2%) municípios com PM_{2,5} ≥ 25 µg/m³
- Impactos potenciais: agravamento de doenças respiratórias
- Insumos a revisar: insumos respiratórios conforme protocolo
- Ação municipal: orientar redução de exposição e monitorar SRAG conforme protocolos
- Ação SES-MT: consolidar casos e orientar regionais

Recomendações oficiais aos estados e municípios CENÁRIO SAZONAL

Fonte: Painel El Niño n.º 02 — não são gatilhos automáticos do ARARAS.

- Revisar e atualizar os Planos de Contingência para cenários associados ao El Niño.
- Fortalecer monitoramento, alerta e comunicação de riscos com previsões e avisos oficiais.
- Intensificar a articulação entre Defesa Civil, recursos hídricos, meio ambiente, saúde e assistência.
- Identificar previamente capacidades e recursos, priorizando populações mais vulneráveis.

15. Matriz de encaminhamentos da semana (áreas da SES-MT)

UNIEVS/CIEVS-MT — território: Estado · prazo: Imediato

- Ação: Integrar o cenário, avaliar o risco e comunicar eventos à Sala de Situação.



**Governo de
Mato
Grosso**



- Evidência: Convergência de calor, fumaça e classes vermelha e roxa

Vigilância Epidemiológica — território: Regionais com maior T_{máx}/PM_{2,5} · prazo: Até a próxima Sala

- Ação: Monitorar SRAG, DDA e sinais de desidratação no recorte prioritário.
- Evidência: Agravos respiratórios e relacionados ao calor

Vigilância em Saúde Ambiental / Vigidesastres — território: Municípios nas classes vermelha e roxa · prazo: Imediato

- Ação: Acompanhar fumaça, água e articulações territoriais.
- Evidência: PM_{2,5} ≥ 25 µg/m³ em 13 municípios

Vigilância em Saúde do Trabalhador — território: Estado · prazo: Curto prazo

- Ação: Orientar ações de vigilância e proteção aos grupos ocupacionais potencialmente expostos.
- Evidência: Trabalhadores externos urbanos e rurais em calor e fumaça

Atenção à Saúde — território: Municípios prioritários · prazo: Curto prazo

- Ação: Organizar APS e continuidade do cuidado a grupos vulnerabilizados.
- Evidência: 43 de 142 (30,3%) nas classes vermelha ou roxa

Assistência Farmacêutica — território: Municípios da base operacional, quando houver carga · prazo: Imediato

- Ação: Conferir a autonomia dos itens com cálculo válido e validar a situação no sistema oficial de estoques.
- Evidência: Autonomia de insumos críticos na base SAF

Gestão Regional — território: Regionais listadas · prazo: 24/48 h

- Ação: Contatar municípios prioritários da seção territorial.
- Evidência: Regionais com maior concentração de classes vermelha e roxa

Comunicação — território: Estado · prazo: Imediato

- Ação: Alinhar mensagens de risco à população, sem antecipar decisão de gestão.
- Evidência: Cenário de calor, baixa umidade e fumaça

Articulações intersetoriais recomendadas

- SEMA-MT — compartilhar o cenário de qualidade do ar, focos de calor e territórios prioritários para avaliação ambiental integrada (PM_{2,5} elevado em 13 municípios).
- Defesa Civil Estadual — compartilhar municípios classificados em níveis elevados e a projeção para os próximos sete dias Atual: 43 de 142 (30,3%); projeção ~7 dias: 136 de 142 (95,8%); agravamento: 118 de 141 (83,7%) comparáveis.
- Corpo de Bombeiros Militar — articular informações sobre incêndios florestais nos territórios prioritários (acumulado de 53.679 focos em sete dias).
- Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT) / municípios — pactuar acompanhamento dos planos de ação nos municípios estratégicos.

- DSEI / SESAI e FUNAI — articular continuidade do cuidado em territórios indígenas com risco climático elevado.
- INMET / CEMADEN / INPE / ANA / SGB — utilizar apenas produtos oficiais já consultados nesta rodada.

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O Ministério da Saúde reconhece trabalhadores externos urbanos e rurais como particularmente expostos a ondas de calor e eventos climáticos extremos.

Limitação: o boletim ainda não dispõe de estimativa do número de trabalhadores potencialmente expostos.

Exposições ocupacionais coerentes com o cenário da semana: calor extremo, radiação solar, baixa umidade, fumaça, PM2,5, incêndios e esforço físico ao ar livre.

Grupos ocupacionais a considerar: trabalhadores rurais e da construção; serviços urbanos externos; coleta de resíduos e saneamento; transporte e entregadores; agentes comunitários e de endemias; brigadistas, bombeiros e Defesa Civil; equipes de unidades de saúde e ambientais.

Ações: CEREST/VISAT — monitorar agravos e orientar setores; Gestão de Pessoas — revisar proteção dos trabalhadores da própria SES-MT; municípios — orientar ações de vigilância e proteção aos grupos ocupacionais potencialmente expostos, conforme protocolos vigentes.

Encaminhamentos recomendados

Organizados em três horizontes. Nem todo sinal implica acionamento operacional.

Imediatos — 24 a 48 horas

UNIEVS/CIEVS-MT

- Território: Estado / municípios prioritários
- Ação: Validar a priorização territorial e consolidar o cenário para a Sala de Situação.
- Evidência: Convergência de calor, fumaça e classificação elevada.
- Prazo: 24–48 h

Assistência Farmacêutica

- Território: Municípios da base SAF
- Ação: Conferir a autonomia dos itens com cálculo válido e validar a situação no sistema oficial de estoques.
- Evidência: Combinações com estoque crítico calculável (observar defasagem da carga).
- Prazo: 24–48 h

Comunicação / Vigilância Ambiental

- Território: Estado
- Ação: Alinhar mensagem de calor e fumaça.
- Evidência: Cenário estadual de exposição.
- Prazo: 24–48 h

Curto prazo — até a próxima Sala de Situação

Vigilância Epidemiológica / LACEN-MT

- Território: Regionais prioritárias
- Ação: Monitorar SRAG e agravos relacionados ao calor.
- Evidência: Pressão climática elevada no território.
- Prazo: Até a próxima Sala

VISAT/CEREST / Gestão de Pessoas

- Território: Estado
- Ação: Orientar proteção de trabalhadores expostos conforme protocolos vigentes.
- Evidência: Exposição ambiental ocupacional.
- Prazo: Até a próxima Sala

Gestão Regional / COSEMS-MT

- Território: Municípios estratégicos
- Ação: Articular planos de ação municipais.
- Evidência: Municípios nas classes vermelha e roxa.
- Prazo: Até a próxima Sala

Preparação — próximas semanas

Vigidesastres / SEMA / Defesa Civil

- Território: Estado
- Ação: Manter leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Evidência: Continuidade do cenário El Niño.
- Prazo: Próximas semanas

16. Notas metodológicas

- Horizontes: cenário sazonal (semanas/meses), situação atual (observado), projeção operacional de aproximadamente sete dias (ARARAS).
- Tratamento de dados ausentes: valores não disponíveis não são convertidos em zero.
- Índice de prioridade de preparação: expressa necessidade de preparação (maior = maior urgência); metodologia na seção correspondente.
- Figuras e tabelas: identificação acima e fonte abaixo (NBR 14724 / NBR 10719); referências bibliográficas em NBR 6023.

17. Glossário

Termo	Definição
Anomalia	Diferença entre valor observado e climatologia de referência.
Climatologia	Comportamento médio esperado para região e época.
PM2,5	Partículas com diâmetro aerodinâmico até 2,5 µm.
Percentil 95 (P95)	Valor acima do qual estão cerca de 5% das observações históricas comparáveis.
Índice de prioridade de preparação	Score 0–100 de necessidade de preparação clima–saúde (maior = maior urgência).
Índice de prioridade global	Score 0–100 do painel (vigilância, pressão, adaptação, fragilidade, alerta).

Conclusão e tendência para a próxima semana

A Semana Epidemiológica mantém cenário de elevada atenção em Mato Grosso, com 43 de 142 (30,3%) municípios nas classes vermelha ou roxa no momento da emissão. O padrão territorial é marcado principalmente pela combinação de calor, baixa umidade e exposição à fumaça.

As maiores concentrações de risco encontram-se em Água Boa, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, entre outras regionais. A sobreposição com aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas reforça a necessidade de abordagem territorial e articulação específica.

Para a saúde, a prioridade é a vigilância de agravos respiratórios e relacionados ao calor, a organização da atenção nos municípios prioritários e a conferência de insumos estratégicos pela Assistência Farmacêutica no sistema oficial de estoques.

Para os próximos sete dias, a projeção indica agravamento disseminado: 118 de 141 (83,7%) municípios comparáveis apresentam elevação da classificação, sendo 28 com aumento de um nível e 90 com aumento de dois ou mais níveis. Apenas um município apresenta melhora e 22 permanecem estáveis. Ao final do horizonte projetado, 136 de 142 (95,8%) estarão nas classes vermelha ou roxa, caso o cenário estimado se confirme.

Um município sem pareamento válido entre situação atual e projeção nesta rodada.

A magnitude da mudança projetada exige acompanhamento das próximas rodadas e interpretação dos determinantes do modelo, especialmente porque a situação observada no momento da emissão apresenta 43 de 142 (30,3%) nas classes vermelha ou roxa. Alertas oficiais vigentes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta emissão: 1.

Tendência: agravamento disseminado.

Entre as principais limitações desta rodada estão a cobertura parcial dos indicadores hidrológicos, a diferença de competência temporal entre bases epidemiológicas e a indisponibilidade de alguns indicadores municipais.

Encaminhamento prioritário: validar a lista territorial e os determinantes da projeção na Sala de Situação e articular Regionais, Assistência Farmacêutica e Vigilância Ambiental nas próximas 24–48 horas.

18. Referências



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Painel de alertas. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://painelalertas.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 21 ago. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT: base integrada de povos e comunidades tradicionais (aldeias indígenas e comunidades quilombolas certificadas). Cuiabá: SES-MT, 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Avisos meteorológicos — feed RSS Alert-AS. Brasília: INMET, 2026. Disponível em: <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/rss>. Acesso em: 21 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS; SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Painel El Niño 2026–2027: boletim mensal n.º 02 — julho de 2026. Brasília: INMET/INPE, jul. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria n.º 0590/2026/GBSES: dispõe sobre a instituição da Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026-2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e define sua composição, governança, competências e produtos. Cuiabá: SES-MT, 2026. Protocolo 1843437.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Climate Prediction Center. ENSO Diagnostic Discussion. Silver Spring: NOAA, 2026. Disponível em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml. Acesso em: 21 ago. 2026.

OPEN-METEO. Weather Forecast API: documentação técnica. 2026. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 21 ago. 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Assistência Farmacêutica — estoques estratégicos e autonomia de insumos (base operacional ARARAS MT). Cuiabá: SES-MT, 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO; CENTRO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DE MATO GROSSO. ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde. Cuiabá: SES-MT, 2026.