

Модифицированный протокол снижения висцерального жира воздействием на базальный инсулин

Vladimir 'mend0za' Shakhov

May 8, 2026

Содержание

- Вводная информация
- Общее описание методики
- Шаг 1. Окно питания под хронотип
- Шаг 2. Белково-жировой завтрак
- Шаг 3. Порядок еды на тарелке
- Шаг 4 (Вариант А). Пятиминутный силовой протокол после еды
- Шаг 4 (Вариант Б). Прогулка 10-15 минут после приёма пищи
- Шаг 5. Вечерний температурный и поведенческий протокол
- Шаг 6. Перестройка пищевой среды дома
- Шаг 7. Омега-3 в жирные приёмы пищи
- Измерение прогресса
- Описание происходящего в течении 2 недель
- Комментарии врача-терапевта

Изменения от оригинального протокола:

- вечерний напиток с уксусом (проявления гастрита) заменён на травяной сбор + мелатонин
- приём мелатонина + глицината магния - уточнены какие именно препараты доступны в РП
- убран берберин (принимаю средства от холестерина и повышенного давления)
- в шаг 1 добавлено требование убрать перекусы, 3 приёма пищи в день (завтрак, обед, ужин)
- вырезаны водянистые объяснения (из начального видео)
- добавлен раздел "Вводная информация" с общей информацией о висцеральном жире, его формировании и вреде
- добавлено рекомендованное видео о методике и вариант Шага 4 с прогулкой после еды

Вводная информация

Рекомендованное видео о сути методики и на какие механизмы тела воздействует : Висцеральный жир: причина, о которой вам не говорят (37 минут).

Висцеральный жир - жир обволакивающий внутренние органы органами (печень, почки, кишечник, поджелудочная железа), в отличие от подкожного жира, расположенного прямо под кожей.

Главная причина появления висцерального жира - постоянно повышенный уровень гормона инсулина в крови. Гормон инсулин переносит сахар из крови в клетки. Пока инсулин повышен, тело просто не сжигает жир совсем. Это как замок на жировых клетках. Пока он закрыт, ничего оттуда не выйдет. Ни бег, ни дефицит калорий не помогут, если инсулин постоянно высокий. Каждый приём пищи поднимает инсулин. Даже маленький кусочек хлеба, даже полезное печенье без сахара. В итоге, весь день инсулин держится на уровне выше нормы, и вы искренне не понимаете, почему жир не уходит.

Висцеральный жир считается токсичным и опасным, так как он способен провоцировать развитие воспаления и стимулировать работу молекул, которые влияют на нормальную работу гормонов. На самом деле, по влиянию на организм его можно сравнить с работой жизненно важных органов.

Жировые клетки являются не только запасом дополнительных калорий, они вовлечены в физиологию человека намного сильнее. Сейчас мы знаем, что жировая ткань способна увеличивать производство гормонов и стимулировать воспалительный процесс. Жир вокруг органов брюшной полости стимулирует появление провоспалительных химических соединений, цитокинов. При этом он также взаимодействует с гормонами, регулирующими аппетит, вес, настроение и работу головного мозга.

Связь висцерального жира и воспаления:

1. *Эндокринная активность:* Висцеральный жир не просто хранит энергию, он вырабатывает гормоны (лептин, резистин) и вещества, усиливающие воспаление
2. *Цитокины и воспаление:* Жировая ткань производит провоспалительные химические соединения — цитокины, которые запускают скрытое воспаление во всем организме
3. *Связь с печенью:* Согласно «теории портала», воспалительные вещества из висцерального жира поступают непосредственно в печень через воротную вену, провоцируя метаболические нарушения.

Общее описание методики

Семь шагов, 2 недели. Чёткая последовательность.

Висцеральный жир уходит не от голода и не от изнурительных тренировок, а от

последовательного снижения базального инсулина через семь конкретных точек воздействия в правильном порядке.

Текст методики создан первоначально по материалам Видео: Обхитри инсулин и СОЖГИ висцеральный ЖИР за 7 шагов (1 час 30 минут, крайне нудное) , таймскип по ссылке сразу на суммирование метода.

Полный двухнедельный протокол, семь конкретных шагов с привязкой к дням.

С дополнениями из Видео: Как убрать висцеральный жир и живот и Статья: Мелатонин при диабете и ожирении показан

Шаг 1. Окно питания под хронотип

Внедряется в дни с первого по третий. 8 (вариант - 10) часов окно питания. Время важнее калорий.

Золотое правило : 3 приёма пищи. НОЛЬ перекусов. (Дайте поджелудочной железе отдохнуть от выбросов инсулина).

Если вы жаворонок и просыпаетесь до 7:00 утра, ваше окно питания с 7:30 до 15:30 (17:30). Первый приём пищи не раньше, чем через 40 минут после пробуждения. Последний приём- не позже 15:30 (17:30). За пределами окна только вода, чай и кофе без молока, без сахара и без заменителей сахара.

Если вы сова и просыпаетесь после, ваше окно с 10:00 до 18:00 (20:00). Принцип тот же. 40 минут после пробуждения до первого приёма пищи. Последний приём не позже 18 (20) часов. 3 дня только это изменение.

Без всего остального организм должен адаптироваться к новому режиму без стрессового кортизолового ответа на множество одновременных изменений.

Шаг 2. Белково-жировой завтрак

Внедряется с четвёртого дня.

Завтрак строго без углеводов и без молочных продуктов.

Три варианта на выбор:

1. Вариант первый: три яйца в любом виде без молока плюс половина авокадо плюс горсть любой листовой зелени.
2. Вариант второй. 150 г живой рыбы плюс два варёных яйца плюс свежие овощи без крахмала.
3. Вариант третий. Для тех, кто не привык есть утром плотно. Два варёных яйца плюс 30 гleckих орехов, плюс чёрный кофе без добавок.

Почему нет молочных продуктов? Потому что творог и йогурт, даже обезжиренные, вызывают инсулиновый ответ, сопоставимый с углеводным завтраком, и уничтожают утреннее окно жиросжигания.

Шаг 3. Порядок еды на тарелке

Внедряется одновременно с четвёртым днём вместе со вторым шагом.

Последовательность следующая: * Сначала некрахмалистые овощи не менее 150 г, огурцы, помидоры, брокколи, шпинат, кабачок. * Затем белок и жир, * и только в последнюю очередь углеводы, если они есть в этом приёме пищи

Этот порядок снижает инсулиновый ответ на 37% за счёт того, что клетчатка из овощей физически замедляет всасывание глюкозы, а белок и жир стимулирует выброс гормонов, замедляющих опорожнение желудка. Соблюдается при каждом приёме пищи без исключений, начиная с четвёртого дня.

Шаг 4 (вариант А). Пятиминутный силовой протокол сразу после еды

Внедряется с восьмого дня после каждого основного приёма пищи.

Последовательность:

- 20 приседаний в медленном темпе по 3 секунды вниз и 3 секунды вверх.
- 10 отжиманий от пола или от стола (в обычном темпе)
- 30 секунд статической планки на предплечьях

Выполняется в течение первых 10 минут после окончания приёма пищи. Снижает инсулиновый пик после еды на 28%.

Если же мы сразу ложимся на диван или садимся за компьютер - сахар никуда не уходит и наступает интенсивный выброс инсулина в кровь, блокируя жиросжигание.

Шаг 4 (Вариант Б). Пройтись 10-15 минут сразу после приёма пищи

Внедряется с восьмого дня после каждого основного приёма пищи (например - обед и ужин).

Во время прогулки мышцы напрямую поглощают глюкозу из крови, снижая пик сахара в крови без участия инсулина.

Если же мы сразу ложимся на диван или садимся за компьютер - сахар никуда не уходит и наступает интенсивный выброс инсулина в кровь, блокируя жиросжигание.

Шаг 5. Вечерний температурный и поведенческий протокол

Внедряется с девятого дня.

Три действия в строгой последовательности:

- Первое. Последний приём пищи не позже, чем за 3 часа до сна. и без углеводов, только белок и жир.
- Второе. За 90 минут до сна прохладный душ 5-7 минут при температуре воды около 20°. Либо обтирание мокрым прохладным полотенцем если лень.
- Третье. За 60 минут до сна полностью убрать все экраны и снизить температуру в спальне до 18-19°.
- Четвёртое. Вечерний напиток - травяной успокаивающий чай (1-2 чашки)
- Пятое - мелатонин (Dr Theiss 1.5mg - 1 tab либо Melatonina Lek-Am 5 mg) и магний глицинат 300 mg (Olimp Chela Mag B6 Forte - 250 mg)

Шаг 6. Перестройка пищевой среды дома

Внедряется с десятого дня.

Пять конкретных действий, которые убирают необходимость силе воли:

- Первое, убрать все быстрые углеводы с видимых поверхностей в закрытый шкаф.
- Второе. Разместить на видном месте холодильника готовые белково-жаровые продукты: варёные яйца, орехи в контейнерах, нарезанные овощи.
- Третье, готовить еду на следующий день вечером, когда новая кора работает в полную силу, а не в момент голода, когда она ослаблена.
- Четвёртое. Определить три личных триггера срыва и заменить пищевой ритуал на непищевой: стакан воды, короткая прогулка, звонок близкому человеку.
- Пятое. Не держать дома продукты, которые запускают неконтролируемое переедание. Это не слабость, это грамотно выстроенная среда.

Шаг 7. Омега-3

С одиннадцатого дня.

Омега-3 2 грамма в сутки, с высоким содержанием эйкозопентаеновой и докозогексоеновой кислоты в сумме. Принимать во время жирного приёма пищи для максимального всасывания.

\pagebreak

Измерение прогресса

Не используйте весы как единственный критерий. Висцеральный жир может уходить при стабильном весе, потому что параллельно растёт мышечная масса от силового протокола.

Измеряйте окружность талии раз в неделю, утром на тощак на уровне пупка. По данным исследований, при последовательном соблюдении всех семи шагов среднее уменьшение окружности талии за 12 недель составляет от 4 до 7 см. без изменения общей калорийности рациона. Именно уменьшение талии, а не цифры на весах, является наиболее точным бытовым маркером снижения висцерального жира.

Описание происходящего в течении 2 недель

В первые 3-4 дня многие люди чувствуют лёгкое головокружение, раздражительность и усиление чувства голода в непривычное время. Это нормально и это ожидаемо. Ваш организм годами работал в режиме частых инсулиновых скачков. И перестройка на новый режим требует адаптации.

Эти симптомы проходят к четвёртому-пятому дню. И именно после этого большинство людей впервые замечают устойчивую энергию без провалов во второй половине дня. Это первый признак того, что базальный инсулин начал снижаться. Держитесь эти первые дни, потому что дальше будет значительно легче.

Данный протокол разработан для практически здоровых людей и не является медицинской рекомендацией.

Комментарии врача-терапевта

1. Почитала про берберин, тебе всё-таки лучше не пить, он взаимодействует с ферментами печени, может замедлить метаболизм антигипертензивных и антидепрессантов.
2. Омегу, конечно, пить можно. Про уксус тоже такое себе, на сколько я помню, у тебя в последние годы и гастрит появился.
3. В целом в этой статье много рационального, но не без вопросов, я не очень понимаю, что сильно режут углеводы, белково-жировая диета достаточно сложная как морально, так и для организма, но, конечно, быстрые углеводы урезать - это хорошо.
4. Физ нагрузка сразу после еды - ок, но смотри по состоянию, можно спровоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс, но попробовать переносимость можно.