

Модифицированный протокол снижения висцерального жира воздействием на базальный инсулин

Vladimir “mend0za” Shakhov

Модифицированный протокол снижения висцерального жира воздействием на базальный инсулин

По материалам Видео: Обхитри инсулин и СОЖГИ висцеральный ЖИР за 7 шагов - по ссылке суммирование метода.

Полный двухнедельный протокол, семь конкретных шагов с привязкой к дням.

С дополнениями из Видео:Как убрать висцеральный жир и живот и Статья: Мелатонин при диабете и ожирении показан

Изменения от оригинального протокола:

- вечерний напиток с уксусом (проявления гастрита) заменён на травяной сбор + мелатонин
- приём мелатонина + глицената магния - уточнены какие именно препараты доступны в РП
- убран берберин (принимаю средства от холестерина и повышенного давления)
- в шаг 6 добавлено требование убрать перекусы, 3 приёма пищи в день (завтрак, обед, ужин)
- вырезаны водянистые объяснения (из начального видео)

TODO - разобраться , сделать окно питания в 8 или 10 часов

Содержание

- Общее описание
 - Шаг 1. Окно питания под хронотип
 - Шаг 2. Белково-жировой завтрак
 - Шаг 3. Порядок еды на тарелке
 - Шаг 4. Пятиминутный силовой протокол после еды
 - Шаг 5. Вечерний температурный и поведенческий протокол и вечерний напиток
 - Шаг 6. Перестройка пищевой среды дома
 - Шаг 7. Берберин и омега-3
- Измерение прогресса
- Описание происходящего в течении 2 недель
- Комментарии врача-терапевта

Общее описание

Семь шагов, 2 недели. Чёткая последовательность.

Висцеральный жир уходит не от голода и не от изнурительных тренировок, а от последовательного снижения базального инсулина через семь конкретных точек воздействия в правильном порядке.

Шаг 1. Окно питания под хронотип

Внедряется в дни с первого по третий. 8 (или 10 - по другим источникам) часов окно питания :

Если вы жаворонок и просыпаетесь до 7:00 утра, ваше окно питания с 7:30 до 15:30 (17:30). Первый приём пищи не раньше, чем через 40 минут после пробуждения. Последний приём- не позже 15:30 (17:30). За пределами окна только вода, чай и кофе без молока, без сахара и без заменителей сахара.

Если вы сова и просыпаетесь после, ваше окно с 10:00 до 18:00 (20:00). Принцип тот же. 40 минут после пробуждения до первого приёма пищи. Последний приём не позже 18 (20) часов. 3 дня только это изменение.

Без всего остального организм должен адаптироваться к новому режиму без стрессового кортизолового ответа на множество одновременных изменений.

Шаг 2. Белково-жировой завтрак

Внедряется с четвёртого дня.

Завтрак строго без углеводов и без молочных продуктов.

Три варианта на выбор:

1. Вариант первый: три яйца в любом виде без молока плюс половина авокадо плюс горсть любой листовой зелени.
2. Вариант второй. 150 г живой рыбы плюс два варёных яйца плюс свежие овощи без крахмала.
3. Вариант третий. Для тех, кто не привык есть утром плотно. Два варёных яйца плюс 30 гleckих орехов, плюс чёрный кофе без добавок.

Почему нет молочных продуктов? Потому что творог и йогурт, даже обезжиренные, вызывают инсулиновый ответ, сопоставимый с углеводным завтраком, и уничтожают утреннее окно жиросжигания.

Шаг 3. Порядок еды на тарелке

Внедряется одновременно с четвёртым днём вместе со вторым шагом.

Последовательность следующая: * Сначала некрахмалистые овощи не менее 150 г, огурцы, помидоры, брокколи, шпинат, кабачок. * Затем белок и жир, * и только в последнюю очередь углеводы, если они есть в этом приёме пищи

Этот порядок снижает инсулиновый ответ на 37% за счёт того, что клетчатка из овощей физически замедляет всасывание глюкозы, а белок и жир стимулирует выброс гормонов, замедляющих опорожнение желудка. Соблюдается при каждом приёме пищи без исключений, начиная с четвёртого дня.

Шаг 4. Пятиминутный силовой протокол после еды

Внедряется с восьмого дня после каждого основного приёма пищи.

Последовательность: * 20 приседаний в медленном темпе по 3 секунды вниз и 3 секунды вверх. * 10 отжиманий от пола или от стола (в обычном темпе) * 30 секунд статической планки на предплечьях

Выполняется в течение первых 10 минут после окончания приёма пищи. Снижает инсулиновый пик после еды на 28%.

Шаг 5. Вечерний температурный и поведенческий протокол, вечерний травяной чай + мелатонин

Внедряется с девятого дня.

Три действия в строгой последовательности: * Первое. Последний приём пищи не позже, чем за 3 часа до сна. и без углеводов, только белок и жир. * Второе. За 90 минут до сна прохладный душ 5-7 минут при температуре воды около 20°. Либо обтирание мокрым прохладным полотенцем если лень. * Третье. За 60 минут до сна полностью убрать все экраны и снизить температуру в спальне до 18-19°. * Четвёртое. Вечерний напиток - травяной успокаивающий чай (1-2 чашки) * Пятое - мелатонин (Dr Theiss 1.5mg - 1 tab) и магний глицинат 300 mg (Olimp Chela Mag Forte - 250 mg)

Шаг 6. Перестройка пищевой среды дома

Внедряется с десятого дня.

Пять конкретных действий, которые убирают необходимость силе воли: * Первое, убрать все быстрые углеводы с видимых поверхностей в закрытый шкаф. * Второе. Разместить на видном месте холодильника готовые белково-жаровые продукты: варёные яйца, орехи в контейнерах, нарезанные овощи. * Третье, готовить еду на следующий день вечером, когда новая кора работает в полную силу, а не в момент голода, когда она ослаблена. * Четвёртое. Определить три личных триггера срыва и заменить пищевой ритуал на непищевой: стакан воды, короткая прогулка, звонок близкому человеку. * Пятое. Не держать дома продукты, которые запускают неконтролируемое переёдание. Это не слабость, это грамотно выстроенная среда.

Шаг 7. Омега-3

С одиннадцатого дня.

Омега-3 2 грамма в сутки, с высоким содержанием эйкозопентаеновой и докозогексоеновой кислоты в сумме. Принимать во время жирного приёма пищи для максимального всасывания.

Измерение прогресса

Не используйте весы как единственный критерий. Висцеральный жир может уходить при стабильном весе, потому что параллельно растёт мышечная масса от силового протокола.

Измеряйте окружность талии раз в неделю, утром на тощак на уровне пупка. По данным исследований, при последовательном соблюдении всех семи шагов среднее уменьшение окружности талии за 12 недель составляет от 4 до 7 см. без изменения общей калорийности рациона. Именно уменьшение талии, а не цифры на весах, является наиболее точным бытовым маркером снижения висцерального жира.

Описание происходящего в течении 2 недель

В первые 3-4 дня многие люди чувствуют лёгкое головокружение, раздражительность и усиление чувства голода в непривычное время. Это нормально и это ожидаемо. Ваш организм годами работал в режиме частых инсулиновых скачков. И перестройка на новый режим требует адаптации.

Эти симптомы проходят к четвёртому-пятому дню. И именно после этого большинство людей впервые замечают устойчивую энергию без провалов во второй половине дня. Это первый признак того, что базальный инсулин начал снижаться. Держитесь эти первые дни, потому что дальше будет значительно легче.

Данный протокол разработан для практически здоровых людей и не является медицинской рекомендацией.

Комментарии врача-терапевта

Почитала про берберин, всё-таки лучше не пить, он взаимодействует с ферментами печени, может замедлить метаболизм антигипертензивных и антидепрессантов.

Омегу, конечно, пить можно. Про уксус тоже такое себе, на сколько я помню, у тебя в последние годы и гастрит появился.

В целом в этой статье много рационального, но не без вопросов, я не очень понимаю, что сильно режут углеводы, белково-жировая диета достаточно сложная как морально, так и для организма, но, конечно, быстрые углеводы урезать - это хорошо.

Физ нагрузка сразу после еды - ок, но смотри по состоянию, можно спровоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс, но попробовать переносимость можно.