

Протокол снижения висцерального жира воздействием на базальный инсулин.

По материалам видео Обхитри инсулин и СОЖГИ висцеральный ЖИР за 7 шагов - по ссылке суммирование метода.

Полный двухнедельный протокол, семь конкретных шагов с привязкой к дням и рецепт вечернего напитка

Последнее обновление : 7 апреля 2026 .

Содержание

- Общее описание
- Шаг первый. Окно питания под хронотип
- Шаг второй. Белково-жировой завтрак
- Шаг третий. Порядок еды на тарелке
- Шаг четвёртый. Пятиминутный силовой протокол после еды
- Шаг пятый. Вечерний температурный и поведенческий протокол и вечерний напиток
- Шаг шестой. Перестройка пищевой среды дома
- Шаг седьмой. Берберин и омега-3
- Измерение прогресса
- Описание происходящего в течении 2 недель

Общее описание

Семь шагов, 2 недели. Чёткая последовательность. Висцеральный жир уходит не от голода и не от изнурительных тренировок, а от последовательного снижения базального инсулина через семь конкретных точек воздействия в правильном порядке.

Шаг первый. Окно питания под хронотип

Внедряется в дни с первого по третий. И только он без других изменений.

Если вы жаворонок и просыпаетесь до 7:00 утра, ваше окно питания с 7:30 до 15:30. Первый приём пищи не раньше, чем через 40 минут после пробуждения. Последний приём- не позже 15:30. За пределами окна только вода, чай и кофе без молока, без сахара и без заменителей сахара.

Если вы сова и просыпаетесь после, ваше окно с 10 до 18. Принцип тот же. 40 минут после пробуждения до первого приёма пищи. Последний приём не позже 18 часов. 3 дня только это изменение.

Без всего остального организм должен адаптироваться к новому режиму без стрессового кортизолового ответа на множество одновременных изменений.

Шаг второй. Белково-жировой завтрак

Внедряется с четвёртого дня.

Завтрак строго без углеводов и без молочных продуктов.

Три варианта на выбор: 1. Вариант первый: три яйца в любом виде без молока плюс половина авокадо плюс горсть любой листовой зелени. 2. Вариант второй. 150 г живой рыбы плюс два варёных яйца плюс свежие овощи без крахмала. 3. Вариант третий. Для тех, кто не привык есть утром плотно. Два варёных яйца плюс 30 г орехов, плюс чёрный кофе без добавок.

Почему нет молочных продуктов? Потому что творог и йогурт, даже обезжиренные, вызывают инсулиновый ответ, сопоставимый с углеводным завтраком, и уничтожают утреннее окно жиросжигания.

Шаг третий. Порядок еды на тарелке

Внедряется одновременно с четвёртым днём вместе со вторым шагом.

Последовательность следующая: * Сначала некрахмалистые овощи не менее 150 г, огурцы, помидоры, брокколи, шпинат, кабачок. * Затем белок и жир, * и только в последнюю очередь углеводы, если они есть в этом приёме пищи

Этот порядок снижает инсулиновый ответ на 37% за счёт того, что клетчатка из овощей физически замедляет всасывание глюкозы, а белок и жир стимулирует выброс гормонов, замедляющих опорожнение желудка. Соблюдается при каждом приёме пищи без исключений, начиная с четвёртого дня.

Шаг четвёртый. Пятиминутный силовой протокол после еды

Внедряется с восьмого дня после каждого основного приёма пищи.

Последовательность: * 20 приседаний в медленном темпе по 3 секунды вниз и 3 секунды вверх. * 10 отжиманий от пола или от стола * 30 секунд статической планки на предплечьях

Выполняется в течение первых 10 минут после окончания приёма пищи.

Если физическая подготовка пока не позволяет выполнить полный объём, начните с десяти приседаний и пяти отжиманий и увеличивайте постепенно. Главное не интенсивность, а своевременность. Нагрузка должна произойти в первые 10 минут после еды, пока постпридиальная глюкоза ещё не достигла максимума. По данным исследования в Journal of Applied Physiology, это снижает инсулиновый пик после еды на 28%.

Напоминаю, при заболеваниях суставов и позвоночника упражнения подбираются индивидуально с врачом.

Шаг пятый. Вечерний температурный и поведенческий протокол и вечерний напиток

Внедряется с девятого дня.

Три действия в строгой последовательности: * Первое. Последний приём пищи не позже, чем за 3 часа до сна. и без углеводов, только белок и жир. * Второе. За 90 минут до сна прохладный душ 5-7 минут при температуре воды около 20°. Это ускоряет засыпание на 22 минуты и усиливает первый ночной пик гормона роста. При сердечно-сосудистых заболеваниях прохладный душ заменяется тёплым с постепенным снижением температуры воды до комфортного прохладного уровня. строго после консультации с врачом. * Третье. За 60 минут до сна полностью убрать все экраны и снизить температуру в спальне до 18-19°.

Параллельно с девятого дня начинается вечерний напиток. Две чайные ложки натурального яблочного уксуса с мутью. Растворить в стакане тёплой воды. Принять отдельно 300 мг магния глицината в капсулах. выпить за 30 минут до сна.

Яблочный уксус подавляет ночную продукцию глюкозы печенью и снижает уровень глюкозы на тощак утром. Магний-глицинат улучшает качество глубокого сна и усиливает ночной пик гормона роста.

Людям с гастритом, язвой желудка и повышенной кислотностью яблочный уксус необходимо предварительно согласовать с гастроэнтерологом.

Шаг шестой. Перестройка пищевой среды дома

Внедряется с десятого дня.

Пять конкретных действий, которые убирают необходимость силе воли: * Первое, убрать все быстрые углеводы с видимых поверхностей в закрытый шкаф. * Второе. Разместить на видном месте холодильника готовые белково-жаровые продукты: варёные яйца, орехи в контейнерах, нарезанные овощи. * Третье, готовить еду на следующий день вечером, когда новая кора работает в полную силу, а не в момент голода, когда она ослаблена. * Четвёртое. Определить три личных триггера срыва и заменить пищевой ритуал на непищевой: стакан воды, короткая прогулка, звонок близкому человеку. * Пятое. Не держать дома продукты, которые запускают неконтролируемое переедание. Это не слабость, это грамотно выстроенная среда.

Шаг седьмой. Берберин и омега-3

внедряется с одиннадцатого дня при отсутствии противопоказаний и только после консультации с лечащим врачом, особенно если вы принимаете любые препараты.

Берберин 500 мг три раза в день за 15-30 минут до каждого основного приёма пищи. Курс 12 недель с последующим перерывом 4 недели. Омега-3 2 г в сутки с высоким содержанием эйкозопентаеновой и докозгексоеновой кислоты

в сумме. Принимать во время жирного приёма пищи для максимального всасывания. Берберин идёт последним, потому что он усиливает эффект уже запущенной системы и именно в сочетании с предыдущими шестью шагами даёт максимальный результат.

Измерение прогресса

Не используйте весы как единственный критерий. Висцеральный жир может уходить при стабильном весе, потому что параллельно растёт мышечная масса от силового протокола.

Измеряйте окружность талии раз в неделю, утром на тощак на уровне пупка. По данным исследований, при последовательном соблюдении всех семи шагов среднее уменьшение окружности талии за 12 недель составляет от 4 до 7 см. без изменения общей калорийности рациона. Именно уменьшение талии, а не цифры на весах, является наиболее точным бытовым маркером снижения висцерального жира.

Описание происходящего в течении 2 недель

Но сначала я хочу, чтобы вы поняли, что произойдёт с вашим телом в течение этих двух недель, потому что без этого понимания вы можете бросить протокол на третий день, решив, что он не работает.

В первые 3-4 дня многие люди чувствуют лёгкое головокружение, раздражительность и усиление чувства голода в непривычное время. Это нормально и это ожидаемо. Ваш организм годами работал в режиме частых инсулиновых скачков. И перестройка на новый режим требует адаптации.

Эти симптомы проходят к четвёртому-пятому дню. И именно после этого большинство людей впервые замечают устойчивую энергию без провалов во второй половине дня. Это первый признак того, что базальный инсулин начал снижаться. Держитесь эти первые дни, потому что дальше будет значительно легче.

Но здесь я обязан сделать важную оговорку. Если в первые дни вы чувствуете не лёгкий дискомфорт, а выраженное недомогание, сильное головокружение, сердцебиение, резкую слабость или любые другие тревожные симптомы, немедленно прекратите протокол и обратитесь к врачу. Особенно это касается людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и тех, кто принимает любые препараты, влияющие на уровень глюкозы или давления. Для этих людей любые изменения режима питания должны проходить только под медицинским наблюдением.

Данный протокол разработан для практически здоровых людей и не является медицинской рекомендацией.