


## **Trabajo Práctico N° 7:** **Ejercicios de Repaso.**

### **Ejercicio 1.**

Para cada una de las siguientes funciones:

- Determinar el dominio de la función.
- Estudiar la continuidad: indicar el conjunto donde la función es continua, señalar y clasificar sus discontinuidades si las hay.
- Estudiar la existencia de asíntotas verticales y horizontales.
- Determinar el conjunto donde es derivable.

(a)  $f(x) = 4x^3 + 1$ .



(i) Dominio:

$$\text{Dom}_f = \mathbb{R}.$$

(ii) Continuidad:

Al ser una función polinómica,  $f(x)$  es continua en todo su dominio. Por lo tanto,  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

(iii) Asíntotas verticales y horizontales:

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty, \forall a \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^3 + 1 = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^3 + 1 = -\infty.$$


Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas horizontales.

(iv) Derivabilidad:

$$\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, \forall x_0 \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es derivable en  $\mathbb{R}$ .

$$(b) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$



(i) Dominio:

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1.$$

$$Dom_f = \mathbb{R} - \{1\}.$$

(ii) Continuidad:

$f(x)$  es discontinua evitable en  $x=1$ , ya que  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  y, entonces,  $\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ . Por lo tanto,  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R} - \{1\}$ .

(iii) Asíntotas verticales y horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} x + 1 = 1 + 1 = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x + 1 = 1 + 1 = 2.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene una asíntota vertical en  $x=0$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-1}{x-1} = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{x-1} = +\infty.$$


Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas horizontales.

(iv) Derivabilidad:

$$\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}, \forall x_0 \in \mathbb{R} - \{1\}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es derivable en  $\mathbb{R} - \{1\}$ .

$$(c) f(x) = \frac{x}{|x|}.$$



(i) Dominio:

$$|x| = 0$$

$$x = 0.$$

$$\text{Dom}_f = \mathbb{R} - \{0\}.$$

(ii) Continuidad:

$f(x)$  es discontinua inevitable en  $x = 0$ , ya que  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  y, entonces,  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ . Por lo tanto,  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R} - \{0\}$ .

(iii) Asíntotas verticales y horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene una asíntota vertical en  $x = 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{|x|} = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{|x|} = 1.$$


Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas horizontales.

(iv) Derivabilidad:

$$\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, \forall x_0 \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es derivable en  $\mathbb{R} - \{0\}$ .

(d)  $f(x) = \frac{x-1}{x^2-3x+2}$



(i) Dominio:

$$x^2 - 3x + 2 = 0.$$

$$x_1, x_2 = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{3 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$x_2 = \frac{3-1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$Dom_f = \mathbb{R} - \{1, 2\}.$$

(ii) Continuidad:

$f(x)$  es discontinua evitable en  $x=1$ , ya que  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  y, entonces,  $\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .  $f(x)$  es discontinua inevitable en  $x=2$ , ya que  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  y, entonces,  $\nexists \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ . Por lo tanto,  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R} - \{2\}$ .

(iii) Asíntotas verticales y horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{1-2} = \frac{1}{-1} = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{1-2} = \frac{1}{-1} = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{2-2} = \frac{1}{0} = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{2-2} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  tiene una asíntota vertical en  $x=2$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x^2-3x+2} = 0.$$


Por lo tanto,  $f(x)$  tiene una asíntota horizontal en  $y=0$ .

(iv) Derivabilidad:

$$\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}, \forall x_0 \in \mathbb{R} - \{1, 2\}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es derivable en  $\mathbb{R} - \{1, 2\}$ .

$$(e) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2}, & \text{si } x \geq -1 \\ x^2 + 1, & \text{si } x < -1 \end{cases}.$$



(i) Dominio:

$$Dom_f = \mathbb{R}.$$

(ii) Continuidad:

$f(x)$  es discontinua inevitable en  $x = -1$ , ya que  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  y, entonces,  $\nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ . Por lo tanto,  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R} - \{-1\}$ .

(iii) Asíntotas verticales y horizontales:

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty, \forall a \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + 1 = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+2} = 0.$$


Por lo tanto,  $f(x)$  tiene una asíntota horizontal en  $y = 0$ .

(iv) Derivabilidad:

$$\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, \forall x_0 \in \mathbb{R} - \{-1\}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es derivable en  $\mathbb{R} - \{-1\}$ .

$$(f) f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x}, & \text{si } x \geq 0 \\ x^2, & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$



(i) Dominio:

$$Dom_f = \mathbb{R}.$$

(ii) Continuidad:

$f(x)$  es continua en  $x = 0$ , ya que  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  y, entonces,  $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ . Por lo tanto,  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

(iii) Asíntotas verticales y horizontales:

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty, \forall a \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  tiene una asíntota horizontal en  $y = 0$ .



(iv) Derivabilidad:

$$\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, \forall x_0 \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es derivable en  $\mathbb{R}$ .

**Ejercicio 2.**

Calcular los siguientes límites:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = \frac{3^2 - 3 - 6}{3 - 3} = \frac{9 - 3 - 6}{0} = \left(\frac{0}{0}\right).$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} \quad (*)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} x + 2 = 3 + 2 = 5.$$

$$(*) \quad x_1, x_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$x_1 = \frac{1 + 5}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$x_2 = \frac{1 - 5}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 2} (2 - x)^2 \operatorname{sen} \frac{2}{2 - x}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2 - x)^2 \operatorname{sen} \frac{2}{2 - x} = (2 - 2)^2 \operatorname{sen} \frac{2}{2 - 2} = 0^2 \operatorname{sen} \frac{2}{0} = 0 * \operatorname{sen} \frac{2}{0} = 0.$$

(c)  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} = \frac{4 \cdot 4 - 4^2}{2 - \sqrt{4}} = \frac{16 - 16}{2 - 2} = \left(\frac{0}{0}\right).$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4 - 2x}{\frac{-1}{2\sqrt{x}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 4} -8\sqrt{x} + 4\sqrt{x^3} = -8\sqrt{4} + 4\sqrt{4^3} = -8 * 2 + 4\sqrt{64} = -16 + 4 * 8 = -16 + 32 = 16.$$

(d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{3x^3}$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{3x^3} = -\infty.$$

(e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

(f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0.$$

(g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2+x+1}{2x^2-x}.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2+x+1}{2x^2-x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right).$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2+x+1}{2x^2-x} = \frac{x^2(5+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(2-\frac{1}{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2+x+1}{2x^2-x} = \frac{5+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{2-\frac{1}{x}} = \frac{5+0+0}{2-0} = \frac{5}{2}.$$

(h)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^6+1}{2x^4-x^2}.$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^6+1}{2x^4-x^2} = +\infty.$$

**Ejercicio 3.**

Calcular las derivadas de las siguientes funciones utilizando reglas de derivación.

(a)  $a(x) = \tan 2\pi x$ .

$$a(x) = \frac{\sin 2\pi x}{\cos 2\pi x}.$$

$$a'(x) = \frac{\cos 2\pi x \cdot \cos 2\pi x - \sin 2\pi x (-\sin 2\pi x)}{(\cos 2\pi x)^2}$$

$$a'(x) = \frac{(\cos 2\pi x)^2 + (\sin 2\pi x)^2}{(\cos 2\pi x)^2}$$

$$a'(x) = \frac{2\pi}{(\cos 2\pi x)^2}$$

$$a'(x) = (\sec 2\pi x)^2.$$

(b)  $b(x) = e^{x^2+1}$ .

$$b'(x) = e^{x^2+1} \cdot 2x$$

$$b'(x) = 2xe^{x^2+1}.$$

(c)  $c(x) = \frac{3x}{2x+10}$ .

$$c'(x) = \frac{3(2x+10) - 3x \cdot 2}{(2x+10)^2}$$

$$c'(x) = \frac{6x+30-6x}{(2x+10)^2}$$

$$c'(x) = \frac{30}{(2x+10)^2}.$$

(d)  $d(x) = \ln(x^2 + 1)$ .

$$d'(x) = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x$$

$$d'(x) = \frac{2x}{x^2+1}.$$

(e)  $e(x) = \cos 2x \sin x$ .

$$e'(x) = -\sin 2x \cdot 2 \sin x + \cos 2x \cos x$$

$$e'(x) = -2\sin 2x \sin x + \cos 2x \cos x.$$

$$(f) f(x) = \sqrt{1+x^4} - 1.$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x^4}} 4x^3$$

$$f'(x) = \frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}.$$

$$(g) g(x) = \frac{e^{2x}}{x-1}.$$

$$g'(x) = \frac{e^{2x} \cdot 2(x-1) - e^{2x} \cdot 1}{(x-1)^2}$$

$$g'(x) = \frac{2xe^{2x} - 2e^{2x} - e^{2x}}{(x-1)^2}$$

$$g'(x) = \frac{2xe^{2x} - 3e^{2x}}{(x-1)^2}$$

$$g'(x) = \frac{e^{2x}(2x-3)}{(x-1)^2}.$$

$$(h) h(x) = \frac{\ln x + 2}{\sin x}.$$

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x+2} \sin x - \ln(x+2) \cos x}{(\sin x)^2}.$$

**Ejercicio 4.**

Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes de las siguientes funciones en los puntos indicados.

(a)  $f(x) = e^x + 1$  en  $x = 0$ .

$$f'(x) = e^x.$$

$$f(0) = e^0 + 1$$

$$f(0) = 1 + 1$$

$$f(0) = 2.$$

$$f'(0) = e^0$$


$$f'(0) = 1.$$

$$y - 2 = 1(x - 0)$$

$$y - 2 = 1x$$

$$y - 2 = x$$

$$y = x + 2.$$



(b)  $g(x) = -x^4 + 2x + 1$  en  $x = 2$ .

$$g'(x) = -4x^3 + 2.$$

$$g(2) = -2^4 + 2 \cdot 2 + 1$$

$$g(2) = -16 + 4 + 1$$

$$g(2) = -11.$$

$$g'(2) = -4 \cdot 2^3 + 2$$

$$g'(2) = -4 \cdot 8 + 2$$

$$g'(2) = -32 + 2$$


$$g'(2) = -30.$$

$$y - (-11) = -30(x - 2)$$

$$y + 11 = -30x + 60$$

$$y = -30x + 60 - 11$$

$$y = -30x + 49.$$



(c)  $h(x) = 2 \ln(x^2 + 2)$  en  $x = 1$ .

$$h'(x) = 2 \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x$$

$$h'(x) = \frac{4x}{x^2+1}.$$

$$h(1) = 2 \ln(1^2 + 2)$$

$$h(1) = 2 \ln(1 + 2)$$

$$h(1) = 2 \ln 3.$$

$$h'(1) = \frac{4 \cdot 1}{1^2+1}$$

$$h'(1) = \frac{4}{1+1}$$

$$h'(1) = \frac{4}{2}$$


$$h'(1) = 2.$$

$$y - 2 \ln 3 = 2(x - 1)$$

$$y - 2 \ln 3 = 2x - 2$$

$$y = 2x - 2 + 2 \ln 3$$

$$y = 2x + 2(\ln 3 - 1).$$



(d)  $i(x) = \sin 2x$  en  $x = \pi$ .

$$i'(x) = \cos 2x \cdot 2$$

$$i'(x) = 2 \cos 2x.$$

$$i(\pi) = \sin 2\pi$$

$$i(\pi) = 0.$$

$$i'(\pi) = 2 \cos 2\pi$$


$$i'(\pi) = 2 \cdot 1$$

$$i'(\pi) = 2.$$

$$y - 0 = 2(x - \pi)$$

$$y = 2x - 2\pi.$$





(e)  $j(x) = \frac{x^2+x-2}{x}$  en  $x = 1$ .

$$j'(x) = \frac{(2x+1)x - (x^2+x-2) \cdot 1}{x^2}$$

$$j'(x) = \frac{2x^2+x-x^2-x+2}{x^2}$$

$$j'(x) = \frac{x^2+2}{x^2}.$$

$$j(1) = \frac{1^2+1-2}{1}$$

$$j(1) = \frac{1+1-2}{1}$$

$$j(1) = \frac{0}{1}$$

$$j(1) = 0.$$

$$j'(1) = \frac{1^2+2}{1^2}$$


$$j'(1) = \frac{1+2}{1}$$

$$j'(1) = \frac{3}{1}$$

$$j'(1) = 3.$$

$$y - 0 = 3(x - 1)$$


$$y = 3x - 3.$$



**Ejercicio 5.**


Graficar las siguientes funciones a trozos. ¿Para qué valores de  $x$  las funciones no son derivables?

(a)  $a(x) = |x|$ .




La función  $a(x)$  no es derivable para  $x=0$ .

(b)  $b(x) = \begin{cases} x - 2, & \text{si } x \leq 2 \\ 3x - 3, & \text{si } x > 2 \end{cases}$




La función  $b(x)$  no es derivable para  $x=2$ .

$$(c) \ c(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ x + 1, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$



La función  $c(x)$  no es derivable para  $x=0$ .

$$(d) d(x) = \begin{cases} e^x + 1, & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{1}{x+2}, & \text{si } x > -1 \end{cases}$$



La función  $d(x)$  no es derivable para  $x=-1$ .

**Ejercicio 6.**

Realizar el estudio de las siguientes funciones y graficar.

(a)  $f(x) = x^3 - 3x$ .

(1) Determinar el dominio de la función:

$$\text{Dom}_f = \mathbb{R}.$$

(2) Determinar el conjunto donde la función es continua. Donde sea discontinua, clasificar sus discontinuidades:

Las funciones polinómicas son continuas en  $\mathbb{R}$ . Por lo tanto,  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

(3) Determinar las asíntotas verticales y horizontales:

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty, \forall a \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 3x = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 3x = +\infty.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no tiene asíntotas horizontales.

(4) Calcular la primera derivada y determinar los puntos críticos de la función:

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$f'(x) = 3(x^2 - 1).$$

$$\exists f'(x) \forall x \in \text{Dom}_f.$$

$$f'(x) = 0$$

$$3(x^2 - 1) = 0$$

$$x^2 - 1 = \frac{0}{3}$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{1}$$

$$|x| = 1$$

$$x = \pm 1.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  tiene puntos críticos en  $x_1 = -1$  y  $x_2 = 1$ .

(5) Determinar los intervalos de crecimiento / decrecimiento de la función:

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$x = -1$	$(-1, 1)$	$x = 1$	$(1, +\infty)$
VP	-2	---	0	---	2
$f'(x)$	$> 0$	0	$< 0$	0	$> 0$
$f(x)$	creciente	máximo relativo	decreciente	mínimo relativo	creciente

Por lo tanto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $f(x)$  son  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$  y  $(-1, 1)$ , respectivamente.

(6) Determinar los valores máximos y mínimos relativos:

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)$$

$$f(-1) = -1 + 3$$

$$f(-1) = 2.$$

$$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1$$

$$f(1) = 1 - 3$$

$$f(1) = -2.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  tiene puntos máximo y mínimo relativos en  $(-1, 2)$  y  $(1, -2)$ , respectivamente.

(7) Calcular la segunda derivada y determinar los puntos donde  $f''(x) = 0$  o donde  $f''$  no existe:

$$f''(x) = 6x.$$

$$\exists f''(x) \forall x \in \text{Dom}_f.$$

$$f''(x) = 0$$

$$6x = 0$$

$$x = \frac{0}{6}$$

$$x = 0.$$

Por lo tanto,  $f''(x) = 0$  en  $x = 0$ .

(8) Determinar los intervalos de concavidad:

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$x = 0$	$(0, +\infty)$
VP	-1	---	1
$f''(x)$	$< 0$	0	$> 0$
$f(x)$	cóncava hacia abajo	punto de inflexión	cóncava hacia arriba

Por lo tanto, los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de  $f(x)$  son  $(0, +\infty)$  y  $(-\infty, 0)$ , respectivamente.

(9) Determinar si la función presenta puntos de inflexión:


$$f(0) = 0^3 - 3 \cdot 0$$

$$f(0) = 0 - 0$$

$$f(0) = 0.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  tiene un punto de inflexión en  $(0, 0)$ .

(10) Realizar la representación gráfica de la función, utilizando los datos obtenidos en el análisis desarrollado en los puntos anteriores:



(b)  $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}.$

(1) Determinar el dominio de la función:

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1.$$

$$\text{Dom}_h = \mathbb{R} - \{1\}.$$

(2) Determinar el conjunto donde la función es continua. Donde sea discontinua, clasificar sus discontinuidades:

$h(x)$  es discontinua inevitable en  $x = 1$ , ya que  $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x)$  y, entonces,  $\nexists \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ . Por lo tanto,  $h(x)$  es continua en  $\mathbb{R} - \{1\}$ .

(3) Determinar las asíntotas verticales y horizontales:



$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+1}{x-1} = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2+1}{x-1} = +\infty.$$

Por lo tanto,  $h(x)$  tiene una asíntota vertical en  $x = 1$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+1}{x-1} = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x-1} = -\infty.$$

Por lo tanto,  $h(x)$  no tiene asíntotas horizontales.

(4) Calcular la primera derivada y determinar los puntos críticos de la función:

$$h'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}.$$

$$\exists h'(x) \forall x \in Dom_h.$$

$$h'(x) = 0$$

$$\frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2} = 0$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0 \quad (x-1)^2$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0.$$

$$x_1, x_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4+4}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4 \cdot 2}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4} \sqrt{2}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2}$$

$$x_1 = \frac{2-2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(1-\sqrt{2})}{2} = 1 - \sqrt{2}.$$

$$x_2 = \frac{2+2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(1+\sqrt{2})}{2} = 1 + \sqrt{2}.$$

Por lo tanto,  $h(x)$  tiene puntos críticos en  $x_1 = 1 - \sqrt{2}$  y  $x_2 = 1 + \sqrt{2}$ .

(5) Determinar los intervalos de crecimiento / decrecimiento de la función:

Intervalo	$(-\infty, 1 - \sqrt{2})$	$x = 1 - \sqrt{2}$	$(1 - \sqrt{2}, 1)$	$x = 1$	$(1, 1 + \sqrt{2})$	$x = 1 + \sqrt{2}$	$(1 + \sqrt{2}, +\infty)$
VP	-1	---	0	---	2	---	3
$h'(x)$	$> 0$	0	$< 0$	---	$< 0$	0	$> 0$
$h(x)$	creciente	máximo relativo	decreciente	asíntota vertical	decreciente	mínimo relativo	creciente

Por lo tanto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $f(x)$  son  $(-\infty, 1 - \sqrt{2}) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$  y  $(1 - \sqrt{2}, 1) \cup (1, 1 + \sqrt{2})$ , respectivamente.

(6) Determinar los valores máximos y mínimos relativos:

$$h(1 - \sqrt{2}) = \frac{(1 - \sqrt{2})^2 + 1}{1 - \sqrt{2} - 1}$$

$$h(1 - \sqrt{2}) = \frac{1 - 2\sqrt{2} + 2 + 1}{-\sqrt{2}}$$

$$h(1 - \sqrt{2}) = \frac{2\sqrt{2} - 4}{\sqrt{2}}$$

$$h(1 - \sqrt{2}) = \frac{2(\sqrt{2} - 2)}{\sqrt{2}}$$

$$h(1 - \sqrt{2}) = \sqrt{2}(\sqrt{2} - 2)$$

$$h(1 - \sqrt{2}) = 2 - 2\sqrt{2}$$

$$h(1 - \sqrt{2}) = 2(1 - \sqrt{2}).$$

$$h(1 + \sqrt{2}) = \frac{(1 + \sqrt{2})^2 + 1}{1 + \sqrt{2} - 1}$$

$$h(1 + \sqrt{2}) = \frac{1 + 2\sqrt{2} + 2 + 1}{\sqrt{2}}$$

$$h(1 + \sqrt{2}) = \frac{2\sqrt{2} + 4}{\sqrt{2}}$$

$$h(1 + \sqrt{2}) = \frac{2(\sqrt{2} + 2)}{\sqrt{2}}$$

$$h(1 + \sqrt{2}) = \sqrt{2}(\sqrt{2} + 2)$$

$$h(1 + \sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2}$$

$$h(1 + \sqrt{2}) = 2(1 + \sqrt{2}).$$

Por lo tanto,  $h(x)$  tiene puntos máximo y mínimo relativos en  $(1 - \sqrt{2}, 2(1 - \sqrt{2}))$  y  $(1 + \sqrt{2}, 2(1 + \sqrt{2}))$ , respectivamente.

(7) Calcular la segunda derivada y determinar los puntos donde  $f''(x) = 0$  o donde  $f''$  no existe:

$$h''(x) = \frac{(2x-2)(x-1)^2 - (x^2-2x-1)2(x-1)}{(x-1)^4}$$

$$h''(x) = \frac{2(x-1)(x^2-2x+1) - 2(x-1)(x^2-2x-1)}{(x-1)^4}$$

$$h''(x) = \frac{2(x-1)[(x^2-2x+1) - (x^2-2x-1)]}{(x-1)^4}$$

$$h''(x) = \frac{2(x^2-2x+1-x^2+2x+1)}{(x-1)^3}$$

$$h''(x) = \frac{2 \cdot 2}{(x-1)^3}$$

$$h''(x) = \frac{4}{(x-1)^3}.$$

$$\exists h''(x) \forall x \in Dom_h.$$

$$h''(x) = 0$$

$$\frac{4}{(x-1)^3} = 0$$

$$4 = 0 * (x - 1)^3$$

$$4 \neq 0.$$

Por lo tanto,  $h''(x) \neq 0 \forall x \in Dom_h$ .

(8) Determinar los intervalos de concavidad:


Intervalo	$(-\infty, 1)$	$x = 1$	$(1, +\infty)$
VP	0	---	2
$h''(x)$	$< 0$	0	$> 0$
$h(x)$	cóncava hacia abajo	punto de inflexión	cóncava hacia arriba

Por lo tanto, los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de  $h(x)$  son  $(1, +\infty)$  y  $(-\infty, 1)$ , respectivamente.

(9) Determinar si la función presenta puntos de inflexión:

Por lo tanto,  $h(x)$  no tiene puntos de inflexión.

(10) Realizar la representación gráfica de la función, utilizando los datos obtenidos en el análisis desarrollado en los puntos anteriores:



(c)  $g(x) = x^2 + \ln x$ .

(1) Determinar el dominio de la función:

$$\text{Dom}_g = (0, +\infty).$$

(2) Determinar el conjunto donde la función es continua. Donde sea discontinua, clasificar sus discontinuidades:

Las funciones logarítmicas son continuas en sus dominios. Por lo tanto,  $g(x)$  es continua en  $(0, +\infty)$ .

(3) Determinar las asíntotas verticales y horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + \ln x = -\infty.$$

Por lo tanto,  $g(x)$  tiene una asíntota vertical en  $x = 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + \ln x = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \ln x = +\infty.$$

Por lo tanto,  $g(x)$  no tiene asíntotas horizontales.

(4) Calcular la primera derivada y determinar los puntos críticos de la función:

$$g'(x) = 2x + \frac{1}{x}$$

$$g'(x) = \frac{2x^2 + 1}{x}$$

$$\exists g'(x) \forall x \in \text{Dom}_g.$$

$$g'(x) = 0$$

$$\frac{2x^2 + 1}{x} = 0$$

$$2x^2 + 1 = 0x$$

$$2x^2 + 1 = 0$$

$$2x^2 = -1$$

$$x^2 = \frac{-1}{2}. \quad \nexists x \in \mathbb{R} / x^2 = \frac{-1}{2}.$$

Por lo tanto,  $g(x)$  no tiene puntos críticos.

(5) Determinar los intervalos de crecimiento / decrecimiento de la función:

Intervalo	$(0, +\infty)$
VP	1
$g'(x)$	$> 0$
$g(x)$	creciente

Por lo tanto,  $g(x)$  es crece en todo su dominio.

(6) Determinar los valores máximos y mínimos relativos:

Dado que decrece en todo su dominio,  $g(x)$  no tiene puntos máximos ni mínimos relativos.

(7) Calcular la segunda derivada y determinar los puntos donde  $f''(x) = 0$  o donde  $f'$  no existe:

$$g''(x) = \frac{4x \cdot x - (2x^2 + 1)}{x^2}$$

$$g''(x) = \frac{4x^2 - 2x^2 - 1}{x^2}$$

$$g''(x) = \frac{2x^2 - 1}{x^2}.$$

$$\exists g''(x) \forall x \in \text{Dom}_g.$$

$$g''(x) = 0$$

$$\frac{2x^2 - 1}{x^2} = 0$$

$$2x^2 - 1 = 0 \cdot x^2$$

$$2x^2 - 1 = 0$$

$$2x^2 = 1$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$|x| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Por lo tanto,  $g''(x) = 0$  en  $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

(8) Determinar los intervalos de concavidad:

Intervalo	$(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$	$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$
VP	$\frac{1}{2}$	---	1
$g''(x)$	$< 0$	0	$> 0$
$g(x)$	cóncava hacia abajo	punto de inflexión	cóncava hacia arriba

Por lo tanto, los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de  $g(x)$  son  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$  y  $(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ , respectivamente.


(9) Determinar si la función presenta puntos de inflexión:

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \ln \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} + \ln \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Por lo tanto,  $g(x)$  tiene un punto de inflexión en  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} + \ln \frac{1}{\sqrt{2}})$ .

(10) Realizar la representación gráfica de la función, utilizando los datos obtenidos en el análisis desarrollado en los puntos anteriores:



(d)  $j(x) = xe^x$ .

(1) Determinar el dominio de la función:

$$\text{Dom}_j = \mathbb{R}.$$

(2) Determinar el conjunto donde la función es continua. Donde sea discontinua, clasificar sus discontinuidades:

La función identidad ( $y = x$ ) y las funciones exponenciales son continuas en  $\mathbb{R}$ . Por lo tanto,  $j(x)$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

(3) Determinar las asíntotas verticales y horizontales:

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} j(x) = \pm\infty, \forall a \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,  $j(x)$  no tiene asíntotas verticales.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} j(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} j(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x = +\infty.$$

Por lo tanto,  $j(x)$  tiene una asíntota horizontal en  $y = 0$ .

(4) Calcular la primera derivada y determinar los puntos críticos de la función:

$$j'(x) = e^x + xe^x$$

$$j'(x) = e^x (x + 1).$$

$$\exists j'(x) \forall x \in Dom_j.$$

$$j'(x) = 0$$

$$e^x (x + 1) = 0$$

$$x + 1 = \frac{0}{e^x}$$

$$x + 1 = 0$$

$$x = -1.$$

Por lo tanto,  $j(x)$  tiene un punto crítico en  $x = -1$ .

(5) Determinar los intervalos de crecimiento / decrecimiento de la función:

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$x = -1$	$(-1, +\infty)$
VP	-2	---	0
$j'(x)$	$< 0$	0	$> 0$
$j(x)$	decreciente	mínimo relativo	creciente

Por lo tanto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $j(x)$  son  $(-1, +\infty)$  y  $(-\infty, -1)$ , respectivamente.

(6) Determinar los valores máximos y mínimos relativos:

$$j(-1) = -1e^{-1}$$

$$j(-1) = \frac{-1}{e}.$$

Por lo tanto,  $j(x)$  tiene un punto mínimo relativo en  $(-1, \frac{-1}{e})$ .

(7) Calcular la segunda derivada y determinar los puntos donde  $f''(x) = 0$  o donde  $f''$  no existe:

$$j''(x) = e^x (x + 1) + e^x x$$

$$j''(x) = e^x x + e^x + e^x x$$

$$j''(x) = 2e^x x + e^x$$

$$j''(x) = e^x (2x + 1).$$

$$\exists j''(x) \forall x \in Dom_j.$$

$$j''(x) = 0$$

$$e^x (2x + 1) = 0$$

$$2x + 1 = \frac{0}{e^x}$$

$$2x + 1 = 0$$

$$2x = -1$$

$$x = \frac{-1}{2}.$$



Por lo tanto,  $j'''(x) = 0$  en  $x = \frac{-1}{2}$ .

(8) Determinar los intervalos de concavidad:

Intervalo	$(-\infty, \frac{-1}{2})$	$x = \frac{-1}{2}$	$(\frac{-1}{2}, +\infty)$
VP	-1	---	1
$j''(x)$	$< 0$	0	$> 0$
$j(x)$	cóncava hacia abajo	punto de inflexión	cóncava hacia arriba

Por lo tanto, los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de  $j(x)$  son  $(\frac{-1}{2}, +\infty)$  y  $(-\infty, \frac{-1}{2})$ , respectivamente.


(9) Determinar si la función presenta puntos de inflexión:

$$j\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{-1}{2} e^{\frac{-1}{2}}$$

$$j\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{-1}{2\sqrt{e}}$$

Por lo tanto,  $j(x)$  tiene un punto de inflexión en  $(\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2\sqrt{e}})$ .

(10) Realizar la representación gráfica de la función, utilizando los datos obtenidos en el análisis desarrollado en los puntos anteriores:




**Ejercicio 7.**

En cada caso, realizar el gráfico de una función  $f(x)$  que cumpla con los siguientes requisitos:

(a)

- Dominio de  $f(x)$ :  $(-\infty, -3) \cup (-3, +\infty)$ .
- Continuidad:  $(-\infty, -3) \cup (-3, 2) \cup (2, +\infty)$ .
- Discontinuidad inevitable en  $x=2$ .
- $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$ .
- $f'(x) > 0$  en  $(-\infty, -3) \cup (-1, +\infty)$ .
- $f'(x) < 0$  en  $(-3, -1)$ .
- $f''(x) > 0$  en  $(-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (2, +\infty)$ .
- $f''(x) < 0$  en  $(0, 2)$ .

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+	+	+
$f''(x)$	+	+	+	-	+
$f(x)$	creciente y convexa	decreciente y convexa	creciente y convexa	creciente y cóncava	creciente y convexa




(b)

- Dominio de  $f(x)$ :  $[-2, 8]$ .
- Creciente en  $(-2, 4) \cup (6, 8)$  y decreciente en el intervalo  $(4, 6)$ .
- $f'(x) > 0$  en  $(-2, 2) \cup (5, 8)$  y  $f'(x) < 0$  en  $(2, 5)$ .

- ¿Esta función tiene máximo absoluto? Sí, tiene máximo absoluto (por teorema de Weierstrass).

Intervalo	$(-2, 2)$	$(2, 4)$	$(4, 5)$	$(5, 6)$	$(6, 8)$
$f'(x)$	+	+	-	-	+
$f''(x)$	+	-	-	+	+
$f(x)$	creciente y cóncava	creciente y convexa	decreciente y convexa	decreciente y cóncava	creciente y cóncava



**Ejercicio 8.**

Calcular las siguientes integrales indefinidas:

(a)  $\int \frac{\pi}{2} \cos x \, dx.$

$$\int \frac{\pi}{2} \cos x \, dx = \frac{\pi}{2} \int \cos x \, dx$$

$$\int \frac{\pi}{2} \cos x \, dx = \frac{\pi}{2} \sin x + C.$$

(b)  $\int 2x^8 - \frac{1}{x} dx.$

$$\int 2x^8 - \frac{1}{x} dx = \int 2x^8 dx + \int \frac{-1}{x} dx$$

$$\int 2x^8 - \frac{1}{x} dx = 2 \int x^8 dx - \int \frac{1}{x} dx$$

$$\int 2x^8 - \frac{1}{x} dx = 2 \frac{x^9}{9} - \ln x$$

$$\int 2x^8 - \frac{1}{x} dx = \frac{2}{9} x^9 - \ln x + C.$$

(c)  $\int \cos 3x \, dx.$

$$\int \cos 3x \, dx = \int \cos u \frac{du}{3} \quad (*)$$

$$\int \cos 3x \, dx = \frac{1}{3} \int \cos u \, du$$

$$\int \cos 3x \, dx = \frac{1}{3} \sin u$$

$$\int \cos 3x \, dx = \frac{1}{3} \sin 3x + C.$$

(\*)  $u = 3x; du = 3 \, dx.$

(d)  $\int x \sen x \, dx.$

$$\int x \sen x \, dx = x (-\cos x) - \int -\cos x \, dx \quad (*)$$

$$\int x \sen x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx$$

$$\int x \sen x \, dx = -x \cos x + \sen x + C.$$

(\*)  $u = x; du = dx; dv = \sen x \, dx; v = -\cos x.$

(e)  $\int x^2 e^x \, dx.$

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int e^x 2x dx \quad (*)$$

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x dx \\ \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2 (x e^x - \int e^x dx) \\ \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2 (x e^x - e^x) \\ \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C. \end{aligned} \quad (**)$$

$$(*) \text{ u} = x^2; \text{ du} = 2x \text{ dx}; \text{ dv} = e^x \text{ dx}; \text{ v} = e^x.$$

$$(**) \text{ u} = x; \text{ du} = \text{ dx}; \text{ dv} = e^x \text{ dx}; \text{ v} = e^x.$$

$$(f) \int x^2 (1 + x^3) dx.$$

$$\begin{aligned} \int x^2 (1 + x^3) dx &= \int x^2 + x^5 dx \\ \int x^2 (1 + x^3) dx &= \int x^2 dx + \int x^5 dx \\ \int x^2 (1 + x^3) dx &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^6}{6} + C. \\ \int x^2 (1 + x^3) dx &= \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{6} x^6 + C. \end{aligned}$$

$$(g) \int (e^x - 3x^3)^5 (e^x - 9x^2) dx.$$

$$\begin{aligned} \int (e^x - 3x^3)^5 (e^x - 9x^2) dx &= \int u^5 du \quad (*) \\ \int (e^x - 3x^3)^5 (e^x - 9x^2) dx &= \frac{u^6}{6} \\ \int (e^x - 3x^3)^5 (e^x - 9x^2) dx &= \frac{1}{6} (e^x - 3x^3)^6 + C. \end{aligned}$$

$$(*) \text{ u} = e^x - 3x^3; \text{ du} = (e^x - 9x^2) \text{ dx}.$$

$$(h) \int \sin x \cos x dx.$$

$$\begin{aligned} \int \sin x \cos x dx &= \int u du \quad (*) \\ \int \sin x \cos x dx &= \frac{u^2}{2} \\ \int \sin x \cos x dx &= \frac{1}{2} (\sin x)^2 + C. \end{aligned}$$

$$(*) \text{ u} = \sin x; \text{ du} = \cos x \text{ dx}.$$

$$(i) \int \frac{x}{x+1} dx.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x+1} dx &= \int \frac{u-1}{u} du \quad (*) \\ \int \frac{x}{x+1} dx &= \int 1 - \frac{1}{u} du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x+1} dx &= \int du + \int \frac{-1}{u} du \\ \int \frac{x}{x+1} dx &= u - \int \frac{1}{u} du \\ \int \frac{x}{x+1} dx &= u - \ln |u| \\ \int \frac{x}{x+1} dx &= x + 1 - \ln |x + 1| + C.\end{aligned}$$

$$(*) u = x + 1; du = dx.$$

$$(j) \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx.$$

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx &= \int \frac{1}{u} du & (*) \\ \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx &= \ln |u| \\ \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx &= \ln |x^2 + x + 1| + C.\end{aligned}$$

$$(*) u = x^2 + x + 1; du = (2x + 1) dx.$$

$$(k) \int \frac{4}{(\ln x)^3 x} dx.$$

$$\begin{aligned}\int \frac{4}{(\ln x)^3 x} dx &= \int \frac{4}{u^3} du & (*) \\ \int \frac{4}{(\ln x)^3 x} dx &= 4 \int \frac{1}{u^3} du \\ \int \frac{4}{(\ln x)^3 x} dx &= 4 \int u^{-3} du \\ \int \frac{4}{(\ln x)^3 x} dx &= 4 \frac{u^{-2}}{-2} \\ \int \frac{4}{(\ln x)^3 x} dx &= \frac{-2}{u^2} \\ \int \frac{4}{(\ln x)^3 x} dx &= \frac{-2}{(\ln x)^2} + C.\end{aligned}$$

$$(*) u = \ln x; du = \frac{1}{x} dx.$$

**Ejercicio 9.**

Calcular las siguientes integrales definidas:

(a)  $\int_1^3 (2x + 3)^2 dx$ .

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \int_1^3 u^2 \frac{du}{2} \quad (*)$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{2} \int_{2*1+3}^{2*3+3} u^2 du$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} \Big|_{2*1+3}^{2*3+3}$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{6} (2x + 3)^3 \Big|_1^3$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{6} [(2 * 3 + 3)^3 - (2 * 1 + 3)^3]$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{6} [(6 + 3)^3 - (2 + 3)^3]$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{6} (9^3 - 5^3)$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{6} (729 - 125)$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{1}{6} * 604$$

$$\int_1^3 (2x + 3)^2 dx = \frac{302}{3}.$$

(\*)  $u = 2x + 3$ ;  $du = 2 dx$ .

(b)  $\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx$ .

$$\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx = -\cos x \Big|_0^\pi$$

$$\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx = -(\cos \pi - \cos 0)$$

$$\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx = -(-1 - 1)$$

$$\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx = -(-2)$$

$$\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx = 2.$$

(c)  $\int_{-1}^1 x^{\frac{1}{3}} dx$ .

$$\int_{-1}^1 x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} \Big|_{-1}^1$$

$$\int_{-1}^1 x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4} [1^{\frac{4}{3}} - (-1)^{\frac{4}{3}}]$$

$$\int_{-1}^1 x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4} (1 - 1)$$

$$\int_{-1}^1 x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4} * 0$$

$$\int_{-1}^1 x^{\frac{1}{3}} dx = 0.$$

$$(d) \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx.$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx &= \int_0^{\pi} \cos x dx + \int_0^{\pi} 3x^4 dx \\ \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx &= \sin x \Big|_0^{\pi} + 3 \int_0^{\pi} x^4 dx \\ \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx &= (\sin \pi - \sin 0) + 3 \frac{x^5}{5} \Big|_0^{\pi} \\ \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx &= (0 - 0) + \frac{3}{5} (\pi^5 - 0^5) \\ \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx &= (0 - 0) + \frac{3}{5} (\pi^5 - 0) \\ \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx &= 0 + \frac{3}{5} \pi^5 \\ \int_0^{\pi} \cos x + 3x^4 dx &= \frac{3}{5} \pi^5. \end{aligned}$$

$$(e) \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx.$$

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx &= \int_{1^2+1}^{e^2+1} \frac{1}{u} du & (*) \\ \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx &= \ln |u| \Big|_{1^2+1}^{e^2+1} \\ \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx &= \ln |x^2 + 1| \Big|_1^e \\ \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx &= \ln (e^2 + 1) - \ln (1^2 + 1) \\ \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx &= \ln (e^2 + 1) - \ln (1 + 1) \\ \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx &= \ln (e^2 + 1) - \ln 2 \\ \int_1^e \frac{2x}{x^2+1} dx &= \ln \frac{e^2+1}{2}. \end{aligned}$$

$$(*) u = x^2 + 1; du = 2x dx.$$

$$(f) \int_0^4 e^x x^3 dx.$$

$$\int_0^4 e^x x^3 dx = (x^3 e^x - \int e^x 3x^2 dx) \Big|_0^4 \quad (*)$$

$$\int_0^4 e^x x^3 dx = (x^3 e^x - 3 \int x^2 e^x dx) \Big|_0^4$$

$$\int_0^4 e^x x^3 dx = [x^3 e^x - 3 (x^2 e^x - \int e^x 2x dx)] \Big|_0^4 \quad (**)$$

$$\int_0^4 e^x x^3 dx = [x^3 e^x - 3 (x^2 e^x - 2 \int x e^x dx)] \Big|_0^4$$

$$\int_0^4 e^x x^3 dx = \{x^3 e^x - 3 [x^2 e^x - 2 (x e^x - \int e^x dx)]\} \Big|_0^4 \quad (***)$$

$$\int_0^4 e^x x^3 dx = \{x^3 e^x - 3 [x^2 e^x - 2 (x e^x - e^x)]\} \Big|_0^4$$

$$\int_0^4 e^x x^3 dx = [x^3 e^x - 3 (x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x)] \Big|_0^4$$



$$\begin{aligned}
\int_0^4 e^x x^3 dx &= (x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6e^x) \Big|_0^4 \\
\int_0^4 e^x x^3 dx &= (4^3 e^4 - 3 * 4^2 e^4 + 6 * 4 e^4 - 6e^4) - (0^3 e^0 - 3 * 0^2 e^0 + 6 * 0 e^0 - 6e^0) \\
\int_0^4 e^x x^3 dx &= (64e^4 - 3 * 16e^4 + 24e^4 - 6e^4) - (0 * 1 - 3 * 0 * 1 + 6 * 0 * 1 - 6 * 1) \\
\int_0^4 e^x x^3 dx &= (64e^4 - 48e^4 + 24e^4 - 6e^4) - (0 - 0 + 0 - 6) \\
\int_0^4 e^x x^3 dx &= 34e^4 - (-6) \\
\int_0^4 e^x x^3 dx &= 34e^4 + 6.
\end{aligned}$$

$$(*) u = x^3; du = 3x^2 dx; dv = e^x dx; v = e^x.$$

$$(**) u = x^2; du = 2x dx; dv = e^x dx; v = e^x.$$

$$(***) u = x; du = dx; dv = e^x; v = e^x.$$

$$(g) \int_1^4 \sqrt{2x+3} dx.$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \int_{2*1+3}^{2*4+3} \sqrt{u} \frac{du}{2} \quad (*)$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \frac{1}{2} \int_{2*1+3}^{2*4+3} u^{\frac{1}{2}} du$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \frac{1}{2} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_{2*1+3}^{2*4+3}$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \frac{1}{3} (2x+3)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \frac{1}{3} [(2*4+3)^{\frac{3}{2}} - (2*1+3)^{\frac{3}{2}}]$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \frac{1}{3} [(8+3)^{\frac{3}{2}} - (2+3)^{\frac{3}{2}}]$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \frac{1}{3} (11^{\frac{3}{2}} - 5^{\frac{3}{2}})$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = \frac{1}{3} (11^{\frac{3}{2}} - 5^{\frac{3}{2}})$$

$$\int_1^4 \sqrt{2x+3} dx = 8,434.$$

$$(*) u = 2x + 3; du = 2 dx.$$

$$(h) \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_1^3 x^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \Big|_1^3$$


$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 (3^{\frac{1}{2}} - 1^{\frac{1}{2}})$$

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 (\sqrt{3} - 1).$$

**Ejercicio 10.**

Graficar las curvas y hallar el área de la región encerrada entre las gráficas de esas curvas.

(a)  $y = x^2$ ;  $y = 2x$ .



$$f(x) = g(x)$$

$$x^2 = 2x$$

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x - 2) = 0.$$

$$x_1 = 0; x_2 = 2.$$

Intervalo	(0, 2)
VP	1
f(x)	1
g(x)	2

$$A = \int_0^2 g(x) - f(x) dx$$

$$A = \int_0^2 2x - x^2 dx$$

$$A = \int_0^2 2x dx + \int_0^2 -x^2 dx$$

$$A = 2 \int_0^2 x dx - \int_0^2 x^2 dx$$

$$A = 2 \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^2 - \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^2$$

$$A = (2^2 - 0^2) - \frac{1}{3}(2^3 - 0^3)$$


$$A = (2^2 - 0^2) - \frac{1}{3}(8 - 0)$$

$$A = (4 - 0) - \frac{1}{3} * 8$$

$$A = 4 - \frac{8}{3}$$

$$A = \frac{4}{3}.$$

(b)  $y = 2x^3$ ;  $y = 2x$ .



$$f(x) = g(x)$$

$$2x^3 = 2x$$

$$x^3 = x$$

$$x^3 - x = 0$$

$$x(x^2 - 1) = 0.$$

$$x_1 = 0; x_2 = -1; x_3 = 1.$$


Intervalo	$(-1, 0)$	$(0, 1)$
VP	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$f(x)$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$g(x)$	-1	1

$$A = \int_{-1}^0 f(x) - g(x) dx + \int_0^1 g(x) - f(x) dx$$

$$A = \int_{-1}^0 2x^3 - 2x dx + \int_0^1 2x - 2x^3 dx$$

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-1}^0 2(x^3 - x) dx + \int_0^1 2(x - x^3) dx \\
A &= 2 \int_{-1}^0 x^3 - x dx + 2 \int_0^1 x - x^3 dx \\
A &= 2 \left( \int_{-1}^0 x^3 - x dx + \int_0^1 x - x^3 dx \right) \\
A &= 2 \left( \int_{-1}^0 x^3 dx + \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx + \int_0^1 -x^3 dx \right) \\
A &= 2 \left( \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^0 - \int_{-1}^0 x dx + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \int_0^1 x^3 dx \right) \\
A &= 2 \left\{ \frac{1}{4} [0^4 - (-1)^4] - \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} (1^2 - 0^2) - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 \right\} \\
A &= 2 \left\{ \frac{1}{4} (0 - 1) - \frac{1}{2} [0^2 - (-1)^2] + \frac{1}{2} (1 - 0) - \frac{1}{4} (1^4 - 0^4) \right\} \\
A &= 2 \left[ \frac{1}{4} (-1) - \frac{1}{2} (0 - 1) + \frac{1}{2} * 1 - \frac{1}{4} (1 - 0) \right] \\
A &= 2 \left[ \frac{-1}{4} - \frac{1}{2} (-1) + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} * 1 \right] \\
A &= 2 \left( \frac{-1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) \\
A &= 2 \frac{1}{2} \\
A &= 1.
\end{aligned}$$

(c)  $y = \frac{-x^2}{2} + 2$ ;  $y = 0$ -



$$\begin{aligned}
f(x) &= g(x) \\
\frac{-x^2}{2} + 2 &= 0 \\
\frac{x^2}{2} &= 2 \\
x^2 &= 2 * 2 \\
x^2 &= 4
\end{aligned}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{4}$$

$$|x| = 2$$

$$x = \pm 2.$$

Intervalo	$(-2, 2)$
VP	0
$f(x)$	2
$g(x)$	0

$$A = \int_{-2}^2 f(x) - g(x) dx$$

$$A = \int_{-2}^2 \frac{-x^2}{2} + 2 - 0 dx$$

$$A = \int_{-2}^2 \frac{-x^2}{2} + 2 dx$$

$$A = \int_{-2}^2 \frac{-x^2}{2} dx + \int_{-2}^2 2 dx$$

$$A = \frac{-1}{2} \int_{-2}^2 x^2 dx + 2 \int_{-2}^2 dx$$

$$A = \frac{-1}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_{-2}^2 + 2x \Big|_{-2}^2$$

$$A = \frac{-1}{6} [2^3 - (-2)^3] + 2 [2 - (-2)]$$

$$A = \frac{-1}{6} [8 - (-8)] + 2 (2 + 2)$$


$$A = \frac{-1}{6} (8 + 8) + 2 * 4$$

$$A = \frac{-1}{6} * 16 + 8$$

$$A = \frac{-16}{6} + 8$$

$$A = \frac{16}{3}.$$

(d)  $y = 2x^3 - x$ ;  $y = x^3$ .



$$f(x) = g(x)$$

$$2x^3 - x = x^3$$

$$2x^3 - x - x^3 = 0$$

$$x^3 - x = 0$$

$$x(x^2 - 1) = 0.$$

$$x_1 = 0; x_2 = -1; x_3 = 1.$$

Intervalo	$(-1, 0)$	$(0, 1)$
VP	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$f(x)$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$
$g(x)$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$A = \int_{-1}^0 f(x) - g(x) dx + \int_0^1 g(x) - f(x) dx$$

$$A = \int_{-1}^0 2x^3 - x - x^3 dx + \int_0^1 x^3 - (2x^3 - x) dx$$

$$A = \int_{-1}^0 x^3 - x dx + \int_0^1 x^3 - 2x^3 + x dx$$

$$A = \int_{-1}^0 x^3 - x dx + \int_0^1 -x^3 + x dx$$

$$A = \int_{-1}^0 x^3 dx + \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 -x^3 dx + \int_0^1 x dx$$

$$A = \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^0 - \int_{-1}^0 x dx - \int_0^1 x^3 dx + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1$$

$$A = \frac{1}{4} [0^4 - (-1)^4] - \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 + \frac{1}{2} (1^2 - 0^2)$$

$$A = \frac{1}{4} (0 - 1) - \frac{1}{2} [0^2 - (-1)^2] - \frac{1}{4} (1^4 - 0^4) + \frac{1}{2} (1 - 0)$$

$$A = \frac{1}{4}(-1) - \frac{1}{2}(0 - 1) - \frac{1}{4}(1 - 0) + \frac{1}{2} * 1$$

$$A = \frac{-1}{4} - \frac{1}{2}(-1) - \frac{1}{4} * 1 + \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{-1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{1}{2}.$$