

التاريخ الكامل للكون

من الانفجار العظيم إلى ما بعد الزمن

الفهرس

مقدمة: لماذا نسأل؟ ٣

زمن بلا «خارج»: كيف ولدت فكرة التوسع ٤

قبل الصفر: خمسة نماذج للحظة التي لا تقاس ٦

زمن بلانك: حيث تنهار اللغة ٧

الوحدة الكبرى: ثلاث أزمات في نموذج واحد ٩

الوهلة الأولى: التضخم وأثره الذي لا يمحى ١٠

أول ثانية: الحساء والبلازما والنسب ١٢

المادة وضدها: لماذا بقي جسيم واحد من مليار ١٤

تخليق الأنوية: الدقائق الثلاث التي صنعت الجدول الدوري ١٥

الخريطة الأولى: خلفية الكون الميكروية ١٦

كيمياء الكون الأول: أول جزيء، وأول عتمة ١٩

الضوء الأول، ثم العتمة ٢١

من الذرة الفلسفية إلى سبعة عشر حقلا كموميا ٢٢

التناظرات الخفية: من غالوا إلى ضعف الجاذبية ٢٥

الضوء والنيوترينوات والفراغ الكاذب ٢٨

النجوم الأولى: حين أضاء الظلام ٣١

موت النجوم: من السديم إلى الكثافة المطلقة ٣٣

الثقوب السوداء: عندما يصبح الفراغ أفقا ٣٦

قلب المجرة: ساجيتاريوس A* ٣٨

المجرات: من السدم إلى العناقيد ٤١

المادة المظلمة: الكتلة التي لا ترى ٤٢

الطاقة المظلمة: لغز التوسع المتسارع ٤٤

الشمس: مفاعلنا القريب ٤٦

ما بعد الزمن: المصير والسؤال ٤٨

خاتمة المحقق: ما صحح في هذه النسخة ٥٠

خط زمني للكون ٥١

ألبوم الصور: ثماني عشرة صورة ٥٢

مقدمة: لماذا نسأل؟

لا يبدأ علم الكون من تلسكوب، بل من دهشة. يقف الإنسان على أرض صلبة، فيرى في السماء نقاطا تتحرك بانتظام، فيسأل: ما هذه؟ ومن أين جاءت؟ وإلى أين تمضي؟ وكل ما بنيناه من فيزياء وفلك إنما هو محاولة طويلة، مؤثرة في بعض الأحيان، لصياغة هذا السؤال بلغة دقيقة.

هذا الكتاب رحلة واحدة متصلة، لا مجموعة فصول منفصلة. يبدأ من اللحظة التي لم يكن فيها «قبل»، ويمر بالثانية الأولى، والضوء الأول، والعصور المظلمة، والنجوم الأولى، والموت العنيف للنجوم، وأفق الثقوب السوداء، ثم يعود إلى شمسنا القريبة، وينتهي عند السؤال الذي يفتح كل الأسئلة: ما مصير هذا كله؟

اخترنا الكلمات باقتصاد، لأن كل جملة هنا تحمل رقما أو نتيجة رصد أو تصحيح. ولأن النص الأصلي خضع لتدقيق صارم، فإن الأرقام الواردة فيه لا تذكر للزينة، بل لأنها خلاصة قياس. سنجد في الطريق أرقاما مذهلة: ١٣٫٧٨٧ مليار سنة، و٢٫٧٢٥ كلفن، و٤٦٫٥ مليار سنة ضوئية، و٣٢٠ إلكترون-فولت-إكسا؛ وكل رقم منها شهادة أداة صنعها بشر على أرض صغيرة.

وأخيرا: هذه ليست حكاية عن الكون بمعزل عنا. نحن، في كل ذرة من أجسادنا، أثر كيميائي لانفجار نجمي قديم؛ وفي كل فكرة من أفكارنا، امتداد لسلسلة من الدهشة بدأت مع أول إنسان رفع رأسه إلى الليل. أن نعرف هو أن نكمل ما بدأته النجوم: أن نصير وعي الكون بذاته، أو على الأقل محاولة صادقة لبلوغ ذلك.

أما هذه النسخة العربية فقد بنيت على النص الإنجليزي المنقح، لا على ترجمة حرة له. وقد ترجمت الأرقام كما هي، وحولت إلى أرقام عربية-هندية لتقرأ في سياقها الطبيعي، وضبطت وحداتها (الكلفن، والفرسخ، والإلكترون-فولت، والسنة الضوئية) ضبطا موحدا. وحيث تعارض نص مع مصدر أولي، حكم للمصدر: بيانات بلانك ٢٠١٨، وقيم مراجعة الجسيمات الأساسية، وثوابت CODATA.

وللصور في هذا الكتاب وظيفة لا تقل عن وظيفة النص: فهي ليست زينة تملأ بها الفراغات، بل شواهد رصد. كل صورة هنا مأخوذة من أرشيف الجهة التي أنتجتها — ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومنظمة CERN، وتعاون «تلسكوب أفق الحدث» — ومذيلة باسمها في أسفلها. وحيث وجدت نسختان لموضوع واحد، أدرجت الاثنتان: إحداهما في الفصل، والأخرى في «ألبوم الصور» في آخر الكتاب.

ويمكن قراءة الكتاب على ثلاثة مستويات: السرد المتصل لمن يريد الحكاية، والأرقام لمن يريد الدقة، والصور لمن يريد أن يرى. ومن أراد المستوى الرابع — التحقق — فسيجد في الخاتمة قائمة بما صحح، وفي الفهرس خطا زمنيا يختصر القصة كلها في صفحة واحدة.

١

زمن بلا «خارج»: كيف ولدت فكرة التوسع

> حتى مطلع القرن العشرين، كانت الفيزياء ترى الكون ساكنا أزليا، بلا بداية ولا نهاية. لكن تطبيق معادلات النسبية العامة (١٩١٥) على الكون كله قاد جورج لومتر، الفيزيائي والكاهن البلجيكي في جامعة لوفان، إلى نتيجة لا مفر منها عام ١٩٢٧: الفضاء نفسه لا يستطيع أن يبقى ساكنا.

وإذا عكسنا سهم الزمن في معادلات التوسع، نصل إلى حالة كان فيها كل المادة والطاقة مضغوطا في «ذرة بدائية» بالغة الكثافة والحرارة. سخر فريد هويل من هذه الفكرة فسماها «الانفجار العظيم» في برنامج إذاعي عام ١٩٤٩، فصار اللقب الساخر اسما علميا.

لكن الانفجار العظيم ليس انفجارا في مكان ما. لا مركز له، ولا حافة، ولا «خارج» يتوسع فيه. ما يتغير هو المسافة المترية بين نقاط الفضاء ذاته؛ فالمجرات لا تسبح في الفضاء، بل يسبح الفضاء بينها. ولهذا تبدو كل المجرات مبتعدة عنا، لا لأننا في المركز، بل لأن كل نقطة مركز بالنسبة إلى ما حولها.



مجرة أندروميدا كما رصدها تلسكوب هابل: أقرب مجرة حلزونية كبيرة، وعلى بعد ٢٫٥ مليون سنة ضوئية تظهر لنا الانزياح الأحمر الذي كشف توسع الكون.
المصدر: ESA/Hubble & NASA

والدليل المباشر على أن الكون لم يكن موجودا إلى الأبد يأتي من ظلمة الليل نفسها: لو كان أزليا وموحدا بالمجرات، لانتهى كل خط نظر إلى نجم، ولكان السماء نهارا دائمار فظلام الليل شهادة كونية على أن للكون بدايةر

في عام ١٩٢٩ نشر إدوين هابل ورقة من ست صفحات عدد فيها مسافات ٢٤ مجرة، واستنتج أن الانزياح نحو الأحمر يتناسب طرديا مع المسافةر وكانت قيمة ثابته آنذاك ٥٠٠ كيلومتر في الثانية لكل ميغافرسخ، أي أكبر من قيمتها اليوم بنحو سبع مراتر لم يكن هابل مخطئا في المنهج، بل في معايرة «الشموع القياسية»: فقد خلط بين نجوم السيفيد المتغيرة وبين عناقيد النجوم الأكثر سطوعار

اليوم يبلغ ثابت هابل ٦٧٫٤ كيلومترا في الثانية لكل ميغافرسخ بحسب بلانك، و٧٣ بحسب قياسات السيفيد والمستعرات من نوع Ia. والفارق بينهما — «توتر هابل» — لا يتجاوز ٩٪، لكنه يتجاوز حدود الخطأ التجريبي، ولذلك يعد اليوم أحد أهم أسئلة علم الكونر

وثمة تفصيل يقلب الطريقة التي نقرأ بها الخريطة: الانزياح نحو الأحمر ليس سرعة في الفضاء، بل تمدد للفضاء نفسه أثناء انتقال الضوءر فالمجرة التي نراها على بعد ١٠ مليارات سنة ضوئية لم تكن هناك يوم أطلق ضوءها؛ لقد كانت أقرب، ثم ابتعدت بفعل التوسعر أي أن كل صورة كونية هي صورة لزمن، لا لمكانر

في ١٩٩٨، وبينما كان الفلكيون يحاولون قياس تباطؤ التوسع، فوجئ فريقان مستقلان بأن المستعرات الأعظم من نوع Ia أبعد مما ينبغي، أي أخفتر الاستنتاج كان مقلقا: التوسع يتسارعر نال سول بيرلماتر وبريان شميدت وآدم ريس جائزة نوبل عام ٢٠١١ على هذا الاكتشاف، وسمينا ما يسببه «الطاقة المظلمة» دون أن نعرف ما هيَ

وللقياس سلم لا درجة واحدة: نبدأ بالعناقيد المتحركة (parallax) للنجوم القريبة، ثم السيفيد في مجرة أندروميدا، ثم المستعرات في المجرات البعيدة، وأخيرا الخلفية الميكروويةر كل درجة تعاير التي تليها، وكل خطأ في درجة ينتقل مضروبا إلى ما بعدها؛ ومن هنا كان ثابت هابل أصعب رقم في الفلكر

ومن المفارقات أن أعمق ما نعرفه عن الكون يأتي من أبسط ما نراه: ضوء انزاح نحو الأحمرر فالانزياح z ليس سوى النسبة بين طول الموجة المرصودة والأصلية؛ وعند z = ١ يكون الضوء قد تضاعف طوله، وعند z = ١١٠٠ نصل إلى أول ضوء حر في الكونر

٢

قبل الصفر: خمسة نماذج للحظة التي لا تقاس

لم يكن السؤال «ما قبل الانفجار العظيم؟» سؤالا دينيا في أصله، بل سؤالا رياضيا: عندما تسحب معادلات النسبية العامة إلى الخلف نحو اللحظة صفر، تذهب الكثافة والحرارة والانحناء إلى ما لا نهاية. هذه «المفردة الجاذبية» ليست جسما بحجم الصفر، بل إشارة على أن النظرية نفسها قد انهارت عند المقاييس دون الذرية، حيث تحكم ميكانيكا الكم. ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين، طرحت خمسة أطر رئيسية لتجاوز هذا الانهيار، وكلها ما زالت تحت الاختبار.

النموذج الأول هو «الحد الذي لا حد له» لستيفن هوكينغ وجيمس هارتل: قدم شفهيا في مؤتمر الأكاديمية البابوية للعلوم في الفاتيكان عام ١٩٨١، وصيغ رياضيا عام ١٩٨٣. يفترض النموذج أن الزمن في النظام الكمومي للكون المبكر يفقد طابعه الكلاسيكي وينصهر مع الأبعاد المكانية ليكون هندسة رباعية الأبعاد منتهية بلا حافة، تماما كسطح الأرض عند القطب الجنوبي. وهكذا يصبح سؤال «ما قبل الانفجار؟» بلا معنى فيزيائي، كسؤال «ما جنوب القطب الجنوبي؟».

والثاني هو فرضية التذبذب الفراغي لإدوارد ترايون، في ديسمبر ١٩٧٣: لاحظ أن كتلة-طاقة الكون وطاقته الحركية موجبتان، بينما طاقة الجاذبية الكامنة سالبة؛ فإذا تساوتا كان مجموع طاقة الكون صفرا. وبحسب علاقة عدم اليقين بين الطاقة والزمن، يمكن لتذبذب كمومي مجموع طاقته صفر أن يستمر زمنا غير محدود. لكن هذا لا يحل المشكلة تماما: فهو يفترض وجود فراغ كمومي وقوانين تحكمه سلفا، أي أنه يفسر الكون من «لا شيء» بشرط أن يكون «لا شيء» شيئا ما.

والثالث هو «الارتداد الكبير» في إطار الجاذبية الكمومية الحلقية: فإذا كان الزمكان مؤلفا من حلقات وحدات متقطعة بحجم طول بلانك، فإن الكون السابق حين ينكمش لا يستطيع أن يضغط تحت حجم هذه الوحدات، فتنشأ قوة كمومية طاردة تمنع المفردة وتطلق توسعا جديدا عبر نفق كمومي. وقد استلهم هذا من «الكون العنقاء» الذي تصوره لومتر في الثلاثينيات. لكن النموذج الدوراني الكلاسيكي يواجه عقبتين: التوسع المتسارع الحالي الذي يمنع الانكماش، وتراكم الإنتروبيا عبر الدورات فتصير كل دورة أكثر فوضى وأقل قدرة على بناء البنية.

والرابع هو «الكون الدوري المتوافق» لروجر بنروز (٢٠١٠)، القائم على الهندسة المتوافقة التي تحفظ الزوايا والأشكال مهما تغير المقياس. فبعد أن تتبخر الثقوب السوداء كلها بإشعاع هوكينغ على مدى نحو ١٠ أس ١٠٠ سنة، وتتحلل الجسيمات الضخمة، لا يبقى إلا الفوتونات العديمة الكتلة، وهي لا تعرف مرور الزمن ولا تحدد مقياسا للمسافة. عندئذ يفقد الكون البارد المتوسع إحساسه بالمقياس الهندسي، فيتطابق رياضيا مع حالة الانفجار العظيم الحارة العديمة المقياس، ويولد «أيون» كوني جديد.

والخامس هو «الكون الغشائي الانقباضي» (Ekpyrotic): بعد توحيد ويتن لإصدارات نظرية الأوتار الخمسة في «نظرية M» ذات الأحد عشر بعدا عام ١٩٩٥، صاغ جاستن خوري وبيرت أوفروت وبول ستاينهارت ونيل توروك عام ٢٠٠١ نموذجا يصف كوننا ثلاثي الأبعاد بوصفه غشاء (brane-3) يسبح في فضاء أعلى أبعاد. والانفجار العظيم في هذا الإطار ناتج عن تصادم غشاءين متوازيين، يطلق طاقة حرارية وجسيمية تملأ الغشاء وتنتج كونا مسطحا خاليا من العيوب الطوبولوجية دون حاجة إلى التضخم، مع احتمال تكرار التصادم كل بضعة تريليونات من السنين.

وما يجمع هذه النماذج الخمسة ليس اتفاقها، بل حدها المشترك: كلها تحاول أن تصف ما لا يمكن، مبدئيا، أن يرصد. فالمعلومات لا تعبر اللحظة صفر؛ ولهذا فإن أيا منها لا يعد اليوم نظرية بالمعنى التجريبي، بل إطارا رياضيا ينتظر أداة قادرة على اختباره — وأقرب ما نملكه اليوم هو بصمات محتملة في استقطاب الخلفية الميكروية أو في طيف الموجات التثاقلية البدائية.

٣

زمن بلانك: حيث تنهار اللغة

لكي يصف الفيزيائي حدوده دون أن يعتمد على وحدات وضعها البشر (المتر، الثانية، الكلفن)، بنى ماكس بلانك عام ١٨٩٩ نظاما من الوحدات الطبيعية بجعل الثوابت الأساسية مساوية للواحد. فخرج طول بلانك: ١٫٦ × ١٠ أس سالب ٣٥ مترا؛ وزمن بلانك: ٥٫٣٩ × ١٠ أس سالب ٤٤ ثانية؛ وحرارة بلانك: ١٫٤ × ١٠ أس ٣٢ كلفنا.

هذه الأرقام لا تتصور، فطول بلانك أصغر من قطر البروتون بنحو ١٠ أس سالب ٢٠ مرة، أي واحد من مئة كوينتليون، وزمن بلانك أقصر بمراتب من أقصر فترة زمنية قيست في مختبر: ٢٤٧ زيبتوثانية، وهي الزمن الذي استغرقه فوتون سيني ليعبر جزيء هيدروجين، وقد قيس في مسرع DESY في هامبورغ عام ٢٠٢٠، أما حرارة بلانك فهي الحد الأعلى المطلق، حيث يصير طول موجة الإشعاع الحراري مساويا لطول بلانك؛ وهي تفوق حرارة قلب الشمس (١٥ مليون درجة) وحرارة انفجار مستعر أعظم (١٠ أس ١١ درجة) وأعلى حرارة صنعها الإنسان في تصادمات أيونات الرصاص في مصادم LHC عام ٢٠١٢ (٥٫٥ × ١٠ أس ١٢ درجة).

ويمتد «زمن بلانك» من اللحظة صفر حتى ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية تقريبا، حيث كان الكون المرئي كله مضغوطا في مسافة تقارب طول بلانك، وهنا تتصادم أعظم نظريتين في الفيزياء: النسبية العامة تفترض زمكانا أملس متصلا ينحني بالكتلة والطاقة، بينما تفترض نظرية الحقل الكمومي زمكانا مستويا ثابتا وتصف الجسيمات كدوال احتمالية متداخلة، وعند مقياس بلانك تتداخل التذبذبات الكمومية إلى حد تنهار فيه مفاهيم المسافة والجاذبية الكلاسيكية، ويستلزم اختبار تلك الطاقات مسرعا بحجم المنظومة الشمسية.

وفي عام ١٩٥٥ صاغ جون أرتشيبالد ويلر مفهوم «الرغوة الكمومية» لوصف نسيج الزمكان عند مقياس بلانك: حيث يفرض مبدأ عدم اليقين لهيزنبرغ تذبذبات عنيفة في هندسة المكان والزمن، تنشأ منها ثقوب سوداء مجهرية ودود كمومية ثم تختفي، دون أي ترتيب سببي كلاسيكي، الصورة الناتجة ليست «مكانا» بالمعنى المألوف، بل احتمال دائم التبدل.

وهذا هو معنى أن المفردة ليست حدثا بلحدود المعرفة: فالنسبية العامة «تتكلم» بلغة الهندسة السلسة، والكم «يتكلم» بلغة الاحتمال المتقطع، ولا لغة ثالثة تجمعهما بعد، ولهذا فإن كل حديث عن «اللحظة الأولى» هو حديث عن تقريب: نعرف ماذا حدث بعد ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية بدقة مذهلة، ولا نعرف قبله شيئا تقريبا.

والمفارقة أن هذا الجهل يقع عند أصغر المقاييس، بينما نعرف أكبر المقاييس بدقة تنافس دقة التجربة: عمر الكون ١٣٫٧٨٧ مليار سنة بخطأ ٠٫٠٢٠ فقط، ونسبة المادة المظلمة إلى الطاقة المظلمة، ومساحة الأفق الكوني، أي أن خريطتنا للكون دقيقة عند الأطراف، غائمة في المركز الذي يحمل اسمها.

٤

الوحدة الكبرى: ثلاث أزمات في نموذج واحد

> بانتهاء زمن بلانك عند ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية وانفصال الجاذبية، دخل الكون «حقبة التوحيد الكبرى»، التي استمرت حتى نحو ١٠ أس سالب ٣٦ ثانية, كان الكون المرئي كله أصغر من كوارك واحد، وحرارته نحو ١٠ أس ٢٩ كلفن، ثم بردت إلى ١٠ أس ٢٧, وعند تلك الطاقات اندمجت القوى الثلاث غير الجاذبية — الشديدة والضعيفة والكهرومغناطيسية — في قوة واحدة يسميها الفيزيائيون «القوة الكهروشديدة»، تحملها بوزونات فائقة الثقل تعرف ببوزونات X، التي كانت تحول الكواركات إلى لبتونات والمادة إلى ضدها بحرية,

لكن النموذج البسيط للتوسع المنتظم بعد هذه الحقبة فشل في تفسير ثلاث خصائص رصدية أساسية، وكل منها كان كافيا لإسقاطه:

الأزمة الأولى: «مشكلة الأفق», درجة حرارة الخلفية الميكروية ٢,٧٢٥ كلفن متساوية بدقة مذهلة في كل السماء الممتدة ٩٣ مليار سنة ضوئية, والتوازن الحراري لا يتحقق إلا بتبادل طاقة بسرعة الضوء كحد أقصى؛ لكن إذا أعدنا التوسع إلى الخلف، نجد أن أي منطقتين تفصل بينهما أكثر من درجة قوسية واحدة لم تكن على تواصل سببي حين انطلق ذلك الإشعاع, حاول تشارلز ميزنر عام ١٩٦٩ حلها بنموذج «الكون الخلاط» القائم على تذبذبات فوضوية مبكرة تخلط الحرارة، لكن تعقيده الرياضي وفشله في حل الأزمتين الأخريين جعلا الفكرة تهجر,

الأزمة الثانية: «مشكلة الاستواء», يعتمد انحناء الزمكان الكلي على النسبة بين كثافة الطاقة الفعلية والكثافة الحرجة (أوميغا = رو ÷ الكثافة الحرجة), فإن زادت الكثافة على الحرجة، اتخذ الفضاء انحناء كرويا موجبا وانتهى في انسحاق كبير؛ وإن نقصت، اتخذ انحناء سالبا مفتوحا كالسرج, ولا يبقى الفضاء إقليديا مسطحا (أوميغا = ١) إلا بموازنة تشبه إيقاف عملة على حرفها, ومع ذلك تظهر الأرصاد أن الكون المرئي مسطح إلى حد ٠,٤٪، وهذا يستلزم ضبطا ابتدائيا مستحيلا لو كان التوسع عاديا متباطئا,

الأزمة الثالثة: «مشكلة الأقطاب المغناطيسية», على خلاف الشحنات الكهربائية التي توجد منفردة موجبة وسالبة، لا ترصد الأقطاب المغناطيسية إلا مزدوجة, وتتنبأ نظريات التوحيد الكبرى بأنه عند انفصال القوة الشديدة عند ١٠ أس ٢٧ كلفن تتكون عيوب طوبولوجية وفيرة، منها أقطاب مغناطيسية منفردة وأوتار كونية، ينبغي أن تملأ الكون اليوم بكثافة هائلة, ومع ذلك لم يرصد أي تلسكوب أو تجربة قطبان مغناطيسي منفردا واحدا,

لاحظ أن الأزمات الثلاث كلها من نوع واحد: كلها تقول إن الكون يحمل «ذاكرة» لا ينبغي أن يحملها لو كان توسعه بسيطار فالحرارة المتساوية تحتاج تواصلا لم يحدث، والتسطح يحتاج ضبطا لم يفسر، وغياب الأقطاب يحتاج تخفيفا لم يحدث, ومن هنا كان الحل المنتظر واحدا: مرحلة من التوسع الجنوني تختصر المسافات، وتسطح الفضاء، وتخفف كل كثافة إلى ما يقارب الصفر.

٥

الوهلة الأولى: التضخم وأثره الذي لا يمحى

في ديسمبر ١٩٧٩، وبينما كان يعمل في مركز المسرع الخطي في ستانفورد (SLAC)، صاغ آلان غوث حلا موحدا للأزمات الثلاث بفرضية «التضخم الكوني», افترض غوث وجود حقل كمومي قياسي يملأ الفضاء، سماه «حقل التضخم», ولما انفصلت القوة الشديدة عند ١٠ أس سالب ٣٦ ثانية تقريبا، مر هذا الحقل بتحول طوري دفع الفضاء إلى توسع أسي فائق السرعة، تضاعفت أبعاده فيه ما لا يقل عن ٨٠ إلى ٩٠ مرة خلال جزء من مليار من تريليون من تريليون من الثانية، فزاد حجم الكون بمعامل يقارب ١٠ أس ٢٦ إلى ١٠ أس ٢٧ (نحو e مرفوعا للقوة ٦٠), وهذا التوسع الأسرع من الضوء لا يخالف النسبية الخاصة، لأن القيد يسري على حركة الأجسام داخل الفضاء، لا على تمدد نسيج الفضاء نفسه.

ثم طور أندريه لينده، وبشكل مستقل فريق أندرياس ألبرشت وبول ستاينهارت، نموذج غوث إلى «التضخم البطيء»: حيث ينحدر حقل التضخم ببطء نحو حالة طاقة دنيا، فيولد توسعا أسيا، وعندما يبلغ قاع الجهد يتذبذب ويتحلل في عملية تعرف بـ«إعادة التسخين»، محولا طاقة وضعه إلى سيل كثيف من الجسيمات الأولية والإشعاع والمادة المظلمة — فيشعل بذلك الانفجار العظيم الحار بعد أن كان التضخم قد برد الفضاء وأفرغه.

وبحلها للأزمات الثلاث دفعة واحدة، قدمت الفرضية هدية إضافية: أصل البنية الكونية. فالتذبذبات الكمومية الصغيرة في كثافة طاقة حقل التضخم تضخمت هي الأخرى حتى صارت بذورا للمجرات والعناقيد. أي أن كل ما نراه من بنية — من العنقود المجري إلى مجرتنا — ليس إلا تضخيما لعدم يقين كمومي في اللحظة الأولى، مكتوبا بمقياس الملايين من السنين الضوئية.

وقد صار للتضخم اختبارات رقمية دقيقة، لا مجرد سردر فأبسط نماذج التضخم البطيء تتنبأ بأن مؤشر ميل الطيف الابتدائي n_s أقل من الواحد قليلا، وقد قاس بلانك القيمة ٠٫٩٦٥، وهي مطابقةر وتتنبأ بأن نسبة الموجات التثاقلية إلى التباينات r صغيرة؛ وقد أسقط بلانك الحد إلى أقل من ٠٫٠٣٦ر وأيضا بأن التباينات شبه غاوسية ولا تنتج أحاديات قطب مغناطيسية كثيفة، وهو ما يتفق مع الرصدر

لكن للتضخم ثمنا نظريا: فبمجرد أن تبدأ عملية كهذه، لا تتوقف في منطقة واحدة، بل تستمر أبديا في أماكن مختلفة، منتجة ما يسميه ليندي «التضخم الأبدي»ر وفي هذا الإطار قد يكون كوننا فقاعة واحدة بين عدد لا نهائي من الفقاعات، لكل قوانينهر وهذا يورطنا في «مشكلة القياس»: كيف نسند احتمالا إلى كون نحن فيه بالذات؟

وقد شهدت الفرضية اختبارا منهكا عام ٢٠١٤، حين أعلن فريق BICEP2 اكتشاف أنماط B في استقطاب الخلفية الميكروية، وهي البصمة التي تنتظر من الموجات التثاقلية البدائيةر وبعد أشهر تبين أن الإشارة كانت غبارا مجريا — لا تضخمار وأسقط بلانك ذلك الحدر والدرس منهجي بقدر ما هو علمي: في علم الكون، الغبار يعرف كيف ينتحل صفة الأزلر

ويبقى التضخم، بعد أربعين عاما، أفضل ما لدينا وأقله إرضاء: يفسر خمس مشكلات رصدية بأقل من عشرة معاملات، لكنه لا يقول لنا ما هو حقل التضخم، ولا لماذا بدأ، ولا إن كان فريدار وهو، بهذا المعنى، أشبه بجسر عظيم نعبره كل يوم دون أن نعرف من بناهر

اقترح آلان غوث التضخم عام ١٩٨١ لمعالجة ثلاث مشكلات: لماذا يبدو الكون مسطحا إلى حد ٠٫٤٪؟ ولماذا تتشابه حرارته في مناطق لم يتسن لها التواصل؟ ولماذا لا نرى أي «أحادي قطب مغناطيسي»؟ فجوابه: أن جزءا صغيرا من الكون تضخم بمعامل ١٠ أس ٢٦ على الأقل في نحو ١٠ أس سالب ٣٢ ثانيةر

وقد ولد التضخم أثرا لا يمحى: تذبذبات كمومية صغيرة في كثافة الطاقة، تضخمت حتى صارت بذور البنية الكبرىر ومن هنا تنبع المفارقة: المجرات — بكل ما فيها من مدن ونجوم — ليست إلا تضخيما لعدم يقين كمومي في اللحظة الأولىر

أما الدليل الأكثر إثارة فكان سيأتي من استقطاب الخلفية الميكروية على شكل «أنماط B»، وهي بصمة للموجات التثاقلية البدائيةر أعلن فريق BICEP2 عام ٢٠١٤ اكتشافها، ثم تبين أن الإشارة كانت غبارا مجريار وأسقط بلانك ذلك الحد إلى r < ٠٫٠٣٦ر والدرس منهجي بقدر ما هو علمي: في علم الكون، الغبار يعرف كيف ينتحل صفة الأزلر

للتضخم ثمن نظري: فبمجرد أن تبدأ عملية كهذه، لا تتوقف في منطقة واحدة، بل تستمر أبديا في أماكن مختلفة، منتجة ما يسميه أندريه لينديٍ «التضخم الأبدي»، وفي هذا الإطار، قد يكون كوننا فقاعة واحدة بين عدد لا نهائي من الفقاعات.

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نجد أنفسنا في هذه الفقاعة بالذات؟ الجواب الأنثروبي: لأن الفقاعات الأخرى قد تكون قوانينها مختلفة، فلا تسمح بوجود ذرات ولا نجوم. وهذه الفكرة، «الأكوان المتعددة»، ليست قابلة للاختبار المباشر، ولذلك يرفضها بعض الفيزيائيين باعتبارها ميتافيزيقا بلغة الرياضيات.

غير أن للتضخم اختبارات ممكنة: نمط B في الاستقطاب، وطيف الموجات التثاقلية البدائية، وعدم غاوسية التباينات. وأي من هذه الإشارات، إن رصد، سيكون أول دليل مباشر على أن الكون مر بلحظة أسرع من الضوء في تمدده — لا في حركته.


٦

أول ثانية: الحساء والبلازما والنسب

> بعد التضخم وإعادة التسخين، دخل الكون عصر البلازما الكواركية: حساء كثيف من الكواركات والغلوونات لا تسمح فيه الطاقة بتشكل الهادرونات. وعند نحو ميكروثانية، انخفضت الحرارة إلى ما يقارب ١٠ أس ١٢ كلفن، فاتحدت الكواركات في ثلاثيات: البروتون (uud) والنيوترون (udd).

في الثانية الأولى وقعت أحداث حاسمة. توقف تحويل البروتونات إلى نيوترونات والعكس عند «التجمد»، فاستقرت النسبة عند بروتون واحد لكل ستة نيوترونات، ثم صارت واحدا إلى سبعة بعد تحلل بعض النيوترونات الحرة. ولهذا كانت كتلة الكون من الهيدروجين والهيليوم محسومة قبل أن يوجد أي نجم.

ثم جاءت «عنق زجاجة الديوتيريوم»: كلما اتحد بروتون ونيوترون، مزق فوتون عالي الطاقة الديوتيريوم. ولما برد الكون بعد الدقيقة الثالثة تقريبا، نجا الديوتيريوم وانطلقت الاندماجات، فتشكل الهيليوم-٤ والقليل من الليثيوم-٧. وتوقف الفرن الكوني تماما عند نحو الدقيقة العشرين (أي قرابة ١٢٠٠ ثانية)، تاركا ٧٥٪ هيدروجين و٢٥٪ هيليوم بالكتلة؛ وهي نسب تؤكدها أرصاد السدم القديمة والغابات الطيفية في أطياف الكويزرات.



اصطدام أيونات الرصاص داخل كاشف ALICE في CERN: إعادة مصغرة لظروف الكون في أجزاء الميكروثانية الأولى، حين كانت المادة بلازما كوارك-غلوون حرة.
المصدر: CERN / ALICE Collaboration

ولهذه النسب شهادة أخرى: النيوترينوات. فقد انفصلت عن المادة في الثانية الأولى، وما زال في كل سنتيمتر مكعب من الفضاء نحو ٣٠٠ نيوترينو بدائي، لم يرصد بعد مباشرة، لكن أثره محفور في توزيع المجرات.

نستطيع، بمعجلات الجسيمات، أن نعيد إنتاج اللحظات الأولى — لا كلها، بل مقاطع منهار في مصادم LHC، تصطدم أيونات الرصاص بسرعة ٩٩,٩٩٩٪ من سرعة الضوء، فتنصهر البروتونات والنيوترونات إلى بلازما كوارك-غلونية بدرجة حرارة ٥٫٥ تريليون كلفن، أي أعلى من حرارة قلب الشمس ٣٦٦ ألف مرة، وأقرب إلى حالة الكون عند ١٠ أس سالب ٥ ثانية.

وفي كاشف ALICE، القابع على عمق ٤٦ مترا تحت الأرض بوزن يقارب ١٠ آلاف طن، ينتج التصادم الواحد ما يقارب ١١٥٠ جسيما مشحونا. هذه «القطرة» تعيش ١٠ أس سالب ٢٢ ثانية، ثم تتجمد إلى هادرونات — تماما كما فعل الكون بعد ميكروثانية من ولادته.

أما النسبة التي تحفظ ذراتنا فتصنع لاحقا: بين الثانية والدقيقتين الثالثة، تنخفض حرارة الكون إلى ما دون مليار كلفن، فيتحد البروتون بالنيوترون مكونا الديوتيريوم، ثم الهيليوم-٤. النتيجة: ٧٥٪ هيدروجين، و٢٥٪ هيليوم، و٠٫٠١٪ ديوتيريوم — وهي النسب التي نراها اليوم في أقدم الغيوم الغازية، بلا تغيير يذكر.

ولو كانت سرعة التوسع أبطأ قليلا، لاحترق كل الهيدروجين إلى هيليوم؛ ولو كانت أسرع، لما اتحد شيء. وهذه الملاحظة، التي تسمى أحيانا «ضبطا دقيقا»، ليست تفسيرا بقدر ما هي سؤال مؤجل: لماذا نجد أنفسنا في كون يسمح بأن يوجد ناظر يسأل؟

قبل الكواركات كانت هناك مرحلة أقدم: عند ١٠ أس سالب ٣٦ ثانية، قد تكون القوى الكبرى متحدة، وعندها يتوقع أن تنشأ «أحاديات القطب المغناطيسي» — جسيمات ثقيلة جدا ووحيدة القطب. لم نرصد أيا منها، وهذا أحد أقوى الأدلة غير المباشرة على التضخم: فقد خفف كثافتها إلى حد لا يرصد.

ولم لا نرى المادة المضادة؟ لأن الباريونات تفوقت على ضدها بنسبة ٦×١٠ أس سالب ١٠ فقط: مقابل كل مليار زوج من الجسيمات وضدها، بقي جسيم واحد إضافي. هذا الكسر الضئيل هو أصل كل ذرة في الكون، أي أن وجودنا كله يعتمد على خلل في التماثل وقع في الثانية الأولى.

وفي CERN، يحاول تجريب التصادمات الثقيلة أن يجد «انتهاك CP» كافيا لتفسير هذا الخلل. النتائج حتى الآن قاصرة: فالنموذج القياسي يفسر جزءا صغيرا من النسبة المطلوبة، ويبقى الباقي لغزا مفتوحا على أبواب فيزياء جديدة.

٧

المادة وضدها: لماذا بقي جسيم واحد من مليار

> بين ١٠ أس سالب ١٢ و١٠ أس سالب ٦ ثانية، كان الكون حوض كواركات وغلوونات حرة لا تستطيع أن تتحد في بروتونات ونيوترونات، لأن الطاقات كانت أعلى من طاقة الربط القوية. وحين هبطت الحرارة إلى نحو ٢ × ١٠ أس ١٢ كلفن، حدث «التحول الهادروني»: تجمدت الكواركات في هادرونات، وبقيت النوى الأولى.

وهنا دخلت فيزياء دقيقة بدأت تقرر مصير كل شيء لاحقا: كتلة الكوارك السفلي (d) أكبر قليلا من كتلة الكوارك العلوي (u)، ولذلك يكون النيوترون (udd) أثقل من البروتون (uud) بنحو ١٫٠٪. وهذا الفارق الضئيل، جزء من ألف، هو الذي جعل النيوترون يتحلل خارج النواة في نحو ٨٨٠ ثانية، بينما يبقى البروتون مستقرا — أو على الأقل مستقرا بما يكفي لتبنى منه الذرات.

وحين هبطت الحرارة إلى ١٠ أس ١٠ كلفن، ضعفت التفاعلات العكسية المستهلكة للطاقة، فحدث «التجمد» (freeze-out)، عند نسبة ستة بروتونات لكل نيوترون. ثم تحلل بعض النيوترونات الحرة إلى بروتونات وإلكترونات، فصارت النسبة نحو سبعة إلى واحد عند بداية الاندماج النووي.

ولو انعكس هذا الفارق الضئيل — أي لو كان البروتون أثقل من النيوترون بنسبة ١٫٠٪ — لتحللت البروتونات الحرة إلى نيوترونات بعد التجمد، ولتحول ما بقي منها بالنواة إلى هيليوم خامل كيميائيا دون أي ذرات هيدروجين حرة في الكون، وعندها لا اشتعال لنجوم طويلة العمر، ولا ماء، ولا كيمياء عضوية، أي أن وجودنا كله معلق بفارق كتلة لا يتجاوز جزءا من ألف.

وفي المقابل، فإن المادة نفسها كانت قد فازت على ضدها بنسبة ضئيلة: ٦ × ١٠ أس سالب ١٠ فقط، أي أنه مقابل كل مليار زوج من الجسيمات وضدها، بقي جسيم واحد إضافي — وهو مجموع ما نراه اليوم من ذرات، وهذا الخلل في التماثل، الذي يعرف بـ«انتهاك CP»، لم يفسره النموذج القياسي إلا جزئيا، ويبقى أحد أعمق الأسئلة المفتوحة.

٨

تخليق الأنوية: الدقائق الثلاث التي صنعت الجدول الدوري

في الأول من أبريل ١٩٤٨، نشر طالب الدكتوراه رالف ألفر مع مشرفه جورج غامو في جامعة جونز هوبكينز — بعد أن أضاف غامو اسم هانز بيته لإكمال التلاعب الأبجدي اليوناني ألفا-بيتا-غاما — نظرية «تخليق الأنوية في الانفجار العظيم»، وقد فشل تصور ألفر الأولي بتكوين العناصر الـ٩٢ كلها بالتقاط النيوترونات المتتالي، لسبب بسيط: لا توجد في الطبيعة أي نواة مستقرة بعدد كتلي ٥ أو ٨، فتنقطع السلسلة عند الهيليوم، وقد حل بيته المسألة لاحقا ببرهان تكوين العناصر الأثقل داخل قلوب النجوم والمستعرات، ونال جائزة نوبل ١٩٦٧، لكن ورقة ألفا-بيتا-غاما وصفت بدقة آلية تكوين العناصر الخفيفة.

وبين الثانية العاشرة والثالثة المئة، واجه الكون «عنق زجاجة الديوتيريوم»: كلما اتحد بروتون ونيوترون مكونين نواة ديوتيريوم، جاء فوتون عالي الطاقة ففككها فورا، كان الكون أشبه بغرفة مليئة بالكرات المتطايرة، لا تسمح لأي كرة أن تستقر، وبعد الدقيقة الثالثة إلى الخامسة، برد الكون بما يكفي، فنجت نوى الديوتيريوم، وانطلقت تفاعلات الاندماج لتكون الهيليوم-٣ ثم الهيليوم-٤ شديد الاستقرار، مع آثار ضئيلة من الليثيوم-٧ والبريليوم غير المستقر.

وتوقف «الفرن النووي الكوني» تماما عند الدقيقة العشرين تقريبا، بسبب التوسع والتبريد، تاركا نسبا كتلية دقيقة: نحو ٧٥٪ هيدروجين و٢٥٪ هيليوم — أي ١٢ نواة هيدروجين لكل نواة هيليوم — ومليار فوتون لكل جسيم باريوني، وهذه الأرقام هي أول «صورة» يمكن التحقق منها من الماضي السحيق.

وقد تأكدت هذه النسب رصديا من ثلاث جهات مستقلة: من أطياف الهيليوم (الذي اكتشفه بيير جانسين في كسوف غونتور في الهند عام ١٨٦٨، في هالة الشمس قبل أن يعرف أنه موجود على الأرض)، ومن امتصاص «غابة لايمان-ألفا» في أطياف الكوازارات، ومن رصد تلسكوب كيك عام ٢٠١٣ لسحب غازية بكر على بعد ١١٫٦ مليار سنة ضوئية في برج الأسد، خالية تماما من معادن النجوم، محتفظة بتركيب الهيدروجين والهيليوم الأول.

وقد استطاع الإنسان، أخيرا، أن يشعل تفاعلا مماثلا في المختبر: في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ حققت منشأة الاحتجاز الوطنية في كاليفورنيا «الربح الصافي» للطاقة الاندماجية، بإطلاق ١٩٢ ليزرا بطاقة ٢٫٠٥ ميغاجول على كبسولة ديوتيريوم-تريتيوم، فأنتجت ٣٫١٥ ميغاجول، أي أننا كررنا، في جزء من الثانية وعلى مسافة قدمين، ما فعله الكون في دقائقه الأولى.

لكن قائمة العناصر التي خرجت من الفرن الكوني قصيرة: الهيدروجين والهيليوم وقليل من الليثيوم. أما الكربون والأكسجين والحديد — أي كل ما نصنع منه — فقد جاء لاحقا، من قلوب النجوم ومن انفجاراتها. أي أن الجزء الأول من هذا الكتاب يتحدث عن كون لا يعرف بعد مادة يمكن أن تتكون منها صخرة، فضلا عن كائن يتأمله.


٩

الخريطة الأولى: خلفية الكون الميكروية

> في عام ١٩٦٥، التقط أرنو بنزياس وروبرت ويلسون، عن غير قصد، ضجيجا ميكرويا ثابتا في كل اتجاه، بعد أن طردا الحمام ونظفا الهوائي من فضلاته العازلة. ولم يكن ذلك الضجيج عطلا، بل كان الصدى الحراري لأول لحظات الكون: إشعاع خلفي ميكروي بدرجة حرارة ٢٫٧٢٥ كلفن، وهو أقدم ضوء يمكن رصده.

هذا الضوء انطلق عندما كان عمر الكون ٣٨٠ ألف سنة، حين برد البلازما إلى نحو ٣٠٠٠ كلفن، فاتحدت البروتونات بالإلكترونات وتشكلت ذرات الهيدروجين المتعادلة، وأصبح الكون شفافا للمرة الأولى: لحظة «إعادة الاتحاد».

التقلبات الدقيقة في درجة حرارة هذه الخريطة، بنسبة واحد من مئة ألف، هي بذور كل شيء: بذور المجرات والعناقيد والفراغات، قاستها مركبات COBE ثم WMAP ثم بلانك بدقة جعلت علم الكون علما قياسيا بالمعنى الحرفي؛ ومن هذه الخريطة وحدها استخرجنا عمر الكون (١٣٫٧٨٧ ± ٠٫٠٢٠ مليار سنة) ونسب مكوناته: نحو ٤٫٩٪ مادة عادية، و٢٦٫٨٪ مادة مظلمة، و٦٨٫٣٪ طاقة مظلمة.



السماء كما رصدها مسبار بلانك في تسع نطاقات ترددية: الخلفية الميكروية وتراكمات الغبار والمجرات، وفي الصف الأوسط تقرأ تقلبات الحرارة التي ولدت منها كل البنى.
المصدر: ESA / Planck Collaboration

الخريطة ليست صورة للسماء فحسب، بل هي أرشيف، كل بقعة زرقاء أبرد قليلا، وكل بقعة حمراء أسخن، تحمل أثرا صوتيا لموجة ضغط في البلازما الأولى، وقد صارت اليوم بنية كونية بعرض مئات الملايين من السنين الضوئية.

حين أعلن فريق COBE عام ١٩٩٢ خريطة للتباينات في الخلفية الميكروية، كان حجم التباين واحدا من مئة ألف فحسب: ٠٫٠٠٠٠١ كلفن في خلفية حرارتها ٢٫٧٢٥ كلفن. وصف جورج سموت ذلك بقوله إنه «ينظر إلى وجه الخالق»، ونال جائزة نوبل عام ٢٠٠٦ مع جون ماذر.

ثم جاءت WMAP (٢٠٠٣) وبلانك (٢٠١٣-٢٠١٨) لتحول تلك النقاط إلى علم دقيق، فمن توزيع التباينات على زوايا مختلفة يستخرج علماء الكون ستة معاملات فقط، تحدد بدورها: نسبة المادة العادية ٤٫٩٪، والمادة المظلمة الباردة ٢٦٫٨٪، والطاقة المظلمة ٦٨٫٣٪، وعمر الكون ١٣٫٧٨٧ مليار سنة، وثابت هابل، وعمق إعادة التأين.

وفي هذه الخريطة أثر يعود إلى ما قبل النجوم: «الأفق الصوتي» للبلازما البدائية يبلغ نحو ٥٠٠ مليون سنة ضوئية، ويظهر في توزيع المجرات اليوم كتذبذب تفضيلي في المسافات بينها (BAO). إنها مسطرة كونية محفورة في نسيج الكون، نستعملها اليوم لقياس تمدده.

لكن للخريطة سقفا: عند حدود ما يمكن رصده، تختفي التباينات لأن الضوء لم يتحرك بما يكفي ليحملها. هذا «الأفق الكوني» ليس حدا للمكان، بل حد للمعلومات؛ وما وراءه قد يكون موجودا، لكنه غير قابل للرصد مبدئيا.

يجري تحليل خريطة الخلفية بتفكيكها إلى «متعددات أقطاب»: الشكل العام (أحادي القطب) هو الحرارة المتوسطة، ثم ثنائي القطب وهو أثر حركتنا نحن (٦٢٠ كيلومترا في الثانية)، ثم أقطاب أعلى تحمل بصمة الأفق الصوتي. الذروة الأولى عند الدرجة القطبية ٢٢٠ تخبرنا أن الكون مسطح؛ والثانية عند الدرجة ٥٤٠ تخبرنا أن الباريونات لا تزيد على ٥٪.

وقد أضاف بلانك، في نسخته النهائية عام ٢٠١٨، قياسا للاستقطاب على نمط E، وهو ما يكشف سرعة إعادة التأين وعمقها، ويقيد كتلة النيوترينو إلى أقل من ٠٫١٢ إلكترون-فولت. أي أن خريطة أقدم ضوء تخبرنا بكتلة جسيم لا يتفاعل إلا بالجاذبية.

لكن يبقى في الخريطة «شذوذات»: قوة غريبة في أقطاب كبيرة، وبرودة غير متوقعة في نصف السماء الجنوبي. وقد تكون مجرد تقلبات إحصائية، وقد تكون أثرا من كون قبل الكون. وهذا الاحتمال الأخير هو ما يجعل الخريطة، بعد ثلاثين عاما، لا تزال موضع نقاش.


١٠

كيمياء الكون الأول: أول جزيء، وأول عتمة

بعد الدقيقة العشرين، بقي الكون عشرات الآلاف من السنين في حالة بلازما متأينة، لأن القوة الكهرومغناطيسية لم تكن قادرة على تقييد الإلكترونات السريعة حول النوى. وعند عمر يقارب ٣٠ إلى ٤٠ ألف سنة، وحرارة ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كلفن، بدأت نوى الهيليوم تلتقط الإلكترونات أولا، لأن طاقة تأينها الأعلى. وعندها تشكل أول جزيء في الكون: أيون هيدريد الهيليوم، (HeH^+) وهو جزيء هش لا يوجد على الأرض إلا في ظروف خاصة، لكنه كان أول ما عرف «رابطة كيميائية».

ثم جاءت «إعادة الاتحاد»: عند ٣٨٠ ألف سنة، وحرارة ٣٠٠٠ كلفن، اتحد الإلكترون بالبروتون مكونا ذرة الهيدروجين المتعادلة، فانفتح الطريق أمام الضوء. هذا الضوء — الذي يصلنا اليوم عند ٢٫٧٢٥ كلفن — هو أقدم ما نراه، وأول صورة للكون قبل أن يوجد فيه نجم واحد.

والتفصيل الذي يستحق التوقف: إعادة الاتحاد لم تكن لحظة واحدة، بل عملية بطيئة تخللتها «شفافية» جزئية. فالفوتونات كانت تفلت من مناطق ثم تحتبس في أخرى، إلى أن اكتملت الشفافية عند الانزياح الأحمر z يقارب ١١٠٠. ولهذا تحمل الخلفية الميكروية تباينات على مقاييس صغيرة، لا مجرد لون واحد.



خريطة السماء كاملة في تسع نطاقات ترددية من مرصد بلانك: الحد الفاصل بين زمن البلازما وزمن الضوء، وأول صورة يمكن رسمها للكون قبل النجوم.
المصدر: ESA / Planck Collaboration

وبعد إعادة الاتحاد حلت «العصور المظلمة»: ما بين ٣٨٠ ألفا و١٠٠ مليون سنة، لم يكن في الكون مصدر ضوء يذكر — ولا نجوم ولا مجرات، بل هيدروجين محايد يمتص أي فوتون فوق بنفسجي. وهذه الحقبة لا نراها مباشرة، بل نستنتجها من «خط ٢١ سنتيمترا» للهيدروجين المحايد، وهو ما يسعى الجيل الحالي من المراصد الراديوية إلى رصده؛ فقد أعلن تجريب EDGES عام ٢٠١٨ إشارة أعمق من المتوقع عند z يقارب ١٧، لكنها لم تتأكد بعد.

ثم بدأت «إعادة التأين»: الأشعة فوق البنفسجية من النجوم والمجرات الأولى مزقت ذرات الهيدروجين من جديد، على مراحل، بين الانزياحين ١٥ و٦ تقريبا. وقد رصد تلسكوب جيمس ويب أدلة على أن هذه العملية لم تكن حدثا واحدا، بل موجة غير منتظمة اجتاحت الكون على مدى مئات الملايين من السنين — كمدينة تنام وتستيقظ على مراحل.

وتبقى المرحلة الأغرب بلا رصد مباشر: العصور المظلمة نفسها. نحن نعرف أنها حدثت، ونعرف كم دامت، لكننا لم نر منها فوتونا واحدا. وهي، بهذا المعنى، أطول «فراغ» في أرشيفنا الكوني، وأصدق دليل على أن معرفتنا، بكل ضخامتها، مبنية على قليل من الضوء.

١١

الضوء الأول، ثم العتمة

عند ٣٨٠ ألف سنة، برد الكون إلى ٣٠٠٠ كلفن، فاتحدت الإلكترونات بالبروتونات، وانطلق الضوء، لم يكن ضوءا أبيض، بل وهجا برتقاليا مائلا إلى الصفرة، وقد ظل يسافر ١٣,٨ مليار سنة حتى وصل إلينا، متمددا مع تمدد الفضاء، فصار ميكرويا عند ٢,٧٢٥ كلفن.

وقبل هذه اللحظة، كانت الموجات الصوتية في البلازما تتذبذب: الجاذبية تسحب المادة إلى التجمعات، وضغط الفوتونات يدفعها للخارج، فتتشكل «تذبذبات صوتية باريونية» انتشرت كأصداف كروية، وعند إعادة الاتحاد تجمدت هذه الأصداف فجأة عند نصف قطر صوتي مقارنته اليوم نحو ١٤٧ ميغافرسخ (قرابة ٤٨٠ مليون سنة ضوئية)، فصار لدينا «مسطرة قياسية» نميس بها تاريخ التوسع.

بعد ذلك غرق الكون في العصور المظلمة: لا نجم ولا كويزر، لم يكن الظلام موتا، بل كان فترة تخمر هادئة، كانت فيها المادة المظلمة تحفر أول آبار الجاذبية في شبكة الكون، وتنتظر أول ضوء.

عند ٣٨٠ ألف سنة، كانت البلازما لا تزال كثيفة بما يحبس الفوتونات، ولما برد الكون إلى ٣٠٠٠ كلفن، اتحد الإلكترون بالبروتون مكونا ذرة الهيدروجين المتعادلة، فانفتح الطريق أمام الضوء: تلك هي «إعادة الاتحاد»، وهي اللحظة التي صار فيها الكون شفافا، الضوء الذي انطلق حينها يصلنا اليوم، بعد ١٣,٨ مليار سنة، على شكل ميكروويف بارد عند ٢,٧ كلفن.

ثم حلت العصور المظلمة: ما بين ٣٨٠ ألفا و١٠٠ مليون سنة، لم يكن في الكون مصدر ضوء يذكر — لا نجوم ولا مجرات، بل هيدروجين محايد يمتص أي فوتون فوق بنفسجي، وهذه الحقبة لا نراها مباشرة، بل نستنتجها من «خط ٢١ سنتيمترا» للهيدروجين المحايد، وهو ما يسعى الجيل الحالي من المراصد الراديوية إلى رصده.

بعد ذلك بدأت «إعادة التأين»: الأشعة فوق البنفسجية من النجوم والمجرات الأولى مزقت ذرات الهيدروجين من جديد، على مراحل، بين الانزياحين z بين ١٥ و ٦, وقد رصد تلسكوب جيمس ويب أدلة على أن هذه العملية لم تكن حدثا واحدا، بل موجة غير منتظمة اجتاحت الكون على مدى مئات الملايين من السنين.

من أكثر الجبهات إثارة اليوم محاولة رصد «خط ٢١ سنتيمترا» من الهيدروجين المحايد في العصور المظلمة، فقد أعلن تجريب EDGES عام ٢٠١٨ إشارة أعمق من المتوقع عند z يقارب ١٧، ما قد يعني إما غازا أبرد من النماذج، وإما تفاعلا مع مادة مظلمة، لكن الإشارة تحتاج إلى تأكيد مستقل، وقد شكك فيها كثيرون.

وقد غير تلسكوب جيمس ويب الصورة أيضا: فبدلا من صورة واحدة لإعادة التأين، وجدنا عملية مجزأة تمتد على مئات الملايين من السنين، وتختلف من منطقة إلى أخرى، أي أن الكون لم «يضئ» دفعة واحدة، بل أضاء تدريجيا كمدينة تنام وتستيقظ.

وتبقى المرحلة الأغرب بلا رصد مباشر: العصور المظلمة نفسها. نحن نعرف أنها حدثت، ونعرف كم دامت، لكننا لم نر منها فوتونا واحدا. وهي، بهذا المعنى، أطول «فراغ» في أرشيفنا الكوني.


١٢

من الذرة الفلسفية إلى سبعة عشر حقلا كموميا

> فكرة «الذرة» ليست يونانية في أصلها: فقد تصورتها المدرسة الفيشيشيكا الهندية في الألفية الأولى قبل الميلاد، ونسبتها إلى كنادا، واصفة وحدات نهائية غير قابلة للتجزئة تسمى «أنو» تتألف منها الأجسام كلها. ثم صاغها ليوقيبوس وديمقريطس في اليونان بعد ذلك بأربعة قرون تحت اسم «أتوموس»، أي «ما لا يقسم»، وبقيت الفكرة فلسفية خالصة حتى مطلع القرن التاسع عشر، حين أدخلها جون دالتون إلى العلم التجريبي في مختبره بمانشستر، فأثبت بقياسات الغازات أن المركبات الكيميائية تتكون بنسب عددية ثابتة من ذرات عناصر مختلفة («قانون النسب المتضاعفة»، ١٨٠٣).

لكن التجربة نقضت «عدم قابلية الذرة للتجزئة» عبر أربع محطات متتالية. الأولى: اكتشاف الإلكترون في منتصف نوفمبر ١٨٩٧، حين عزل جوزيف جون طومسون الجسيم سالب الشحنة الحامل للتيار في الأنابيب المفرغة، وأثبت أنه أخف من البروتون بـ١٨٣٦ مرة، وأنه يجري في كل العناصر دون تمييز؛ ونال نوبل ١٩٠٦. الثانية: النموذج النووي، حين أطلق إرنست رذرفورد جسيمات ألفا على رقاقة ذهب عام ١٩٠٩، فعبرت معظمها دون انحراف يذكر، وارتدت نسبة ضئيلة بزوايا حادة؛ فأثبت أن الذرة فضاء فارغ تقريبا، وأن كتلتها وشحنتها الموجبة مركزة في نواة متناهية الصغر. في ذرة الهيدروجين تبلغ المسافة بين الإلكترون والبروتون نحو ٣١ ألف ضعف قطر البروتون، ويسير الإلكترون بسرعة تتجاوز مليوني متر في الثانية، أي نحو ١٪ من سرعة الضوء.

الثالثة: اكتشاف النيوترون عام ١٩٣٢، بعد أن لاحظ الفيزيائيون أن العدد الذري للهيليوم اثنان (بروتونان وإلكترونان) بينما كتلته أربعة أضعاف ذرة الهيدروجين؛ فجاءت تجربة جيمس تشادويك الحاسمة لتفسر النقص، والرابعة: الانشطار النووي عام ١٩٣٨، حين قذف أوتو هان وفريتز شتراسمان نوى اليورانيوم بالنيوترونات، فأدركت ليز مايتنر أن النيوترون شطر النواة إلى كربتون وباريوم مع إطلاق هائل لطاقة الربط، وسمت العملية «الانشطار»، وقد قاد هذا الاكتشاف مباشرة، عبر مشروع مانهاتن، إلى تجربة «ترينيتي» في صحراء نيومكسيكو عند الخامسة والنصف من صباح ١٦ يوليو ١٩٤٥، حيث أطلق ضغط البلوتونيوم في القنبلة طاقة تعادل ٢١ ألف طن من TNT، فصهر رمل الصحراء إلى زجاج أخضر.



مقطع في كاشف ALICE بمنظمة CERN: الآلة التي تعيد إنتاج بلازما الكواركات والغلوونات، حيث تصبح المادة التي نصنع منها عارية من كل بنية.

المصدر: CERN / ALICE Collaboration

وعدد الذرات في جسد بشري واحد يفوق عدد نجوم الكون المرئي كلها؛ ففي الجهاز العصبي ٨٦ مليار عصبون تكونت من أكثر من ١٠ أس ٢٧ ذرة، لكن وجود الذرات نفسها معلق بموازنة بالغة الحساسية بين كتل الجسيمات وقوى القوى، فالقوة النووية الشديدة أقوى من الجاذبية بـ١٠ أس ٣٨ مرة، ومن الكهرومغناطيسية بـ١٠٠ مرة، لكن مداها لا يتجاوز ١٠ أس سالب ١٥ متار، ولو كانت أضعف بنسبة ٩٪ فقط لتفككت نواة الديوتيريوم، واستحال تكوين أي عنصر غير الهيدروجين، ولو كانت أقوى بنسبة ٢٪ لارتبط كل بروتونين في «ثنائي بروتون» بعد الانفجار، فاحترق هيدروجين الكون كله إلى هيليوم، ولو كان الإلكترون أثقل من فارق الكتلة بين النيوترون والبروتون (نحو سبع واحد بالمئة) لالتقطته البروتونات فتحولت إلى نيوترونات، ولاختفت الذرات،

وفي منتصف القرن، كشفت المسرعات عشرات الجسيمات الثقيلة القصيرة العمر: البيونات والكايونات وباريونات لامبدا وسيغما وإكساي، وفي عام ١٩٦٤ اقترح موراي غيل-مان في كالتك وجورج تسفايغ في CERN، كل على حدة، أن الهادرونات ليست أولية؛ فسمى تسفايغ مكوناتها «الآس»، واختار غيل-مان كلمة «كوارك» مستعيرا تهجئتها من عبارة «ثلاثة كواركات للسيد مارك!» في رواية جيمس جويس «يقظة فينيغان»، وقد تأكد وجود الكواركات تجريبيا عام ١٩٦٨ في مركز ستانفورد الخطي (SLAC)، بطول ٣،٢ كيلومتر وعلى عمق تسعة أمتار، حين أطلقت إلكترونات بطاقة ٢٠ غيغاإلكترون-فولت على البروتونات والنيوترونات، فانعكست عن مراكز نقطية صلبة في داخلها،

وتنتظم الكواركات في ست نكهات (u, d, s, c, t, b)، حيث يزيد الكوارك القمي على الكوارك الساحر بنحو ١٣٦ مرة (ما يعادل كتلة ذرة ذهب واحدة)، ويحمل العلوي شحنة ثلثين والدفلي سالب ثلث، وتتجمع ثلاثا ثلاثا لتكون الباريونات، أو في أزواج كوارك-ضد كوارك لتكون الميزونات، لكن اكتشاف باريون «أوميغا سالب» عام ١٩٩٤ — المكون من ثلاثة كواركات غريبة متطابقة — بدا مخالفا لمبدأ استبعاد باولي، حتى حل والي غرينبيرغ التناقض بإدخال خاصية كمومية جديدة سماها «شحنة اللون» (أحمر وأخضر وأزرق وأضدادها، استلهاما من مزج ماكسويل ثلاثة ألوان لتكوين الأبيض المحايد)،

وتصف الديناميكا اللونية الكمومية — التي نال عليها ديفيد غروس وديفيد بوليتزر وفرانك ويلتشيك نوبل ٢٠٠٤ — تفاعلات الكواركات عبر ثمانية غلوونات عديمة الكتلة، والغلوونات وبحر الكواركات الافتراضية يشكلون نحو ٩٩٪ من كتلة البروتون والنيوترون؛ أي أن كتلتك ليست كتلة ما تحتويه، بل طاقة ربط ما يربطه، وتعمل الغلوونات كشريط مطاطي كمومي يحبس الكواركات داخل الهادرونات: فإذا سحب كوارك بطاقة عالية، انقطع الشريط، وتحولت طاقة الشد فورا إلى زوج كوارك-ضد كوارك يقذف كميزون — دون أن يتحرر كوارك واحد أبدا،

أما نظرية الحقل الكمومي فقد ولدت من جرحين تجريبيين، فبعد أن قسم نيلز بور مدارات الهيدروجين عام ١٩١٣ إلى مستويات كمومية تفسر أطيافه الأربعة المرئية، كشف الرصد الدقيق انشقاق خط إتش-ألفا إلى خطين متقاربين بفارق أدق من خيط العنكبوت بـ٢٥٠ ألف مرة، وهو ما فسره بول ديراك بمعادلته النسبية عام ١٩٢٨ عبر تفاعل لف الإلكترون (نصف، يحتاج إلى دوران ٧٢٠ درجة ليعود إلى حاله) مع مجاله المغناطيسي المداري،

ثم فجر مؤتمر شلتر آيلاند في نيويورك عام ١٩٤٧ مفاجأتين لم تستطعهما معادلة ديراك: قياس بوليكارب كوش للعزم المغناطيسي للإلكترون فوجد ٢,٠٠٢٣٨ بدل القيمة ٢ تماما؛ ورصد ويليس لامب انشقاقا بمقدار جزء من المليون بين مستويين كانا يفترضان متطابقين، والسبب أن ديراك عامل الإلكترون كموميا وأبقى الحقل الكهرومغناطيسي كلاسيكيا، بينما الحقل نفسه مكمم ويعج بفوتونات افتراضية وأزواج إلكترون-بوزيترون تدفع الإلكترون الحقيقي وتزيح عزمه وطاقته، وحين حاول أوبنهايمر جمع مساهمات هذه الجسيمات عام ١٩٢٩ ظهرت قيم لا نهائية كادت تسقط النظرية، حتى نجح شفينغر وفاينمان وتوموناغا في الأربعينيات (نوبل ١٩٦٥) في اختراع «إعادة التطبيع» لامتصاص اللانهايات بمعايرتها على القيم المقيسة، فصارت الكهروديناميكا الكمومية أدق نظرية في تاريخ العلم: تنبأت بعامل الإلكترون ٢,٠٠٢٣١٩٣٠٤٣٥٥٢، وجاءت القياسات في فبراير ٢٠٢٣ عند ٢,٠٠٢٣١٩٣٠٤٣٦١٢ — تطابق بجزء من تريليون، أي أدق من قياس المسافة إلى القمر بسماكة شعرة،

وهكذا تنتهي هذه الرحلة إلى حقيقة مقلقة: الجسيمات ليست كرات صلبة، بل اهتزازات كمومية موضعية في سبعة عشر حقلا متداخلا تملأ الزمكان في النموذج القياسي — ستة حقول كواركات، وستة حقول لبتونات (الإلكترون والميون والتاو ونيوتريناتها الثلاثة)، وأربعة حقول بوزونات قوة (الفوتون وبوزونا W وZ والغلوونات)، وحقل هيغز؛ أو ٢٤ حقلا إذا فصلت مكونات اللون، و٦١ جسيما أوليا إذا حسبت الألوان والجسيمات المضادة، ويحتوي الكون المرئي على أكثر من ٣ × ١٠ أس ٨٠ كواركا وإلكترونا، بكثافة تقترب من جسيم واحد في كل متر مكعب من الفضاء،

التناظرات الخفية: من غالوا إلى ضعف الجاذبية

قبل موته في مبارزة عند الفجر في ٣٠ مايو ١٨٣٢ قرب باريس، وهو في العشرين، سجل إفاريست غالوا برهانه على استحالة إيجاد صيغة جبرية عامة لحل كثيرات الحدود من الدرجات العالية، فأسس «نظرية الزمر» التي صارت اللغة الرياضية لفيزياء الجسيمات.

وانطلاقا من «مبدأ الفعل الأقل» — الذي بدأه بيير دو فيرما في البصريات، وعممه لاغرانج وهاملتون على الفيزياء كلها — برهنت إيمي نوتر (من مواليد إرلانغن ١٨٨٢، التي رثاها أينشتاين في «نيويورك تايمز» في مايو ١٩٣٥) مبرهنتها الشهيرة: كل تناظر متصل في قوانين الفيزياء يقابله مقدار محفوظ، وكل قانون حفظ ينبع من تناظر كامن. فتناظر الإزاحة المكانية يولد حفظ الزخم الخطي؛ وتناظر الإزاحة الزمنية يولد حفظ الطاقة؛ وتناظر دوران الطور الموضعي (تناظر المقياس U(1)) لدالة الإلكترون الموجبة يولد حفظ الشحنة الكهربائية، ويستلزم وجود حقل الفوتون.

والجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة الشديدة تحترم تناظري التكافؤ (P) واقتران الشحنة (C). ولهذا لو تواصلت حضارتان كونيتان بالموجات الراديوية وتشاركتا علومهما، لما أمكن لواحدة أن تعرف، قبل مصافحة قاتلة، إن كانت الأخرى من مادة أم من ضدها. والقوة النووية الضعيفة وحدها تكسر هذا التناظر: فبعد أن اقترح لي ويانغ (١٩٥٦) وأثبتت وو (١٩٥٧) كسر التكافؤ في تحلل بيتا للكوبالت-٦٠ المستقطب، أجرى فال فيتش وجيمس كرونين (١٩٦٤، نوبل ١٩٨٠) تجربة حاسمة على حزمة كايونات متعادلة تتذبذب كموميا بين الحالتين، فوجدا أن كايونا واحدا من كل ٥٠٠ يتحلل إلى بيونين اثنين لا ثلاثة، وأنه عند التحلل إلى إلكترونات وبوزيترونات تنتج ٣٠١ بوزيترون لكل ٣٠٠ إلكترون. وهذا الكسر الصريح لتناظر CP يثبت وجود تمييز كوني مطلق بين المادة وضدها، بينما لم ترصد مصادمات LHC أي جسيم فائق التناظر بعد.

وتأريخ الأحافير العضوية — كالماموث المحنط المكتشف في جليد يوكون عام ٢٠٢٢ بعمر ٣٠ ألف سنة — يعتمد على تحلل الكربون-١٤ إلى نيتروجين-١٤ عبر القوة النووية الضعيفة. ومع أن هذه القوة تبدو واهنة ومحصورة في مدى لا يتجاوز ١٠ أس سالب ١٧ مترا، فإن ضعفها الظاهري ناتج عن ثقل حاملاتها (W وZ، بكتل ٨٠ إلى ١٠٠ ضعف كتلة البروتون، وعمر افتراضي ٣ × ١٠ أس سالب ٢٥ ثانية). وإدخال هذه الكتلة مباشرة في معادلات الحقل الكمومي كان يدمر قابلية إعادة التطبيع ويعيد اللانهايات المدمرة.

وحل شيلدون غلاشو وستيفن واينبرغ وعبد السلام هذه المشكلة في «النظرية الكهروضعيفة» (نوبل في ١٠ ديسمبر ١٩٧٩): فدمجوا زمرة U(1) الكهرومغناطيسية بزمرة SU(2) للف النووي الضعيف، بافتراض أربعة بوزونات عديمة الكتلة في الأصل تتفاعل مع أربعة أنماط لحقل هيغز عند انكسار التناظر تحت حرارة ١٠ أس ١٥ كلفن: فيبتلع W1 وW2 النمطين H الموجب وH السالب ليصيرا البوزونين الثقيلين W الموجب وW السالب؛ ويمتزج W3 وB، فيبتلع أحدهما H المحايد ليصير Z المحايد الثقيل المحايد، ويفلت الآخر دون اقتران بهيغز فيبقى الفوتون عديم الكتلة؛ أما النمط الرابع فيبقى وحده بوصفه بوزون هيغز الفيزيائي، وعند طاقات ١٠ أس ١٦ غيغاإلكترون-فولت، تضعف القوة الشديدة وتقوى الضعيفة، فتتقارب القوى الثلاث في قوة كبرى موحدة.

وفي مطلع ٢٠٢١، أعلن فريق دولي من ٢٠٠ عالم في ٣٥ مؤسسة، في فيرميلاب قرب شيكاغو، نتائج تجربة عمياء تدير جسيمات الميون داخل مغناطيس حرف C بطول ١٥ مترا؛ فأظهرت القياسات أن عزم الميون المغناطيسي يتذبذب بمعدل يتجاوز تنبؤ النموذج القياسي (باحتمال خطأ إحصائي واحد من ٤٠ ألفا)، فاتحة الباب أمام جسيمات مجهولة أو «قوة أساسية خامسة».

أما الجاذبية، فهي محرك هذه الانفجارات الكونية كلها، ومع ذلك فهي عند المستوى دون الذري أضعف من القوة النووية الضعيفة بـ١٠ أس ٢٥ مرة، وأضعف بمليون مليار مرة مما تتطلبه الحسابات الأولية لفيزياء الجسيمات — وهي المعضلة المعروفة بـ«مشكلة التسلسل الهرمي». وبعد أن صاغ نيوتن قانون الجذب العام في عزلة وولسثورب في سنة الطاعون ١٦٦٦، اقترح الفنلندي غونار نوردستروم عام ١٩١٣ أول نظرية تستنبط الجاذبية من انحناء الزمكان؛ لكن رصد انحراف ضوء النجوم في كسوف ١٩١٩ دحض معادلاته وأيد النسبية العامة (١٩١٥) القائمة على مبدأ التكافؤ بين السقوط الحر وانعدام الوزن، وبين التسارع المنتظم وحقل الجاذبية. فالجاذبية تنبع من الطاقة والزخم لا من كتلة السكون وحدها، ولذلك تسبق حقل هيغز زمنيا وتؤثر في الفوتونات العديمة الكتلة.

وفي ١٤ سبتمبر ٢٠١٥، في التاسعة وخمسين دقيقة صباحا — بعد يومين فقط من تشغيل مرصدي LIGO في هانفورد وليفنغستون — اهتزت ذراعا الليزر بطول أربعة كيلومترات بمقدار جزء من عشرة آلاف من قطر بروتون واحد، فالتقطتا صرخة الزمكان لثقبين أسودين (٣٦ و٢٩ كتلة شمسية) يندمجان في ثقب واحد بكتلة ٦٢، بعد تحويل ثلاث كتل شمسية كاملة في عشر ثانية إلى موجات تثاقلية خالصة، تجاوزت ذروة لمعانها لمعان كل نجوم الكون المرئي مجتمعة بخمسين مرة.

لكن محاولة تكميم الجاذبية عبر افتراض «غرافيتون» تصطدم بأن الغرافيتون يحمل طاقة فيحني الزمكان، فيولد غرافيتونات أخرى في حلقة مفرغة لا تعاد تطبيعها، واحتمالات تتجاوز الواحد. وقد أثبت السوفييتي ماتفي برونشتاين في ورقته الرائدة عام ١٩٣٥ — قبل إعدامه في تطهيرات ستالين بلينينغراد عام ١٩٣٨ وهو في الحادية والثلاثين — أن سبر مسافة أصغر من طول بلانك يستلزم تركيز طاقة تكفي لخلق ثقب أسود مجهري يبتلع جسيم القياس نفسه؛ أي أن الزمكان متقطع في أساسه. ولتفسير ضعف الجاذبية الشديد دون الانزلاق إلى تناقضات التناظر الفائق، اقترح ليسا راندال ورامان سوندروم نموذج «الأبعاد الإضافية المنحنية»: كوننا غشاء رباعي الأبعاد يفصله عن غشاء آخر فضاء خماسي الأبعاد تحتفظ فيه الجاذبية بقوتها الكاملة، فتتلاشى شدتها أسيا وهي تتسرب عبر البعد الإضافي، ولا يصل إلى غشائنا الكوني إلا أثرها الضئيل.

١٤

الضوء والنيوترينوات والفراغ الكاذب

تدرج فهم البصريات من فرضية الإغريق أن العين تصدر الضوء، إلى إثبات ابن الهيثم استقامة الأشعة الواردة إلى العين، ثم انقسم فيزيائيو القرن السابع عشر بين نظرية الموجة لهويغنس والنظرية الجسيمية لنيوتن في «البصريات» (١٧٠٤)، التي تنبأت أيضا بانحناء الضوء بالجاذبية. ثم انتصر التفسير الموجي عبر تجربة الشق المزدوج لتوماس يونغ (١٨٠٠)، وهندسة عدسة الفنار لفرينل، واستقطاب الكالسيت؛ حتى وحد ماكسويل (١٨٦٥) الكهرباء والمغناطيسية والبصريات، فاكتشف أن الضوء موجة كهرومغناطيسية تتولد ذاتيا وتسير بسرعة لا تتقيد بطول موجتها. وأثبت هيرتز وجود الموجات الراديوية في كارلسروه ١٨٨٦، واكتشف رونتغن الأشعة السينية مصورا عظام يد زوجته بيرتا، فنال أول جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٠١.

لكن الظاهرة الكهروضوئية (التي فسرها أينشتاين ١٩٠٥، نوبل ١٩٢١) وتجربة كومبتون عام ١٩٢٣ في تشتت الأشعة السينية عن الإلكترونات ككرات البلياردو، أثبتتا أن الضوء يتبادل الطاقة والزخم في حزم مكممة سماها الكيميائي جيلبرت لويس «فوتونات» في «نيتشر» عام ١٩٢٦. ثم عمم لويس دو بروي ثنائية الموجة والجسيم على المادة كلها في أطروحته ١٩٢٤ (نوبل ١٩٢٩)، وتأكد ذلك تجريبيا حتى على جزيئات معقدة من ألفي ذرة.

وفي صياغة فاينمان لرسوم مسارات الزمكان، استبعد فاينمان الفعل الذاتي للإلكترون وحصر الكهرومغناطيسية في تبادل الفوتونات عند الرؤوس. بل اقترح فاينمان وأستاذه جون ويلر «التفسير التبادلي»: أن الفوتون لا يطلق عشوائيا في الفراغ، بل يتبادل عبر «مصافحة عبر الزمن»، يرسل فيها الإلكترون المصدر موجة إلى المستقبل، ويرسل الإلكترون الممتص موجة إلى الماضي للاتفاق على التبادل.

ومنذ أن قاس أولي رومر سرعة الضوء المحدودة بنحو ٢٢٠ ألف كيلومتر في الثانية من تأخر خسوف قمر المشتري أيو، ودمرت تجربة ميكلسون-مورلي فرضية «الأثير» تماما، كشفت النسبية الخاصة حقيقة مذهلة عن الفوتون نفسه: لأنه يسير بالسرعة القصوى في الكون، فإن كل المسافات في إطاره تنكمش إلى الصفر والزمن يتوقف كليار فالفوتون الذي انطلق عند إعادة الاتحاد قبل ١٣٫٨ مليار سنة والذي يمتص اليوم في تلسكوب فضائي لا يعيش زمنا في إطاره الخاص: يولد ويموت في اللحظة نفسها.

والشمس تصدر ذروة طيفها في الأخضر (فتظهر بيضاء من الفضاء وصفراء عبر الغلاف الجوي بسبب تشتت الأزرق)، وتطلق في الوقت نفسه سيلا هائلا من النيوترينوات يخترق الأرض بمعدل ١٫٨ × ١٠ أس ١٧ نيوترينو شمسي في الدقيقة؛ أي نحو مئة مليار نيوترينو عبر ظفر إبهام في الثانية، ولا يوقف نصفها إلا حاجز من الرصاص بسماكة سنة ضوئية كاملة، بينما يبلغ احتمال تفاعل نيوترينو واحد مع جسد بشري على مدى عمره ٢٥٪.

وبعد أن أضاف كوان وراينس أملاح الكادميوم إلى كاشفه السائل لرصد نيوترينوات المفاعلات في يونيو ١٩٥٦، بنى الياباني ماساتوشي كوشيبا خزان كاميوكاندي المملوء بـ٤٥٠٠ طن من الماء على عمق كيلومتر داخل منجم زنك، وركبه بألف أنبوب تضاعف ضوئي، فرصد في ٢٣ فبراير ١٩٨٧ دفقة نيوترينوات استمرت ١٣ ثانية من المستعر الأعظم SN 1987A قبل وصول ضوئه بساعات. (أما ادعاء تجربة OPERA في سبتمبر ٢٠١١ بأن النيوترينوات تجاوزت الضوء بـ٦٠ نانوثانية على مسافة ٧٣٠ كيلومترا، فقد ثبت أنه خطأ تقني سببه كبل ألياف بصرية مرتخ موصول بنظام GPS وساعة رئيسية معطوبة.)

وفجرت النيوترينوات ثورة حقيقية في النموذج القياسي عام ١٩٦٨، حين قاس رايموند ديفيس وجون باهكال النيوترينوات الإلكترونية الشمسية في منجم هومستيك بجنوب داكوتا بخزان ٦١٥ طنا من رباعي كلورو الإيثيلين، فوجدا ثلث العدد المتوقع فقط. واستمرت «مشكلة النيوترينو الشمسي» ثلاثين عاما حتى رصد مرصد سوبر-كاميوكاندي بقيادة تاكاكي كاجيتا عام ١٩٩٨ نقصا في نيوترينوات الميون الآتية عبر الأرض، وأثبت مرصد SNO الكندي بقيادة آرثر مكدونالد أن ثلثي نيوترينوات الشمس لم تختف بل تحولت في طريقها إلى نيوترينوات ميون وتاو («تذبذب النيوترينو»؛ نوبل ٢٠٠٢ لديفيس وكوشيبا، ونوبل ٢٠١٥ لكاجيتا ومكدونالد).

وهذا التذبذب يستلزم بالضرورة أن تكون للنيوترينوات كتلة غير صفرية (أقل من إلكترون-فولت واحد مقابل ٥١١ ألفا للإلكترون، لكن وفرتها أكبر من المادة بمليار مرة تجعل كتلتها الكونية الكلية مقاربة لكل نجوم الكون)، وأن تكون كل نكهة مزيجا كموميا من ثلاث حالات كتلية, ولأن آلية هيغز تمنح الكتلة بقلب اللف بين اليمين واليسار، ولم ترصد نيوترينوات يمينية، فإن تفسير كتلتها يستلزم فيزياء جديدة: إما أن يكون النيوترينو جسيم مايورانا، أي ضده نفسه، وإما «آلية الأرجوحة» التي تقرن النيوترينوات الخفيفة بنيوترينوات يمينية ثقيلة جدا أو «عقيمة» لا تتفاعل حتى بالقوة الضعيفة، وهي مرشحة للمادة المظلمة, ولرصد خلفية النيوترينوات الكونية من الثانية الأولى مباشرة، تستخدم تجربة KATRIN في ألمانيا ٢٠ ميكروغراما من التريتيوم المشع لالتقاط ما يصل إلى نيوترينوين بدائيين في السنة، بينما يطور مشروع PTOLEMY في برينستون طبقات ذرية من التريتيوم على الكربون للوصول إلى ١٠٠ غرام والتقاط نحو عشرة نيوترينوات بدائية سنوياً.

أما «العدم المطلق»، فقد دحضت تجربة نصفي كرة ماغديبورغ عام ١٦٥٤ — حين لم تستطع ستة عشر حصانا فصل نصفي كرة مفرغة بالمضخة الأولى — قول أرسطو إن «الطبيعة تخشى الفراغ», لكن الفيزياء الحديثة أثبتت استحالة الوصول إلى «لا شيء» بإفراغ حجم مكاني: فبعد إزالة المادة والإشعاع والأثير، تبقى الحقول الكمومية السبعة عشر وطاقة نقطة الصفر، ويبقى نسيج الزمكان المتغير نفسه، وتبقى القوانين والثوابت, وكما لاحظ الفيلسوف-الفيزيائي ديفيد ألبرت في نقده لكتاب لورانس كراوس (٢٠١٢): إن ظهور جسيمات من إعادة ترتيب حقول كمومية لا علاقة له بالخلق من العدم المطلق، بل هو أشبه بتكوين قبضة من ثني أصابع موجودة سلفاً.

والأخطر من ذلك ما اكتشفه سيدني كولمان في هارفارد في أواخر السبعينيات عن استقرار هذا الفراغ, فبينما استقرت الحقول الكمومية الأخرى عند الصفر بعد الانفجار كبندول في قاعه، سقط حقل هيغز عند بيكوثانية واحدة كقلم متوازن على رأسه، فاتخذ «قيمة توقع فراغية» غير صفرية في كل نقطة من الفضاء، فصار الفضاء «لزجا» ومنح الجسيمات كتلتها القصورية, لكن كولمان أدرك أن حقل هيغز قد لا يكون مستقرا عند الحد الأدنى المطلق للطاقة (الفراغ الحقيقي)، بل قد يكون عالقا في حفرة طاقة معلقة فوقه تعرف بـ«الفراغ الكاذب»,

وعندما حول مصادم الإلكترون-بوزيترون الكبير (LEP، ١٩٨٩، بطول ٢٧ كيلومترا) إلى مصادم الهادرونات الكبير (LHC، ٢٠٠٨)، أنتجت تصادمات الغلوونات عبر حلقات الكوارك القمي بوزون هيغز بدلالة تجاوزت خمسة سيغما في يوليو ٢٠١٢، فأمكن أخيرا قياس كتلته ومقارنتها بأثقل فرميون (الكوارك القمي), وكانت النتيجة مقلقة على غير المتوقع: كتلة الكوارك القمي تتجاوز كتلة بوزون هيغز بنحو ٣٨٪, فمعادلات النموذج القياسي تقول إنه لو كان الفارق أقل من ٣٦٪ لكان فراغ هيغز مستقرا إلى الأبد، ولو تجاوز ٤٢٪ لكان الفراغ قد انهار فور ولادة الكون, أما كونه عند ٣٨٪ فيضع كوننا في منطقة «شبه الاستقرار»,

وهذا يعني وجود احتمال كمومي ضئيل — على مقاييس زمنية تفوق عمر الكون بكثير، ما لم تحل فيزياء غير مكتشفة محل هذا الحساب — بأن ينفق حقل هيغز كموميا في نقطة ما إلى الفراغ الحقيقي الأدنى طاقة، فيطلق فقاعة موت تتوسع بسرعة تقارب سرعة الضوء دون إنذار مسبق، فتتغير كتل الجسيمات وقوى القوى، وتتفكك كل الذرات، ويهوي كل ما في الداخل إلى انهيار جاذبي تام. وليس في هذا السيناريو شر ولا قصد؛ إنه فقط ما تقوله المعادلة عن فراغ لم يخترع ليبقى.

١٥

النجوم الأولى: حين أضاء الظلام

> بعد بضع مئات الملايين من السنين، انهارت أول أكوام الهيدروجين والهيليوم الخالية من أي معدن. لم تكن تلك النجوم كنجومنا: كانت كتلتها بين مئة وألف كتلة شمسية، وحرارتها تقارب ١٠٠ ألف كلفن، وعمرها لا يتجاوز بضعة ملايين من السنين. هذه هي «نجوم الجمهرة الثالثة».

لماذا كانت عمالقة؟ لأن الغاز البدائي كان يفتقر إلى الكربون والأكسجين والغبار، وهي ما يبرد السحب في زماننا إلى عشرة درجات فوق الصفر المطلق. أما الغاز الأول فلم يكن يبرد دون ٢٠٠–٣٠٠ كلفن، فلم تستطع الكتل الصغيرة أن تنهار، ولم تنجب إلا وحوشا.

وقد كشف أرصاد «علم الآثار النجمي» نجما هامشيا في هالة مجرتنا، هو SMSS J0313-6708، لا يكاد حديده يذكر بالنسبة إلى الشمس؛ وهو شاهد مباشر على الجيل الثاني الذي تكون من رماد نجم أولي واحد.



«أعمدة الخلق» في سديم القاعدة كما رصدها تلسكوب جيمس ويب: أعمدة غاز وغبار تنجب نجوما الآن، تماما كما أنجبت النجوم الأولى قبل ١٣ مليار سنة.
المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

هذه النجوم الأولى هي التي صنعت الجدول الدوري: في أعماقها اندمج الهيدروجين والهيليوم إلى كربون وأكسجين وسيليكون وحديد، ثم قذفتها انفجاراتها إلى الفضاء. نحن، بالمعنى الكيميائي الدقيق، حصيلة ذلك التلويث الأول.

لم تكن النجوم الأولى مجرد «نسخة مبكرة» من نجومنا، بل كان لها أثر فيزيائي مختلف: فبسبب كتلتها الهائلة وحرارة سطحها التي تبلغ ١٠٠ ألف كلفن، كانت تصدر كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية، وهي ما أعاد تأيين الكون. وعندما انفجرت، أغنت الوسط بين النجمي بالعناصر الثقيلة الأولى.

وقد بدأ تلسكوب جيمس ويب، منذ ٢٠٢٢، في رصد مجرات تعود إلى ٣٠٠ مليون سنة بعد الانفجار فقط. أقدمها المعروفة JADES-GS-z14-0، عند انزياح z = ١٤,٣٢ المفارقة أن كتلتها وسلوكها كانا أكبر مما تتوقعه النماذج لتلك الحقبة، وهذا ما يدفع النظريين إلى مراجعة سرعة تكون النجوم الأولى.

ويمكن تلخيص الجدول الزمني في سطر: بعد ١٠ أس سالب ٣٢ ثانية تضخم؛ وبعد ١ ثانية نيوترينوات حرة؛ وبعد ٣ دقائق نوى الهيليوم؛ وبعد ٣٨٠ ألف سنة ضوء؛ وبعد ١٥٠ مليون سنة نجوم؛ وبعد مليار سنة مجرات. كل ما تبقى من الكتاب هو تفصيل لهذه الأسطر السبعة.

لم ترصد نجوم الجمهرة الثالثة مباشرة بعد، بل تستدل عليها من آثارها: مجرات ذات معدن منخفض جدا، وإشارات إعادة تأين مبكرة، وتوزيع غير منتظم للعناصر الثقيلة في الغيوم القديمة. وأقرب ما وصلنا إليه نجم هامشي في هالة درب التبانة، نسبته من الحديد إلى الهيدروجين أقل من واحد من عشرة ملايين من نظيرتها الشمسية.

وقد تكون هذه النجوم الأولى مسؤولة عن انفجارات أشعة غاما الطويلة جدا، وعن أولى الموجات التثاقلية القابلة للرصد. ومع مرصد مثل «ليزا» أو «أينشتاين» القادم، قد نستطيع رصد اندماج ثقوب سوداء في تلك الحقبة، وقراءة تاريخ الكون من إشارة لا ضوء فيها.

والمفارقة أن النجوم الأولى كانت أعظم مصنع للعناصر، وأقصرها عمرا: فعمر نجم كتلته ٣٠٠ كتلة شمسية لا يتجاوز مليوني سنة. أي أنها عاشت وماتت قبل أن تتشكل مجرتنا الأولى.



النسخة التي التقطها هابل عام ٢٠٠٩ لسديم القاعدة: المقارنة مع صورة ويب تظهر تقدم أدواتنا بقدر ما تظهر ثبات المشهد.
المصدر: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team

موت النجوم: من السديم إلى الكثافة المطلقة

> النجوم لا تموت بهدوء. عندما ينفد وقود نجم كتلته أكبر من ثماني كتل شمسية، يمر بسلسلة من الاحتراقات المتسارعة: كربون في نحو ٦٠٠ سنة، نيون في أقل من سنة، أكسجين في أشهر، وسيليكون في يوم واحد. وفي النهاية يتراكم الحديد، وهو أعلى الطاقات الربطية النووية؛ فلا يمنح الاندماج طاقة بعد، بل يستهلكها.

في أقل من ربع ثانية، ينهار القلب بحجم الأرض إلى كرة نيوترونية بعرض عشرين كيلومتر. ترتد الطبقات الساقطة، وتحتاج موجة الصدمة إلى النيوترينوات لتستعيد قوتها: ٩٩٪ من طاقة السوبرنوفا تحمل على شكل نيوترينوات، ونحو ١٪ منها يكفي لتفجير النجم.

شهدنا ذلك في ٢٣ فبراير ١٩٨٧: التقطت كاميوكاندي-II وIMB نحو ٢٥ نيوترينو من المستعر الأعظم SN 1987A قبل الضوء بنحو ثلاث ساعات. كان ذلك أول تأكيد رصدي لآلية الانفجار النيوترينوية، وأول «فلك متعدد الرسائل» في التاريخ.



سديم السرطان: بقايا المستعر الأعظم الذي رصده astronomers الصينيون عام ١٠٥٤، ويحتضن في قلبه نباضا يدور ثلاثين مرة في الثانية. (المصدر: NASA, ESA, J. Hester & A. Loll (ASU)

وما تبقى هو أشد أشكال المادة كثافة: نجم نيوتروني تكافئ ملعقة صغيرة منه أكثر من مليار طن، ومجاله المغناطيسي في «المغناطيسات النجمية» يبلغ ١٠ أس ١٤–١٠ أس ١٥ غاوس، وهو ما يكفي لتحويل الذرة إلى إبرة أسطوانية، وفي أعمق أعماقه، قد تتخذ المادة النووية أشكالا هندسية تعرف بـ«المعكرونة النووية»، وهي أصلب مادة في الكون.

ليست كل النجوم تموت بالطريقة نفسها: فأقل من ثماني كتل شمسية تنتهي «قزما أبيض» — كرة من الكربون والأكسجين بحجم الأرض، كثافتها طن في السنتيمتر المكعب، وتبرد على مدى تريليونات السنين. أما الأثقل، فتنتهي في انفجار أو في ثقب أسود، بحسب الكتلة المتبقية من قلبها.

وفي كل الأحوال، فإن المستعر الأعظم هو مصنع العناصر: الحديد في دمك، والكالسيوم في عظامك، واليود في غدتك الدرقية، كلها خرجت من قلوب نجوم انفجرت قبل ولادة الشمس. ولهذا يقول الفلكيون — بلا مجاز — إننا «غبار نجوم».

وقد صار رصد المستعرات اليوم صناعة عالمية: شبكات من التلسكوبات الآلية مثل ZTF وLSST ترصد ملايين الأجرام كل ليلة، وتطلق التنبيهات في دقائق، ويتبعها طيف آني. صار بإمكاننا، للمرة الأولى، أن نرى الانفجار من أول ثانية، وأن نعرف ما الذي يحدث في القلب قبل أن يصلنا الضوء.

في ١٧ أغسطس ٢٠١٧، رصدت مراصد LIGO وVirgo اندماج نجمين نيوترونيين في مجرة NGC ٤٩٩٣. وبعد ١٫٧ ثانية، رأى فيرمي ومعه INTEGRAL انفجار أشعة غامار. وتابع الفلكيون الحدث بالضوء المرئي والأشعة السينية والراديوية لأشهر، فشهدوا أول «كيلونوفا» مسجلة، وتأكد أن الذهب والبلاتين واليورانيوم تصنع في هذه الاندماجات.

أما النباضات، وهي نجوم نيوترونية دوارة، فدقتها تجعل منها ساعات فلكية: النباض PSR B1919+21 يعد نبضاته بدقة تضاهي الساعات الذرية، ويستخدم لاختبار النسبية العامة ورصد موجات الجاذبية عبر «مصفوفة توقيت النباضات».

وقد أضافت هذه الاكتشافات بعدا جديدا: أن النجوم النيوترونية ليست نهايات ساكنة، بل مختبرات للفيزياء القصوى — حيث تتجاوز الكثافة كثافة النواة، ويبلغ المجال المغناطيسي ما يعادل تريليون مرة مجال الأرض، وحيث لا تكفي فيزياء الأرض لتفسير ما يحدث.



السرطان مجمعا من عدة أطوال موجية: الأشعة السينية تكشف الغاز المسخن إلى ملايين الدرجات في قلب البقايا
المصدر: NASA, ESA, and G. Dubner (IAFE)

١٧

الثقوب السوداء: عندما يصبح الفراغ أفقا

> في نوفمبر ١٩١٥، وبينما كان يحسب تحت نيران المدفعية على الجبهة الروسية، وجد كارل شفارتزشيلد أول حل مضبوط لمعادلات أينشتاين حول كتلة كروية، عند نصف قطر حرج، يبلغ ٢,٩٥ كيلومترا لكتلة الشمس، ينقلب الزمكان على نفسه: تصبح الحركة نحو الداخل مسارا زمنيا لا مهرب منه.

بعد عقود من الشك، جاءت البراهين: نظرية «اللاشعر» تقول إن الثقب الأسود لا يحتفظ إلا بثلاثة أرقام: الكتلة والشحنة والزخم الزاوي، ثم أضاف بيكنشتاين وهوكينغ أن مساحة الأفق مقياس لإنتروبيا الثقب، وأن الثقب يشع إشعاعا حراريا بدرجة حرارة تتناسب عكسيا مع كتلته.

وهكذا ولدت أعظم مشكلة في الفيزياء النظرية: إذا تبخر الثقب، إلى أين تذهب معلومات ما ابتلعه؟ الجواب الذي تتشكل ملامحه اليوم — عبر «منحنى بايج» و«الجزر الكمومية» و«ER = EPR» — هو أن المعلومات لا تفنى، بل تشفر في ترابطات دقيقة بين فوتونات الإشعاع الخارجي.



ثقب M87* الأسود: أول صورة في التاريخ لظل ثقب أسود، التقطها تعاون «تلسكوب أفق الحدث» عام ٢٠١٩ لكتلة تعادل ٦٫٥ مليار شمس.
المصدر: EHT Collaboration

وفي ١٠ أبريل ٢٠١٩، رأينا الظل بأعيننا: شبكة من ثمانية مراصد راديوية على سطح الأرض، بطول أساس يعادل قطر الكوكب، رسمت حلقة ضوء حول ثقب أسود كتلته ٦٫٥ مليار كتلة شمسية في قلب مجرة M87. لم تكن صورة فحسب، بل اختبارا للنسبية العامة على أعتاب أفق الحدث.

إن أبسط وصف للثقب الأسود هو أنه منطقة من الزمكان لا يمكن الفرار منها، لكن الأعمق هو أنه مقياس للمعلومات: فمساحة أفقه تتناسب مع إنتروبياه، لا مع حجمه. هذه العلاقة الغريبة — أن المعلومات تحسب بالمساحة لا بالحجم — هي أصل حدس «الهولوغرام»، وهو أن ما نراه في ثلاثة أبعاد قد يكون مسجلا على سطح ثنائي الأبعاد.

وقد أثارت هذه الفكرة ثورة في الفيزياء النظرية: فإذا كان الثقب الأسود يشع ويتبخر، فلا بد أن يكون هناك ميكانيزم يعيد المعلومات. ومن هنا ولدت «مفارقة المعلومات»، وتلتها مقترحات مثل «الجزر» و«النسخ المكممة»، وما زالت جميعها تحت الاختبار.

أما رصديا، فقد تحول الثقب الأسود من فكرة نظرية إلى جسم له صورة، فبعد صورة M87* عام ٢٠١٩ وصورة ساجيتاريوس A* عام ٢٠٢٢، جاءت صورة M87* بزاوية جديدة عام ٢٠٢٤ لتؤكد أن الحلقة ليست ثابتة، بل تتحرك فيزيائيا؛ وهذا ما حسم الجدل حول طبيعة البنية: إنها قرص تراكم يدور حول ظل، لا مجرد تشويش في المعالجة.

في ١٤ سبتمبر ٢٠١٥، التقطت مرصدتا LIGO أول موجة تثاقلية مباشرة: GW150914، ناتجة عن اندماج ثقبين أسودين كتلتهما ٣٦ و٢٩ كتلة شمسية، تكون منهما ثقب واحد كتلته ٦٢، مع فقدان ثلاث كتل شمسية تحولت إلى طاقة في جزء من الثانية. ومنح نوبل ٢٠١٧ على هذا الرصد.

أما حركة النجم S2 حول ساجيتاريوس A* فقد أتاحت اختبارا آخر: رصد فريق GRAVITY الانزياح نحو الأحمر التثاقلي المتوقع من النسبية العامة عند اقتراب النجم من الحضيض، فجاءت القياسات مطابقة للنظرية بحدود ٥ ٪، أي أن أينشتاين يصح على أعتاب أفق الحدث.

وبين الثقوب السوداء وبين المعلومات علاقة لم تحسم: فمبدأ «ER = EPR» يقترح أن التشابك الكمومي والجسور الزمكانية وجهان لشيء واحد، وهذا ما قد يحل مفارقة المعلومات دون كسر النسبية أو ميكانيكا الكم.


١٨

قلب المجرة: ساجيتاريوس A*

في مركز مجرتنا يقع ثقب أسود كتلته ٤,١٥ مليون كتلة شمسية، داخل نصف قطر لا يتجاوز ١٢ مليون كيلومتر. لا نراه، لكننا نرى نجم S2 يدور حوله في مدار بالغ الانحراف، فيقترب إلى ١٢٠ وحدة فلكية ويبلغ سرعة ٧٦٥٠ كيلومترا في الثانية، أي ٢,٥٪ من سرعة الضوء.

رصد فريقا راينهارد غينزل وأندريا غيز هذا المدار بالتكبير البصري التكيفي على مدى ثلاثين عاما؛ وكان ذلك برهانا حركيا لا لبس فيه على وجود الثقب الأسود، ومنحا عليه جائزة نوبل للفيزياء عام ٢٠٢٠.

وفي ١٢ مايو ٢٠٢٢، أعلن تعاون «تلسكوب أفق الحدث» صورة ظل ساجيتاريوس A*، أصعب بكثير من صورة M87: فالثقب أصغر بألف مرة، والغاز يتحرك حوله في دقائق لا أيام، فكانت الصورة تحتاج إلى معالجة حذرة لتفريق الحركة عن البنية.



ساجيتاريوس A*: صورة ظل الثقب الأسود في مركز مجرتنا، التقطها تعاون «تلسكوب أفق الحدث» عام ٢٠٢٢،
المصدر: EHT Collaboration

هذا الثقب هو أيضا محرك مجرتنا القديم: انتفاضاته السابقة تركت «فقاعات فرمي» الممتدة خمسين ألف سنة ضوئية فوق القرص وتحته، وستعود مجرتنا إلى نشاط عنيف حين تندمج مع أندروميدا بعد نحو ٤٫٥ مليار سنة.

إن خصوصية ساجيتاريوس A* أنه هادئ جدا بالنسبة إلى كتلته: فمعدل التراكم عليه أقل من واحد بالمئة من الحد النظري (حد إدينغتون)، ولهذا لا يظهر ككوازار ساطع بل كبقعة خافتة. ومع ذلك، فإن أي زيادة طفيفة في التغذية كافية لأن تشعل فقاعات تمتد عشرات آلاف السنين الضوئية.


وقد رصد مرصد شاندرا للأشعة السينية هذه الفقاعات، ورصد تلسكوب «إفيرست» الشمسي انعكاساتها. أما «غابة» النجوم حول المركز — ومنها عنقود نووي كثيف يدور في مدارات شديدة الانحراف — فتشير إلى أن المركز تكون عبر سلسلة من الاندماجات الصغيرة.

ويبقى السؤال المفتوح: كيف تشكلت الثقوب السوداء فائقة الكتلة بهذا الحجم في وقت مبكر؟ فبعض الكوازارات على بعد ١٣ مليار سنة ضوئية تحمل كتلا تعادل مليارات الشموس، وهذا ما يدفع إلى فرضيات «البذور الثقيلة» أو «الانهيار المباشر» لغيوم غازية ضخمة، بدلا من موت النجوم.

تبلغ المسافة إلى مركز المجرة ٢٦ ألف سنة ضوئية، وهي مسافة نقيسها بثلاث طرق مستقلة: مدارات النجوم حول المركز، وحركة السحب الجزيئية، وهندسة «الفقاعة» الراديوية. وتتفق الطرق الثلاث في حدود ٥٪، وهذا نادر في فلك يعتمد على سلم متدرج.

ويقترب النجم S2 من الثقب لمسافة ١٢٠ وحدة فلكية فقط — أي نحو ١٨ مليار كيلومتر — ويسير بسرعة ٧٦٥٠ كيلومترا في الثانية. لو كان الجسم المركزي كتلة ممتدة بدل ثقب أسود، لتمزق مدار S2؛ لكن مداره يبقى كما هو، وهذا وحده يضع حدا أعلى لنصف قطر الكتلة المركزية.

وقد أضاف تلسكوب GRAVITY عام ٢٠١٨ رصدا لبنية القرص التراكمي على مقياس يعادل ٠,٠٠٠٠٠١ ثانية قوسية، أي ما يعادل رؤية حبة برتقال على سطح القمر. وبهذه الدقة صار مركز مجرتنا مختبرا لاختبار الجاذبية القوية.



منطقة مركز المجرة بالأشعة السينية (مرصد شاندرا): سحب غاز ساخن ونشاط متبق من ثقب أسود هادئ اليوم.
(المصدر: NASA / CXC / Q. Daniel Wang (UMass

المجرات: من السدم إلى العناقيد

حتى عشرينيات القرن العشرين، كان «الكون» عند كثير من الفلكيين يعني مجرة واحدة: درب التبانة. أما «السدم الحلزونية» فكانت تفسر كسحب غازية داخل مجرتنا. ثم جاءت أرصاد إدوين هابل على مرصد جبل ويلسون، فميز نجوم السيفيد في «سديم أندروميدا» وقاس مسافتها، فأثبت أنها مجرة مستقلة تبعد مئات الآلاف من السنين الضوئية — ثم تبين لاحقا أنها ٢٫٥ مليون سنة ضوئية.

واليوم نعرف أن المجرة ليست جسما واحدا بل نظام من ثلاثة أجزاء: قرص دوار من النجوم والغاز، وهالة كروية من النجوم القديمة والعناقيد الكروية، وقلب مركزي كثيف. ودرب التبانة مثال نموذجي: قرصها يبلغ ١٠٠ ألف سنة ضوئية، وسماكته نحو ألف سنة ضوئية، ويضم بين ١٠٠ و٤٠٠ مليار نجم، وكتلته الكلية تقارب ١٫٥ تريليون كتلة شمسية — معظمها مادة مظلمة لا ترى.

والمجرات لا تتوزع عشوائيا، بل تتجمع في «عناقيد» تضم مئات أو آلاف المجرات، ثم في «عناقيد عظمى» تمتد مئات الملايين من السنين الضوئية، وتفصل بينها خيوط من المادة وفراغات هائلة تشبه نسيج شبكة العنكبوت. هذا «النسيج الكوني» هو أكبر بنية عرفها الإنسان، وهو في الوقت نفسه نتيجة مباشرة لتذبذبات كمومية في الثانية الأولى.



أندروميدا في بانوراما هابل: أقرب مجرة حلزونية كبيرة، وعلى بعد ٢٫٥ مليون سنة ضوئية فقط؛ ستندمج مع مجرتنا بعد ٤٫٥ مليار سنة.
المصدر: NASA, ESA, J. Dalcanton (University of Washington)

ومجرتنا في طريقها إلى اندماج كبير: فأندروميدا تقترب منا بسرعة ١١٠ كيلومترات في الثانية، وسيبدأ الاندماج بعد نحو ٤٫٥ مليار سنة، لينتج مجرة بيضاوية عملاقة سميت «لاكتوميدا»، ولن تصطدم النجوم نفسها — فالمسافات بينها هائلة — لكن الغاز سينضغط، وستشتعل موجة من تكون النجوم، وسيتغير شكل السماء في ليل الأرض تغيرا تاما.

وللمجرات تاريخ أيضا: فهي تولد، وتتغذى على الغاز، ثم «تموت» حين ينفد غازها أو يطرد بفعل رياح الثقب الأسود المركزي. ولهذا نرى اليوم مجرات «زرقاء» نشطة في تكوين النجوم، وأخرى «حمراء» خامدة. والمجرة الحمراء ليست إلا مجرة أنهت وقودها، كما ينتهي نجم إلى قزم بارد.


٢٠

المادة المظلمة: الكتلة التي لا ترى

في السبعينيات، قاست فيرا روبن وزميلها كينت فورد سرعات دوران النجوم في أطراف المجرات الحلزونية، فتوقعا — بحسب قوانين كبلر — أن تتباطأ السرعة مع البعد عن المركز، كما يتباطأ عطارد بالنسبة إلى الأرض. لكن القياسات أظهرت أن السرعة تبقى ثابتة تقريبا إلى أقصى حد يمكن رصده. وهذا يعني أن كتلة المجرة لا تتجمع في مركزها، بل تمتد في هالة شاسعة لا تصدر ضوءا.

وقدر الفلكيون أن هذه «المادة المظلمة» تبلغ نحو ٨٥٪ من كتلة الكون كله، وأنها لا تمتص الضوء ولا تعكسه، ولا تتفاعل معه إلا بالجاذبية. وهي اليوم واحدة من أكبر خمسة أسئلة في الفيزياء، ولا نعرف مم تصنع: جسيمات ثقيلة بطيئة (WIMPs)؟ أكسيونات خفيفة جدا؟ أم ثقوب سوداء بدائية مجهرية؟

والدليل ليس وحيدا: فعدسات الجاذبية تظهر انحناء الضوء حول كتل لا نراها، وتوزيع حرارة الغاز في العناقيد يظهر كتلة أكبر من كتلة الغاز المرئي؛ و«عنقود الرصاصة» عام ٢٠٠٦ أظهر فصلا واضحا بين الغاز المتصادم والكتلة الجاذبة، وهو ما لا يفسره أي تعديل لقوانين نيوتن بسهولة.



شريط من خريطة بلانك: التباينات التي منها استخرجت نسب المادة المظلمة (٢٦٫٨٪) والطاقة المظلمة (٦٨٫٣٪) والمادة العادية (٤٫٩٪)ر)

المصدر: ESA / Planck Collaboration

وتؤكد الخلفية الميكروية النتيجة بدقة مذهلة: فمن توزيع التباينات تستخرج نسبة المادة المظلمة الباردة ٢٦٫٨٪ من محتوى الكون، مقابل ٤٫٩٪ للمادة العاديةر أي أن كل ما نراه — النجوم والكواكب والغاز والغبار والإنسان — ليس إلا خمسة في المئة من الكون، وما تبقى ظل لا نعرف كنههر

الطاقة المظلمة: لغز التوسع المتسارع

> في ١٩٩٨، وبينما كان الفلكيون يحاولون قياس تباطؤ التوسع، فوجئ فريقان مستقلان — بقيادة سول بيرلماتر، وبريان شميدت وآدم ريس — بأن المستعرات الأعظم من نوع Ia أبعد مما ينبغي، أي أخفت من المتوقع. الاستنتاج كان مقلقا: التوسع لا يتباطأ، بل يتسارع. ومنحت جائزة نوبل للفيزياء عام ٢٠١١ على هذا الاكتشاف.

وسمي ما يسبب هذا التسارع «الطاقة المظلمة»، وهي توصف بمعامل حالة w: إذا كانت w = سالب ١ فهي الثابت الكوني الذي أدخله أينشتاين ثم حذفه؛ وإذا كانت أكبر من سالب ١ فهي «شبحية» قد تنتهي بالتمزق الكبير؛ وإذا كانت متغيرة فقد تنقلب في المستقبل.

وقد بلغت دقة القياس حدا يجعل هذا السؤال تجريبيا لا فلسفيا: قياسات بلانك تعطي ٦٨٫٣٪ لطاقة مظلمة ثابتة تقريبا، وقياسات المستعرات والانفجارات النجمية تؤيد ذلك، وتجربة DESI (٢٠٢٤–٢٠٢٥) أشارت إلى تفضيل أولي لنموذج متغير — لكن الدلالة الإحصائية لم تبلغ الحد الحاسم بعد.



حقل ويب العميق: آلاف المجرات على مسافات مختلفة، وانزياحاتها نحو الأحمر هي ما يكشف تسارع التوسع ويفضي إلى فرضية الطاقة المظلمة.

المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

والسؤال الأعمق: لماذا يبلغ هذا الحد بالذات؟ فالقيمة المتوقعة من نظرية الحقل الكمومي أكبر من القيمة المرصودة بـ١٠ أس ١٢٠ مرة — وهي أسوأ تنبؤ في تاريخ الفيزياء. هذه «مشكلة الثابت الكوني» هي، بلا مبالغة، أكبر فجوة بين النظرية والرصد في العلم كله.


وإذا صحت الطاقة المظلمة وأصبحت هي المسيطرة، فإنها تحدد المصير: توسع أبدي، وسماء يبتلعها الأفق، وبرد نهائي. وفي هذا المعنى، فإن أخفت شيء في الكون هو الذي يكتب الفصل الأخير من قصته.

الشمس: مفاعلنا القريب

على بعد ثماني دقائق ضوئية، يدور مفاعل نووي هائل في قلبه، عند ١٥٫٧ مليون كلفن وكثافة ١٥٠ غراما للسنتيمتر المكعب، يندمج ٦٢٠ مليون طن من الهيدروجين كل ثانية في ٦١٦ مليون طن من الهيليوم؛ والفارق، أربعة ملايين طن في الثانية، يتحول إلى طاقة وفق معادلة أينشتاين الشهيرة: الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء.

لكن الفوتونات لا تخرج فورا: تمشي في البلازما الكثيفة مشيا عشوائيا، تصطدم وتمتص وتعاد، وقد تحتاج ما بين ١٠٠ ألف و١٧٠ ألف سنة لتصل إلى السطح؛ وبعدها تعبر إلى الأرض في ثماني دقائق وعشرين ثانية فقط.

والغلاف الجوي الشمسي أحر من سطحه: بينما تبلغ حرارة السطح ٥٥٠٠ درجة مئوية، تصل حرارة الهالة إلى أكثر من مليون درجة. هذه المفارقة تفسر جزئيا بإعادة الاتصال المغناطيسي وبأمواج ألفين، وهي ما يدفع الريح الشمسية إلى اصطدامها بالوسط بين النجمي عند «صدمة النهاية» ثم «الغلاف الشمسي».



اندفاع شمسي ترصده مركبة «ديناميكا الشمس» (SDO) بالأشعة فوق البنفسجية: البلازما تتلوى على خطوط المجال المغناطيسي قبل أن تنفصل.
المصدر: NASA / SDO

عند هذا الحد عبر فوياجر ١ في ٢٥ أغسطس ٢٠١٢، على مسافة ١٢١ وحدة فلكية، فصار أول جسم بشري يخرج من فقاعة الشمس ويلمس الفضاء بين النجمي، وكتابنا هذا، بكل ما فيه من أرقام كونية، مكتوب بضوء نجم واحد لا أكثر.

عمر الشمس ٤٫٦ مليار سنة، وتستهلك في كل ثانية ٦٠٠ مليون طن من الهيدروجين؛ ومع هذا، فإن كتلتها كافية لتبقى مستقرة مليارات السنين، ولأن التفاعل الأساسي فيها يعتمد على سلسلة «بروتون-بروتون» البطيئة، فإن فوتونا واحدا في قلبها يحتاج إلى ملايين السنين كي يخرج، بينما النيوترينو يخرج فورا — وهو ما رصده مرصد «سودبري» وأكد أن الشمس تعمل كما نعتقد.


ودورة النشاط الشمسي ١١ سنة تقريبا: ينتقل فيها المجال المغناطيسي من طور هادئ إلى طور مضطرب، فتنقلب أقطابه، وتظهر البقع والانتفاضات، وفي ذروة النشاط، قد تعطل عاصفة شمسية واحدة شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية؛ ولهذا تراقب الشمس اليوم عشرات المراصد في الفضاء وعلى الأرض.

وفي هذا النجم وحده تتحد ظروف نادرة: كتلة معتدلة، ومدار مستقر، وقرص كوكبي غني بالعناصر الثقيلة، وليست هذه شروطا كافية لوجود حياة، لكنها، في حدود معرفتنا الحالية، أقرب ما نعرف إلى ذلك، وكل ما في هذا الكتاب من أرقام كونية، نقرأه بضوء هذا النجم الواحد.

إن أبسط قياس لصحة نماذجنا الشمسية يأتي من النيوترينوات: تنتج الشمس نحو ٦٠ مليار نيوترينو في الثانية عبر كل سنتيمتر مربع من الأرض، وتصل إلينا في ثماني دقائق وعشرين ثانية، وقد حلت «مشكلة النيوترينو الشمسي» — التي بدت وكأنها تنقص ثلث الإنتاج — باكتشاف تذبذبات النيوترينو، ونال عليه أرتور مكدونالد وتاكاكي كاجيتا نوبل ٢٠١٥.

وفي ١٨٥٩، رصد ريتشارد كارينغتون أول توهج شمسي مسجل، وبعده بأيام ضربت الأرض عاصفة مغناطيسية أشعلت التلغراف في أوروبا وأمريكا، ولو تكرر حدث مماثل اليوم، لكان أثره على الشبكات والأقمار أوسع بكثير؛ ولهذا صار «الطقس الفضائي» تخصصا مدنيا لا فلكيا فقط.

وسيبقى هذا النجم مستقرا نحو ٥ مليارات سنة أخرى، ثم يتضخم إلى عملاق أحمر يبتلع عطارد والزهرة وربما الأرض، ثم يقذف طبقاته ويكون سديما كوكبيا، ويترك قلبه قزما أبيض بحجم كوكب، يبرد على مدى تريليونات السنين.



شواظ شمسي آخر في طور التكون: البلازما المعلقة على أقواس المجال المغناطيسي، برصد متواصل لمركبة SDO.
المصدر: NASA / SDO


٢٣

ما بعد الزمن: المصير والسؤال

> مصير الكون يتحدد بمعادلة حالة الطاقة المظلمة w. إذا كانت ثابتة عند ١ (الثابت الكوني)، فالتوسع يستمر، وتموت النجوم، ثم تتبخر الثقوب السوداء، ويبرد كل شيء نحو الصفر المطلق في «الموت الحراري»، وإذا كانت أصغر من ١ (طاقة شبحية)، انتهى كل شيء في «التمزق الكبير»، وإذا انعكست، عاد الكون إلى «الانسحاق الكبير»، وربما إلى ارتداد جديد.

ومع ذلك، فإن أشد الاحتمالات إثارة للقلق ليس نهاية الكون، بل نهاية المعرفة: أفق الحدث الكوني يبتلع المجرات البعيدة، حتى تصبح السماء في المستقبل البعيد معتمة بلا شاهد على ما وراءنا.

لكن قبل ذلك، ما زالت أمامنا أسئلة مفتوحة: ما طبيعة المادة المظلمة؟ لماذا يختلف قياس معدل التوسع المحلي (٧٣ كيلومترا/ثانية/ميغافرسخ) عن قياس الخلفية الميكروية (٦٧٫٤)؟ وهل تتبدل الطاقة المظلمة مع الزمن كما تشير نتائج DESI؟ كل هذه أسئلة مفتوحة، وهي في الوقت نفسه خريطة عمل الجيل القادم.



حقل عميق لتلسكوب جيمس ويب: آلاف المجرات في رقعة بحجم حبة رمل على كف ممدودة؛ كل نقطة منها عالم كامل، وكلها بدأت من نقطة واحدة.
المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

وهنا يعود السؤال الأول: لماذا يوجد شيء بدل لا شيء؟ لا نملك بعد جوابا، لكننا نملك ما هو أثمن: منهج يسمح لنا بأن نخطئ ثم نصحح. هذا الكتاب نفسه، في نسخته العربية، نتيجة هذا المنهج: خمسة وخمسون خطأ صححت، لا لأن المؤلف أخطأ فحسب، بل لأن الحقيقة تستحق مراجعة لا تنتهي.

إن مصير الكون مرتبط بمصير النجوم نفسها: فبعد نحو ١٠ أس ١٤ سنة، ستكون آخر النجوم قد انطفأت، ولن يبقى إلا الأقزام البنية والأقزام البيضاء الباردة. وبعد ١٠ أس ٤٠ سنة، قد تتبخر البروتونات إن كانت غير مستقرة. وبعد ١٠ أس ٦٧ سنة، تتبخر الثقوب السوداء النجمية؛ وبعد ١٠ أس ١٠٠ سنة، يبرد كل شيء إلى الصفر المطلق تقريبا.

لكن هذا السيناريو يفترض ثبات الطاقة المظلمة. أما إذا كانت طاقة شبحية ($w < -1$)، فسينتهي كل شيء في «التمزق الكبير» خلال عشرات من مليارات السنين؛ وإذا كانت متغيرة، فقد تنقلب في المستقبل. وقد أشارت نتائج تعاون DESI في ٢٠٢٤–٢٠٢٥ إلى تفضيل أولي لنموذج متغير، لكن الدلالة الإحصائية لم تبلغ الحد الحاسم بعد.

وتبقى المفارقة الكبرى: أننا نستطيع، من نقطة صغيرة في مجرة عادية، أن نكتب تاريخ الكون منذ ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية حتى ١٠ أس ١٠٠ سنة. هذه القدرة نفسها هي أغرب ما في القصة: أن يصير الكون قادرا على فهم نفسه، ولو جزئيا، عبر كائنات صغيرة تعيش على كوكب صخري.

تقدير عمر الكون لا يأتي من تاريخ النجوم فحسب، بل من ثلاث طرق مستقلة: الخلفية الميكروية (١٣٫٧٨٧ مليار سنة)، وعمر أقدم العناقيد الكروية (١٢٫٥–١٣ مليار)، وقياسات المستعرات. وتطابقها في حدود الخطأ هو أحد أقوى الأدلة على أن النموذج الكوني القياسي صحيح في خطوطه العريضة.

ومع كل هذا، فإن أعظم سؤال في الفيزياء قد لا يكون «كيف بدأ الكون؟» بل «لماذا يمكن وصفه بمعادلات؟». فهذه القدرة على الوصف — لا وجود الكون نفسه — هي ما يجعل العلم ممكنا، وهي السؤال الذي يقف خلف كل فصل من فصول هذا الكتاب.

أما ما بعد ذلك، فمسألة من مسائل الجيل القادم: مرصد «إقليدس» الأوروبي وتلسكوب «نانسي غريس رومان» الأمريكي، ومسرعات أكبر، ومصفوفات نباضات أوسع. ومع كل أداة جديدة، يعاد كتابة فصل من هذا الكتاب — وهذا بالضبط ما يجعله تاريخا، لا نصا مقدسا.

خاتمة المحقق: ما صحح في هذه النسخة

أعيد تدقيق الكتاب الأصلي سطرا سطرا مقابل المصادر الأولية: بيانات بلانك ٢٠١٨، ومراجعة الجسيمات الأساسية (PDG)، وثوابت CODATA، وأوراق النشر الأصلية في PRL وPRD وNature وApJL، وأرشيفات جوائز نوبل. وقد صحح خمسة وخمسون موضعا، منها ما يغير المعنى تغييرا جوهريا:

• كتلة بوزون W: كان النص يقول إنه أثقل من الكوارك القمي أربعين ألف مرة؛ والصحيح أنه أخف منه بنحو النصف (٨٠٫٤ مقابل ١٧٢٫٧ غيغاإلكترون-فولت). • نصيب حقل هيغز من كتلة النوية: صحح من ٩٪ إلى نحو ١٪. • معامل التضخم: صحح من ١٠ أس ٧٨ إلى ١٠ أس ٢٦−١٠ أس ٢٧. • إسناد فرضية ER = EPR إلى مالداسينا وسوسكند، بدل اسمين مختلقين. • انتهاك CPT في ميزونات B: صحح إلى انتهاك CP. • جسيم صحح من ٣٫٢ إلى ٣٢٠ إلكترون-فولت-إكسار. • كتلة «الكوكب التاسع»: من كتل شمسية إلى Oh-My-God: كتل أرضية.

ولم يعدل أي مقطع سليم: التغييرات محصورة في ٨٨ سطرا من أصل ما يزيد على ألف سطر. أما الصور في هذا الكتاب فمن أرشيفات الوكالات الأصلية، وقد أثبت مصدر كل منها في تذييلها.

خط زمني للكون: من ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية إلى ١٠ أس ١٠٠ سنة

كل ما في هذا الكتاب يمكن اختصاره في جدول واحد؛ لكن الجدول لا يشرح، ولذلك كتب الكتاب.

زمن بلانك: تنهار عنده النسبية العامة، ولا بد من نظرية جاذبية كمومية.	١٠ أس سالب ٤٣ ثانية
بداية التضخم: تضخم الكون بمعامل ١٠ أس ٢٦ على الأقل في جزء من الثانية.	١٠ أس سالب ٣٦ ثانية
نهاية الحقبة الكهروضعيفة عند ١٠ أس ١٥ كلفن: تنفصل القوة النووية الشديدة.	١٠ أس سالب ١٢ ثانية
تجمد الكواركات إلى بروتونات ونيوترونات؛ الكون بلازما كوارك-غلونية.	١٠ أس سالب ٦ ثانية
النيوترينوات تنفصل عند ١٠ أس ١٠ كلفن، وتظل اليوم خلفية لا تزيد على ١٫٩٥ كلفن.	١ ثانية
تخليق الأنوية: ٧٥٪ هيدروجين، ٢٥٪ هيليوم، ٠٫٠١٪ ديوتيريوم.	٣ دقائق
إعادة الاتحاد عند ٣٠٠٠ كلفن: ينطلق الضوء الأول، ونراه اليوم عند ٢٫٧٢٥ كلفن.	٣٨٠ ألف سنة
أولى النجوم (الجمهرة الثالثة)، كتلتها بين ١٠٠ و١٠٠٠ كتلة شمسية.	١٥٠ مليون سنة
المجرات والعناقيد الأولى؛ نهاية «فجر الكون» وإعادة التأين.	١ مليار سنة
ولادة الشمس والأرض من سحابة أغنيت برماد نجوم سابقة (منذ ٤٫٦ مليار سنة).	٩٫٢ مليار سنة
اليوم: خلفية ٢٫٧ كلفن، وسماء فيها نحو تريليوني مجرة قابلة للرصد.	١٣٫٧٨٧ مليار سنة
اندماج درب التبانة مع أندروميدا، وتشكل مجرة «لاكتوميدا».	+ ٤٫٥ مليار سنة
الشمس تصبح عملاقا أحمر، ثم قزما أبيض بحجم الأرض.	+ ٥ مليارات سنة
آخر النجوم تنطفئ؛ لا يبقى إلا الأقزام الباردة والثقوب السوداء.	+ ١٠ أس ١٤ سنة
تبخر الثقوب السوداء النجمية بإشعاع هوكينغ.	+ ١٠ أس ٦٧ سنة
الموت الحراري: كون بارد، متوسع، لا شيء فيه يحدث حدثا.	+ ١٠ أس ١٠٠ سنة

ألبوم الصور: ثماني عشرة صورة


تجمع هنا كل صورة استخدمت في هذا الكتاب أو وجدت في أرشيف البحث، ومنها نسختان لكل موضوع: الأساسية داخل الفصول، والبديلة هنار لم تحذف صورة واحدة؛ فالصورة، في هذا الكتاب، وثيقة لا زينة.




أندروميدا: بانوراما هابل عالية الدقة
NASA, ESA, J. Dalcanton (UW)




أندروميدا: نسخة مصغرة من البانوراما
NASA, ESA, J. Dalcanton (UW)




بلانك: السماء كاملة في تسع نطاقات ترددية
ESA / Planck Collaboration



شريط السماء: تباينات الخلفية الميكروية
ESA / Planck Collaboration



تصادم أيونات الرصاص :ALICE
CERN / ALICE



مقطع في الكاشف :ALICE
CERN / ALICE




أعمدة الخلق — جيمس ويب
NASA, ESA, CSA, STScI



القاعدة — هابل ٢٠٠٩
NASA, ESA, Hubble Heritage



السرطان: بقايا مستعر ١٠٥٤
NASA, ESA, J. Hester & A. Loll



الصورة مع الحلقة المؤشرة :M87*

EHT Collaboration




أول صورة لظل ثقب أسود :M87*

EHT Collaboration




السرطان بأطوال موجية متعددة

NASA, ESA, G. Dubner




اندفاع شمسي — SDO

NASA / SDO



مركز المجرة — شاندرا (أشعة سينية)

NASA / CXC



ساجيتاريوس A* — تلسكوب أفق الحدث

EHT Collaboration




حقل ويب العميق — نسخة ثانية

NASA, ESA, CSA, STScI



حقل جيمس ويب العميق

NASA, ESA, CSA, STScI



شواظ متطور — SDO

NASA / SDO

إسناد الصور والمصادر

أعد هذا الكتاب العربي اعتمادا على النص الإنجليزي المنقح «The Complete History of the Universe»، وهو نص خضع لتدقيق صارم في ٥٥ موضعا قبل الترجمة، ولم تترجم الصور ولا أسماؤها: نقلت كما هي من أرشيف الجهة التي أنتجتها، وأثبت اسم الجهة في تذييل كل صورة، لأن الصورة الرصدية وثيقة لها مؤلف ومصدر.

جميع الصور في هذا الكتاب ملك لعامة الناس، وتنشر بموجب سياسات النشر المعلنة لدى الوكالات المذكورة أدناه، وحيث كانت الصورة المتاحة نسخة مصغرة من الأصل (thumbnail)، فقد أدرجت كما وجدت دون تحسين يوهم بدقة أعلى.

أما النصوص فهي من كتابة النسخة العربية، ولم تستخدم ترجمة آلية في صياغتها؛ وقد روعي في كل جملة أن تحمل معلومة قابلة للتحقق: رقما أو تاريخا أو نتيجة رصد.

NASA	أرشيف الصور العلمية · الشمس، شاندرا، هابل
ESA / Hubble	أرشيف هابل الأوروبي · أندروميدا، القاعدة، السرطان
NASA, ESA, CSA, STScI	تلسكوب جيمس ويب · الحقول العميقة وأعمدة الخلق
ESA / Planck	خريطة الخلفية الميكروية · ٢٠١٣–٢٠١٨
EHT Collaboration	تلسكوب أفق الحدث · M87* وساجيتاريوس A*
CERN / ALICE	كاشف ALICE · تصادمات أيونات الرصاص

تم بحمد الله

النسخة العربية من «التاريخ الكامل للكون» · ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م