



Empfehlungen für ausgewählte ackerbauliche FAKT II-Maßnahmen

Eine Handreichung für die Praxis zu

FAKT II E1.2, E7, E8, E9, E13.1, E13.2, E14, E15, F3 und F4



Landwirtschaftliches
Technologiezentrum
Augustenberg

Inhalt

1	Einleitung	3
2	FAKT II E1.2:	
	Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau	5
2.1	Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile	5
2.2	Die wichtigsten Vorgaben in Kürze	6
2.3	Mischungen	6
2.4	Tipps zur Umsetzung	8
3	Brachebegrünung mit Blühmischungen in FAKT II	10
3.1	Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile	10
3.3	FAKT II E8: Brachebegrünung mit mehrjährigen Blühmischungen	13
3.4	Tipps zur Anlage von Blühflächen	15
4	FAKT II E9:	
	Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)	16
4.1	Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile	16
4.2	Die wichtigsten Vorgaben in Kürze	16
4.3	Tipps zur Umsetzung	16
5	FAKT II E13.1 und E13.2:	
	„Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)“ und „Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide“	18
5.1	Zielsetzung und mögliche ackerbauliche Vor- und Nachteile	18
5.2	Die wichtigsten Vorgaben in Kürze	19
5.3	Tipps zur Umsetzung	20
6	FAKT II E14 und E15:	
	„Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen“ und „Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen“	21
6.1	Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile	21
6.2	Die wichtigsten Vorgaben für E14	22
6.3	Die wichtigsten Vorgaben für E15	22
6.4	Tipps zur Umsetzung	22
7	FAKT II F3:	
	Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung)	24
7.1	Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile	24
7.2	Die wichtigsten Vorgaben in Kürze	24
7.3	Tipps zur Umsetzung	25
7.4	Dokumentation	27
8	FAKT II F4:	
	Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Verfahren	28
8.1	Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile	28
8.2	Tipps zur Umsetzung	29
	Anhang Abbildungen	30
	Anhang Tabellen	31
	Impressum	47



Abb. 1: Bläuling auf Kleeblüte in einer mehrjährigen Blühfläche

Foto: Alexander Holstein/LTZ

1 Einleitung

Das baden-württembergische Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II) umfasst rund 40 Einzelmaßnahmen. Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Pflege der Kulturlandschaft, dem Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft, der Förderung der artgerechten Tierhaltung und dem Erhalt und der Förderung der Biodiversität. In dieser Broschüre für Praktiker werden für ausgewählte ackerbauliche FAKT II-Maßnahmen Hinweise zur ackerbaulichen und besonders natur- und umweltfreundlichen Umsetzung, aber auch zu möglichen Problemen gegeben. Um gesetzliche Auflagen, aber vor allem auch die umwelt- und naturschutzfachlichen Zielsetzungen zu erfüllen, sind viele FAKT II-Maßnahmen bis zu bestimmten Terminen zu etablieren und es gibt Auflagen zur Flächengröße, zur Nutzung und zu Ruhepausen. Eine Übersicht findet sich in Tabelle 1.

Weitere Hinweise sind auf den Internetseiten des Infodienstes der Landwirtschaftsverwaltung unter www.landwirtschaft-bw.info zu finden:

- Informationen zur neuen GAP und den Ökoregelungen des Bundes unter <https://foerderung.landwirtschaft-bw.de> >Agrarpolitik >GAP-Strategieplan;

Genaue fördertechnische Bestimmungen und Angaben zur Höhe der Fördersätze bei den verschiedenen „FAKT II“-Maßnahmen sind den Antragsunterlagen/Erläuterungen zum Gemeinsamen Antrag und der „FAKT II“-Broschüre des MLR zu entnehmen. Die wichtigsten praktischen Vorgaben werden hier nur kurz zusammengefasst und wiedergegeben, es handelt sich hierbei nicht um eine vollständige Auflistung der Förderbedingungen.

- Informationen zum Gewässerschutz unter <https://lw.landwirtschaft-bw.de> >Pflanzenproduktion >Boden und Gewässerschutz;
- Informationen zu FAKT II unter <https://foerderung.landwirtschaft-bw.de> >Förderwegweiser >4. Förderung von Naturschutz, Landschaftspflege und Biodiversität >Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II);
- Empfehlungen zur Umsetzung von FAKT II E10 unter <https://lazbw.landwirtschaft-bw.de> >Themen >Grünland und Futterbau >Ackerfutterbau >FAKT II E10 Hinweise

Tabelle 1: Termine und Bearbeitungsaufgaben für ausgewählte „FAKT II“-Maßnahmen

Maßnahme	Mindestfläche/ Mindestmaße	Aussaat	Mulchen/ Einarbeiten	Ruhephasen	Pflegemaßnahme
E1.2.	–	bis 31.08.	ab 16.01. des Folgejahres		Beweidung durch Wanderschäfer möglich
E7	Mindestgröße 0,3 ha; Mindestbreite 10 m	bis 15.05.; im ersten Jahr auch im Spätsommer/ Herbst des Vorjahres möglich	bei Winterung als Folgefrucht ab 01.09. im letzten Standjahr, bei Sommerung als Folgefrucht ab 16.01. nach dem 5. Standjahr	Winterruhe bis einschl. 15.01.	keine
E8	max. 10 ha und 50 % AF des ersten Verpflichtungsjahrs des Betriebes, Mindestbreite 5 m	Spätsommer/ Herbst Vorjahr oder bis spätestens 15.05.	bei Winterung als Folgefrucht ab 01.09. im letzten Standjahr, bei Sommerung als Folgefrucht ab 16.01. nach dem 5. Standjahr	generell kein Befahren/ Pflege etc.	Pflegemaßnahmen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde
E13.2	–		ab 01.09.	mechanische Unkrautregulierung ist ab der Aussaat der Untersaat unzulässig.	–
E14	max. 10 ha	–	nach Abschluss der Ernte im vierten auf das Erstjahr folgenden Jahr	Winterruhe zwischen 15.09. und 15.03.	Schnittnutzung mindestens einmal/ Jahr ab zweitem Antragsjahr ab dem 15.07. bis spätestens 14.09.; Neuaussaat mit Zustimmung möglich
E15	max. 10 ha; Mindestbreite der Wildpflanzenmischungen 6 m. Die Fläche der mehrjährigen Biomassepflanzen darf je Schlag einen Flächenanteil von 90 Prozent und eine Breite von 60 m nicht überschreiten.	–		Wildpflanzenmischung: Winterruhe zwischen 15.09. und 15.03.	Wildpflanzenmischung: Schnittnutzung mindestens einmal/ Jahr ab zweitem Antragsjahr ab dem 15.07. bis spätestens 14.09.; Neuaussaat mit Zustimmung möglich



Abb. 2: Artenreiche Zwischenfruchtmischung, wie sie auch für Maßnahme E1.2 zulässig ist.

Foto: Dr. Margarete Finck/LTZ

FAKT II E1.2

2 Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau

2.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Zwischenfrüchte erfüllen eine Vielzahl von ökologischen und agronomischen Funktionen. Nährstoffe werden über den Winter in Biomasse konserviert und stehen der Nachfrucht zur Verfügung. Auch das Risiko von Wind- und Wassererosion sowie Abschwemmung wird vermindert, d.h. der Boden bleibt wo er ist und der Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in die Oberflächengewässer wird reduziert.

Durch die mit Zwischenfruchtanbau einhergehende Bodenbedeckung, durch die intensive Durchwurzelung (vor allem bei winterharten Zwischenfrüchten) und durch die Zufuhr von organischer Masse erhöhen Zwischenfrüchte die biologische Aktivität und mikrobielle Biomasse, verbessern die Aggregatstabilität des Bodens, reduzieren Verdichtungen und erhöhen die Wasserinfiltration. Zudem

unterdrückt ein erfolgreich etablierter Bestand die Keimung von Unkraut und Ausfallsamen. Eine langfristige und konsequente Integration von Zwischenfrüchten kann zum Aufbau von Humus beitragen. Zwischenfrüchte fördern die Vielfalt des Bodenlebens, sie können aber aufgrund der kurzen Standzeit lediglich eine eingeschränkte positive Wirkung (Nahrung, Deckung) auf die Vielfalt nicht-bodenbewohnender Arten entfalten. Für diesen Zweck sind andere Maßnahmen – wie etwa die Brachebegrünung mit mehrjährigen Blühmischungen (s. FAKT II E 8) – besser geeignet.

Die Aussaat von Artenmischungen hat im Vergleich zu Reinsaaten viele Vorteile: Der Biomasseaufwuchs sowie die Nährstoffakkumulation ist bei ihnen meist höher, und damit auch oft die positiven Effekte auf den Ertrag der Folgefrucht, insbesondere, wenn Leguminosen in der Mischung sind. Zudem bieten Mischungen aus verschiedenen Arten eine Art Versicherung gegenüber Ausfällen oder geringem Keimverhalten einzelner

Komponenten. Durch die sogenannte „vertikale Nischendifferenzierung“ – d. h. dadurch, dass unterschiedliche Pflanzenspezies auch jeweils ganz eigene Wurzelsysteme (flach, tief, weit verzweigt, Pfahlwurzel etc.) ausbilden – erreichen Artenmischungen oft eine höhere Wurzelbiomasse und intensivere Durchwurzelung, vor allem in den oberen Bodenschichten. Artenmischungen können Unkraut wirksamer unterdrücken. Zudem lassen sich durch geschickte Zusammensetzungen mehr Funktionen erfüllen, als einzelne Arten es leisten können: Einige Kreuzblütler sind z. B. sehr effektiv beim Aufbrechen von Bodenverdichtungen (Tillage Radish (TR) = Meliorationsrettich – eine besondere Ölrettichsorte oder auch Raps) und die beim Abbau entstehenden Substanzen wirken keimhemmend. Süßgräser bilden viel Wurzelbiomasse in den oberen Bodenschichten und können gut Unkraut unterdrücken, Leguminosen haben, bei einer Einarbeitung kurz vor dem Anbau der Nachfrucht, besonders positive Effekte auf die Nährstoffversorgung der Nachfrucht. Alle diese Wirkungen sind von der Stärke der Entwicklung der Zwischenfrüchte abhängig.

Ackerbauliche Nachteile entstehen bei einem Anbau von Zwischenfrüchten in der Regel nicht, ein Anbau von Mischungen mit Leguminosenanteil

führt eher zu Ertragserhöhungen der Nachfrucht. Falls einige Arten aussamen oder nicht abfrieren, können sie allerdings in der Nachfrucht durchwachsen (z. B. Ölrettich, Senf, Phacelia, Buchweizen). Überwintert die Zwischenfrucht kann sie ab dem Beginn der Vegetationsperiode die Wasservorräte beanspruchen, was in trockenen Jahren den Trockenstress in der Nachfrucht verstärken kann. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die wichtigsten abfrierenden und winterharten Zwischenfrüchte und deren Bodenansprüche.

2.2 Die wichtigsten Vorgaben in Kürze

Die für die Maßnahme aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Internetseite zum Förderprogramm zu entnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Broschüre „Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II)“ des MLR: <https://foerderung.landwirtschaft-bw.de> >Förderwegweiser >Direktzahlungen und Ausgleichsleistungen für landwirtschaftliche Betriebe >Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II).

Tabelle 2: Auswahl an möglichen Zwischenfruchtarten nach Aussaattermin und Bodenansprüchen

Quelle: BLE (Hrsg.) Zwischen- und Zweitfrüchte im Pflanzenbau (2018). www.ble-medienservice.de >Landwirtschaft >Biodiversität

Abfrierende Sommerzwischenfrüchte, Aussaat der meisten Arten Juli bis August			
Leichte Böden	Schwere Böden	Anspruchslos	Spätsaatverträglich
Serradella	Ackerbohne	Kreuzblütler (Senf, Ölrettich, Kresse, Rübsen)	Senf
Platterbsen	Futtererbse	Alexandrinerklee	Ölrettich
Blaue Lupine	Sommerwicke	Phacelia	Sarpetasenf
Perserklee		Ramtilkraut	Michelis Klee
Buchweizen		Rauhafer	
Öllein			
Sonnenblumen			
Winterharte Zwischenfrüchte (August bis Mitte September)			
Welsches Weidelgras, Winterroggen, Wintertriticale			
Winterraps, Winterrübsen			
Inkarnatklee			
Gelbklee			
Hornklee			
Winterwicken			
Luzerne			
Rotklee			
Markstammkohl			

- Aussaat bis spätestens 31.8.
- Keine Eigenmischungen, Saatgutfirmen bieten verschiedene fertig gemischte, für die Maßnahme zugelassene Mischungen aus mindestens fünf Arten an (s. u.), Rechnung, Lieferschein oder Saatgutetiketten sind aufzubewahren.
- Mulchen/Einarbeiten/Walzen des Aufwuchses nicht vor dem 16.1. des Folgejahres.
- Ein Einsatz von Herbiziden von der Aussaat der Zwischenfrucht bis zur Einsaat der Nachfrucht ist nicht zulässig.
- Ab 2027 ist zwingend das Saatgutetikett/der Sackanhänger/ein Dokument mit der Zusammensetzung der Mischung und ggf. die Rechnung oder der Lieferschein aufzubewahren. Auf einem dieser Dokumente muss der Satz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ aufgedruckt sein.

2.3 Mischungen

- Zur Begrünung müssen von den Saatgutfirmen fertig zusammengestellte Saatgutmischungen mit mind. fünf Mischungskomponenten aus einer Liste zugelassener Arten verwendet werden (siehe Tabelle A1 im Anhang)
- Dabei müssen die Saatgutfirmen folgende Kriterien beachten und auch anhand einer Tabelle dokumentieren:
 - Mindestens fünf Arten mit jeweils mind. 5 %-Anteil Samen.
 - Eine Art darf keinen höheren Anteil als 50 % an den Samen der Mischung enthalten.
 - Gräser max. 60 % Anteil an den Samen der Mischung.
- Folgende Änderungen sind ab Verschlussdatum 1.1.2027 verbindlich zu beachten und sollen bereits ab sofort angewendet werden. Folgende Vorgaben gelten dann für die Mischungen (bezogen auf die jeweiligen Gewichtsanteile):
 - Weiterhin müssen mindestens 5 botanische Arten (Spalte A in der Artenliste Anhang A1) entsprechend der vorgegebenen Artenliste in

- der Mischung vorhanden sein, mit jeweils mindestens 5 % Gewichtsanteil der Samen.
- Eine Art darf keinen höheren Gewichtsanteil als 50 % an den Samen der Mischung ausmachen.
- Gräser (Gruppe 3 in der Artenliste im Anhang A1) dürfen maximal 40 % Gewichtsanteil an den Samen der Mischung ausmachen.
- Sofern 5 Arten mit jeweils mind. 5 %-Gewichtsanteil enthalten sind, dürfen darüber hinaus beliebig viele andere Arten, auch mit unter 5 % Gewichtsanteil, enthalten sein. Das bedeutet, wenn die Mischung mehr als 5 Arten enthält, müssen die 5 % Mindestgewichtsanteil nur von 5 Arten eingehalten werden.
- Verschiedene Sorten einer botanischen Art gelten gemeinsam als eine Art.
- Bei pilliertem/ummanteltem Saatgut muss das Gewicht der reinen Samen dem Erreichen des Mindestanteils von 5 % Gewichtsanteil zugrunde gelegt werden.
- Nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen dürfen die Saatgutmischungen mit dem Zusatz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ als zulässig für FAKT II E1.2 in den Verkehr gebracht werden. Dieser Satz muss auf Rechnung/Lieferschein/Beiblatt zum Lieferschein oder Etikett abgedruckt sein.

Nachweis und Dokumentation 2023–2026

- Die Saatgutfirmen müssen zusätzlich zum o. g. Zusatz
 - **entweder** die Tabelle aus dem Zwischenfruchtmischungsrechner exportiert/unverändert kopiert auf dem Lieferschein oder einem Beiblatt zum Lieferschein oder auf der Rechnung abdrucken,
 - **oder:** Ein PDF mit der Tabelle aus dem Zwischenfruchtmischungsrechner muss für die jeweilige Mischung auf der Homepage der Firma bei den Angaben zur jeweiligen Mischung bereitgestellt werden. **Es ist ratsam, für spätere Kontrollen möglichst im Jahr der Aussaat das PDF abzurufen und zu speichern, auch wenn die Saatgutfirmen verpflichtet sind, die Dokumente über die gesamte Förderperiode und auf Nachfrage auch darüber hinaus bereitzustellen.**

- Als Ergebnis dieses Vorgehens haben Sie als Landwirtin oder Landwirt eine Rechnung, einen Lieferschein, ein Beiblatt zum Lieferschein oder ein Etikett, auf dem der Zusatzsatz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ steht UND eine Tabelle, in der die Zulässigkeit für FAKT II E1.2 mit Hilfe des Mischungsrechners dokumentiert ist. Die Mischung ist E1.2 konform, wenn alle 4 Kriterien in der Tabelle auf grün und „okay“ stehen.

Nachweis und Dokumentation beim neuen Verfahren (ab sofort, spätestens ab Verschlussdatum 1.1.2027)

Bei Mischungen, die nach dem neuen Verfahren für FAKT II E1.2 zulässig sind, sind bei Kontrollen vorzuweisen:

- Rechnung/Lieferschein/Beiblatt zum Lieferschein oder Etikett/Sackanhänger, auf dem der Satz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ abgedruckt ist
- Saatgutetikett oder Sackanhänger oder ein anderes Dokument, aus dem die Zusammensetzung der Mischung mit Gewichtsprozenten hervorgeht.

Die bis zum Verschlussdatum 1.1.2027 noch nach dem alten Verfahren gemischten/vertriebenen Mischungen, verbunden mit dem o. g. Zusatzsatz, sind weiterhin zulässig und förderfähig.

2.4 Tipps zur Umsetzung

Auswahl der Mischungen/Eindordnung in Fruchtfolge

- Für eine erfolgreiche Etablierung von Zwischenfrüchten sind die Wahl der Zwischenfruchtarten und die Stellung der Zwischenfrucht zwischen zwei Hauptfruchtarten entscheidend. Damit den Pflanzen ausreichend Wärme und Wasser aus Niederschlägen und/oder Bodenwasservorräten zur Verfügung stehen, bietet sich besonders die Stellung der Zwischenfrucht nach Winterungen vor Sommerungen an.

- Bei der Auswahl der Zwischenfruchtmischung sind insbesondere in höheren Lagen die Temperatursprüche, die Spätsaatverträglichkeit, die Frosthärte und die Konkurrenzkraft gegenüber Ausfallgetreide, Verunkrautung und Verungrasung entscheidend. Besonders spätsaatverträglich sind einige Kreuzblütler (Senf, Ölrettich) und einige Süßgräser.
- In milden Lagen sollte, besonders bei früherer Aussaat, bei der Auswahl der Zwischenfruchtmischung darauf geachtet werden, dass die Mischungsbestandteile entweder möglichst spät in die generative Phase (Blüte) kommen oder entsprechend frostempfindlich sind, um ein Aussamen der Zwischenfrucht zu vermeiden. Insbesondere Senf, Ölrettich, Kresse, Winterraps und Winterrüben sollten nicht vor Mitte August gesät werden.
- Pflanzenarten, die in der Fruchtfolge als Hauptfrucht angebaut werden, sollten nicht als Zwischenfrucht angebaut werden.
- In Raps- und Gemüsefruchtfolgen mit Kohl sollten Kreuzblütler wie Senf, Ölrettich, Rüben oder Markstammkohl nicht als Zwischenfrüchte ausgesät werden (Wirtspflanzen für verschiedene Kreuzblütlerkrankheiten wie z. B. Kohlhernie).
- In engen Getreidefruchtfolgen sollte der Anbau von Gräsern und Getreidearten als Zwischenfrüchte nur eingeschränkt erfolgen (Zwischenwirte und grüne Brücke für Pilzkrankheiten und Schädlinge wie z. B. Getreideblattläuse).
- In Kartoffelfruchtfolgen sollten wegen der Übertragung des bodenbürtigen Rattlevirus (Eisenfleckigkeit) weder Senf noch Phacelia als Zwischenfrucht angebaut werden.
- Bei Leguminosen als Nachfrucht sollte die Mischung leguminosenfrei sein, bei grobkörnigen Leguminosen in der Fruchtfolge sollte auf grobkörnige Leguminosen in der Zwischenfruchtmischung verzichtet werden.
- Beim Anbau von Zuckerrüben und anderen von Nematoden gefährdeten Kulturen sind nematodenresistente Sorten zu bevorzugen, die den Schlupf von Nematoden anregen und als Fehlwirt dienen. Dies ist besonders bei Raps, Senf und

Ölrettich erforderlich, da ansonsten die Gefahr der Nematodenübertragung besteht. Zudem sollte auf Buchweizen, Phacelia und Gräser in der Zwischenfrucht verzichtet werden, da diese schwer zu bekämpfen sind.

- Wenn die Vorfrucht viel Stickstoff hinterlässt, sollte ein hoher Anteil Nicht-Leguminosen in der Mischung sein.
- Eventuelle Nachbaurisiken von in der Vorkultur eingesetzten Herbiziden für Zwischenfrüchte, sind bei der Planung der Herbizidstrategie in der Fruchtfolge und der Artenwahl der Zwischenfrüchte zu beachten. (Siehe Übersicht [„Nachbaurisiko bzw. Ausschluss von Nachbaukulturen beim Herbizideinsatz“](#) der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.)

Aussaat

- Für eine erfolgreiche Etablierung ist eine sofortige Aussaat der Zwischenfrucht direkt nach Ernte der Hauptfrucht (spätestens am Tag nach der Ernte) zu empfehlen, da die „unproduktive Wasserverdunstung“ mit Beseitigung des Bestandes sprunghaft ansteigt.
- Zwischen der Ernte der Vorkultur und der Aussaat der folgenden Hauptfrucht sollten mindestens 50 Vegetationstage mit Tagesdurchschnittstemperaturen über 9 °C liegen.
- Die Aussaat mit der Sämaschine ist bei Zwischenfruchtmischungen den anderen Aussaattechniken vorzuziehen, eine Aussaat mit dem Schleuderstreuer oder der Drohne ist wegen des Entmischungsrisikos und des schlechten Feldaufgangs für viele Mischungen nicht empfehlenswert und sollte auf jeden Fall mit einer Erhöhung der Saatstärke oder der Wahl einer für das Verfahren optimierten Mischung einhergehen. (Weitere Tipps zur Drohnensaat im Merkblatt [„Zwischenfruchtaussaat mit der Drohne“](#) vom Ingenieurbüro Schnittstelle Boden GmbH.)
- Die empfohlenen Mindestaussaatmengen der Saatgutfirmen für die jeweilige Mischung sollten nicht unterschritten werden. Zu lichte Bestände unterdrücken den Ausfallaufwuchs der Vorfrucht und Unkräuter ungenügend und haben ein geringeres Nährstoffanreicherungsvermögen.

Terminierung

Fördertechnisch ist bei der Maßnahme „Begrünmischungen im Acker-/Gartenbau“ (Maßnahme E1.2) ein Mulchen/Einarbeiten/Walzen ab 16.1. möglich. Zu diesem Termin endet auch spätestens die Anforderung an die Mindestbodenbedeckung im Rahmen von GLÖZ 6. Um die mit dem Zwischenfruchtanbau verbundenen Ziele zum Wasser- und Erosionsschutz zu erreichen, ist es jedoch unter Berücksichtigung der jeweiligen Standortverhältnisse und der Fruchtfolge anzustreben, die Zwischenfrüchte möglichst lange auf der Fläche zu belassen. Eine Mulchdecke aus abgestorbenen Zwischenfrüchten hilft zudem, Evaporation zu verringern und damit Wasser für die Nachfrucht zu sparen. Zur Förderung des Bodenlebens und auch der Ertragsstabilität der Nachfrucht ist ein Zerkleinern durch Walzen oder Mulchen der Zwischenfruchtmischungen und mischendes Einarbeiten dem Einpflügen noch stehender grüner Bestände vorzuziehen.



Abb. 3: Agrarlandschaft mit Blühmischung

Foto: Dr. Erich Unterseher/LTZ

3 Brachebegrünung mit Blühmischungen in FAKT II

In FAKT II werden seit 2023 nur noch mehrjährige Blühflächen (FAKT II E8) sowie mehrjährige Rotationsbrachen mit einer über- bzw. einjährigen Blühmischung (M3+ für FAKT II E7) gefördert. Im Rahmen der Öko-Regelungen ist die Bereitstellung von Flächen zur Erhöhung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen als Öko-Regelung 1 auch für nur ein Jahr förderbar. Mehr Informationen zu ÖR 1 finden Sie im Merkblatt Nr. 40: ([„ÖR 1a“- und „GLÖZ 8“-Brachflächen](#)) unter www.LTZ-Augustenberg.de >Service >Schriftenreihen >Merkblätter für die Umweltgerechte Landbewirtschaftung. Sowohl auf Brach- als auch auf Blühflächen ist der Einsatz von Düngemitteln (einschließlich Wirtschaftsdünger) und Pflanzenschutzmitteln nicht erlaubt.

3.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Durch die Aussaat von Blühmischungen lassen sich Ackerflächen zu wertvollen Bunt- oder Blühbrachen und damit zu Lebensräumen für die wildlebende Flora und Fauna entwickeln. Es wird ein

vielfältiges und qualitativ hochwertiges Nahrungsangebot für Insekten aller Art geschaffen. Auch Niederwild und Feldvögel können hier Nahrung und Schutz finden. Während einjährige Mischungen vor allem aus Kulturformen bestehen und für kurze Zeit Nahrung für eher generalistische Arten bieten (z. B. Honigbienen), fördern zwei- oder mehrjährige Blühflächen durch den hohen Anteil einheimischer Wildarten ab dem zweiten Standjahr viele verschiedene, auch seltene, Insektenarten, da diese auf einheimische Arten spezialisiert sind (v. a. Maßnahmen E7 und E8; auch zweijährige ÖR 1b). In überwinternden Beständen können Feldvögel Samen, Niederwild Deckung und Insekten Überwinterungsmöglichkeiten finden (beispielsweise in hohlen Pflanzenstängeln und in der Streu).

Ackerbauliche Probleme entstehen vor allem, wenn auf den Flächen unerwünschte Arten überhand nehmen. Dieses Risiko besteht im ersten Jahr auf mehrjährigen Flächen in Form annualer Samenunkräuter (z. B. Gänsefuß, Hirsen). Diese treten in den Folgejahren aber kaum noch auf. Sorgen bereiten dann aber u. U. mehrjährige Problemunkräuter wie Quecke oder Ackerkratzdisteln. Hier können