



Abb. 3: Agrarlandschaft mit Blühmischung

Foto: Dr. Erich Unterseher/LTZ

3 Brachebegrünung mit Blühmischungen in FAKT II

In FAKT II werden seit 2023 nur noch mehrjährige Blühflächen (FAKT II E8) sowie mehrjährige Rotationsbrachen mit einer über- bzw. einjährigen Blühmischung (M3+ für FAKT II E7) gefördert. Im Rahmen der Öko-Regelungen ist die Bereitstellung von Flächen zur Erhöhung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen als Öko-Regelung 1 auch für nur ein Jahr förderbar. Mehr Informationen zu ÖR 1 finden Sie im Merkblatt Nr. 40: ([„ÖR 1a“- und „GLÖZ 8“-Brachflächen](#)) unter www.LTZ-Augustenberg.de >Service >Schriftenreihen >Merkblätter für die Umweltgerechte Landbewirtschaftung. Sowohl auf Brach- als auch auf Blühflächen ist der Einsatz von Düngemitteln (einschließlich Wirtschaftsdünger) und Pflanzenschutzmitteln nicht erlaubt.

3.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Durch die Aussaat von Blühmischungen lassen sich Ackerflächen zu wertvollen Bunt- oder Blühbrachen und damit zu Lebensräumen für die wildlebende Flora und Fauna entwickeln. Es wird ein

vielfältiges und qualitativ hochwertiges Nahrungsangebot für Insekten aller Art geschaffen. Auch Niederwild und Feldvögel können hier Nahrung und Schutz finden. Während einjährige Mischungen vor allem aus Kulturformen bestehen und für kurze Zeit Nahrung für eher generalistische Arten bieten (z. B. Honigbienen), fördern zwei- oder mehrjährige Blühflächen durch den hohen Anteil einheimischer Wildarten ab dem zweiten Standjahr viele verschiedene, auch seltene, Insektenarten, da diese auf einheimische Arten spezialisiert sind (v. a. Maßnahmen E7 und E8; auch zweijährige ÖR 1b). In überwinternden Beständen können Feldvögel Samen, Niederwild Deckung und Insekten Überwinterungsmöglichkeiten finden (beispielsweise in hohlen Pflanzenstängeln und in der Streu).

Ackerbauliche Probleme entstehen vor allem, wenn auf den Flächen unerwünschte Arten überhand nehmen. Dieses Risiko besteht im ersten Jahr auf mehrjährigen Flächen in Form annualer Samenunkräuter (z. B. Gänsefuß, Hirsen). Diese treten in den Folgejahren aber kaum noch auf. Sorgen bereiten dann aber u. U. mehrjährige Problemunkräuter wie Quecke oder Ackerkratzdisteln. Hier können

Mehrjährige Blühmischungen für die Biodiversität



Was sehen Sie hier?

Auf diesem Feld wurde eine Blühmischung ausgesät, die mehrere Jahre ohne Bearbeitung stehen bleibt. Ab dem zweiten Jahr blühen hier viele heimische Wildpflanzen. Die Flächen dürfen normalerweise nicht bearbeitet werden und sehen daher über den Winter oft unordentlich aus. Das ist allerdings zur Förderung möglichst vieler Arten besonders wichtig.

Warum sind mehrjährige Blühflächen so wichtig?

Durch den Artenreichtum der Mischung ist über die gesamte Vegetationsperiode Nahrung für verschiedene, auch gefährdete Tierarten verfügbar. Feldvögel können bei ausreichender Größe ungestört nisten. Die Flächen bieten Schutz und Deckung, z. B. für Insekten und Spinnen, die in abgestorbenen Pflanzenteilen überwintern.



Wie fördert das Land mehrjährige Blühflächen?

In Baden-Württemberg wird die Anlage mehrjähriger Blühflächen über das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) gefördert.

Informationen: Landesfachstelle für Naturgenuss und Agrarumwelt (LTZ) Augustenberg, 72799 Nürtingen, Tel. 07141 90040, genuss@ltz.de, www.ltz.de, Baden-Württemberg, Dr. Julia Weiss, Landesjugendamt, 07/2022

Baden-Württemberg

Um die Bevölkerung über die mehrjährige Blühmischung, die über den Winter oft „wild“ aussieht, zu informieren, können am Feldrand Informationstafeln aufgestellt werden. Druckvorlagen für ein Schild im Format DIN A3 können auf den Internetseiten des LTZ Augustenberg heruntergeladen werden unter: www.LTZ-Augustenberg.de >Arbeitsfelder >Landwirtschaft und Umwelt >Biodiversität >Wissenstransfer.

nach Genehmigung durch die Unteren Landwirtschaftsbehörden (Teil)-Flächen evtl. gepflegt oder bearbeitet werden. Nach der Wiederaufnahme der ackerbaulichen Nutzung verursachen die mehrjährigen Staudenpflanzen der Blühflächen in der Regel keinen ertragsmindernden Durchwuchs. Einige Arten aus einjährigen Mischungen, wie Buchweizen, Borretsch, Phacelia, Kornblumen oder Senf können aber wieder in Erscheinung treten. Auf das Bodenleben, die Bodenfruchtbarkeit und den Ertrag der Folgefrucht wirkt sich eine langjährige Bodenruhe und Bedeckung mit dem Eintrag organischer Substanz positiv aus.

Die für die Maßnahme aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Internetseite zum Förderprogramm zu entnehmen (s. o.).

3.2 FAKT II-Maßnahme E7: Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)

Bei dieser Maßnahme werden durch die gestaffelte Bearbeitung und Neuaussaat vielfältige Strukturen geschaffen, die vor allem für Niederwild interessant



Abb. 4: Lebensraum für Niederwild (FAKT II-Maßnahme E7)
Foto: René Greiner/Landesjagdverband

sind. Die jährlich neu ausgesäten, noch lückigen Bestände sind attraktive Bruthabitate für viele Feldvögel. Die dichteren, älteren überjährigen Bestände dienen auch über den Winter als Nahrungshabitat und Rückzugsraum.

Das Wichtigste in Kürze

- Mindestbreite 10 m, Mindestgröße 0,3 ha;
- Aussaat der vorgegebenen Mischung M3+ bis spätestens 15. Mai (Artenzusammensetzung Tabelle 3; für Öko-Mischungen dürfen bis zu 5 Arten weggelassen werden);
- Bei der Maßnahme E7 werden nach der Aussaat im ersten Jahr jeweils Bodenbearbeitung und Neuaussaat wechselnd auf einer Fläche von mindestens 1/3 bis maximal 2/3 der Förderfläche bis zum 15. Mai durchgeführt (Abbildung 5). Ausgangsjahr: Einsaat auf kompletter Fläche, keine Pflege.



Abb. 5: Schematische Darstellung der Maßnahme FAKT II E7. Hier erfolgen nach dem ersten Jahr Bearbeitung und Neuaussaat mit FAKT II-M3+ jährlich im Wechsel auf ca. der Hälfte der Fläche (1/3-2/3).

Tabelle 3: Mischung M3+, die für FAKT II Maßnahme E7 seit 2025 vorgegeben und fertig gemischt erhältlich ist

Für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe dürfen bis zu 5 Arten weggelassen werden. Anstatt der angegebenen Arten dürfen auch die Ersatzarten verwendet werden. Aufbewahrung von Rechnung, Lieferschein oder Etikett für Kontrollen.

Deutscher Name	Botanischer Name	M3+ Gew. %	Wildform (W)/ Kulturform (K)	Spezifikation	Ersatzarten
Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	1	W		<i>Anthriscus sylvestris</i> ; <i>Pastinaca sativa</i>
Kornrade	<i>Agrostemma githago</i>	2	W		
Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	1	W/K		<i>Medicago lupulina</i> ; <i>Trifolium dubium</i> ; <i>Trifolium campestre</i>
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	3	K		
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	6	K		
Kümmel	<i>Carum carvi</i>	3	K		
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	3	W		<i>Hieracium spec.</i> ; <i>Crepis capillaris</i> ; <i>Crepis biennis</i> ; <i>Leontodon hispidus</i>
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	1	W	ungefüllt	<i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	2	W		<i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	0,1	W		<i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	6	K		
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	2	W		<i>Anthriscus sylvestris</i> ; <i>Pastinaca sativa</i>
Gem. Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	0,3	W		<i>Anchusa officinalis</i>
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	6	K		
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	4	K		
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	3	K	Pollensorte	
Kresse	<i>Lepidium sativum</i>	3	K		
Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	2	W		<i>Leucanthemum ircutianum</i>
Öllein	<i>Linum usitatissimum</i>	5	K		
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	4	K		<i>Hippocrepis comosa</i>
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3	K		
Weißer Steinklee	<i>Melilotus alba</i>	2	W		
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	6	W	Handelssaatgut	
Oregano	<i>Origanum vulgare</i>	0,1	W		<i>Thymus pulegioides</i>
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	0,3	W		
Phacelie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	5	K		
Gew. Bitterkraut	<i>Picris hieracioides</i>	0,1	W		<i>Hieracium spec.</i> ; <i>Crepis capillaris</i> ; <i>Crepis biennis</i> ; <i>Leontodon hispidus</i> ; <i>Hypochaeris radicata</i>
Gew. Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	0,2	W		<i>Betonica officinalis</i> ; <i>Clinopodium vulgare</i> ; <i>Lamium spec.</i>
Waldstaudenroggen	<i>Secale multicaule</i>	4	K		
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	3	K		
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	10	K		
Ackerbohne	<i>Vicia faba</i>	5	W/K		<i>Medicago lupulina</i> ; <i>Anethum graveolens</i>
Saatwicke	<i>Vicia sativa</i>	3,9	K		




Abb. 6: Mehrjährige Blütmischung mit Esparsette
Foto: Alexander Holstein/LTZ

3.3 FAKT II E8: Brachebe- grünung mit mehrjährigen Blütmischungen

Das Wichtigste in Kürze

Die Mischungen für FAKT II E8 enthalten viele besonders wertvolle Wildpflanzen und helfen damit, einheimische Insekten zu fördern. Durch die lange Standzeit ergeben sich wertvolle Rückzugsräume in der Agrarlandschaft, zahlreiche Insekten nutzen die Flächen zum Überwintern.

- Förderfähig ist eine Fläche von max. 10 ha je Betrieb und maximal 50 Prozent der gesamten betrieblichen Ackerfläche des ersten Verpflichtungsjahrs.
- Mindestbreite auf überwiegender Länge 5 m.
- Aussaat von einer vorgegebenen, für FAKT II E8 zulässigen Saatgutmischung bis spätestens 15.5. mit 8-10 kg/ha (Etikett, Rechnung oder Lieferschein für Kontrollen aufbewahren).

- weder Befahren, noch Bearbeiten noch Nutzung zulässig. Neuaussaat oder Pflege bei problematischen Entwicklungen nur nach Genehmigung der ULBen.
- Standzeit mindestens fünf Jahre. Im letzten Jahr der Verpflichtung Nutzung vor Winterung ab dem 1. September, vor Sommerung ab 16.1.

Mischungen für FAKT II E8

Für FAKT II E8 sind nur Mischungen zulässig, die regionales Wildpflanzensaatgut enthalten. Das bedeutet in diesem Kontext, dass die Ausgangspopulationen des Wildpflanzensaatgutes nur aus Ursprungsgebieten kommen dürfen, die ganz oder zu einem nennenswerten Teil in Baden-Württemberg liegen (Ursprungsgebiete 9–13, 17 und 21 siehe Karte in Anhang, Abb. A1).

Folgende Mischungen sind für FAKT II E8 zulässig:

- FAKT II E8 Blühende Landschaft mehrjährig (Süd oder West), Spätsommersaat (Tab. A2)
- FAKT II E8 Blühende Landschaft mehrjährig (Süd oder West), Frühljahrsaat (Tab. A2)
- FAKT II E8 Lebendiger Acker trocken (Tab. A3)
- FAKT II E8 Lebendiger Acker frisch (Tab. A3)
- FAKT II E8 Lebendiger Waldrand frisch (Tab. A3)
- FAKT II E8 Lebendiger Waldrand trocken (Tab. A3)
- FAKT II E8 Lebendiger Gewässerrand (Tab. A3)

Auf dem Lieferschein, der Rechnung oder auf dem Etikett müssen die Artenzusammensetzung mit den jeweiligen Gewichtsanteilen und die Ursprungsgebiete des Wildpflanzensaatguts verzeichnet sein. Außerdem muss der Zusatz „Die Wildarten sind zertifiziert nach VWW Regiosaaten® bzw. RegioZert®“ auf Lieferschein, Etikett oder Rechnung stehen. Etikett, Lieferschein oder Rechnung sind für Kontrollen aufzubewahren.

- Eine Liste mit Zeichennutzern des VWW Regiosaaten-Zertifikats ist abrufbar unter www.natur-im-vww.de > Bezugsquellen > Gräser und Kräuter.

- Eine Liste der Zeichennutzer des RegioZert®-Zertifikats ist abrufbar unter www.bdp-online.de >Branche >RegioZert® > RegioZert® - wo kann ich das Saatgut beziehen?.
- Mischungen, die die Artenzusammensetzungen im Anhang (Tab. A2 und A3) und die Vorgaben zur Regionalität erfüllen, können mit dem Zusatz „zulässig für die FAKT II-Maßnahme E8“ vertrieben werden.

Die Anlage eines Insektenwalls/Bienenhügels/Beetle bank in Form einer langgestreckten, hügel-förmigen Erhebung im Schlag auf E8-Flächen ist zulässig, sofern sie gleichzeitig mit der Anlage der Fläche erfolgt und wenn der Wall ebenfalls mit FAKT II E8-Saatgut angesät wird. Eine Pflege des Walls kann, analog zur restlichen FAKT E8-Fläche, beim Auftreten von negativen Entwicklungen nur nach Genehmigung und in Absprache mit der ULB erfolgen.

Sonderregelungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe für FAKT II E8

Seit 2023 ist folgendes Verfahren für ökologisch wirtschaftende Betriebe umzusetzen:

- Die FAKT II E8 Blühmischungen werden aus zwei Mischungskomponenten selbst gemischt: erhält-lich sind regionale Wildformenkomponenten für FAKT II E8 (allgemeinverfügt) und öko-zer-tifizierte Kulturformenkomponenten für FAKT II E8 (vollständig bestehend aus Öko-Saatgut von Kulturformen).
- Beide Komponenten werden vor der Aussaat im Verhältnis 40 % (Wildformen) zu 60 % (Kulturfor-men) vermischt.
- Vorgesehen sind die Mischungskomponenten für die Mischungen „Blühende Landschaft West/Süd, FAKT II E8“, jeweils Frühjahrs- und Spätsommer-aussaat und „Lebendiger Acker trocken/frisch FAKT II E8“.
- Für die Wildformenkomponente muss regio-nales Saatgut aus baden-württembergischen Ursprungsgebieten verwendet werden (s. o., Regelungen wie für konventionelle Mischungen, Artenzusammensetzung mit Samengewichtsanteilen nach Tabelle A4 und A5 im Anhang). Hier

liegt derzeit eine Allgemeinverfügung vor, d. h. wenn in der Datenbank oXs (organicXseeds.de) kein ökologisches gebietseigenes Saatgut für das Ursprungsgebiet verfügbar ist, in dem das Saatgut verwendet werden soll, und das Saatgut nach VWWRegiosaat® bzw. RegioZert® zertifiziert ist, darf auch konventionelles Saatgut verwendet werden. Auf dem Lieferschein oder einem Anhang zum Lieferschein und auf dem Etikett müssen die Artenzusammensetzung mit den jeweiligen Gewichtsanteilen der Mischung und die Ursprungsgebiete des Wildpflanzen-saatguts verzeichnet sein. Außerdem muss der Zusatz „Die Wildarten sind zertifiziert nach VWW Regiosaat® bzw. RegioZert® auf Etikett oder Lieferschein stehen. Dabei sind die oben genannten Ursprungsgebiete und (seitens der Saatgutfirmen) die Artenzusammensetzungen und Samengewichtsanteile der Tabellen A4 und A5 im Anhang zu beachten. Lieferschein, Rechnung oder Etikett sind für Kontrollen aufzube-wahren. Im Namen der Mischung muss sowohl FAKT II E8 als auch die Mischungsbezeichnung vorkommen.

- Vom Verwender/ der Verwenderin muss vor der Aussaat über die Datenbank www.organic-Xseeds.de (oXs) geprüft werden, ob die in der Wildformen-Mischung enthaltenen Arten mit Herkunftsnachweis in ökologischer Qualität ver-fügbare sind. Auskünfte bzgl. der Nutzung der Datenbank (Eintragung der Saatgutmenge und Ausdruck der Belege) erteilt die jeweils zustän-dige Öko-Kontrollstelle.
- Die Mischungszusammensetzung der Kultur-formenkomponenten für die zugelassenen Mischungen sind den Tabellen A6 und A7 im Anhang zu entnehmen. Hier muss zu 100 % öko-zertifiziertes Saatgut der aufgeführten Arten enthalten sein.
- Es müssen die passenden, zusammengehörigen Wild- bzw. Kulturformenkomponenten gekauft werden.

Für den Erfolg dieser Maßnahmen ist eine sorgfältige Aussaat und gründliche Saatbettvorbereitung essentiell. Das lohnt sich vor allem bei den empfindlichen mehrjährigen Mischungen. Die Wildfor-men, die die Mischung besonders wertvoll machen, keimen oft langsam und unregelmäßig.

3.4 Tipps zur Anlage von Blühflächen

- Standorte mit sehr hohem Unkrautdruck durch Wurzelunkräuter oder andere mehrjährige Unkräuter sind ungeeignet.
- Zu empfehlen ist eine Spätsommerausssaat bis Ende September des Vorjahres der Förderung, insbesondere bei einem hohen Druck von wärmeliebenden Samenunkräutern (wie z. B. Hirsen, Weißer Gänsefuß). Viele Wildarten keimen so früher und erfolgreicher.

Bodenvorbereitung

- Herstellung eines lockeren und feinkrümeligen Saatbetts; optimal: mehrmaliges Grubbern der Fläche im Abstand von 10–14 Tagen.
- Nach der letzten flachen Bearbeitung den Boden vor der Aussaat absetzen lassen.
- Bei starkem Unkrautauflauf vor der Aussaat nochmals sehr flach bearbeiten (Kreiselegge). Dies dient auch der vorbeugenden Unkrautregulierung im Sinne eines falschen Saatbetts.

Aussaat

- Saatgut sorgfältig durchmischen, ggf. während der Aussaat wiederholen.
- Oberflächliche Aussaat mit der Drillmaschine, die meisten Arten sind Lichtkeimer (Säschare/Striegel hochstellen; Rührwelle ausstellen, um Entmischung zu vermeiden).
- Eine Aussaat mit Schleuderstreuer ist wegen der Gefahr der Entmischung und des erhöhten Risikos eines mangelhaften Auflaufens nicht empfehlenswert.
- Nach Aussaat anwalzen/rückverfestigen, damit Bodenkontakt hergestellt wird. Ein starker Bodenkontakt ist für das Auflaufen der Saat extrem wichtig, das Anwalzen kann sehr viel zu einem guten Auflaufen beitragen.
- Trockenphasen meiden.

Aussaatstärke

- Für Maßnahme E7 Aussaatstärke von M3+ ca. 10 kg/ ha, die in den Folgejahren bei stärkerem Unkrautdruck aber erhöht werden kann.
- Für Maßnahme E8 Aussaatstärke von 8–10 kg/ha
- Bewährt hat sich das Strecken mit Füllmaterial (z. B. Sojaschrot) im Verhältnis 1:4, um eine gleichmäßige Verteilung des Saatguts zu gewährleisten. Es ist aber nicht zwingend erforderlich.

Pflege

Besonders bei den mehrjährigen Blühmischungen kann die Verunkrautung aufgrund des unregelmäßigen und langsamen Auflaufens der Wildformen im ersten Jahr sehr hoch sein. Hier kann für FAKT II E8 die ULB hinzugezogen und nach Genehmigung ein Schröpschnitt vorgenommen werden. Ein solcher wird ca. 6–8 Wochen nach der Aussaat (Bestand kniehoch) auf 10–20 cm Höhe durchgeführt, um das Aussamen der Unkräuter zu verhindern. Oft sehen die Flächen ab dem zweiten Standjahr ohne weiteres Eingreifen gut aus (auch ohne Schröpschnitt), so dass von einem zu frühen Umbruch abgeraten wird, der die Probleme oft noch verstärken kann. Falls sich im weiteren Verlauf problematische Entwicklungen ergeben, sind nach Absprache mit und Genehmigung durch die ULB weitere geeignete Pflegemaßnahmen möglich (siehe auch [Merkblatt zur Pflege von mehrjährigen Blühflächen](#) des LTZ).



Abb. 7: Mais mit Bohnen als Gemengepartner

Foto: Caroline Schumann/LTZ

FAKT II E9

4 Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)

4.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Durch die Stangenbohne wird besonders für Hummeln ein zusätzliches Nektarangebot geschaffen. Die filigranen Bohnenblüten werben die Maisbestände zudem auch optisch auf, was dem Landschaftsbild in ackerbaulich geprägten Regionen zu Gute kommt.

4.2 Die wichtigsten Vorgaben in Kürze

Die für die Maßnahme aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Internetseite zum Förderprogramm zu entnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der entsprechenden [MLR-Broschüre](#).

- Aussaat von fertigen Mais-Stangenbohnen-Mischungen.
- zwischen 60 und 67 % Mais und 33–40 % Stangenbohne
- Nachweis des Saatguteinkaufs über Lieferschein, Rechnung oder Etikett.

4.3 Tipps zur Umsetzung

- Standorte mit hohem Unkrautdruck oder Wassermangel meiden.
- Wenn die Silage verfüttert werden soll, sollten die Bohnen einen Grenzwert von 10 mg Phasin pro g Trockenmasse nicht überschreiten.
- Weitere Hinweise zum Mais-Stangenbohnen- und Mais-Gemenge-Anbau finden sich im Internet auf den Seiten des LTZ Augustenberg: