



Abb. 7: Mais mit Bohnen als Gemengepartner

Foto: Caroline Schumann/LTZ

FAKT II E9

4 Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)

4.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Durch die Stangenbohne wird besonders für Hummeln ein zusätzliches Nektarangebot geschaffen. Die filigranen Bohnenblüten werben die Maisbestände zudem auch optisch auf, was dem Landschaftsbild in ackerbaulich geprägten Regionen zu Gute kommt.

4.2 Die wichtigsten Vorgaben in Kürze

Die für die Maßnahme aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Internetseite zum Förderprogramm zu entnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der entsprechenden [MLR-Broschüre](#).

- Aussaat von fertigen Mais-Stangenbohnen-Mischungen.
- zwischen 60 und 67 % Mais und 33–40 % Stangenbohne
- Nachweis des Saatguteinkaufs über Lieferschein, Rechnung oder Etikett.

4.3 Tipps zur Umsetzung

- Standorte mit hohem Unkrautdruck oder Wassermangel meiden.
- Wenn die Silage verfüttert werden soll, sollten die Bohnen einen Grenzwert von 10 mg Phasin pro g Trockenmasse nicht überschreiten.
- Weitere Hinweise zum Mais-Stangenbohnen- und Mais-Gemenge-Anbau finden sich im Internet auf den Seiten des LTZ Augustenberg:

- [Möglichkeiten und Herausforderungen des Silomais-Gemenge-Anbaus](#)
www.LTZ-Augustenberg.de >Service >Schriftenreihe >Augustenberger Beratungshilfen
- [Mais-Stangenbohnen-Gemenge](#)
www.LTZ-Augustenberg.de >Service >Schriftenreihe >Hinweise zum Pflanzenbau

Bodenvorbereitung

- Saatbettbereitung praxisüblich für Mais.

Aussaat

- Aussaatzeitpunkt wie bei Mais üblich, die Bodentemperatur darf nicht unter 10 °C liegen. Keine Aussaat bei Gefahr von Spätfrösten.
- Bei der Saattiefe am Mais orientieren, generell sollte nicht tiefer als 5–6 cm gesät werden, da die optimale Saattiefe für Bohnen 2–3 cm beträgt.

Düngung

- Die Stickstoff-Düngung kann auf 50–75 % des N-Düngebedarfs nach Düngeverordnung für Silomais reduziert werden. Mais-Stangenbohnen-Gemenge ist als eigene Kultur in Düngung BW zur Düngebedarfsermittlung verfügbar.

Unkrautregulierung

- Der chemisch-synthetische Pflanzenschutz muss im Voraufbau erfolgen (nicht später als 2–3 Tage nach der Saat). Bei der mechanischen Unkrautregulierung ist, wie in Maisbeständen, praxisübliches Striegeln und Hacken möglich. Ein Anhäufeln sollte erst beim letzten Hackgang erfolgen, wenn sich die Bohne schon etabliert hat.

Fruchtfolge

- Auf Grund der geringen Erfahrungen mit Mais-Stangenbohnen in der Fruchtfolge wird empfohlen, 3–5 Jahre vor dem Mais-Stangenbohnen-Anbau keine Leguminosen angebaut zu haben. Für die legumen Nachfrüchte sollte ebenfalls eine Anbaupause eingehalten werden, um einer möglichen „Leguminosenmüdigkeit“ vorzubeugen.



Abb. 8: Lichttacker nach FAKT E13.1 mit Acker-Rittersporn, einem gefährdeten Ackerwildkraut

Foto: Juliane Langer/LTZ

FAKT II E13.1 und E13.2

5 „Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichttacker)“ und „Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide“

5.1 Zielsetzung und mögliche ackerbauliche Vor- und Nachteile

Mit weitem Reihenabstand gesätes Getreide bietet Platz für Ackerwildkräuter und bodenbrütende Feldvögel. Der Aufwuchs zwischen den Reihen liefert vielfältige Nahrung für Wildtiere, u. a. für bestäubende Insekten, aber auch für andere Insekten und Vögel. Gerade im zeitigen Frühjahr und Sommer tun sich in der Agrarlandschaft sogenannte „Trachtlücken“ auf, die durch blühende Untersaaten oder Ackerwildkräuter geschlossen werden können. Die beiden vorgesehenen Maßnahmen helfen, den Herbizid-, Düngemittel- und Insektizideinsatz zu verringern. Die Untersaaten

in der Maßnahme E13.2 können nach der Ernte die Funktionen von Zwischenfruchtmischungen übernehmen, ohne eine erneute Bodenbearbeitung und Aussaat nötig zu machen und tragen durch die intensive und vielfältige Durchwurzelung zum Boden- und Wasserschutz bei. Sie ermöglichen so auch auf schweren Böden oder in höheren Lagen die Etablierung einer wüchsigen, vielfältigen Zwischenfrucht.

Ackerbauliche Probleme ergeben sich möglicherweise durch eine Verunkrautung. Dies ist bei FAKT E13.2 vor allem der Fall, wenn die Untersaat sich nicht gut etabliert. Da die Untersaat mit dem Getreide um Nährstoffe und Wasser konkurriert, kann es unter Umständen zu Ertragsrückgängen von bis zu 30 % kommen. In nassen und wüchsi-