



Abb. 8: Lichtacker nach FAKT E13.1 mit Acker-Rittersporn, einem gefährdeten Ackerwildkraut

Foto: Juliane Langer/LTZ

FAKT II E13.1 und E13.2

5 „Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)“ und „Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide“

5.1 Zielsetzung und mögliche ackerbauliche Vor- und Nachteile

Mit weitem Reihenabstand gesätes Getreide bietet Platz für Ackerwildkräuter und bodenbrütende Feldvögel. Der Aufwuchs zwischen den Reihen liefert vielfältige Nahrung für Wildtiere, u. a. für bestäubende Insekten, aber auch für andere Insekten und Vögel. Gerade im zeitigen Frühjahr und Sommer tun sich in der Agrarlandschaft sogenannte „Trachtlücken“ auf, die durch blühende Untersaaten oder Ackerwildkräuter geschlossen werden können. Die beiden vorgesehenen Maßnahmen helfen, den Herbizid-, Düngemittel- und Insektizideinsatz zu verringern. Die Untersaaten

in der Maßnahme E13.2 können nach der Ernte die Funktionen von Zwischenfruchtmischungen übernehmen, ohne eine erneute Bodenbearbeitung und Aussaat nötig zu machen und tragen durch die intensive und vielfältige Durchwurzelung zum Boden- und Wasserschutz bei. Sie ermöglichen so auch auf schweren Böden oder in höheren Lagen die Etablierung einer wüchsigen, vielfältigen Zwischenfrucht.

Ackerbauliche Probleme ergeben sich möglicherweise durch eine Verunkrautung. Dies ist bei FAKT E13.2 vor allem der Fall, wenn die Untersaat sich nicht gut etabliert. Da die Untersaat mit dem Getreide um Nährstoffe und Wasser konkurriert, kann es unter Umständen zu Ertragsrückgängen von bis zu 30 % kommen. In nassen und wüchsi-

gen Jahren kann zudem die Restfeuchte oder der Besatz im Erntegut erhöht sein.

5.2 Die wichtigsten Vorgaben in Kürze

Die für die Maßnahme aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Internetseite zum Förderprogramm zu entnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Broschüre „Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II)“ des MLR: <https://foerderung.landwirtschaft-bw.de> >Förderwegweiser >Direktzahlungen und Ausgleichsleistungen für landwirtschaftliche Betriebe >Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II).

- Einsaat von Winter- oder Sommergetreide mit einem Abstand der Drillreihen von 25 bis max. 45 cm.

- Doppelreihen erlaubt (je zwei Sädschare geöffnet, zwei geschlossen; Abstand zwischen zwei Getreidedoppelreihen mindestens 30 cm und maximal 45 cm).

- Keine Herbizide und Insektizide ab Aussaat des Getreides

- Aussaat einer vorgegebenen Untersaatenmischung für E13.2 (Tab. 4), ab deren Aussaat keine mechanische Unkrautregulierung.

Untersaatenmischung für FAKT II E13.2

Für FAKT II E13.2 gibt es seit 2025 nur noch eine vorgegebene Mischung, die im Winter- und Sommergetreide zulässig ist. Die beiden 2023 und 2024 zulässigen Mischungen für Winter- und Sommergetreide dürfen bis 2026 noch ausgebracht werden, auch hier darf ab 2025 die Wintergetreidemischung im Sommergetreide ausgesät werden und umgekehrt (Zusammensetzung der Mischung ab 2025 siehe Tab. 4; der Mischungen für 2023/2024 in Anhang

Tabelle 4: Untersaatenmischung, die für FAKT II E13.2 seit 2025 vorgeschrieben ist

Einzelne Arten können durch die jeweils angegebenen Ersatzarten ersetzt werden. 2026 ist auch nach das Verkaufen und Ausbringen der älteren Untersaatenmischungen erlaubt, die von 2023-2025 vorgeschrieben waren.

Deutscher Name	Botanischer Name	Gew %	Wildform (W)/ Kulturform (K)	Anmerkungen zur Sortenwahl	Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	4,0	K	ungefüllt	
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	1,0	K	niedrigwüchsig	
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	4,0	K	niedrigwüchsig	
Kresse	<i>Lepidium sativum</i>	3,5	K		
Lein	<i>Linum usitatissimum</i>	6,0	K	niedrigwüchsig	
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	9,0	K		6 % <i>Medicago lupulina</i> und 3 % <i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)/ <i>Hippocrepis comosa</i> (Schopfiger Hufeisenklee)/ <i>Trifolium campestre</i> / <i>Trifolium dubium</i> / <i>Trifolium arvense</i>
Hopfenklee	<i>Medicago lupulina</i>	12,0	K		9 % <i>Lotus corniculatus</i> / <i>Hippocrepis comosa</i> / <i>Anthyllis vulneraria</i> und 3 % <i>Trifolium campestre</i> / <i>dubium</i> / <i>arvense</i>
Serradella	<i>Ornithopus sativus</i>	10,0	K		
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	4,0	W		
Fadenklee	<i>Trifolium dubium</i>	1,0	K		<i>Trifolium campestre</i> / <i>arvense</i>
Schwedenklee	<i>Trifolium hybridum</i>	5,0	K	niedrigwüchsig	
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	24,0	K		
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	10,0	K	niedrigwüchsig, naturnah	
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	4,0	K	niedrigwüchsig, naturnah	
Erdklee	<i>Trifolium subterraneum</i>	1,5	K		<i>Sanguisorba minor</i> , <i>Crepis capillaris</i> , <i>Trigonella caerulea</i> , <i>Nigella sativa</i>
Feldsalat	<i>Valerianella locusta</i> / <i>olitoria</i>	1,0	K		

Tab. A8). Für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe dürfen bis zu drei Arten weggelassen werden. Einzelne Arten dürfen grundsätzlich durch die angegebenen Ersatzarten ausgetauscht werden. Nachweis über Etikett, Lieferschein oder Rechnung.

5.3 Tipps zur Umsetzung

- E13.1 und E13.2 empfehlen sich nicht auf Flächen, die durch sehr konkurrenzstarke Unkräuter oder Ungräser vorbelastet sind (Disteln, Quecken, Kamille, Fuchsschwanz).
- Damit das Getreide nicht zu dicht wächst, kann/ sollte dessen Aussaatstärke bei weiter Reihe reduziert werden (auf 70–90 %).
- Durch den hohen Leguminosenanteil der Untersaaten bei E13.2 sind Flächen mit Leguminosen als Vor- oder Nachfrucht nicht geeignet.
- Für E13.2 ist eine erfolgreiche Etablierung der Untersaat zentral für den Erfolg der Maßnahme und eine starke Unkrautunterdrückung. Sie sollte daher möglichst zeitgleich oder vor dem Getreide ausgesät werden.
- Bei Wintergetreide sollte sich die Untersaat für eine ausreichende Unkrautunterdrückung bereits im Herbst etablieren können, daher wird von späten Aussaaten (nach Mitte Oktober) oder Aussaaten im Frühjahr abgeraten, um eine starke Verunkrautung zu vermeiden und die ökologischen Ziele der Maßnahme zu erreichen.
- Die Aussaatstärke der Untersaat sollte 10–12 kg/ ha betragen.
- Ein Einschlitzten der Untersaat mit der Sämaschine (auch diagonal) auf ca. 1 cm Tiefe mit anschließendem Andrücken ist oft erfolgreicher als eine oberflächliche Ablage. Gute Ergebnisse können auch beim Ausbringen mit dem Pneumatikstreuer und anschließendem Verschütten des Saatguts mit dem Striegel erzielt werden. Alternativ oberflächlich ausbringen und anwalzen.
- In Doppelreihen entwickelt sich die Untersaat besser, insbesondere wenn der doppelte Saatreihenabstand kleiner als 30 cm wäre.




Abb. 9: Sommergerste in weiter Reihe mit Untersaatenmischung mit Blüten von Inkarnatklée, Lein und Koriander.

Foto: Dr. Julia Walter/LTZ

- Bodenbrütende Feldvögel werden von dem lichten Reihenabstand insbesondere in Maßnahme E13.1 angelockt. Daher ist eine mechanische Unkrautregulierung in FAKT II E13.1 während der Haupt-Brutzeit (April bis Juli) nicht zielführend.
- Um konkurrenzstarke Unkräuter nicht zu sehr zu fördern, ist eine reduzierte Stickstoffdüngung empfehlenswert (beispielsweise 80–90 % der NID-Empfehlung, wobei bei der Ermittlung mit reduzierten Getreideerträgen gerechnet werden sollte).
- Auch in der Maßnahme E13.1 sind Untersaaten erlaubt.



Abb. 10: Biogas-Mischung

Foto: Dr. Julia Walter/LTZ

FAKT II E14 und E15

6 „Extensive Biomassepflanzen: Mehr-jährige artenreiche Wildpflanzenmischungen“ und „Extensive Biomassepflanzen: Streifen-anbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen“

Beide Maßnahmen sind nur bis maximal 10 ha je Betrieb förderbar. Eine Futternutzung ist nicht zulässig.

6.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Artenreiche Wildpflanzenmischungen stellen eine ökologische Alternative zum Mais dar, da sie zahlreichen Tierarten Nahrungs-, Überwinterungs- und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Durch die lange Standzeit tragen sie zum Bodenschutz und Humusaufbau bei. Sie helfen, Pflanzenschutzmittel einzusparen und liefern auch in trockenen Jahren relativ

hohe Erträge. Da die Mischungen fünf Jahre stehen können, steigt die Rentabilität über die Jahre. Bei der Beurteilung von Erträgen ist zu beachten, dass die spezifischen Methanerträge (m^3 Methan je kg oTM) der Wildpflanzenmischungen deutlich geringer liegen im Vergleich zum Silomais. Erfahrungsgemäß kann von einem Wert von rund $0,360 \text{ m}^3$ Methan je kg oTM beim Silomais ausgegangen werden. Bei den Wildpfla m^3 Methan je kg oTM (im ersten Jahr aufgrund der einjährigen Arten ebenfalls bei über 300 m^3 Methan je kg oTM). Damit liegt die spezifische Methanausbeute um rund 30 % geringer im Vergleich zum Mais. Da auch die Trockenmasseerträge i. d. R. deutlich hinter den Maiserträgen zurückbleiben, liegen die Methanerträge je ha üblicherweise unter 50 % im Vergleich zum Silomais. Weichschalige