

Anhang Abbildungen

Abbildung A1: Ursprungsgebiete für Regioaatgut



Ursprungsregionen (Herkunftsgebiete) basierend auf Prasse, R., Kunzmann, D. & R. Schröder (2010)
grafische Umsetzung: D. Kunzmann

Anhang Tabellen

Tabelle A1: Zulässige Arten für FAKT II E1.2 Zwischenfruchtmischungen

Gruppe 1: Kreuzblütler (relevant für Rapsfruchtfolgen), Gruppe 2: Leguminosen, Gruppe 3: Gräser (Mindestanteil zu beachten), Gruppe 4: krautige Arten (nicht-legum, keine Kreuzblütler).

Deutscher Name	Botanischer Name	Gruppe
Kornrade	<i>Agrostemma githago</i>	4
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	4
Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	2
Rauhafer	<i>Avena strigosa</i>	3
Mangold	<i>Beta vulgaris subsp. cicla var. cicla</i>	4
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	4
Abessiner Senf	<i>Brassica carinata</i>	1
Sareptasenf	<i>Brassica juncea</i>	1
Raps	<i>Brassica napus</i>	1
Schwarzsens	<i>Brassica nigra</i>	1
Markstammkohl	<i>Brassica oleracea var. medullosa</i>	1
Stoppelrübe, Rübsen	<i>Brassica rapa</i>	1
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	4
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	1
Saflor, Färberdistel	<i>Carthamus tinctorius</i>	4
Kümmel	<i>Carum carvi</i>	4
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	4
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	4
Pippau (Gattung)	<i>Crepis ssp.</i>	4
Indischer Hanf	<i>Crotalaria juncea</i>	2
Knautgras	<i>Dactylis glomerata</i>	3
Wilde Möhre	<i>Daucus carota subsp. carota</i>	4
Karden (Gattung)	<i>Dipsacus spp.</i>	4
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	4
Rauke, Rucula	<i>Eruca sativa</i>	4
Buchweizen (Gattung)	<i>Fagopyrum spp.</i>	4
Wiesenschweidel	<i>Festulolium</i>	3
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	4
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	4
Sojabohne	<i>Glycine max</i>	2
Ramtilkraut	<i>Guizotia abyssinica</i>	4
Sonnenblumen	<i>Helianthus annuus</i>	4
Echtes Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	4
Taubnesseln (Gattung)	<i>Lamium spp.</i>	4
Platterbse (Gattung, außer breitblättrige Platterbse)	<i>Lathyrus ssp. (ohne L. latifolius)</i>	2
Linse	<i>Lens culinaris</i>	2
Gartenkresse	<i>Lepidium sativum</i>	1
Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	4
Lein	<i>Linum usitatissimum</i>	4
Bastardweidelgras	<i>Lolium x boucheanum</i>	3
Einjähriges u. Welsches Weidelgras	<i>Lolium multiflorum</i>	3
Deutsches Weidelgras	<i>Lolium perenne</i>	3
Hornschottenklee	<i>Lotus corniculatus</i>	2
Weiß Lupine	<i>Lupinus albus</i>	2
Blaulupine, Schmallblättrige Lupine	<i>Lupinus angustifolius</i>	2
Gelbe Lupine	<i>Lupinus luteus</i>	2
Malven (Gattung)	<i>Malva spp.</i>	4
Gelbklee, Hopfenklee	<i>Medicago lupulina</i>	2
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	2
einj. Luzerne	<i>Medicago scutellata</i>	2

Deutscher Name	Botanischer Name	Gruppe
Steinklee (Gattung)	<i>Melilotus ssp.</i>	2
Schwarzkümmel (Gattung)	<i>Nigella ssp.</i>	4
Nachtkerzen (Gattung)	<i>Oenothera spp.</i>	4
Esparsette (Gattung)	<i>Onobrychis ssp.</i>	2
Dost (Gattung)	<i>Origanum spp.</i>	4
Serradella	<i>Ornithopus sativus</i>	2
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	4
Petersilie	<i>Petroselinum crispum</i>	4
Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	4
Futtererbse, Felderbse	<i>Pisum sativum subsp. arvense</i>	2
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	4
Braunellen (Gattung)	<i>Prunella spp.</i>	4
Ölrettich, Meliorationsrettich	<i>Raphanus sativus</i>	1
Reseden (Gattung)	<i>Reseda spp.</i>	4
Chia	<i>Salvia hispanica</i>	4
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	4
Wiesenknapf (Gattung)	<i>Sanguisorba spp.</i>	4
Roggen	<i>Secale cereale</i>	3
Kolbenhirse / Borstenhirse	<i>Setaria italica</i>	3
Leimkräuter (Gattung)	<i>Silene spp.</i>	4
Mariendistel	<i>Silybum marianum</i>	4
Weißer Senf, Gelbsenf	<i>Sinapis alba</i>	1
Sorghum	<i>Sorghum bicolor</i>	3
Sorghum Hybride	<i>Sorghum bicolor x S. sudanense</i>	3
Sudangras	<i>Sorghum sudanense</i>	3
Spinat (Gattung)	<i>Spinacia spp.</i>	4
Tagetes (Gattung)	<i>Tagetes ssp.</i>	4
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	4
Alexandrinklee	<i>Trifolium alexandrinum</i>	2
Schwedenklee	<i>Trifolium hybridum</i>	2
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	2
Michels Klee	<i>Trifolium michelianum</i>	2
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	2
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	2
Persischer Klee	<i>Trifolium resupinatum</i>	2
Sparriger Klee	<i>Trifolium squarrosum L.</i>	2
Erdklee	<i>Trifolium subterraneum</i>	2
Blasenfrüchtiger Klee	<i>Trifolium vesiculosum</i>	2
Schabziger Klee	<i>Trigonella caerulea</i>	2
Bockshornklee	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	2
Königskerzen (Gattung)	<i>Verbascum spp.</i>	4
Purpurwicke, Rotwicke, Bengalen-Wicke	<i>Vicia benghalensis L.; Vicia atropurpurea</i>	2
Linsenwicke	<i>Vicia ervillia</i>	2
Ackerbohne	<i>Vicia faba</i>	2
Narbonner Wicke, Mauswicke	<i>Vicia narbonensis L.</i>	2
Pannonisch Wicke	<i>Vicia pannonica</i>	2
Saatwicke, Sommerwicke	<i>Vicia sativa</i>	2
Zottelwicke / Winterwicke	<i>Vicia villosa</i>	2
Triticale	<i>xTriticosecale</i>	3

Tabelle A2: Für FAKT II E8 zulässige mehrjährige Blümmischungen Blühende Landschaft Süd und West, jeweils Spät- und Frühsommersaat

Für die Wildformen muss regionales Saatgut verwendet werden (siehe Text).

Deutscher Name	Botanischer Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	BL mj. West Späts. Gew. %	BL mj. Süd Späts. Gew. %	BL mj. West Frühj. Gew. %	BL mj. Süd Frühj. Gew. %
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	K	4	4	6	6
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	K	3	3	2,9	2,9
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	K	5	5	2,9	2,9
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	K			9	9
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	K	4	4		
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	K			9	9
Gartenkresse	<i>Lepidium sativum</i>	K	3	3		
Öllein, Saatlein	<i>Linum usitatissimum</i>	K			8,7	8,7
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	K	2	2	1,5	1,5
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	K	2	2	2	2
Petersilie	<i>Petroselinum crispum</i>	K	3	3		
Büschelschön	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	K			5	5
Wintererbse	<i>Pisum sativum</i>	K	12	12		
Wilde Rauke	<i>Rucola selvatica</i>	K	2	2		
Weißer Senf	<i>Sinapis alba</i>	K			2	2
Inkarnatklée	<i>Trifolium incarnatum</i>	K	7	7	6	6
Winter-Ackerbohne	<i>Vicia faba</i>	K	13	13		
Sommerwicke, Saatwicke	<i>Vicia sativa</i>	K			5	5
Anteil Kulturformen (%)			60	60	60	60
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	W	0,8	1	0,8	1
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	W	1	1	1	1
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	W		0,1		0,1
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	W	6	6,2	6	6,2
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	W	0,7	1	0,7	1
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	W	1,5	2	1,5	2
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	W	1,8	2	1,8	2
Raue Nelke	<i>Dianthus armeria</i>	W	0,4		0,4	
Gemeiner Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	W	1,5	1,5	1,5	1,5
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	W	0,3	0,5	0,3	0,5
Färberwaid	<i>Isatis tinctoria</i>	W	0,5	0,5	0,5	0,5
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	W	0,3	0,4	0,3	0,4
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	W	2	2,5	2	2,5
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	W	0,4	0,4	0,4	0,4
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	W	2,5	2	2,5	2
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	W	0,5	0,5	0,5	0,5
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	W	1	0,5	1	0,5
Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	W	1,5		1,5	
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Handelssaatgut	3,3	3,3	3,3	3,3
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>	W	0,2	0,2	0,2	0,2
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	W	2	1,7	2	1,7
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	W	0,7	1	0,7	1
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	W	1,9	2	1,9	2
Silber-Fingerkraut	<i>Potentilla argentea</i>	W	0,5		0,5	

Tabelle A2 (Fortsetzung):

Deutscher Name	Botanischer Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	BL mj. West Späts. Gew. %	BL mj. Süd Späts. Gew. %	BL mj. West Frühj. Gew. %	BL mj. Süd Frühj. Gew. %
Gelbe Resede	<i>Reseda lutea</i>	W	0,2	0,2	0,2	0,2
Färberresede	<i>Reseda luteola</i>	W	0,3	0,3	0,3	0,3
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	W	1	1,2	1	1,2
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	W	2	2	2	2
Echtes Seifenkraut	<i>Saponaria officinalis</i>	W	0,8	0,5	0,8	0,5
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	W	0,6	0,8	0,6	0,8
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia</i>	W	0,8	0,8	0,8	0,8
Traubenkropf-Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	W	1,3	1,5	1,3	1,5
Ackersenf	<i>Sinapis arvensis</i>	W	1	1,3	1	1,3
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	W	0,1	0,1	0,1	0,1
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	W	0,3	0,5	0,3	0,5
Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i>	W	0,3	0,5	0,3	0,5
Anteil Wildformen (%)			39,7	39,5	39,7	39,5

Tabelle A3: Für FAKT II E8 zulässige mehrjährige Blümmischungen Lebendiger Acker trocken und frisch, Lebendiger Waldrand trocken und frisch und Lebendiger Gewässerrand

Für die Wildformen muss regionales Saatgut verwendet werden (siehe Text).

Deutscher Name	Botanischer Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	Leb. Acker tr. Gew. %	Leb. Acker frisch Gew. %	Waldrand frisch Gew. %	Waldrand trocken Gew. %	Leb. Gewässer- rand Gew. %
Wiesen-Fuchsschwanz	<i>Alopecurus pratensis</i>	K					0,5
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	K	3	3,5			
Markstammkohl	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>medullosa</i>	K			4	4	
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	K	2,5	3			
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	K	10	10	15,9	15,4	8
Wiesenschwingel	<i>Festuca pratensis</i>	K					0,5
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	K	2	2			
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	K	10	13			11,5
Gartenkresse	<i>Lepidium sativum</i>	K					6
Öllein, Saatlein	<i>Linum usitatissimum</i>	K	14,8	15	16	14	14,5
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	K		1,1	1,5	1,5	1
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	K	4	3	1,8	1,8	
Wintererbse	<i>Pisum sativum</i>	K			9	9	
Büschelschön	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	K	5	5,5			7
Ölrettich	<i>Raphanus sativus</i>	K			2	2	
Schweden-Klee	<i>Trifolium hybridum</i>	K			2		4,7
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	K			6		
Perserklee	<i>Trifolium resupinatum</i>	K				5,2	5
Sommerwicke, Saatwicke	<i>Vicia sativa</i>	K	6,3	8,2	8,9	9,3	
Anteil Kulturformen (%)			57,6	64,3	67,1	62,2	58,7
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	W	1	1,2	2	1,5	2
Kleiner ODERMENNING	<i>Agrimonia eupatoria</i>	W	0,5			0,8	
Wald-Engelwurz	<i>Angelica sylvestris</i>	W			0,3		0,5
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	W	0,5			0,5	
Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	W			3	3	4,4
Wiesenkerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i>	W		0,7			0,5
Echte Winterkresse	<i>Barbarea vulgaris</i>	W	1	1	1	1	0,7
Heilziest	<i>Betonica officinalis</i>	W					0,3
Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i>	W			0,2		
Wiesenkümmel	<i>Carum carvi</i>	W	1,5	1,5	2		3
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	W	2	2	2	2	3,5
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	W	2	2	2,5	2,2	2
Skabiosenflockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>	W	0,2				
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	W	2,9	3,2			
Wirbeldost	<i>Clinopodium vulgare</i>	W	0,1				
Wiesenpippau	<i>Crepis biennis</i>	W		1,5	1		1,5
Wiesen-Kammgras/ Rot- schwingel/ Ruchgras	<i>Cynosurus cristatus</i> (W), u U. <i>Festuca rubra</i> (K)/ <i>Antoxanthum odoratum</i> (W)	W/K	2,1	3	3	3	5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	W	2	1,7	0,8	2	
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	W	0,2	0,2			
Gemeiner Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	W	1	1			

Tabelle A3 (Fortsetzung):

Deutscher Name	Botanischer Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	Leb. Acker tr. Gew. %	Leb. Acker frisch Gew. %	Waldrand frisch Gew. %	Waldrand trocken Gew. %	Leb. Gewässer- rand Gew. %
Gewöhnlicher Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>	W					0,1
Echtes Mädesüß	<i>Filipendula ulmaria</i>	W					0,5
Weißes Labkraut	<i>Galium album</i>	W	1,3	1,5	3		2,5
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	W	0,8			0,9	
Wiesen-Bärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i>	W		0,2	0,5		0,7
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	W	0,3			0,5	
Färberwaid	<i>Isatis tinctoria</i>	W	0,1				
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	W		0,3	0,3	0,2	0,3
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	W	1	1,5	1,3	1,5	1,8
Gemeines Leinkraut	<i>Linaria vulgaris</i>	W	0,1		0,5		
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	W		0,5	0,8		0,7
Gewöhnlicher Gilbweiderich	<i>Lysimachia vulgaris</i>	W			0,1		0,1
Gewöhnlicher Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	W		0,4	0,4		0,2
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	W	0,6			1	
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	W		0,6	1		
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	W		2			
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	W	2				1,5
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Handels- saatgut	6,3			6	
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>	W	0,2			0,2	
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	W	2	2		2	3
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	W	1	1		0,9	1
Große Bibernelle	<i>Pimpinella major</i>	W		0,3			0,2
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	W	2,4	2,2	3,3	3,3	2,5
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	W	0,3			0,3	
Gemeine Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	W	0,2	0,3			0,2
Gelbe Resede	<i>Reseda lutea</i>	W				0,1	
Färberresede	<i>Reseda luteola</i>	W	0,3				
Wiesen-Sauerampfer	<i>Rumex acetosa</i>	W					0,2
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	W	0,9			1	
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	W	2		2	2	
Echtes Seifenkraut	<i>Saponaria officinalis</i>	W			0,3	0,4	
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	W		0,8	1,5		1,2
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia</i>	W	0,8			1,1	
Traubenkropf-Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	W	1,5	2			1,2
Acker-Senf	<i>Sinapis arvensis</i>	W		1			
Echte Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>	W	1,1			0,2	
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	W		0,1	0,1		
Mehlige Königskerze u. U. schwarze Königskerze	<i>Verbascum lychnitis</i> ; u. <i>U.</i> <i>Verbascum nigrum</i>	W	0,2			0,2	
Anteil Wildformen (%)			42,4	35,7	32,9	37,8	41,3

Tabelle A4: Wildformenkomponente für die Maßnahme FAKT II E8 für ökologisch wirtschaftende Betriebe für die Mischungen „Lebendiger Acker trocken FAKT II E8“ und „Lebendiger Acker frisch FAKT II E8“

Hierzu muss regionales Wildpflanzensaatgut verwendet werden, für das es derzeit eine Allgemeinverfügung gibt.

Deutscher Name	Botanischer Name	Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. %	Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. %
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	2,4	3,4
Kleiner ODERMENNING	<i>Agrimonia eupatoria</i>	1	0
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1,2	0
Wiesenkerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i>	0	2
Echte Winterkresse	<i>Barbarea vulgaris</i>	2,4	2,8
Wiesenkümmel	<i>Carum Carvi</i>	3,5	4,2
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	4,7	5,6
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	4,7	5,6
Skabiosenflockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>	0,5	0
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6,8	9
Wirbeldost	<i>Clinopodium vulgare</i>	0,2	0
Wiesenpippau	<i>Crepis biennis</i>	0	4,2
Wiesen-Kammgras/Ruchgras	<i>Cynosurus cristatus</i> /u. U. <i>Antoxanthum odoratum</i> oder <i>Festuca rubra</i> als Kulturform	5	8,4
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	4,7	4,8
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,5	0,6
Gemeiner Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	2,4	2,8
Weißes Labkraut	<i>Galium album</i> ssp. <i>Album</i>	3,1	4,2
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i> ssp. <i>verum</i>	1,9	0
Wiesen-Bärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i>	0	0,6
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	0,7	0
Färberwaid	<i>Isatis tinctoria</i>	0,2	0
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	0	0,8
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	2,4	4,2
Gemeines Leinkraut	<i>Linaria vulgaris</i>	0,2	0
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	0	1,4
Gewöhnlicher Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	0	1
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	1,4	0
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i> ssp. <i>sylvestris</i>	0	1,7
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	0	5,6
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	4,7	0
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	14,9	0
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>	0,5	0
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	4,7	5,6
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	2,4	2,8
Große Bibernelle	<i>Pimpinella major</i>	0	0,8
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	5,7	6,2
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	0,7	0
Gemeine Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	0,5	0,8
Färberresede	<i>Reseda luteola</i>	0,7	0
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	2,1	0
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	4,7	0

Tabelle A4 (Fortsetzung):

Deutscher Name	Botanischer Name	Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. %	Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. %
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	0	2,2
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	1,9	0
Traubenkropf-Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	3,5	5,6
Acker-Senf	<i>Sinapis arvensis</i>	0	2,8
Echte Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>	2,6	0
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	0	0,3
Mehlige Königskerze u. U. schwarze Königskerze	<i>Verbascum lychnitis</i> ; u. U. <i>Verbascum nigrum</i>	0,5	0

Tabelle A5: Wildformkomponente für die Maßnahme FAKT II E8 für ökologisch wirtschaftende Betriebe für die Mischungen „Blühende Landschaft mehrjährig West FAKT II E8“ und „Blühende Landschaft mehrjährig SüdFAKT II E8“

Hierzu muss regionales Wildpflanzensaatgut verwendet werden, für das es derzeit eine Allgemeinverfügung gibt. Die Mischungen sind für die Spätsommer- und Frühjahrssaat und jeweilige Kulturformenkomponente geeignet (siehe Tab. A4).

Deutscher Name	Botanischer Name	Blühende Landschaft mehrjährig West FAKT II E8, Wildformenkomponente für West-Baden-Württemberg; Gew. %	Blühende Landschaft mehrjährig Süd FAKT II E8, Wildformenkomponente für Süd-Baden-Württemberg; Gew. %
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	2	2,5
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	2,5	2,5
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	0	0,3
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	15	15,5
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	1,7	2,5
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	3,8	5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	4,5	5
Raue Nelke	<i>Dianthus armeria</i>	1	0
Gemeiner Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	3,7	3,7
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	0,8	1,2
Färberwaid	<i>Isatis tinctoria</i>	1,3	1,3
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	0,8	1
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	5	6,2
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	1	1
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i> ssp. <i>sylvestris</i>	6,2	5
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	1,3	1,3
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	2,5	1,2
Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	3,8	0
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	8,2	8,3
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>	0,5	0,5
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	5	4,2
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	1,7	2,5
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	4,7	5
Silber-Fingerkraut	<i>Potentilla argentea</i>	1,2	0
Gelbe Resede	<i>Reseda lutea</i>	0,5	0,5
Färberresede	<i>Reseda luteola</i>	0,8	0,8
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	2,5	3
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	5	5
Echtes Seifenkraut	<i>Saponaria officinalis</i>	2	1,2
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	1,5	2
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	2	2
Traubenkropf-Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	3,2	3,7
Ackersenf	<i>Sinapis arvensis</i>	2,5	3,3
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	0,3	0,3
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,8	1,2
Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i>	0,7	1,3

Tabelle A6: Zugehörige Kulturformenkomponente für die Mischungen „Lebendiger Acker trocken/frisch FAKT II E8“

Deutscher Name	Botanischer Name	Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Kulturformenkomponente für Öko-Landwirte; Gew. %	Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Kulturformenkomponente für Öko-Landwirte; Gew. %
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	5	5,5
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	4,4	4,7
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	17,2	15,6
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3,5	3
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	17,4	20
Öllein, Saatlein	<i>Linum usitatissimum</i>	25,8	23,4
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	0	1,7
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	7	4,7
Büschelschön	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	8,7	8,6
Sommerwicke, Saatwicke	<i>Vicia sativa</i>	11	12,8

Tabelle A7: Zugehörige Kulturformenkomponente für die Mischungen „Blühende Landschaft Süd/West FAKT II E8“, entweder für die Frühjahr- oder Spätsommersaat

Die Mischungen sind mit beiden o. g. Mischungen kombinierbar (Tabelle A2).

Deutscher Name	Botanischer Name	Blühende Landschaft mehrjährig Süd/West; Kulturformenkomponente für Spätsommersaat FAKT II E8; Gew. %	Blühende Landschaft mehrjährig Süd/West; Kulturformenkomponente für Frühlingsaat FAKT E 8; Gew. %
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	7	10
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	7	4,8
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	9	4,8
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	0	15
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	7	0
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	0	15
Gartenkresse	<i>Lepidium sativum</i>	5	0
Öllein, Saatlein	<i>Linum usitatissimum</i>	0	14,5
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	4	2,5
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	5	3,4
Büschelschön	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0	8,3
Wintererbse	<i>Pisum sativum</i>	22	0
Weißer Senf	<i>Sinapis alba</i>	0	3,4
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	12	10
Winter-Ackerbohne	<i>Vicia faba</i>	22	0
Sommerwicke	<i>Vicia sativa L.</i>	0	8,3

Tabelle A8: Sommer- bzw. Wintergetreidemischungen für die FAKT II Maßnahme E13.2, die bis 2024 vorgeschrieben waren und in 2026 noch ausgebracht werden dürfen

Seit 2025 gibt es nur noch eine Mischung (s. Tab. 4), die für Winter- und Sommergetreide zulässig ist.

Deutscher Name	Botanischer Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	Gew. %	Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten
Wintergetreidemischung bis 2024				
Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	W	1	<i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume); <i>Crepis capillaris</i> (Kl. Pippau); <i>Hypochaeris</i> spec. (Ferkelkraut-Arten); <i>Hieracium</i> spec. (Habichtkräuter); <i>Scorzoneroide autumnalis</i> (Herbst-Löwenzahn); <i>Leontodon hispidus</i> (Rauer Löwenzahn)
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	K	3,5	
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	K	1	
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	K	5	
Lein	<i>Linum usitatissimum</i>	K	5	
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	K	12	<i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)
Hopfenklee=Gelbklee	<i>Medicago lupulina</i>	K	13,9	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
Serradella	<i>Ornithopus sativus</i>	K	8,5	
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	W	3	
Gew. Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	W	0,1	Familie Lamiaceae (Lippenblütler) (z. B. <i>Betonica officinalis</i> , <i>Clinopodium vulgare</i>)
Kl. Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	W	1,5	<i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Pimpinella major</i> (Kleine/ Große Bibernelle)
Schwedenklee	<i>Trifolium hybridum</i>	K	3,5	
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	K	25	
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	K	7	
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	K	3	
Erdklee	<i>Trifolium subterraneum</i>	K	4	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
Schabzigerklee	<i>Trigonella caerulea</i>	K	1	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
Feldsalat	<i>Valerianella locusta/olitoria</i>	K	2	
Sommergetreidemischung bis 2024				
Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	W	0,2	<i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume); <i>Hypochaeris</i> spec. (Ferkelkraut-Arten); <i>Hieracium</i> spec. (Habichtkräuter); <i>Scorzoneroide autumnalis</i> (Herbst-Löwenzahn); <i>Leontodon hispidus</i> (Rauer Löwenzahn)
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	K	4	
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	K	1	
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	K	5	
Kresse	<i>Lepidium sativum</i>	K	5	
Lein	<i>Linum usitatissimum</i>	K	8	
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	K	9	<i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)
Hopfenklee = Gelbklee	<i>Medicago lupulina</i>	K	12	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
Serradella	<i>Ornithopus sativus</i>	K	12	
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	W	2,5	
Schwedenklee	<i>Trifolium hybridum</i>	K	3,5	
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	K	24,8	
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	K	6	
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	K	4	
Erdklee	<i>Trifolium subterraneum</i>	K	2	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
Schabzigerklee	<i>Trigonella caerulea</i>	K	1	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)

Tabelle A9: Zulässige Wildpflanzenmischungen für die FAKT II-Maßnahmen E14 und E15

Veitshöchheimer Hanfmix		
Deutscher Name	Botanischer Name	Gewichts-%
Feigenblättrige Stockrose	<i>Alcea ficifolia</i>	4
Eibisch	<i>Althea officinalis</i>	2
Amaranth	<i>Amaranth Bärenkrafft</i>	1,5
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	2
Färber-Kamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1
Große Klette	<i>Arctium lappa</i>	5,5
Faserhanf*	<i>Cannabis sativa</i>	13
Gelbe Riesenflockenblume	<i>Centaurea macrocephala</i>	1,5
Pannonische Flockenblume	<i>Centaurea pannonica</i>	3,5
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	4
Färber-Mähdchenaugen	<i>Coreopsis tinctoria</i>	2
Schmuckkörbchen	<i>Cosmos bipinnatus</i>	1,5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1,5
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	1
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	12
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	1
Sonnenblume mehrköpfig	<i>Helianthus annuus</i>	5
Wiesenbärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i>	0,5
Herzgespann	<i>Leonurus cardiaca</i>	3
Sibirisches Herzgespann	<i>Leonurus japonicus</i>	1
Faser-Lein	<i>Linum usitatissimum</i>	3
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3
Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3,5
Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	2,5
Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	3
Eselsdistel	<i>Onopordon acanthium</i>	4,5
Muskatellersalbei	<i>Salvia sclarea</i>	1,5
Rispenhirse	<i>Sorghum bicolor</i>	8,5
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3,5
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,5

* Sortenliste der zulässigen Hanfsorten unter www.ble.de > Unsere Themen > Landwirtschaft > Nutzhanf > Anlage 4 Sortenliste

Tabelle A9 (Fortsetzung):

Wildpflanzenmischung Becker-Schoell		
Deutscher Name	Botanischer Name	Gewichts-%
Echter Dill	<i>Anethum graveolens</i>	3
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	2
Markstammkohl	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>medullosa</i>	1
Färberdistel	<i>Carthamus tinctoria</i>	2
Kümmel	<i>Carum carvi</i>	3
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	1
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	0,5
Buchweizen	<i>Fagopyron esculentum</i>	6
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	4
Platterbse	<i>Lathyrus spec.</i>	3
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	3
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	10
Bokharaklee gelb	<i>Melilotus albus</i>	10
Espарsette in Hülsen	<i>Onobrychis viciifolia</i>	12,5
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	2
Sudangras	<i>Sorghum sudanense</i>	7
Schwedenklee	<i>Trifolium hybridum</i>	7
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	10
Winterwicke	<i>Vicia villosa</i>	10

Biogas BG 70		
Deutscher Name	Botanischer Name	Gewichts-%
Eibisch	<i>Althea officinalis</i>	7,5
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1,5
Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,5
Flockenblume	<i>Centaurea jacea/nigra</i>	7
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	1,5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	0,5
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,5
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	0,5
Buchweizen	<i>Fagopyron esculentum</i>	8
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3,5
Sonnenblume einköpfig	<i>Helianthus annuus</i>	8
Alant	<i>Inula helenium</i>	3,5
Futtermalve	<i>Malva sylvestris</i>	6
Quirlmalve	<i>Malva verticillata</i>	7,5
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	2
Weißer Steinklee Adela	<i>Melilotus albus</i>	5
Weißer Steinklee Krajova	<i>Melilotus albus</i>	5
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	6,5
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	10
Espарsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	8
Färber-Wau	<i>Reseda luteola</i>	0,3
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia</i>	1
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	1
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	5
Königskerze	<i>Verbascum spec.</i>	0,2

Tabelle A9 (Fortsetzung):

Biogas BG 90		
Deutscher Name	Botanischer Name	Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Althea officinalis</i>	7,5
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1,5
Gew. Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,5
Flockenblume	<i>Centaurea jacea/nigra</i>	7
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	1,5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	0,5
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,5
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	0,5
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3,5
Mauretanische Malve	<i>Malva mauritanica</i>	3,5
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	6
Saat-Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	2
Weißer Steinklee Adela	<i>Melilotus albus</i>	5
Weißer Steinklee Krajova	<i>Melilotus albus</i>	5
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	10
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	8
Färber-Wau	<i>Reseda luteola</i>	0,3
Weißer Lichtnelke	<i>Silene alba</i>	1
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	1
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	5
Königskerze	<i>Verbascum spec.</i>	0,2
Ansaathilfe		30

Biogas BW 2023		
Deutscher Name	Botanischer Name	Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Altheae officinalis</i>	6,3
Gew. Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,7
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	3,4
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1,1
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,7
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	1,4
Buchweizen	<i>Fagopyron esculentum</i>	20
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	13,3
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	7,5
Echter Alant	<i>Inula helenium</i>	2,1
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	4,2
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	7,8
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	3
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	10,8
Rainfarn-Phazelie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	3
Färber-Wau	<i>Reseda luteola</i>	0,7
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	0,7
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3,6
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,7

Tabelle A9 (Fortsetzung):

Biogas-Mischung Spätsommeransaat Süd 2023 (Rieger-Hofmann)		
Deutscher Name	Botanischer Name	Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Althaea officinalis</i>	3,0
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	2,0
Große Klette	<i>Arctium lappa</i>	0,4
Gewöhnlicher Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,7
Leindotter	<i>Camelina satvia</i>	3,0
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	4,4
Gewöhnliche Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6,0
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1,1
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,7
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	1,4
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	9,6
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	11,5
Echtes Herzgespann	<i>Leonurus cardiaca</i>	2,8
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	4,2
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	5,8
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3,0
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	3,0
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	11,1
Petersilie	<i>Petroselinum crispum</i>	3,0
Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	3,0
Wintererbse	<i>Pisum sativum</i>	12,0
Färber-Resede	<i>Reseda luteola</i>	0,5
Waldstaudenroggen	<i>Secale multicaule</i>	3,0
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	0,5
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3,6
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,7

Tabelle A9 (Fortsetzung):

Biogas-Mischung Frühjahrsansaat Süd 2024 (Rieger-Hofmann)		
Deutscher Name	Botanischer Name	Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Althaea officinalis</i>	3,0
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	2,0
Große Klette	<i>Arctium lappa</i>	0,4
Gewöhnlicher Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,7
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	4,4
Gewöhnliche Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6,0
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1,1
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,7
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	1,4
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	20,3
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	13,3
Sonnenblume, Pollensorte	<i>Helianthus annuus</i>	8,5
Echtes Herzgespann	<i>Leonurus cardiaca</i>	2,8
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	4,2
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	5,8
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3,0
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	3,0
Saat-Espарsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	11,1
Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	3,0
Färber-Resede	<i>Reseda luteola</i>	0,5
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	0,5
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3,6
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,7

Extensive Biomassepflanzen Öko			
Deutscher Name	Botanischer Name	Qualität	Gewichts-%
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	Öko	2
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	Öko	1
Hanf*	<i>Cannabis sativa</i>	USO 31 Öko	10
Färberdistel	<i>Carthamus tinctoria</i>	Öko	2
Kümmel	<i>Carum carvi</i>	Öko	2
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	Öko	1
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	Öko	5
Buchweizen	<i>Fagopyron esculentum</i>	Öko	8
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	Öko	3
Sonnenblumen	<i>Helianthus annuus</i>	Öko	8
Platterbse	<i>Lathyrus spec.</i>	Öko	10
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	Öko	5
Bokharaklee	<i>Melilotus albus</i>	gelbbl. Öko	10
Espарsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Öko	10
Serradella	<i>Ornithopus sativa</i>	Öko	4
Rispenhirse	<i>Panicum spec.</i>	Unikum Öko	7
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	Öko	1
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	Öko	5
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	Öko	5
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	Öko	1

* Sortenliste der zulässigen Hanfsorten unter www.ble.de > Unsere Themen > Landwirtschaft > Nutzhanf > Anlage 4 Sortenliste

Impressum

Herausgeber: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Neßlerstr. 25, 76227 Karlsruhe, Tel.: 0721/9468-0, Fax: 0721/9468-209, E-Mail: poststelle@ltz.bwl.de, Internet: www.ltz-augustenberg.de

Titelfoto: Dr. Julia Walter

Autorinnen und Autoren: Dr. Jörn Breuer, Dr. Andreas Butz, Hauke Delfs, Dr. Kurt Möller, Jürgen Ott, Dr. Vanessa Schulz, Kerstin Stolzenburg, Dr. Erich Unterseher, Dr. Julia Walter, Dr. Martin Weis (alle LTZ); Jörg Messner, Wilhelm Wurth (beide LAZBW);

Redaktion: Dr. Julia Walter; Layout: Jörg Jenrich

03/2026