

Spielräume und Optionen beim Umgang mit problematischen Entwicklungen von FAKT II E8 Blühflächen

Die innerdienstlichen Anordnung zum Gemeinsamen Antrag 2025 bzw. zu den Vor-Ort-Kontrollen regeln nunmehr weitgehender, dass auf FAKT II E8 Blühflächen seitens der ULBen **geeignete Gegenmaßnahmen** (also nicht nur Schröpfschnitt, Nachsaat oder Neuansaat) **genehmigt** werden können („Bei problematischer Vegetationsentwicklung oder auftretenden Kalamitäten im Laufe der Verpflichtungsdauer sind nach Zustimmung der unteren Landwirtschaftsbehörde auf den betroffenen Teilflächen Gegenmaßnahmen (z. B. Nachsaat, Schröpfschnitt, Mahd mit Abräumen auf maximal 50 % der Flächen bei Vergrasung) und ggf. eine Neuansaat zulässig.“).

Falls die Verunkrautung so großflächig ist, dass sie für den Landwirt nicht zumutbar ist und wird deswegen die Fläche vom Landwirt so bearbeitet (z.B. kompletter Umbruch), dass sie keine Blühfläche im Sinne von FAKT II-E8 mehr ist, muss der Landwirt den Antrag zu E8 für diese Fläche zurückziehen. In diesen Fällen wären zudem ggf. Rückforderungen für die Vorjahre die Folge, da die mehrjährige Verpflichtung nicht mehr eingehalten würde.

Generell sollte beachtet werden:

1. Standortwahl und Aussaat sind entscheidend

Eine **sorgfältige Auswahl der Flächen** (keine massive Vorbelastung mit Disteln/ Quecken; sonnig) vor Maßnahmenbeginn und **Sorgfalt bei der Aussaat** (gründliche Saatbettvorbereitung für Feinsämereien) sind der Schlüssel für eine langjährig schöne Blühfläche. Eine Spätsommeraussaat bis Ende September des Vorjahres ist insbesondere bei einem hohen Druck von wärmeliebenden Samenunkräutern (wie z. B. Hirsen, Weißer Gänsefuß) zu empfehlen. Auch viele Wildarten keimen so früher und erfolgreicher, oft ist über den Winter die Feuchtigkeitsversorgung besser.

Hinweis: Es gibt keine Pflegemaßnahme in mehrjährigen Blühflächen, mit der man extreme „Verdistelung“ oder flächendeckende Quecke in den Griff bekommen könnte!



Baden-Württemberg



Landwirtschaftliches
Technologiezentrum
Augustenberg

2. Etablierung des Bestandes

Im ersten Jahr kann es, auch bei fachgerechter Etablierung des Bestandes, dennoch zu einer starken Verunkrautung durch einjährige Samenunkräuter kommen (Gegenmaßnahmen s. u.). In den wenigsten Fällen ist hier eine Neuaussaat angezeigt, die Flächen haben sich im zweiten Jahr entgegen des optischen Eindrucks im ersten Jahr meistens ausreichend etabliert. Ggf. sieht man bereits kleine Keimlinge unter den Unkräutern, die dann aufwachsen.

Hinweis: Generell muss gewährleistet sein, dass die Nutzung benachbarter Grundstücke nicht, insbesondere nicht durch schädlichen Samenflug, unzumutbar erschwert wird.

3. Immer Rückzugsräume übriglassen

Es sollten grundsätzlich **immer nur maximal 50 %** der Flächen gepflegt werden, um Insektenpopulationen ein Überleben in den Flächen zu sichern und Rückzugsräume bereitzuhalten.

4. Brut- und Setzzeiten beachten

Viele Tiere nutzen die Flächen **zwischen April und August** für die **Brut**. Hier sollte immer sorgfältig abgewogen und die zu bearbeitenden Flächen ggf. im Vorfeld beobachtet/ abgesprochen werden.

5. Ganzflächiges Mulchen ist nie eine geeignete Gegenmaßnahme

Nicht nur werden über 80 % aller Insekten beim Mulchen verletzt oder getötet und der Rest findet keine Rückzugsräume mehr, es verschlimmert häufig auch negative Vegetationsentwicklungen (Vergrasung) und drängt Zielarten zurück.

Bei speziellen Problemen:

1. Starker Aufwuchs von Samenunkräutern im ersten Jahr (Melde, Gänsefuß, Hirsens, Berufkraut)

Geduld haben, im zweiten Jahr sind einjährige Samenunkräuter in den allermeisten Fällen kein Problem. Ggf. hoher Schröpfungsschnitt in Extremfällen vor dem Aussamen möglich. Auf weniger wüchsigen Flächen ist ein Mähen mit Liegenlassen des Schwads besser als Mulchen, da so die Feuchtigkeit auf der Fläche gehalten wird und weniger Insekten geschädigt werden.



2. Starke Vergrasung, kaum noch Zielarten

Vergrasung per se stellt aus naturschutzfachlicher Sicht kein Problem dar, da sich die ungestörten Flächen weiterhin als Rückzugs- und auch Nahrungshabitate (Heuschrecken, Schmetterlingsraupen, viele Bodenbewohner) für viele Arten eignen. Will man auf den Flächen allerdings wieder Strukturvielfalt schaffen und ggf. den Blühaspekt erhöhen, empfiehlt sich eine Mahd (Hochschnitt) auf maximal 50 % der Flächen (die andere Hälfte im nächsten Jahr oder mindestens zwei Monate später). Mulchen fördert Gräser noch mehr und sollte auf mehrjährigen Blühflächen, außer auf sehr kleinen Teilstücken, unterlassen werden. Bei starkem Befall mit Quecke können Teilflächen (nur in einem Jahr während des Verpflichtungszeitraums) bei trockenem Wetter, ggf. wiederholt, gegrubbert werden, um die Rhizome freizulegen. Danach Neuansaat dieser Teilflächen.

3. Disteln

Teilflächenbearbeitung auf max. 50 % der Flächen vor April oder ab August: Platten mulchen/ abschneiden oder ggf. Schälplflug einsetzen (möglichst zeitig im Frühjahr nach Austrieb, da dann Nährstoffreserven erschöpft sind) oder im Spätsommer Blütenköpfe abschneiden. Ein händisches Ausstechen oder Abmähen einzelner Pflanzen bei einer Höhe von 10-15 cm ist zulässig, jedoch kein Befahren/ Bearbeiten mit Traktoren.

4. Krauser oder Breitblättriger Ampfer

Ähnlich der Distelbehandlung: am besten jung bei feuchtem Wetter 10-15 cm tief ausstechen/ziehen, ansonsten Teilflächenbearbeitung auf max. 50 % der Flächen vor April oder ab August.

5. Goldrute

Ggf. vor der Blüte händisch abschneiden.

6. Gehölzentwicklung

Mulchen/ Schneiden/ Ausgraben der betroffenen Flächen (wieder max. 50 %) vor April oder ab August.

Impressum

Herausgeber: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Neßlerstr. 25, 76227 Karlsruhe,
Telefon 0721/9468-0, Fax: 0721/9468-209, E-Mail: poststelle@ltz.bwl.de, www.ltz-augustenberg.de
Bearbeitung und Redaktion: Julia Walter, Tobias Hartmann, Ref. 12 (Agrarökologie)

Stand: 07/2025

