



# Cours MALG & MOVEX

# Vérification d'une annotation

Dominique Méry Telecom Nancy, Université de Lorraine (13 mars 2025 at 10:46 P.M.)

Année universitaire 2024-2025

1 Correction

#### **Sommaire**

1 Correction

$$\begin{array}{l} \ell_1 : x = 3 \ \land \ y = z + x \ \land z = 2 \cdot x \\ y := z + x \\ \ell_2 : x = 3 \ \land \ y = x + 6 \end{array}$$

### On définit un contrat comme suit :

## On pose les assertions suivantes à partir de l'annotation :

- $ightharpoonup pre(x_0, y_0, z_0) \stackrel{def}{=} x0 = 3 \land y0 = z0 + x0 \land z0 = 2.x0$
- $ightharpoonup prepost(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \land y = x + 6$
- $ightharpoonup Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \land y = z + x \land z = 2 \cdot x$
- $Q_2(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \land y = x + 6$

## On pose les assertions suivantes à partir de l'annotation :

- $ightharpoonup pre(x_0, y_0, z_0) \stackrel{def}{=} x0 = 3 \land y0 = z0 + x0 \land z0 = 2.x0$
- $ightharpoonup prepost(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \land y = x + 6$
- $ightharpoonup Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \ \land \ y = z + x \ \land z = 2 \cdot x$
- $Q_2(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \land y = x + 6$

## On établit les trois conditions pour valider le contrat :

- ightharpoonup (init)  $pre(x_0, y_0, z_0) \land (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) \Rightarrow Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z)$
- ► (concl)  $pre(v_0) \land Q_2(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \Rightarrow prepost(x_0, y_0, z_0, x, y, z)$
- (induct)  $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$ 

- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $\vdash pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z + x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $x0 = 3 \land y0 = z0 + x0, z0 =$ 2. $x0, Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $x0 = 3 \land y0 = z0 + x0, z0 =$ 2. $x0, Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $x0 = 3 \land y0 = z0 + x0, z0 = 2.x0, x = 3 \land y = z + x \land z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z + x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $pre(x_0, y_0, z_0) \land Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \land TRUE \land (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $x0 = 3 \land y0 = z0 + x0, z0 =$ 2. $x0, Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ►  $x0 = 3 \land y0 = z0 + x0, z0 = 2.x0, x = 3 \land y = z + x \land z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- ▶  $x0 = 3 \land y0 = z0 + x0, z0 = 2.x0, x = 3 \land y = z + x \land z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash x' = 3 \land y' = x' + 6$

 $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3 \land y' = x'+6$ 

- $x_0 = 3, y_0 = z_0 + x_0, z_0 = 2.x_0, x = 3, y = z + x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash x' = 3 \land y' = x' + 6$
- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3 \land y' = x'+6$
- $x_0 = 3, y_0 = z_0 + x_0, z_0 = 2.x_0, x = 3, y = z + x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash x' = 3$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3 \land y' = x'+6$
- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x = 3$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3 \land y' = x'+6$
- $x_0 = 3, y_0 = z_0 + x_0, z_0 = 2.x_0, x = 3, y = z + x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash x' = 3$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x' = 3$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash x = 3$
  - x = 3 est une hypothèse à gauche. Le séquent est valide.

 $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$ 

- $x_0 = 3, y_0 = z_0 + x_0, z_0 = 2.x_0, x = 3, y = z + x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash y' = x' + 6$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x+6$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x. TRUE. (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash z+x = x+6$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x. TRUE. (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x$ , TRUE,  $(x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash z+x = x+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash 2.x+x = x+6$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x. TRUE. (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE. (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash z+x = x+6$
  - x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x. TRUE. (x', y', z') = (x. z+x, z) + 2.x+x = x+6
  - x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 0
  - $2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash 2.3 + 3 = 3 + 6$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x$ , TRUE,  $(x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash z+x = x+6$
  - x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 0
  - $2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash 2.x + x = x + 6$ • x0 = 3, y0 = z0 + x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z + x, z = 2
  - x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = z.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x. TRUE. (x', y', z') = (x, z+x, z) + 2.3+3 = 3+6
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash 9 = 9$

- $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$ 
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x'+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x, TRUE. (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash y' = x+6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2 \cdot x$ , TRUE,  $(x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash z+x = x+6$
  - x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x. TRUE. (x', y', z') = (x. z+x, z) + 2.x+x = x+6
  - x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = z+x
  - $2 \cdot x, TRUE, (x', y', z') = (x, z + x, z) \vdash 2.3 + 3 = 3 + 6$
  - $x0 = 3, y0 = z0+x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z+x, z = 2.x, TRUE, (x', y', z') = (x, z+x, z) \vdash 9 = 9$
  - Réflexivité de l'égalité.