Cours MALG & MOVEX

Vérification d'une annotation

Dominique Méry
Telecom Nancy, Université de Lorraine

Année universitaire 2023-2024

Plan

1. Correction
2. Règles appliquées sur les séquents

Sommaire

1. Correction
2. Règles appliquées sur les séquents

Current Summary

1. Correction

2. Règles appliquées sur les séquents

Ecriture du contrat

$$\ell_1 : x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$$
$$y := z{+}x$$
$$\ell_2 : x = 3 \ \wedge \ y = x{+}6$$

On définit un contrat comme suit :

variables x, y, z
requires $x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0 \wedge z0 = 2.x0$
ensures $x_f = 3 \wedge y_f = x_f{+}6$

begin
$\ell_1 : x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$
$y := z{+}x$
$\ell_2 : x = 3 \ \wedge \ y = x{+}6$
end

Conditions de vérification du contrat

On pose les assertions suivantes à partir de l'annotation :

- $pre(x_0, y_0, z_0) \stackrel{def}{=} x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0 \wedge z0 = 2.x0$
- $prepost(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \ \wedge \ y = x{+}6$
- $Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$
- $Q_2(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \ \wedge \ y = x{+}6$

Conditions de vérification du contrat

On pose les assertions suivantes à partir de l'annotation :

- $pre(x_0, y_0, z_0) \stackrel{def}{=} x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0 \wedge z0 = 2.x0$
- $prepost(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \ \wedge \ y = x{+}6$
- $Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x$
- $Q_2(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \stackrel{def}{=} x = 3 \ \wedge \ y = x{+}6$

On établit les trois cpnditions pour valider le contrat :

- (init) $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) \Rightarrow Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z)$
- (concl) $pre(v_0) \wedge Q_2(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \Rightarrow prepost(x_0, y_0, z_0, x, y, z)$
- (induct)
  $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') =$
  $(x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

Preuve du pas induct

Preuve du pas induct

- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

Preuve du pas induct

- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $\vdash pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

Preuve du pas induct

- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $\vdash pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

Preuve du pas induct

- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $\vdash pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

Preuve du pas induct

- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $\vdash pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

Preuve du pas induct

- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $\vdash pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$

Preuve du pas induct

- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $\vdash pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \Rightarrow Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0) \wedge Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z) \wedge TRUE \wedge (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $pre(x_0, y_0, z_0), Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, Q_1(x_0, y_0, z_0, x, y, z), TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash Q_2(x_0, y_0, z_0, x', y', z')$
- $x0 = 3 \wedge y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3 \ \wedge \ y = z{+}x \ \wedge z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3 \ \wedge \ y' = x'{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3 \ \wedge \ y' = x'{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3 \ \wedge \ y' = x'{+}6$
- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3 \ \wedge \ y' = x'{+}6$
- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3 \ \wedge \ y' = x'{+}6$
- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x = 3$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3 \ \wedge \ y' = x'{+}6$
- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x' = 3$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash x = 3$
  - $x = 3$ est une hypothèse à gauche. Le séquent est valide.

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash z{+}x = x{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash z{+}x = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 2.x{+}x = x{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash z{+}x = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 2.x{+}x = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 2.3{+}3 = 3{+}6$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash z{+}x = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 2.x{+}x = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 2.3{+}3 = 3{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 9 = 9$

- $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x'{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash y' = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash z{+}x = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 2.x{+}x = x{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 2.3{+}3 = 3{+}6$
  - $x0 = 3, y0 = z0{+}x0, z0 = 2.x0, x = 3, y = z{+}x, z = 2{\cdot}x, TRUE, (x', y', z') = (x, z{+}x, z) \vdash 9 = 9$
  - Réflexivité de l'égalité.

Current Summary

1. Correction

2. Règles appliquées sur les séquents