

判別

記録

出力の作成日付		26-MAY-2026 09:16:09
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	11
欠損値の取り扱い	欠損の定義	分析段階ではユーザー欠損値は欠損として扱われます。
	使用されたケース	分析段階では、予測変数にユーザー欠損値またはシステム欠損値がないケースが使用されます。ユーザー欠損値かシステム欠損値、またはグループ化変数に範囲外の値のあるケースは常に除外されます。
シンタックス		DISCRIMINANT /GROUPS=ネコ (1 2) /VARIABLES=脳の水銀量 肝臓の水銀量 /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=RAW /CLASSIFY=NONMISSING ...
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.02

[データセット0]

処理した分析ケースの要約

重み付きのないケース		度数	パーセント
有効数		11	100.0
除外数	欠損または範囲外のグループコード	0	.0
	少なくとも判別変数に1つの欠損値	0	.0
	欠損または範囲外のグループコードと少なくとも判別変数に1つの欠損値	0	.0
	合計	0	.0
合計		11	100.0

グループ統計量

組		有効なケースの数 (リストごと)	
		重み付けなし	重み付き
1	脳の水銀量	6	6.000
	肝臓の水銀量	6	6.000
2	脳の水銀量	5	5.000
	肝臓の水銀量	5	5.000
合計	脳の水銀量	11	11.000
	肝臓の水銀量	11	11.000

分析 1

正準判別関数の集計

固有値

関数	固有値	分散の %	累積 %	正準相関
1	2.044 ^a	100.0	100.0	.819

a. 最初の 1 個の正準判別関数が分析に使用されました。

Wilks のラムダ

関数の検定	Wilks のラムダ	カイ 2 乗	自由度	有意確率
1	.329	8.905	2	.012

標準化された正準判別 関数係数

関数	
1	
脳の水銀量	.805
肝臓の水銀量	.439

構造行列

関数	
1	
脳の水銀量	.904
肝臓の水銀量	.620

判別変数と標準化された正
準判別関数間のプールされた
グループ内相関変数は関数
内の相関の絶対サイズにした
がって並べ替えられます。

正準判別関数係数

関数 1	
脳の水銀量	. 381
肝臓の水銀量	. 031
(定数)	-3. 627

非標準化係数

グループ重心の関 数

組	関数 1
1	1. 181
2	-1. 417

グループ平均で評価さ
れた標準化されていな
い正準判別関数