

t 検定

記録

出力の作成日付		21-APR-2026 10:33:08
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	17
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー欠損値は欠損として扱われています。
	使用されたケース	分析ごとの統計量は、その分析中のすべての変数に欠損データや範囲外のデータがないケースに基づいています。
シNTAXス		T-TEST GROUPS=グループ (1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=時給 /ES DISPLAY(TRUE) /HOMOGENEITY DISPLAY(TRUE) /CRITERIA=CI(.95).
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.01

グループ統計量

	グループ	度数	平均値	標準偏差	平均値の標準誤差
時給	ウェイトレス	8	981.25	133.463	47.186
	コンパニオン	7	1928.57	430.946	162.882

独立サンプルの検定

2 つの母平均の差の検定

		t 値	自由度	有意確率		平均値の差	差の標準誤差
				片側 p 値	両側 p 値		
時給	等分散を仮定する	-5.929	13	<.001	<.001	-947.321	159.776
	等分散を仮定しない	-5.586	7.007	<.001	<.001	-947.321	169.579

独立サンプルの検定

2 つの母平均の差の検定

		差の 95% 信頼区間	
		下限	上限
時給	等分散を仮定する	-1292.496	-602.147
	等分散を仮定しない	-1348.231	-546.412

独立サンプルの検定: 片側 p 値

等分散を仮定する

■ ■ 変数の平均差は有意ではありません (グループ化変数に基づ): *None*

■ ■ 平均差は変数に対して (グループ化変数に基づいて) 有意です: 時給

等分散を仮定しない

■ ■ 変数の平均差は有意ではありません (グループ化変数に基づ): *None*

■ ■ 平均差は変数に対して (グループ化変数に基づいて) 有意です: 時給

独立サンプルの検定: 両側 p 値

等分散を仮定する

■ ■ 変数の平均差は有意ではありません (グループ化変数に基づ): *None*

■ ■ 平均差は変数に対して (グループ化変数に基づいて) 有意です: 時給

等分散を仮定しない

■ ■ 変数の平均差は有意ではありません (グループ化変数に基づ): *None*

■ ■ 平均差は変数に対して (グループ化変数に基づいて) 有意です: 時給

注: キュレーション・ヘルプは、フォーマットされた値ではなく、実際のセルの値に基づいて計算されます。

等分散性の検定

等分散性のための Levene の検定

		F 値	有意確率
時給	等分散を仮定する	16.214	.001

独立サンプルの効果サイズ

				95% 信頼区間	
Standardizer ^a			ポイント推定	下限	上限
時給	Cohen の d	308.716	-3.069	-4.589	-1.498
	Hedges の補正	328.078	-2.887	-4.318	-1.409
	Glass のデルタ	430.946	-2.198	-3.746	-.584

a 効果サイズの推定に使用する分母。

Cohenのdは、プールされた標準偏差を使用します。

Hedgesの補正は、プールされた標準偏差に補正係数を加えたものを使用します。

Glassのデルタは、制御（すなわち2 番目の）グループのサンプル標準偏差を使用します。