

t 検定

記録

出力の作成日付		21-APR-2026 10:48:31
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット1
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	7
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー欠損値は欠損として扱われています。
	使用されたケース	分析ごとの統計量は、その分析中のすべての変数に欠損データや範囲外のデータがないケースに基づいています。
シタックス		T-TEST PAIRS=ダイエット前の体重 WITH ダイエット後の体重 (PAIRED) /ES DISPLAY (TRUE) STANDARDIZER (SD) /CRITERIA=CI (.9500) /MISSING=ANALYSIS.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.01

対応サンプルの統計量

		平均値	度数	標準偏差	平均値の標準誤差
ペア 1	ダイエット前の体重	56.114	7	4.1249	1.5591
	ダイエット後の体重	52.586	7	2.2675	.8570

対応サンプルの相関係数

		度数	相関係数	有意確率	
				片側 p 値	両側 p 値
ペア 1	ダイエット前の体重 & ダイエット後の体重	7	.861	.006	.013

対応サンプルの検定

		平均値	標準偏差	対応サンプルの差 平均値の標準誤差	差の 95% 信頼区間 下限	上限
ペア 1	ダイエット前の体重 - ダイエット後の体重	3.5286	2.4581	.9291	1.2552	5.8020

& [ページ タイトル]

対応サンプルの検定

		t 値	自由度	有意確率	
				片側 p 値	両側 p 値
ペア 1	ダイエット前の体重－ダイエット後の体重	3.798	6	.004	.009

対応のあるサンプルの検定: 片側 p 値

平均差は対応のある変数に対して有意ではありません: (None)

平均差は対応のある変数に対して有意です: (ダイエット前の体重 - ダイエット後の体重)

対応のあるサンプルの検定: 両側 p 値

平均差は対応のある変数に対して有意ではありません: (None)

平均差は対応のある変数に対して有意です: (ダイエット前の体重 - ダイエット後の体重)

注: キュレーション・ヘルプは、フォーマットされた値ではなく、実際のセルの値に基づいて計算されます。

対応のあるサンプルの効果サイズ

		Standardizer ^a	ポイント推定	95% 信頼... 下限
ペア 1	ダイエット前の体重 - ダイエット後の体重	Cohen の d	2.4581	1.435
		Hedges の補正	2.8299	1.247

対応のあるサンプルの効果サイズ

		95% 信頼区... 上限
ペア 1	ダイエット前の体重 - ダイエット後の体重	Cohen の d
		Hedges の補正

a 効果サイズの推定に使用する分母。

Cohen の d は、平均値の差のサンプル標準偏差を使用します。

Hedges の補正は、平均値の差のサンプル標準偏差と補正係数を使用します。