

一変量の分散分析

記録

出力の作成日付		28-APR-2026 09:46:11
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	24
欠損値の扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として処理されます。
	使用されたケース	統計量はモデル中のすべての変数について有効データを持つすべてのケースに基づいています。
シンタックス		UNIANOVA 持続時間 BY 麻酔薬 /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /POSTHOC=麻酔薬 (TUKEY) /PLOT=PROFILE(麻酔薬) TYPE=BAR ERRORBAR=CI MEANREFERENCE=YES /CRITERIA=ALPHA(0.05) /DESIGN=麻酔薬.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.05
	経過時間	00:00:00.14

被験者間因子

度数		
麻酔薬	1	8
	2	7
	3	7

被験者間効果の検定

従属変数: 持続時間

ソース	タイプ III 平方和	自由度	平均平方	F 値	有意確率
修正モデル	2468.072 ^a	2	1234.036	8.493	.002
切片	22098.829	1	22098.829	152.084	<.001
麻酔薬	2468.072	2	1234.036	8.493	.002
誤差	2760.826	19	145.307		
総和	28026.500	22			
修正総和	5228.898	21			

a R2 乗 = .472 (調整済み R2 乗 = .416)

その後の検定

麻酔薬

多重比較

従属変数: 持続時間

Tukey HSD

(I) 麻酔薬	(J) 麻酔薬	平均値の差 (I-J)	標準誤差	有意確率	95% 信頼区間	
					下限	上限
1	2	4.255	6.2387	.777	-11.594	20.104
	3	24.413*	6.2387	.003	8.563	40.262
2	1	-4.255	6.2387	.777	-20.104	11.594
	3	20.157*	6.4433	.015	3.788	36.526
3	1	-24.413*	6.2387	.003	-40.262	-8.563
	2	-20.157*	6.4433	.015	-36.526	-3.788

観測平均値に基づいています。

誤差項は平均平方 (誤差) = 145.307 です。

* 平均値の差は 0.05 水準で有意です。

等質サブグループ

持続時間

Tukey HSD^{a, b, c}

麻酔薬	度数	サブグループ	
		1	2
3	7	16.900	
2	7		37.057
1	8		41.313
有意確率		1.000	.781

均質なサブセットのグループに対する平均値が表示されます。

観測平均値に基づいています。

誤差項は平均平方 (誤差) = 145.307 です。

- a 調和平均サンプル サイズ = 7.304 を使用します
- b グループのサイズが等しくありません。グループのサイズの調和平均が使用されています。タイプ I エラー水準は保証されません。
- c アルファ = 0.05

プロファイルプロット

& [ページ タイトル]

