

Jelek és rendszerek 2. házi

Kriván Bálint CBVOEN

Gyakorlat vezető: Farkasvölgyi Andrea

2014. április 26.

2 (a)

Nézzük először az FI-t:

$$\begin{aligned}\underline{x}'(t) &= \begin{bmatrix} -1,2 & -0,5 \\ 2 & -1,2 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1,2 \\ 1,3 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0,8 & -0,6 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + 0,45u(t)\end{aligned}$$

Használva a szokványos jelöléseket:

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} -1,2 & -0,5 \\ 2 & -1,2 \end{bmatrix} \quad \underline{B} = \begin{bmatrix} 1,2 \\ 1,3 \end{bmatrix} \quad \underline{C}^T = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,6 \end{bmatrix} \quad D = 0,45$$

Tudjuk, hogy:

$$H(j\omega) = \frac{\underline{C}^T \operatorname{adj}(j\omega \underline{E} - \underline{A}) \underline{B}}{\det(j\omega \underline{E} - \underline{A})} + D$$

Felírva $j\omega \underline{E} - \underline{A}$ mátrixot, majd ennek adjungáltját és determinánsát:

$$j\omega \underline{E} - \underline{A} = \begin{bmatrix} j\omega + 1,2 & 0,5 \\ -2 & j\omega + 1,2 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{adj}(j\omega \underline{E} - \underline{A}) = \begin{bmatrix} j\omega + 1,2 & -0,5 \\ 2 & j\omega + 1,2 \end{bmatrix}$$

$$\det(j\omega \underline{E} - \underline{A}) = (j\omega + 1,2)^2 + 1 = (j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44$$

Innen már kiszámolhatjuk $H(j\omega)$ -t:

$$\begin{aligned}H(j\omega) &= \frac{\begin{bmatrix} 0,8 & -0,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j\omega + 1,2 & -0,5 \\ 2 & j\omega + 1,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,2 \\ 1,3 \end{bmatrix}}{(j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44} + 0,45 = \\ &= \frac{\begin{bmatrix} (0,8j\omega - 0,24) & (-0,6j\omega - 1,12) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,2 \\ 1,3 \end{bmatrix}}{(j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44} + 0,45 = \\ &= \frac{0,18j\omega - 1,744}{(j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44} + 0,45 = \boxed{\frac{0,45(j\omega)^2 + 1,26j\omega - 0,646}{(j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44}}\end{aligned}$$

Nézzük a DI-t:

$$\underline{x}[k+1] = \begin{bmatrix} -1 & -0,7 \\ 0,8 & 0,8 \end{bmatrix} \underline{x}[k] + \begin{bmatrix} 0,7 \\ 0,6 \end{bmatrix} u[k]$$

$$y[k] = [-0,4 \quad 0,5] \underline{x}[k] + 1,3u[k]$$

Ebből:

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} -1 & -0,7 \\ 0,8 & 0,8 \end{bmatrix} \quad \underline{B} = \begin{bmatrix} 0,7 \\ 0,6 \end{bmatrix} \quad \underline{C}^T = [-0,4 \quad 0,5] \quad D = 1,3$$

Tudjuk, hogy:

$$H(e^{j\vartheta}) = \frac{\underline{C}^T \text{adj}(e^{j\vartheta} \underline{E} - \underline{A}) \underline{B}}{\det(e^{j\vartheta} \underline{E} - \underline{A})} + D$$

Felírva $e^{j\vartheta} \underline{E} - \underline{A}$ mátrixot, majd ennek adjungáltját és determinánsát:

$$e^{j\vartheta} \underline{E} - \underline{A} = \begin{bmatrix} e^{j\vartheta} + 1 & 0,7 \\ -0,8 & e^{j\vartheta} - 0,8 \end{bmatrix}$$

$$\text{adj}(e^{j\vartheta} \underline{E} - \underline{A}) = \begin{bmatrix} e^{j\vartheta} - 0,8 & -0,7 \\ 0,8 & e^{j\vartheta} + 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(e^{j\vartheta} \underline{E} - \underline{A}) = e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24$$

Ebből kiszámíthatjuk $H(e^{j\vartheta})$ -t:

$$H(e^{j\vartheta}) = \frac{[-0,4 \quad 0,5] \begin{bmatrix} e^{j\vartheta} - 0,8 & -0,7 \\ 0,8 & e^{j\vartheta} + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,7 \\ 0,6 \end{bmatrix}}{e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24} + 1,3 =$$

$$= \frac{[(-0,4e^{j\vartheta} + 0,72) \quad (0,5e^{j\vartheta} + 0,78)] \begin{bmatrix} 0,7 \\ 0,6 \end{bmatrix}}{e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24} + 1,3 =$$

$$= \frac{0,02e^{j\vartheta} + 0,972}{(e^{j\vartheta})^2 + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24} + 1,3 = \boxed{\frac{1,3e^{2j\vartheta} + 0,28e^{j\vartheta} + 0,66}{e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24}}$$

2 (b)

Kezdjük az FI jellel:

$$u(t) = -2,75t + 11\varepsilon(t) \cdot t - 16,5 \quad \text{ha} \quad -6 \leq t \leq 2 \quad \text{illetve} \quad u(t+8) = u(t)$$

A komplex Fourier-sor p . együtthatójának kiszámítása:

$$\overline{U}_p^C = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} u(t) e^{-j\omega_0 p t} dt$$

Ahol $T = 8$, illetve $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{4}$. Jelenleg egyszerűbb, ha az integrálási határt nem -4 -től 4 -ig, hanem -6 -tól 2 -ig válasszuk:

$$\overline{U}_p^C = \frac{1}{8} \int_{-6}^2 u(t) e^{-j\omega_0 p t} dt = \frac{1}{8} \int_{-6}^0 (-2,75t - 16,5) e^{-j\omega_0 p t} dt + \frac{1}{8} \int_0^2 (8,25t - 16,5) e^{-j\omega_0 p t} dt =$$

$$= \frac{1}{8} \int_{-6}^0 (-2,75t) e^{-j\omega_0 p t} dt + \frac{1}{8} \int_0^2 (8,25t) e^{-j\omega_0 p t} dt + \frac{1}{8} \int_{-6}^2 (-16,5) e^{-j\omega_0 p t} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-2,75}{8} \int_{-6}^0 t e^{-j\omega_0 p t} dt + \frac{8,25}{8} \int_0^2 t e^{-j\omega_0 p t} dt + \frac{1}{8} \left[\frac{(-16,5)e^{-j\omega_0 p t}}{-j\omega_0 p} \right]_{-6}^2 = \\
&= \frac{-2,75}{8} \left(\left[\frac{t e^{-j\omega_0 p t}}{-j\omega_0 p} \right]_{-6}^0 - \left[\frac{e^{-j\omega_0 p t}}{(j\omega_0 p)^2} \right]_{-6}^0 \right) + \frac{8,25}{8} \left(\left[\frac{t e^{-j\omega_0 p t}}{-j\omega_0 p} \right]_0^2 - \left[\frac{e^{-j\omega_0 p t}}{(j\omega_0 p)^2} \right]_0^2 \right) + \\
&\quad + \frac{1}{8} \left[\frac{(-16,5)e^{-j\omega_0 p t}}{-j\omega_0 p} \right]_{-6}^2 = \\
&= \frac{-2,75}{8} \left(\frac{(-6)e^{6j\omega_0 p}}{j\omega_0 p} - \frac{1 - e^{6j\omega_0 p}}{(j\omega_0 p)^2} \right) + \frac{8,25}{8} \left(\frac{2e^{-2j\omega_0 p}}{-j\omega_0 p} - \frac{e^{-2j\omega_0 p} - 1}{(j\omega_0 p)^2} \right) - \frac{16,5}{8} \cdot \frac{(e^{-2j\omega_0 p} - e^{6j\omega_0 p})}{-j\omega_0 p} = \\
&= \frac{-2,75}{8} \cdot \frac{(-6)j\omega_0 p \cdot e^{6j\omega_0 p} - 1 + e^{6j\omega_0 p}}{(j\omega_0 p)^2} + \frac{8,25}{8} \cdot \frac{-2j\omega_0 p \cdot e^{-2j\omega_0 p} - e^{-2j\omega_0 p} + 1}{(j\omega_0 p)^2} + \\
&\quad + \frac{16,5}{8} \cdot \frac{j\omega_0 p (e^{-2j\omega_0 p} - e^{6j\omega_0 p})}{(j\omega_0 p)^2} = \\
&= \frac{-2,75}{8} \cdot \frac{-1 + e^{6j\omega_0 p}}{(j\omega_0 p)^2} + \frac{8,25}{8} \cdot \frac{-e^{-2j\omega_0 p} + 1}{(j\omega_0 p)^2} = \\
&= \frac{2,75}{8} \cdot \frac{-1 + e^{6j\omega_0 p}}{(\omega_0 p)^2} + \frac{8,25}{8} \cdot \frac{e^{-2j\omega_0 p} - 1}{(\omega_0 p)^2} = \boxed{\frac{1}{8} \left(\frac{2,75e^{6j\omega_0 p} + 8,25e^{-2j\omega_0 p} - 11}{(\omega_0 p)^2} \right)}
\end{aligned}$$

Amire még szükségünk van az \overline{U}_0^C :

$$\overline{U}_0^C = \frac{1}{8} \int_{-6}^2 u(t) dt = \frac{1}{8} \int_{-6}^0 (-2,75t - 16,5) dt + \frac{1}{8} \int_0^2 (8,25t - 16,5) dt =$$

Ez pedig két háromszög (előjeles) területe, azaz:

$$= \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{6 \cdot (-16,5)}{2} + \frac{2 \cdot (-16,5)}{2} \right) = -8,25$$

Mérnöki valós alak:

$$u(t) = U_0 + \sum_{p=1}^{\infty} U_p \cos(p\omega t + \varrho_p)$$

ahol:

$$U_p = 2|\overline{U}_p^C|$$

$$U_0 = \overline{U}_0^C$$

$$\varrho_p = \arccos\{\overline{U}_p^C\}$$

Tehát:

$$u(t) = -8,25 + \sum_{p=1}^{\infty} 2|\overline{U}_p^C| \cos(p\omega t + \arccos\{\overline{U}_p^C\})$$

Az előzőekben kiszámolt \overline{U}_p^C -t $p = 1, 2, 3$ -ra kiszámolhatjuk és az alábbi táblázatba foglalhatjuk a kérdéses értékeket:

| p | \overline{U}_p^C | $2 \overline{U}_p^C $ | $\text{arc}\{\overline{U}_p^C\}$ |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | $-2, 2291 - 2, 2291j$ | 6, 3048 | $-\frac{3\pi}{4}$ |
| 2 | $-1, 1145$ | 2, 2291 | π |
| 3 | $-0, 2477 + 0, 2477j$ | 0, 7005 | $\frac{3\pi}{4}$ |

Tehát akkor a Fourier polinom, ami legalább 3 nem nulla felharmonikust tartalmaz:

$$u(t) \approx \boxed{-8, 25 + 6, 3048 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{3\pi}{4}\right) + 2, 2291 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right) + 0, 7005 \cos\left(\frac{3\pi}{4}t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

Most nézzük meg a DI jelet:

$$u[k] = 18 - 3, 6k \quad \text{ha } 0 \leq k \leq 5 \quad \text{illetve, } u[k+6] = u[k]$$

A komplex Fourier-sor p . együtthatója:

$$\overline{U}_p^C = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} u[k] \cdot e^{-jp\theta k}$$

Ahol $L = 6$, illetve $\theta = \frac{2\pi}{L} = \frac{\pi}{3}$, tehát:

$$\overline{U}_p^C = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 u[k] \cdot e^{-jp\theta k}$$

Mérnöki valós alak, ha L páros:

$$u[k] = U_0 + \sum_{p=1}^{\frac{L}{2}-1} 2|\overline{U}_p^C| \cos(p\theta k + \varrho_p) + |\overline{U}_{L/2}^C|(-1)^k$$

ahol $\varrho_p = \text{arc}\{\overline{U}_p^C\}$ Számoljuk ki a komplex Fourier-sor együtthatókat $p = 0, 1, 2, 3$ -ra:

$$\overline{U}_0^C = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 u[k] = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 (18 - 3, 6k) = 9$$

$$\begin{aligned} \overline{U}_1^C &= \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 u[k] e^{-j\theta k} = \frac{1}{6} (18 + 14, 4e^{-j\theta} + 10, 8e^{-2j\theta} + 7, 2e^{-3j\theta} + 3, 6e^{-4j\theta}) = \\ &= 3 + 2, 4e^{-j\frac{\pi}{3}} + 1, 8e^{-2j\frac{\pi}{3}} + 1, 2e^{-j\pi} + 0, 6e^{-4j\frac{\pi}{3}} = 1, 8 + 2, 4e^{-j\frac{\pi}{3}} + 1, 8e^{-2j\frac{\pi}{3}} + 0, 6e^{-4j\frac{\pi}{3}} = \boxed{3, 6e^{-j\frac{\pi}{3}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{U}_2^C &= \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 u[k] e^{-2j\theta k} = \frac{1}{6} (18 + 14, 4e^{-2j\theta} + 10, 8e^{-4j\theta} + 7, 2e^{-6j\theta} + 3, 6e^{-8j\theta}) = \\ &= 3 + 2, 4e^{-2j\frac{\pi}{3}} + 1, 8e^{-4j\frac{\pi}{3}} + 1, 2e^{-2j\pi} + 0, 6e^{-8j\frac{\pi}{3}} = 4, 2 + 2, 4e^{-2j\frac{\pi}{3}} + 1, 8e^{-4j\frac{\pi}{3}} + 0, 6e^{-8j\frac{\pi}{3}} = \boxed{\frac{3, 6}{\sqrt{3}} e^{-j\frac{\pi}{6}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{U}_3^C &= \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 u[k] e^{-3j\theta k} = \frac{1}{6} (18 + 14, 4e^{-3j\theta} + 10, 8e^{-6j\theta} + 7, 2e^{-9j\theta} + 3, 6e^{-12j\theta}) = \\ &= 3 + 2, 4e^{-j\pi} + 1, 8e^{-2j\pi} + 1, 2e^{-3j\pi} + 0, 6e^{-4j\pi} = 3 - 2, 4 + 1, 8 - 1, 2 + 0, 6 = \boxed{1, 8} \end{aligned}$$

Helyettesítsünk be a mérnöki valós alakba:

$$\begin{aligned}
 u[k] &= U_0 + \sum_{p=1}^{\frac{L}{2}-1} |\overline{U}_p^C| \cos(p\theta k + \varrho_p) = \\
 &= 9 + |2\overline{U}_1^C| \cos(\theta k + \varrho_1) + |2\overline{U}_2^C| \cos(2\theta k + \varrho_2) = \\
 &= \boxed{9 + 7,2 \cos\left(\frac{\pi}{3}k - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{7,2}{\sqrt{3}} \cos\left(\frac{2\pi}{3}k - \frac{\pi}{6}\right) + 1,8(-1)^k}
 \end{aligned}$$

2 (c)

Kezdjük az FI rendszerrel:

Használjuk a komplex számítási módot! Legyenek a polinom tagjainak megfelelő komplex számok $\overline{U}_0, \overline{U}_1, \overline{U}_2$ és \overline{U}_3 a következő módon:

$$\overline{U}_0 = -8,25$$

$$\overline{U}_1 = 6,3048 \cdot e^{-j\frac{3\pi}{4}}$$

$$\overline{U}_2 = 2,2291 \cdot e^{j\pi}$$

$$\overline{U}_3 = 0,7005 \cdot e^{j\frac{3\pi}{4}}$$

Felhasználva, hogy:

$$H(j\omega) = \frac{0,45(j\omega)^2 + 1,26j\omega - 0,646}{(j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44}$$

A rendszernek a gerjesztés egyes komponenseire adott válaszainak megfelelő komplex számok:

$$\overline{Y}_0 = H(0) \cdot \overline{U}_0 = \frac{-0,646}{2,44} \cdot (-8,25) = 2,1842$$

$$\overline{Y}_1 = H\left(j\frac{\pi}{4}\right) \cdot \overline{U}_1 = (0,5162e^{1,5196j})(6,3048 \cdot e^{-j\frac{3\pi}{4}}) = 3,2544 \cdot e^{-0,8365j}$$

$$\overline{Y}_2 = H\left(j\frac{\pi}{2}\right) \cdot \overline{U}_2 = (0,7019e^{0,7185j})(2,2291 \cdot e^{j\pi}) = 1,5646 \cdot e^{-2,4231j}$$

$$\overline{Y}_3 = H\left(j\frac{3\pi}{4}\right) \cdot \overline{U}_3 = (0,67e^{0,3110j})(0,7005 \cdot e^{j\frac{3\pi}{4}}) = 0,4693 \cdot e^{2,6672j}$$

Ebből felírhatóak a gerjesztés egyes komponenseire adott válaszok:

$$y_0(t) = 2,1842$$

$$y_1(t) = 3,2544 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - 0,8365\right)$$

$$y_2(t) = 1,5646 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - 2,4231\right)$$

$$y_3(t) = 0,4693 \cos\left(\frac{3\pi}{4}t + 2,6672\right)$$

Így a rendszer válasza a megadott gerjesztésre:

$$y(t) \approx \boxed{2,1842 + 3,2544 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - 0,8365\right) +}$$

$$+1,5646 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - 2,4231\right) + 0,4693 \cos\left(\frac{3\pi}{4}t + 2,6672\right)$$

Nézzük a DI rendszert:

Hasonlóan az előzőnél, írjuk fel $\overline{U}_0, \overline{U}_1, \overline{U}_2$ és \overline{U}_3 -mat:

$$\overline{U}_0 = 9$$

$$\overline{U}_1 = 7,2 \cdot e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

$$\overline{U}_2 = \frac{7,2}{\sqrt{3}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}}$$

$$\overline{U}_3 = 1,8$$

Felhasználva, hogy:

$$H(e^{j\vartheta}) = \frac{1,3e^{2j\vartheta} + 0,28e^{j\vartheta} + 0,66}{e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24}$$

A rendszernek a gerjesztés egyes komponenseire adott válaszainak megfelelő komplex számok:

$$\overline{Y}_0 = H(e^{0j}) \cdot \overline{U}_0 = \frac{7}{3} \cdot 9 = 21$$

$$\overline{Y}_1 = H(e^{j\frac{\pi}{3}}) \cdot \overline{U}_1 = (1,1278e^{-0,6612j})(7,2 \cdot e^{-j\frac{\pi}{3}}) = 8,1202 \cdot e^{-1,7084j}$$

$$\overline{Y}_2 = H(e^{j\frac{2\pi}{3}}) \cdot \overline{U}_2 = (0,82e^{0,7350j}) \left(\frac{7,2}{\sqrt{3}} \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}} \right) = 3,4087 \cdot e^{0,2114j}$$

$$\overline{Y}_3 = H(je^{\pi}) \cdot \overline{U}_3 = (3)(1,8) = 5,4$$

A gerjesztés egyes komponenseire adott válaszok:

$$y_0[k] = 21$$

$$y_1[k] = 8,1202 \cos\left(\frac{\pi}{3}k - 1,7084\right)$$

$$y_2[k] = 3,4087 \cos\left(\frac{2\pi}{3}k + 0,2114\right)$$

$$y_3[k] = 5,4 \cdot (-1)^k$$

Így a rendszer válasza a megadott gerjesztésre:

$$y[k] = 21 + 8,1202 \cos\left(\frac{\pi}{3}k - 1,7084\right) + 3,4087 \cos\left(\frac{2\pi}{3}k + 0,2114\right) + 5,4 \cdot (-1)^k$$

2 (d)

Kezdjük az FI rendszerrel:

$$U(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

$$u(t) = \begin{cases} -16,5 - 2,75t & \text{ha } -6 \leq x \leq 0 \\ -16,5 + 8,25t & \text{ha } 0 < x \leq 2 \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$$

Így az integrál egyszerűsödik:

$$U(j\omega) = \int_{-6}^0 (-16,5 - 2,75t) \cdot e^{-j\omega t} dt + \int_0^2 (-16,5 + 8,25t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Ehhez nézzük meg a következő integrált:

$$\int t \cdot e^{-j\omega t} dt = t \cdot \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} - \int \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} dt = t \cdot \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} - \frac{e^{-j\omega t}}{-\omega^2} = \frac{e^{-j\omega t}}{\omega} \left(jt + \frac{1}{\omega} \right)$$

Akkor nézzük:

$$\begin{aligned} U(j\omega) &= \int_{-6}^0 (-16,5 - 2,75t) \cdot e^{-j\omega t} dt + \int_0^2 (-16,5 + 8,25t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \\ &= \left[-16,5 \cdot \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right]_{-6}^0 - 2,75 \left[\frac{e^{-j\omega t}}{\omega} \left(jt + \frac{1}{\omega} \right) \right]_{-6}^0 + \left[-16,5 \cdot \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right]_0^2 + 8,25 \left[\frac{e^{-j\omega t}}{\omega} \left(jt + \frac{1}{\omega} \right) \right]_0^2 = \\ &= \left(16,5 \cdot \frac{1}{j\omega} - 16,5 \cdot \frac{e^{6j\omega}}{j\omega} \right) - 2,75 \left(\frac{1}{\omega^2} - \frac{e^{6j\omega}}{\omega} \left(-6j + \frac{1}{\omega} \right) \right) + \left(16,5 \cdot \frac{e^{-2j\omega}}{j\omega} - 16,5 \cdot \frac{1}{j\omega} \right) + \\ &\quad + 8,25 \left(\frac{e^{-2j\omega}}{\omega} \left(2j + \frac{1}{\omega} \right) - \frac{1}{\omega^2} \right) = \\ &= -2,75 \left(\frac{1 - e^{6j\omega}}{\omega^2} \right) + 8,25 \left(\frac{e^{-2j\omega} - 1}{\omega^2} \right) = \boxed{\frac{2,75 \cdot e^{6j\omega} + 8,25 \cdot e^{-2j\omega} - 11}{\omega^2}} \end{aligned}$$

A spektrum a következőképpen számolható:

$$|Y(j\omega)| = |U(j\omega) \cdot H(j\omega)|$$


Mivel

$$H(j\omega) = \frac{0,45(j\omega)^2 + 1,26j\omega - 0,646}{(j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44}$$

Ezért:

$$|Y(j\omega)| = \left| \frac{2,75 \cdot e^{6j\omega} + 8,25 \cdot e^{-2j\omega} - 11}{\omega^2} \cdot \frac{0,45(j\omega)^2 + 1,26j\omega - 0,646}{(j\omega)^2 + 2,4j\omega + 2,44} \right|$$

Ábrázolva $\omega \in [0, 5]$ intervallumon:



Folytassuk a DI rendszerrel:

$$U(e^{j\vartheta}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] \cdot e^{-j\vartheta k}$$

$$u[k] = \begin{cases} 18 - 3,6k & \text{ha } 0 \leq k \leq 5 \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$$

Így a szumma leegyszerűsödik:

$$U(e^{j\vartheta}) = \sum_{k=0}^5 (18 - 3,6k) \cdot e^{-j\vartheta k} =$$

$$= 18 + 14,4 \cdot e^{-j\vartheta} + 10,8 \cdot e^{-2j\vartheta} + 7,2 \cdot e^{-3j\vartheta} + 3,6 \cdot e^{-4j\vartheta}$$

A spektrum a következőképpen számolható:

$$|Y(e^{j\vartheta})| = |U(e^{j\vartheta}) \cdot H(e^{j\vartheta})|$$

Mivel


$$H(e^{j\vartheta}) = \frac{1,3e^{2j\vartheta} + 0,28e^{j\vartheta} + 0,66}{e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24}$$

Ezért:

$$|Y(e^{j\vartheta})| = \left| (18 + 14,4 \cdot e^{-j\vartheta} + 10,8 \cdot e^{-2j\vartheta} + 7,2 \cdot e^{-3j\vartheta} + 3,6 \cdot e^{-4j\vartheta}) \cdot \frac{1,3e^{2j\vartheta} + 0,28e^{j\vartheta} + 0,66}{e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24} \right| =$$


$$= \left| \frac{29,952 + 21,888 \cdot e^{-j\vartheta} + 23,76 \cdot e^{j\vartheta} + 13,824 \cdot e^{-2j\vartheta} + 23,4 \cdot e^{2j\vartheta} + 5,76 \cdot e^{-3j\vartheta} + 2,376e^{-4j\vartheta}}{e^{2j\vartheta} + 0,2e^{j\vartheta} - 0,24} \right|$$

Ábrázolva $\vartheta \in [0, \pi]$ intervallumon:



2 (e)

Ábrázoljuk a spektrumot, és megkeressük a maximum helyet:



Ez 18,6-nál van, így a kérdéses sávszélesség: 2,68.