

Több, nem szomszédos csúcsmagasságot tartalmazó árvizek

Egy folyón N helyen mérik a vízállást, amit egy referenciamagassághoz képest centiméterben adnak meg. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget kell elrendelni, ha a magasság meghaladja a 800 centimétert, másodfokút, ha meghaladja a 900 centimétert és harmadfokút, ha meghaladja a 10 métert. Folyószakasznak nevezzük a leghosszabb egymás mellett levő egyforma tulajdonságú mérésekből álló sorozatokat. Árvíznek nevezzük azt a szakaszt, ahol minden hely legalább elsőfokú készültségű.

Készíts programot, amely meghatározza azokat az árvizeket, amelyeken több, egymással nem szomszédos csúcsmagasság is volt!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a mérési pontok száma szerepel ($1 \leq N \leq 10\,000$), a következő N sor mindegyike egy mérési eredményt tartalmaz ($0 \leq A_i \leq 3\,000$).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába az árvizek K darabszámát kell írni (0, ha nincs ilyen hely, ebben az esetben nincsenek további sorok)! A második sorba ennek a K árvíznek a kezdete és vége, a harmadik sorba pedig ezen K árvíz csúcsmagasságának helye és értéke kerüljön! A negyedik sorba azoknak az árvizeknek az M darabszámát kell írni (0, ha nincs ilyen hely, ebben az esetben nincsenek további sorok), amelyeken több, egymással nem szomszédos csúcsmagasság is volt és végül az ötödik sorba ennek az M árvíznek a kezdete és vége kerüljön!


Példa

Bemenet

7
1100
950
700
850
1200
801
1200

Kimenet

2
1 2 4 7
1 1100 5 1200
1
4 7



Korlátok

Időlimit: 0,1 mp.

Memórialimit: 32 MB