情報数学 II - 第3章レポート-

1111 meswanko

(協力者:)

-2017年7月10日-

1

2

$$(42899634253)_{12} = 4 \times 12^{10} + 2 \times 12^{9} + 8 \times 12^{8}$$
$$+ 9 \times 12^{7} + 9 \times 12^{6} + 6 \times 12^{5} + 3 \times 12^{4}$$
$$+ 4 \times 12^{3} + 2 \times 12^{2} + 5 \times 12^{1} + 3$$

また, $12^k \equiv 1 (mod11)$ より

$$(42899634253)_{12} \equiv 4 + 2 + 8 + 9 + 9 + 6$$
$$+ 3 + 4 + 2 + 5 + 3 \pmod{11}$$
$$\equiv 55$$
$$\equiv 0 \pmod{11}$$

より, $(42899634253)_{12}$ は $(11)_{10}$ で割り切れる.

$$(3A6F2B1)_{16} = (3 \times 16^6 + 10 \times 16^5 + 6 \times 16^4 + 15 \times 16^3 + 2 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 1)_{10}$$

また,
$$(16)_{10}^k \equiv 1 (mod15)$$
 より

$$(3A6F2B1)_{16} \equiv (3+10+6+15+2+11+1)_{10}$$

$$\equiv (48)_{10}$$

$$\equiv (3)_{10} (mod \ 15)$$

$$\equiv (3)_{16} (mod \ F)$$

1

2

 $\{59, 162, -353, 107, 77, -50, 116\}$ &U,

$$59 \equiv 3 (mod \ 7)$$

$$162 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$-353 \equiv 4 \pmod{7}$$

$$107 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$77 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$-50 \equiv 6 \pmod{7}$$

$$116 \equiv 4 (mod \ 7)$$

より、7を法とする完全代表系とはならない。

3

 $\{-141, 65, 103, 70, -6, 199, 32\}$ より,

$$-141 \equiv 6 (mod \ 7)$$

$$65 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$103 \equiv 5 \pmod{7}$$

$$70 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$-6 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$199 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$32 \equiv 4 \pmod{7}$$

より、7を法とする完全代表系とはなる.

4

1

2

3

4

5

6

7

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{2} \\ x \equiv c_2 \pmod{3} \\ x \equiv c_3 \pmod{5} \\ x \equiv c_4 \pmod{7} \end{cases}$$

より, 第1式を満たす整数は,

$$x = c_1 + 2r(A)$$

の形である. これが第2式を満たすようにrを定める.

(A) を第 2 式に代入すると、

$$c_1 + 2r \equiv c_2 \pmod{3}$$

であるから、そのためには $d_1 \equiv c_1 - c_2 (mod \ 3)$ として r を

$$2r \equiv d_1 \ (B)$$

を満たすようにとればよい. (2,3)=1 より, (B) の解は 3 を法としてただ 1 つ存在する. それを $r=r_1 (mod\ 3)$ とすると, (B) を満たす整数は,

$$r = r_1 + 3s$$

の形である. したがってこれを (A) に代入し, $x_2 = c_1 + 2r_1$ とおくと,

$$x = x_2 + 2 \times 3 \times s = x_2 + 6s$$

が第1式,第2式をともに満たす整数となる.

次にこれが第 3 式を満たすように s を定める. そして上と同様にして 第 1 式から 第 3 式までを満たす整数が、

$$x = x_3 + 2 \times 3 \times 5 \times t = x_3 + 30t$$

の形でえられる. $(x_3 = x_2 + 6s_1)$

さらにこれが第 4 式を満たすように t を定める. そして上と同様にして 第 1 式から第 4 式までを満たす整数が、

$$x = x_4 + 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times u = x_4 + 210u$$

の形でえられる. $(x_4 = x_3 + 30t_1)$ したがって、求める解は、

$$x \equiv x_4 \pmod{210}$$

$$\equiv x_3 + 30t_1 \pmod{210}$$

$$\equiv x_2 + 6s_1 + 30t_1 \pmod{210}$$

$$\equiv c_1 + 2r_1 + 6s_1 + 30t_1 \pmod{210}$$

8

9

10

1

(i)

$$3^{47} \equiv (3^3)^{15} \times 3^2$$

 $\equiv 4^{15} \times 3^2 \ (\because 3^3 \equiv 27 \equiv 4 \pmod{23})$ より)
 $\equiv (4^3)^5 \times 3^2$
 $\equiv 18^5 \times 3^2 \ (\because 4^3 \equiv 64 \equiv 18 \pmod{23})$ より)
 $\equiv (-5)^5 \times 3^2 \ (\because 18 \equiv -5 \pmod{23})$ より)
 $\equiv \{(-5)^2\}^2 \times (-5) \times 3^2$
 $\equiv 2^2 \times (-5) \times 3^2 \ (\because (-5)^2 \equiv 25 \equiv 2 \pmod{23})$ より)
 $\equiv -19$
 $\equiv 4 \pmod{23}$

(ii)

$$7^{1000} \equiv (7^2)^{500}$$

$$\equiv 1^{500} \; (\because 7^2 \equiv 49 \equiv 1 (mod \; 24) \;$$
\$\tag{1} \text{mod } 24)

2

3 いずれも Mathematica で素因数分解の計算を行った

(i)
$$n = 127281 = 3 \times 7 \times 11 \times 19 \times 29$$
 より,

$$\varphi(n) = 127281 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \left(1 - \frac{1}{11}\right) \left(1 - \frac{1}{19}\right) \left(1 - \frac{1}{29}\right)$$

$$= 60480$$

また,

$$\mu(n) = (-1)^5 = -1$$

(ii) $n = 18538 = 2 \times 13 \times 23 \times 31$ より、

$$\varphi(n) = 18538 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{13}\right) \left(1 - \frac{1}{23}\right) \left(1 - \frac{1}{31}\right)$$
= 7920

また,

$$\mu(n) = (-1)^4 = 1$$

(iii) $n = 200655 = 3^2 \times 5 \times 7^3 \times 13$ より、

$$\varphi(n) = 200655 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \left(1 - \frac{1}{13}\right)$$
= 84672

また,

$$\mu(n) = 0$$

RSA

FGLM

定理証明