

# TheGI4 HA2

David Konopek(349333)  
, Paul Walger(349968)  
, Lukas Klammt(332263)

10. Juni 2014

## Aufgabe 2

z.Z.: Wenn  $(X, R)$  ein Verband ist mit  $X$  endlich, dann ist  $(X, R)$  auch ein vollständiger Verband.

Beweis:

Sei  $(X, R)$  ein beliebiger Verband mit  $X$  endlich.

Daraus folgt dass für beliebige  $d_1, d_2 \in X$  auch  $\sqcap\{d_1, d_2\}$  existiert. Beweis mittels vollständiger Induktion.

Sei  $A_i$  eine beliebige Menge mit  $A_i \subseteq X$  und  $\#(A_i) = i$

Beweis der Existenz von  $\sqcap$

Induktionsanfang:  $A_2 = \{d_1, d_2\}$ . Nach Voraussetzung existiert  $\sqcap\{d_1, d_2\}$ .

Induktionsvoraussetzung(IV):  $\sqcap A_i$  existiert.

Induktionsschritt:  $\sqcap A_{i+1}$

$\sqcap A_{i+1} = \sqcap(A_i \cup \{d\})$  für ein  $d \in A_{i+1}$

Falls  $\sqcap A_i \subseteq d$  dann ist  $\sqcap A_{i+1} = \sqcap A_i$  (1)

Falls  $d \subseteq \sqcap A_i$  dann ist  $\sqcap A_{i+1} = d$  (2)

Aus (1) und (2) und (IV) folgt dass  $\sqcap A_{i+1}$  existiert (3)

Beweis der Existenz von  $\sqcup$

Induktionsanfang:  $A_2 = \{d_1, d_2\}$ . Nach Voraussetzung existiert  $\sqcup\{d_1, d_2\}$ .

Induktionsvoraussetzung(IV):  $\sqcup A_i$  existiert.

Induktionsschritt:  $\sqcup A_{i+1}$

$\sqcup A_{i+1} = \sqcup(A_i \cup \{d\})$  für ein  $d \in A_{i+1}$

Falls  $\sqcup A_i \subseteq d$  dann ist  $\sqcup A_{i+1} = d$  (4)

Falls  $d \subseteq \sqcup A_i$  dann ist  $\sqcup A_{i+1} = \sqcup A_i$  (5)

Aus (4) und (5) und (IV) folgt dass  $\sqcup A_{i+1}$  existiert (6)

Aus (3) und (6) folgt dass für jede  $A \subseteq X$  sowohl  $\sqcup A$  als auch  $\sqcap A$  existieren,  $\sqcup A_1$  und  $\sqcup A_0$  und  $\sqcap A_1$  und  $\sqcap A_0$  trivialerweise existieren. Daraus folgt dass  $(X, R)$  nach Definition 4.3 ein vollständiger Verband ist. ■