

Sera gazı artışı ve onun dünyaya olan etkileri

METİN HACIYEV*

1 Giriş

İnsan faaliyetlerinden oluşan sera gazı etkilerinin; doğaya verdiği tahribatını, insan ve canlıların yaşamındaki olumsuz etkilerini belirtmek amacıyla bu makale hazırlanmıştır. Konu, çok önemli ve dünya gündeminde olması için hazırlanmıştır. Sera gazının artışı ve etkilerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir makaledir.

1.1 Çalışmanın Amacı

Dünya üzerinde devam eden iklim değişim süreçleri, son yıllarda birçok araştırmaya konu olmuş ve değişen iklim beraberinde birçok bilimsel ve politik tartışmalara zemin hazırlamıştır. Sera gazlarının dünya üzerinde olan negatif etkileri göz önünde bulundurulmuştur.

1.2 Literatür

Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşur. Ayrıca küçük miktarlarda asal gazlar da bulunur. Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları, kısa dalgalı ışınlar) atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olur. (CO₂ havada en çok ısı tutma özelliği olan gazdır.) Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine sera etkisi denir. Atmosfer cam seralara benzer bir özellik gösterir. Son yıllarda atmosferdeki CO₂ miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır. Metan, ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sera gazları çeşitli insan aktiviteleri ile atmosfere katılmaktadır. Bu gazların tamamının ısı tutma özelliği vardır. CO₂ ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişimlerine yol açmasından endişe edilmektedir. Küresel ısınma, dünyadaki yaşamın sürdürüldüğü ekosistemlerin bütüncül yapısını tehdit eden, binlerce bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına neden olan , insan yaşamını etkileyen, aşırı

*20080699, [Github Repo](#)

sıcaklık, yangın, susuzluk, kuraklaşma gibi diğer meteorolojik afetlerin artmasına sebep olan bir oluşumdur. (Özmen, 2009)

Yukarıda ayrıntılı şekilde bahsedildiği gibi; Atmosferde, ozonun (O₃) yoğunluğunu azaltan kloroflorokarbon (CFC) gazları ve karbondioksit (CO₂), metan (CH₄), diazot monoksit (N₂O) gibi sera gazlarının miktarlarında önemli ölçüde artışlar olmuştur. Bu artışlardan dolayı atmosferde kuvvetlenen sera işlemi beraberinde günümüzdeki küresel ısınma ve küresel iklim değişimi problemini ortaya çıkarmıştır. Böylece, yeryüzünde 19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar olan süre içinde küresel ortalama hava sıcaklığı 0.3 - 0.6 C₀ artmıştır. Araştırmalara göre gelecek 40 yıl içindeki her 10 yılda 0.1 C₀ den daha fazla miktarda küresel ısınmanın devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu ısınmanın olası etkileri:

Ortalama sıcaklık değerindeki artış; buna bağlı olarak yağışların azalması, kuraklığın ve çölleşmeye varan sürecin işlemesine neden olması

Yer üstü ve yer altı sularının değişimi, toprağın yapısının bozulması.

Büyük okyanus akıntılarının karakteristiğinde meydana gelecek değişimler.

Sıcak hava dalgalarından birçok canlı ve bitki türlerinin yaşamsal süreçlerinin etkilenmesi ve yok olması, çok sayıda ölümlerin olması.

Küresel ısınmaya dayalı olarak Kuzey Yarım Küre'deki bitki türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için yılda 1 km. kuzeye doğru yayılmalarının gerektiği çeşitli modelleme çalışmalarına dayalı olarak hesaplanmıştır. Ancak bitki türlerinin bu hızlı yayılışa uyum sağlayabilmesi, sorun olarak tartışılmaktadır.

Dünya ekonomisini ve sosyoekonomik yapısını olumsuz etkilemesi ve küresel ekonomik kayıpların oluşması.(Özmen, 2009)

Hızla artan dünya nüfusu ve kontrolsüz sanayileşme süreci, sağlıksız kentleşme, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, bilinçsiz gübreleme ve deterjanlar gibi kimyasal maddeler giderek çevreyi kirletmeye başlamış, bunun sonucu olarak büyük oranda kirlenen hava, su ve toprak, canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulaşmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıtların kullanımının giderek artması ve ormanların hızla yok edilmesi bu olumsuz etkileri neredeyse önüne geçilemeyecek halde ciddi boyutlara taşımıştır. Dünyanın mevcut enerji kaynaklarının yaklaşık %85'ini fosil yakıtlarının (petrol, kömür, doğal gaz vb) oluşturduğu düşünüldüğünde, küresel ısınmanın tek nedeninin, başta fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit olmak üzere atmosferdeki sera gazlarının, büyük ölçüde endüstriyel (enerji ve ulaşım dahil olmak üzere) ve bir ölçüde de tarımsal insan etkinliklerinden kaynaklanan artış olduğu söylenebilir. Küresel ısınma son yıllarda dünya gündemini meşgul eden uzun tartışmalara sebep olan bilimsel ve politik bir mesele haline gelmiştir. Küresel ısınmayı, atmosferde sera gazlarının (CO₂, CH₄, N₂O vb.) konsantrasyonlarının artmasıyla bu moleküllerin güneş ışınlarını hapsederek yeryüzü sıcaklığını yükseltmesi olarak tanımlanabilir. Güneşten, gezegenimizin yüzeyine ulaşan kısa dalgalı radyasyon, ışıktan ısıya dönüşmek suretiyle dünyayı ısıtır. Yeryüzü, bu radyasyonun bir kısmını uzun dalgalı kızılötesi ışın olarak uzaya geri yansıtır. Bu uzun dalgalı kızılötesi ışınların büyük bölümü uzaya geri dönerken, bir bölümü dünya atmosferinde su buharı, karbondioksit ve metan gibi sera etkisi yaratan gaz molekülleri tarafından soğurulur ve atmosferde hapsolür, böylece

dünyanın yüzeyi ve atmosfer, olması gerekenden daha sıcak bir hal alır. Moleküller cam görevi yapar ve ısınan hava dünya atmosferi içerisinde kalır. Bu olay, güneş ışınlarıyla ısınan ama içinde ısıyı dışarıya bırakmayan seralara benzetildiğinden dolayı doğal sera etkisi olarak bilinir. Sera etkisi, dünya sıcaklığının dengede kalması açısından son derece önemli bir mekanizma olmasına karşın son yıllarda yapılan yanlış uygulamalar sonucunda sanayileşme ve fosil yakıtlarının kullanımından dolayı bu gazların oranında artışlar olmuş ve bu nedenle sera etkisi iklim değişikliği ile birlikte olumsuz bir şekilde anılır olmuştur. Atmosferde sera etkisi olmasaydı dünya ortalama sıcaklığı 255 K veya -18 °C olacak ve belki de dünya üzerinde yaşam mümkün olmayacaktı. Atmosferde meydana gelen bu mekanizma nedeniyle uzun dalga boylu yansımanın bir kısmı tutulmakta ve dünya ortalama sıcaklığı +15 °C düzeyinde olmaktadır.(Korkmaz, 2007)

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde toprağın tarımsal üretkenliğinin azalması tarım, mera, orman vb alanların amacı dışında kullanılarak sürdürülebilirliğin ve verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla devam eden bozunma süreci toprak kalitesini de azaltmaktadır. Tarımsal faaliyetler, dünya üzerinde artan sera gazlarının yaklaşık %20'sinden sorumludur (Pathak ve Wassmann, 2007). Tarımsal faaliyetler sonucu (enerji tüketimi, üretim, hayvan yetiştirme, gübreleme, ilaç vb) sera gazlarından artmasından özellikle CO₂, CH₄ ve N₂O sorumlu tutulmaktadır (Houghton, 2003). Tarımsal uygulamalar ve üretimin, küresel ısınmaya olan olumsuz etkileri yanı sıra artan dünya nüfusunun sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmesi açısından tarım son derece önemlidir. Yanlış arazi kullanımı ve bilinçsiz ve aşırı gübreleme gibi tarımsal faaliyetler sonucunda karbon kaynağı olan topraklardan sera gazı salınımları artmaktadır (Lal, 2006). Tarımsal uygulamaların küresel ısınmaya etkilerini azaltmak için organik karbon ve toprak kalitesi arasında da mevcut olan ilişkiden faydalanılması yarar sağlayacaktır. Bozulan ekosistem ve tarımsal topraktaki organik karbon da çözünerek CO₂ ve CH₄ formunda atmosfere salınmakta ve iklim değişikliği nedenleri arasında yer almaktadır. Metan gazı CO₂ hariç tutulduğunda küresel ısınmadan en fazla sorumlu olan sera gazı haline gelmekte ve CO₂ gazına göre sera etkisi oluşturmada 21 kat daha etkili olmaktadır. Metan gazını kaynağı ise hayvan yetiştiriciliği ve çeltik tarımıdır. Artan atmosfer sıcaklığı ve sera gazları konsantrasyonu düşük yağış ile birleştiğinde bitkilerin solunumlarını ve stomal fonksiyonlarını hem de toprakların organik karbon içeriğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle toprakların doğru ve verimli kullanılarak, organik karbon oluşumunun ve tutulmasının arttırılmasının, küresel ısınma, açlık, erozyon, çölleşme, ormansızlaşma ve tarım alanı kaybı gibi sorunların çözümü için yarar sağlayabilir.

Yapılan çalışmada, toplam sera gazı üretiminin %32 endüstriyel proseslerin, %30'unu enerji sektörünün, %16'sını ulaştırmanın, %16'sını diğer sektörlerin ve %6'sını da tarım sektörünün oluşturduğunu belirtmişlerdir. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nin araştırmaları, biyolojik çeşitlilik zenginliği nedeniyle Türkiye'ye özel önem verilmesini ve iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerinin özenle araştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin su kıtlığı, kuraklık ve toprak erozyonu sorunları ile karşı karşıya olması da, Türkiye'yi küresel ısınmanın zararlı ve şiddetli etkilerini en önce yaşayacak ülkeler arasına sokmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye'nin yaşayacağı en önemli felaket kuraklıktır. (Korkmaz, 2007)

The impact of development of land for agriculture and agricultural production practices on

emissions of greenhouse gases is reviewed and evaluated within the context of anthropogenic radiative forcing of climate. Combined, these activities are estimated to contribute about 25%, 65%, and 90% of total anthropogenic emissions of CO₂, CH₄, and N₂O, respectively. Agriculture is also a significant contributor to global emissions of NH₃, CO, and NO. Over the last 150 y, cumulative emissions of CO₂ associated with land clearing for agriculture are comparable to those from combustion of fossil fuel, but the latter is the major source of CO₂ at present and is projected to become more dominant in the future. Ruminant animals, rice paddies, and biomass burning are principal agricultural sources of CH₄, and oxidation of CH₄ by aerobic soils has been reduced by perturbations to natural N cycles. Agricultural sources of N₂O have probably been substantially underestimated due to incomplete analysis of increased N flows in the environment, especially via NH₃ volatilization from animal manures, leaching of NO₃⁻, and increased use of biological N fixation.

The contribution of agriculture to radiative forcing of climate is analyzed using data from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)(base case) and cases where the global warming potential of CH₄, and agricultural emissions of N₂O are doubled. With these scenarios, agriculture, including land clearing, is estimated to contribute between 28–33% of the radiative forcing created over the next 100yr by 1990 anthropogenic emissions of CO₂, CH₄, and N₂O. Analyses of the sources of agriculturally generated radiative climate forcing show that 80% is associated with tropical agriculture and that two-thirds comes from non-soil sources of greenhouse gases. The importance of agriculture to radiative forcing created by different countries varies widely and is illustrated by comparisons between the USA, India, and Brazil. Some caveats to these analyses include inadequate evaluations of the net greenhouse effects of agroecosystems, uncertainties in global fluxes of greenhouse gases, and incomplete understanding of tropospheric chemical processes. The contribution of agriculture to radiative forcing of climate is analyzed using data from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)(base case) and cases where the global warming potential of CH₄, and agricultural emissions of N₂O are doubled. With these scenarios, agriculture, including land clearing, is estimated to contribute between 28–33% of the radiative forcing created over the next 100yr by 1990 anthropogenic emissions of CO₂, CH₄, and N₂O. Analyses of the sources of agriculturally generated radiative climate forcing show that 80% is associated with tropical agriculture and that two-thirds comes from non-soil sources of greenhouse gases.(Duxbury, 1994)

Global GHG emissions continued to rise between 2010 and 2018, although the rate of emissions growth has slowed since 2014. GHG emissions were the highest in human history in 2018, reaching 58 GtCO₂eq. The largest share of emissions in 2018 came from the energy systems sector, followed by industry, AFOLU, transport and the operation of buildings. These estimates are based on direct emissions produced in each sector. As we discuss below, the industry and buildings sectors further contributed to emission growth indirectly, by drawing on electricity and heat production in the energy systems sector. GHG emissions in 2018 were about 11% higher than GHG emission levels in 2010. One third of this increase in GHG emissions between 2010 and 2018 was from energy systems, followed by industry, transport, AFOLU and buildings. In terms of regions, East Asia and North America together accounted for 40% of global GHG emissions in 2018, within which emissions are dominated by China and the United States. The highest absolute increase between 2010 and 2018 was in

Eastern Asia, more than double the growth of the next highest region, Southern Asia. Four regions—the Middle East, Africa, Eurasia and South-East Asia—accounted for the rest of the global emissions increase with approximately 0.5 GtCO₂eq each. The most rapid relative growth in emissions since 2010 occurred in Southern Asia at 3.6% per year, followed by the Middle East, Eastern Asia and Eurasia. The only region with a decline in emissions since 2010 has been Europe. North America, Latin America, and developed countries in the Asia Pacific saw only minimal growth over this period. (Lamb *et al.*, 2021)

2 Kaynakça

- Duxbury, J. M. (1994). The significance of agricultural sources of greenhouse gases. *Fertilizer research*, 38, 151-163.
- Korkmaz, K. (2007). Küresel Isınma ve Tarımsal Uygulamalara Etkisi. *Alatırım dergisi*, 6(2), 43-49.
- Lamb, W. F., Wiedmann, T., Pongratz, J., Andrew, R., Crippa, M., Olivier, J. G., vd.others. (2021). A review of trends and drivers of greenhouse gas emissions by sector from 1990 to 2018. *Environmental research letters*, 16(7), 073005.
- Özmen, M. T. (2009). Sera Gazı-Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü. *İMO Dergisi*, 453(1), 42-46.