

5 Ahorn (Acer)



Der berühmte Fächerahorn im Japanischen Garten von Portland: sichtbarer Stamm, fließende Etagen, liches Dach — das Vorbild für unseren Ahorn.

Steckbrief

- Natürliche Höhe: je nach Art **10–30 m** (Spitzahorn/Bergahorn) bzw. ~5–10 m (Feldahorn).
Welche Art im Garten steht, lohnt sich zu bestimmen — Feldahorn lässt sich deutlich leichter klein halten.
- Wuchs: gegenständige Knospen (immer paarweise!), feine, dichte Verzweigung.
- Schnittverträglichkeit: **gut, aber mit zwei Eigenheiten**: Saftdruck im Spätwinter und empfindliche Rinde.

Der Ahorn ist der Japan-Baum schlechthin

Der Fächerahorn (*Acer palmatum*, **Momiji**) ist neben der Kiefer der wichtigste Gestaltungsbaum japanischer Gärten. Alle Niwaki-Techniken aus [Kapitel 02](#) wurden für den Ahorn entwickelt oder an ihm erprobt — sie funktionieren auch an unseren heimischen Arten:

- **Etagen aus feinen, waagerechten Astfächern**, dazwischen Luft.
- **Handarbeit statt Heckenschere**: Ahornblätter, die die Heckenschere durchtrennt, bekommen braune Ränder. Immer einzelne Triebe mit der Schere nehmen.
- **Transparenz als Ziel**: Ein gut geschnittener Ahorn ist so licht, dass die Sonne durch das Blätterdach fällt — das berühmte *Komorebi* (光 漏れ , „durch Blätter fallendes Licht“).

Die zwei Ahorn-Eigenheiten

1. Saftdruck — nicht im Spätwinter/Frühjahr schneiden

Ahorne entwickeln (wie Birken und Walnüsse) ab Februar einen starken Wurzeldruck: Schnittwunden „bluten“ dann wochenlang. Das ist selten tödlich, schwächt aber und sieht schlimm aus. Der Druck hält bis in den Frühsommer an — auch im Juni und Juli kann ein holziger Schnitt noch tropfen.

Schnittfenster für Ahorn: - **Weiche Neutriebe pinzieren: ab Juni**. Das Einkürzen unverholzter grüner Triebe verursacht kein Bluten und ist die Hauptmethode zum Kleinhalten (siehe unten). - **Holzige und strukturelle Schnitte: Spätsommer (August–September)**. Dann ist der Saftdruck am niedrigsten, und im belaubten Zustand blutet selbst ein dickerer Schnitt kaum. Die Wunde heilt noch vor dem Winter. - Notfalls auch **Oktober–Dezember** (nach Laubfall, vor dem Saftanstieg). - **✗ Tabu: Februar bis Frühsommer** — in dieser Zeit keine verholzten Äste schneiden.

2. Gegenständige Knospen

Ahornknospen sitzen paarweise gegenüber. Kürzt du einen Trieb, treiben **beide** Knospen am Schnittpunkt aus → Gabelung („Zwiesel“). Japanische Gärtner nutzen das bewusst für die feine Fächerverzweigung — wo sie eine klare Linie wollen, entfernen sie aber **einen der beiden** Gabeltriebe. Merksatz: **Nach dem Schnitt kommt die Gabel — eine Zinke ziehst du.**

4-Meter-Plan für den Ahorn

Aufbau

1. Entscheidung: **eintriebzig mit Schirmkrone** (klassisch) oder **mehrstämmig** — sehr japanisch; Momiji werden oft so gezogen. Dann früh 2–3 Stämme festlegen.
2. Den Mitteltrieb bei Erreichen der Zielhöhe im Sommer auf einen flachen Seitenast **ableiten**.
3. **3–5 Leitäste in Etagen** anlegen, mit Schnur und Bambus in die Waagerechte erziehen. Ahornäste verholzen schnell — formiere nur junge, biegsame Triebe.

Jährliche Erhaltung

1. **Pinzieren (ab Juni)**: Lange Neutriebe auf 2–4 Blattpaare einkürzen, bevor sie verholzen — die Hauptmethode, mit der Momiji in Japan fein und klein bleiben. Weiches Grün blutet nicht.
2. **Holzige Korrekturen im Spätsommer (August–September)**: Steile, nach innen oder senkrecht wachsende Triebe ganz raus (*Eda-nuki*), Übersteher über 4 m ableiten.
3. **Feinausputz von unten**: Alle nach unten hängenden Kleinsttriebe unter den Astfächern entfernen → die Etagen werden als klare „Schichten“ lesbar.
4. Bei dichten Kronen: Innenraum auslichten, bis Lichtflecken auf den Boden fallen (*Komorebi*-Probe).

Wundregel

Wie bei der Kirsche: möglichst keine Schnitte über ~5 cm. Ahornrinde ist dünn — stelle im Hochsommer nicht zu viel auf einmal frei, sonst bekommt der Stamm Sonnenbrand.

Typische Fehler

- **✗** Holzschnitt im März/April (und oft noch Juni/Juli) → wochenlanges „Bluten“.
- **✗** Heckenschere → braune Blattränder, struppige Oberfläche, Verlust der Etagenstruktur.
- **✗** Beide Gabeltriebe nach Schnitt stehen lassen → die Krone wird nach wenigen Jahren ein dichter Knäuel.
- **✗** Bei Spitz- und Bergahorn das Tempo unterschätzen: Die schieben in der Jugend über 1 m pro Jahr — der Juni-Durchgang ist hier Pflicht, nicht Kür.