

KOALAMED

Innere Medizin (Q525 - Q1075)

442 Prüfungsfragen mit markierten Lösungen

Korrekte Antworten: BOLD + GRÜN markiert

Statistik

MCQ (Single Answer): 325

MCQ (No Bold - Manual Review): 73

MCQ (Multiple Answers): 40

Matching (No Bold - Manual Review): 4

Mit Bildern: 60

Frage 525 · Seite 152 · MCQ (Single Answer)

Bild auf Seite 152 im Original-PDF vorhanden

Was trifft auf folgendes Sonographie-Schnittbild zu?

- A) parasternaler Querschnitt ohne ersichtliche Pathologie

Frage

Bild auf Seite 152 im Original-PDF vorhanden

Welcher ist der Leitkeim bei ambulant erworbenen Harnwegsinfekten?

- A) Staphylococcus aureus

Frage

Bild auf Seite 152 im Original-PDF vorhanden

Was ist der wichtigste Parameter für die Feststellung einer Gerinnungsstörung?

- ✓ **A) standardisierte Gerinnungsanamnese**

Frage

Welches ist das wichtigste Screening-Tool zur Evaluierung einer möglichen Gerinnungsstörung?

- A) ROTEM-Untersuchung inkl. Fibrinogen

Frage

Was ist sehr UNTYPISCH für die Lymphom-Anamnese?

- A) Fieber

Frage

Welche der Aussagen zum Myokardinfarkt trifft am ehesten zu?

- A) Am häufigsten ist das rechtsventrikuläre Myokardareal beim akuten Koronarsyndrom

Frage

Welches Klappenvitium hat unter den genannten die höchste Prävalenz in der Altersgruppe der über 75-jährigen?

- A) Aortenklappenstenose

Frage

Welche Aussage/n zur Mykoplasmen-Pneumonie ist/sind richtig und welche falsch?

- A) Das typische Bild der Mykoplasmeninfektion ist die Lobärpneumonie mit hohen

Frage

Welches der folgenden Arzneimittel ist nach gegenwärtigen Leitlinien zur Therapie der chronischen Herzinsuffizienz mit reduzierter systolischer Auswurfraction (HFrEF) AM WENIGSTEN geeignet?

- A) Lisinopril

Frage

Welches kardiale Medikament kann während der Schwangerschaft verwendet werden, weil bei üblicher Dosierung KEINE negativen Effekte für das Kind bekannt sind?

- A) Angiotensinhemmer

Frage 538 · Seite 155 · MCQ (Single Answer)

Ein 73-jähriger Mann mit gelegentlichen pektanginösen Beschwerden erlitt beim Wandern eine plötzliche Bewusstlosigkeit mit Sturz auf die rechte Körperhälfte. Bei Klinikaufnahme bestanden keine retrograde Amnesie und kein Hinweis auf einen zerebralen Krampfanfall. RR 140/70 mmHg, Puls rhythmisch 89/min, spindelförmiges raues Systolikum der Intensität 4/6 mit p. max. über 2. ICR rechts, Lunge physikalisch frei. Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

A) Lungenarterienembolie

Frage

Was ist die häufigste Ursache von AKI (acute kidney injury) bei kritisch kranken Patienten?

A) Interstitielle Nephritis

Frage

Was ist die häufigste Ursache des plötzlichen Herztodes im Erwachsenenalter (> 40 Jahre)?

A) Wolff-Parkinson-White-Syndrom

Frage

Welche der folgenden Substanzklassen hat den geringsten prognostischen Stellenwert in der Langzeit-Therapie nach einem akuten Myokardinfarkt?

A) Acetylsalicylsäure

Frage

Bei einer 60jährigen Patientin mit bekannter Amyloidose erfolgt aufgrund einer zunehmenden Belastungsdyspnoe (NYHA III) eine Echokardiographie. Dabei zeigt sich eine ausgeprägte diastolische Funktionsstörung bei reduzierten Volumina des linken Ventrikels. Beide Vorhöfe sind deutlich dilatiert. Die Wandstärken sind grenzwertig hypertrophiert. Welche Form der Kardiomyopathie ist bei der Patientin am wahrscheinlichsten?

A) Hypertrophische Kardiomyopathie

Frage

Welche Aussage zu Formen der Herzinsuffizienz ist richtig?

A) Die systolische Funktionsstörung wird durch eine Füllungsstörung des Herzens

Frage

Ein 72-jähriger Patient wird mit typischer Crescendo-Angina-pectoris- Symptomatik bei bekannter koronarer Herzerkrankung (KHK) vorstellig. Zudem ist bei dem Patienten der Troponin-Wert erhöht. Welche weitere Diagnostik ist bei dem Patienten am sinnvollsten?

A) Ergometrie

Frage

Was ist KEIN Kriterium zur Risikostratifizierung hinsichtlich eines plötzlichen Herztodes bei einer hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie?

✓ **A) Epsilon-Welle im EKG**

Frage

Welche der folgenden Erkrankungen lässt sich am seltensten als Ursache für eine sekundäre Hypertonie finden?

A) OSAS

Frage 547 · Seite 157 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Hormonell verursachte Bindegewebsveränderungen während der Schwangerschaft erhöhen das Risiko wofür?

A) das Entstehen eines akuten Koronarsyndroms

Frage

Ab welchem Stenosegrad einer Koronararterie kann am ehesten von einer hämodynamischen Relevanz ausgegangen werden?

A) 40%

Frage

Welches sind die beiden häufigsten Notfälle bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern?

A) Richtig

Frage

Welcher Score beurteilt die anatomische Komplexität von koronaren Läsionen?

✓ **A) SYNTAX-Score**

Frage

Mit dem HAS-BLED-Score lässt sich das Blutungsrisiko bei Patienten, die wegen Vorhofflimmern prophylaktisch antikoaguliert werden abschätzen. Ab einem Score von ≥ 3 liegt ein relevantes Blutungsrisiko vor! Welchen maximalen Wert kann der HAS- BLED-Score erreichen?

A) Wofür ist der D-Dimer ein Marker?

Frage

Welches der folgenden Präparate soll für eine adäquate Antikoagulation bei venösen Thromboembolien NICHT verwendet werden?

A) Faktor Xa Antagonisten (z.B. Rivaroxaban)

Frage

Welche Aussagen über Monitoring treffen zu?

A) über einen Pulmonalarterienkatheter kann das Herzzeitvolumen bestimmt werden

Frage

Welches der folgenden Krankheitsbilder ist typischerweise NICHT mit einem erhöhten Troponin assoziiert?

A) Myokarditis

Frage

Welche der folgenden Befunde passen zur typischen Diagnose einer Psoriasisarthritis, welche zur rheumatoiden Arthritis?

A) Psoriasisarthritis

Frage

Welche Aussage zum perioperativen Management von kardialen Medikamenten ist richtig?

A) Die bestehende Therapie mit Statinen soll perioperativ abgesetzt werden.

Frage 558 · Seite 160 · MCQ (Single Answer)

Welches der folgenden Krankheitsbilder ist typischerweise NICHT mit einem erhöhten Troponin assoziiert?

- A) Non-STEMI

Frage

Ein 50-jähriger bekannter Patient mit bekannter chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter systolischer Auswurfraction wird aufgrund von Leistungsschwäche elektiv vorstellig. Im EKG findet sich ein Sinusrhythmus sowie ein vorbekannter Linksschenkelblock mit einer QRS-Dauer von 125 ms. In der Echokardiographie zeigt sich eine systolische Auswurfraction von 32 %. Von medikamentöser Seite nimmt der Patient bereits Ramipril und Bisoprolol jeweils in der höchsten Dosis. Was ist nach den aktuellen Empfehlungen am ehesten der nächste therapeutische Schritt?

- ✓ A) Zusätzlich Eplerenon

Frage

Welche der folgenden Befunde passen zur typischen Diagnose einer Psoriasisarthritis, welche zur rheumatoiden Arthritis?

- A) Psoriasisarthritis

Frage

Wodurch sind Notfallaufnahmen bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern häufig verursacht?

- A) Richtig

Frage

Sie werden als diensthabende/r InternistIn zu einer 75-jährigen Dame gerufen, die wegen eines akuten Bandscheibenvorfalles eine internistische Freigabe für eine Notfalloperation benötigt. Unter welchen Bedingungen kann die Patientin ohne weitere, die Operation verzögernde Diagnostik für den Eingriff freigegeben werden?

- A) Ordnen Sie die Aussagen entsprechend zu.

Frage

Welches der folgenden Medikamente gehört NICHT zu den Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARD) = Basistherapeutika bei der rheumatoiden Arthritis?

- A) Infliximab

Frage

Wann ist eine SS mit höheren Risiko verbunden?

- A) Biologischer Klappenersatz

Frage

Welche Aussage zum Zeitpunkt der antibiotischen Prophylaxe bei Operationen ist richtig?

- A) Die antibiotische Prophylaxe sollte über 24 Stunden fortgesetzt werden.

Frage

Welche der folgenden Medikamente sind die Medikamente 1. Wahl für die Embolieprophylaxe bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern und einem CHA2DS2-VASc- Score von > 2 nach geltenden Richtlinien?

- A) Acetylsalicylsäure und Clopidogrel

Frage 572 · Seite 164 · MCQ (Single Answer)

Welcher Laborbefund ist NICHT typisch für eine Sepsis?

- A) D-Dimer-Erhöhung ($> 500 \mu\text{U/L}$)

Frage

Ein 40-jähriger Patient wurde nach einem Trauma vor 3 Wochen mit einem Unterschenkelgips versorgt. Nun kommt er mit starker Luftnot und Kreislaufbeschwerden in die Notfallaufnahme. Der Notfallpfleger misst eine Sauerstoffsättigung von 86 %, eine Herzfrequenz von 130/min und einen Blutdruck von 85/60. Als erste Differentialdiagnose wird eine Lungenembolie vermutet. Welche Überlegung/en zur Therapie ist/sind hier richtig, welche falsch?

- A) Vor einer therapeutischen Entscheidung muss der D-Dimer-Laborwert abgewartet

Frage

Welche Aussage zur akuten Tracheobronchitis ist FALSCH?

- A) Auskultatorisch lässt sich häufig ein verlängertes Expirium feststellen.

Frage

Ein 42-jähriger Mann kommt in die Rheumaambulanz mit tiefen Rückenschmerzen, die schubweise seit 9 Jahren immer wieder auftreten. Welche Information ist UNWICHTIG, bevor man weitere Untersuchungsschritte wie Labor und/oder Bildgebung veranlässt?

- A) Die Rückenschmerzen des Patienten sind am meisten in den frühen Morgenstunden, aber auch in Ruhe, und bessern sich auf Bewegung.

Frage

Frau Meindl, eine 39-jährige Patientin, wird bei ihrem Hausarzt auf Grund von undulierenden Fieberschüben, die seit 10 Tagen bestehen, vorstellig. In der klinischen Untersuchung fällt ihm ein neu aufgetretenes Systolikum auf. Welche Verdachtsdiagnose stellt der Hausarzt?

- ✓ **A) Endokarditis**

Frage

Welches der genannten Arzneimittel ist Therapie einer chronischen Herzinsuffizienz NYHA III-IV am wenigsten geeignet?

- A) Eplerenon

Frage

Bild auf Seite 166 im Original-PDF vorhanden

Ein 63-jähriger Sportler gibt an, dass er in der neuen Saison nach den ersten 100 Höhenmetern beim Skitourengehen wegen Engegefühls hinter dem Brustbein anhalten müsse. Nach kurzer Pause würden die Beschwerden aufhören. Nach wenigen Höhenmetern würden die Beschwerden wieder auftreten. Welche der Diagnosen trifft am ehesten zu?

- A) Endokarditis

Frage

Sie führen eine Untersuchung am Kipptisch durch. Welche der folgenden Reaktionen lässt Sie per definitionem auf eine orthostatische Hypotonie schließen?

- ✓ **A) Abfall des RRsys um 20mmHg bzw. des RRdia um 10 mmHG nach 3 min**

Frage 582 · Seite 167 · MCQ (Single Answer)

Für welchen Wirkstoff stellt Idarucizumab ein Antidot dar?

- A) Was ist KEIN Risikofaktor für die Entwicklung einer Aspirationspneumonie?

Frage

Welche Gerinnungsstörung ist anhand einer isoliert verlängerten PTT (Partiellen Thromboplastinzeit) ohne weitere Labordiagnostik auszuschließen?

- A) Hämophilie B

Frage

Ein 65-jähriger Patient wird wegen seit einigen Wochen progredienter Belastungsdyspnoe ärztlich vorstellig. Welche der folgenden laborchemischen Parameter ist zum Ausschluss einer kardialen Ursache der Beschwerden am ehesten geeignet?

- A) Creatinin

Frage

Welche Substanz ist bei der Behandlung des akuten Myokardinfarktes zur Risikoreduktion eines neuerlichen ischämischen Ereignisses AM WENIGSTEN geeignet?

- A) Ticagrelor

Frage

Welche Aussagen treffen auf eine 'organisierende Pneumonie' zu?

- A) Im CT findet sich das Atoll Zeichen.

Frage

Welche der folgenden Befunde passen zur typischen Diagnose einer Psoriasisarthritis, welche zur rheumatoiden Arthritis?

- A) Psoriasisarthritis

Frage

Bild auf Seite 169 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG (Papiervorlaufgeschwindigkeit 25 mm/s):

- ✓ **A) Kammerflimmern**

Frage

Bild auf Seite 169 im Original-PDF vorhanden

Was ist die wichtigste therapeutische Maßnahme in der Behandlung von Diarrhoen?

- ✓ **A) Orale oder intravenöse Flüssigkeitszufuhr**

Frage

In welcher EKG-Ableitung finden sich typischerweise KEINE ST- Streckenhebungen bei einem Hinterwandinfarkt?

- A) III

Frage 592 · Seite 170 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Welches Klappenvitium hat unter den genannten die höchste Prävalenz in der Altersgruppe der über 75-Jährigen?

A) Mitralklappenstenose

Frage

Wie hoch ist die durchschnittliche Inzidenz von akuter Nierenschädigung (AKI) bei Intensivpatienten?

A) 65 %

Frage

Unter Voraussetzung der entsprechenden Symptomatik liegt unter welcher systolischen Auswurfraction definitionsgemäß eine chronische Herzinsuffizienz mit reduzierter systolischer Auswurfraction vor?

A) LVEF < 50%

Frage

Bild auf Seite 171 im Original-PDF vorhanden

Welche Pathologie erkennen Sie im vorliegenden EKG?

A) Hinterwandinfarkt

Frage

Bild auf Seite 171 im Original-PDF vorhanden

Welches Antibiotikum wird von der S3-Leitlinie als erste Wahl bei unkomplizierter Zystitis der Frau empfohlen?

A) Fosfomycin

Frage

Bild auf Seite 171 im Original-PDF vorhanden

In welcher EKG-Ableitung finden sich typischerweise KEINE ST-Streckenhebung in bei einem Hinterwandinfarkt?

A) II

Frage

Bei einer 13-jährigen Patientin mit chronisch rezidivierenden Bauchschmerzen und Minderwuchs zeigen sich eine Anämie und eine Thrombozytose. Welche Untersuchung soll als nächster Schritt veranlasst werden?

A) Coloskopie

Frage

Diarrhoe während und nach Antibiotikagabe ist ein häufiges klinisches Krankheitsbild. Unterschiedliche Mechanismen sind dafür verantwortlich. Was gehört NICHT dazu?

A) Prokinetische Aktivität von Antibiotika wie Erythromycin, dadurch raschere

Frage 602 · Seite 173 · MCQ (Multiple Answers)

Welche Aussage zur perioperativen Prophylaxe ist richtig?

- A) Die perioperative Antibiotikagabe sollte mindestens über 24 h fortgesetzt werden.

Frage

Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe ist eine der häufigsten nosokomial erworbenen Infektionen. Welche Aussage zur Clostridium difficile assoziierten Diarrhoe ist FALSCH?

- A) Metronidazol oder Vancomycin (oral) sind Mittel der Wahl zur Behandlung der leichten

Frage

Was sind Kontraindikationen (KI) für eine Schwangerschaft?

- A) KI

Frage

Welche Untersuchungsmodalität ist der Goldstandard in der Beurteilung einer Aortenklappenstenose?

- A) Computertomographie

Frage

Bild auf Seite 174 im Original-PDF vorhanden

Mit welchem Verfahren kann man eine Lungenembolie NICHT nachweisen?

- A) Sonographie

Frage

Bild auf Seite 174 im Original-PDF vorhanden

Welche der Aussagen zur chronischen Herzinsuffizienz trifft AM WENIGSTEN zu?

- A) Die systolische Auswurffraktion wird zur Klassifikation der chronischen

Frage

Wodurch äußert sich ein akuter pulmonaler Hochdruck im Rahmen einer Pulmonalembolie im Elektrokardiogramm (EKG)?

- A) ST-Hebungen

Frage

Welches der folgenden Arzneimittel ist nach gegenwärtigen Leitlinien zur Therapie der chronischen Herzinsuffizienz mit reduzierter systolischer Auswurffraktion (HFrEF) am wenigsten geeignet?

- A) Lisinopril

Frage

Die Klassifikation der Gicht kann die Diagnose unterstützen. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

- A) Gichtkristalle in der Mikroskopie des Gelenkpunktates sind typisch für die Gicht (und

Frage

Die 45-jährige Patientin kommt mit einer zweiten spontan aufgetretenen proximalen Beinvenenthrombose zu Ihnen in die Ambulanz. Die erste Thrombose vor 3 Jahren wurde 3 Monate mit einem direkten oralen Antikoagulans behandelt. Wie lautet die Therapieempfehlung für das aktuelle thrombo-embolische Ereignis bei der Patientin mit niedrigem Blutungsrisiko?

✓ **A) Dauerhafte Antikoagulation**

Frage 614 · Seite 176 · MCQ (Single Answer)

Welche Gerinnungsstörung ist anhand einer isoliert verlängerten PTT (Partiellen Thromboplastinzeit) ohne weitere Labordiagnostik auszuschließen?

✓ **A) Faktor-VII-Mangel**

Frage

Bei einer Lymphom-Erkrankung handelt es sich um eine systemische Erkrankung. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Welche Therapie gilt NICHT als Standard?

A) Supportive Therapie

Frage

Welche vasoaktive Substanz ist Mittel der Wahl im septischen Schock?

A) Vasopressin

Frage

Ein 64-jähriger Patient wird mit typischer Angina pectoris-Symptomatik vorstellig. Wie hoch ist die Vortestwahrscheinlichkeit für eine stenosierende koronare Herzkrankheit (KHK)?

A) 75 %

Frage

Wann sollen Vorhofseptumdefekte im Erwachsenenalter verschlossen werden?

A) bei hochgradiger therapieresistenter pulmonaler Hypertonie

Frage

Eine 25-jährige Patientin leidet an Xerophthalmie. Verschiedene Untersuchungen werden zur weiteren Abklärung veranlasst. Welche Befunde passen zur Klassifikation des primären Sjögren-Syndroms?

A) positive ANAs (= Antinukleäre Antikörper), Lymphom

Frage

Noroviren sind häufige Erreger von Gastroenteritiden. Welche Aussage dazu ist FALSCH?

A) Die Norovireninfektionen treten vor allem in der kalten Jahreszeit auf.

Frage

Welche Aussage zur Mitralklappe ist richtig?

A) Die Mitralklappe ist bei Endocarditis im Vergleich zu anderen Klappen relativ selten

Frage

Bei PatientInnen im Krankenhaus, vor allem unter antibiotischer Therapie, kommt es mit der Zeit zu einem Wechsel des Erregerspektrums, weshalb bei nosokomialen Pneumonien häufige Selektionskeime zu finden sind. Welche Erreger finden sich NICHT bei nosokomialen Pneumonien?

A) Gramnegative Erreger, wie Klebsiellen, E. coli und Enterobacter

Frage

Welche Aussage zur Herzbeteiligung bei Infektionen ist richtig?

✓ **A) Schwere Infektionserkrankungen können akute Koronarsyndrome auslösen.**

Frage 625 · Seite 179 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Zu Ihnen kommt ein Psoriasis-Patient von der Dermatologie überwiesen. Worauf müssen Sie bei der Untersuchung achten?

A) Arthritis der DIPs

Frage

Welche Aussage zur rheumatoiden Arthritis trifft zu?

A) Das Schmetterlingserythem ist ein charakteristisches Krankheitszeichen.

Frage

Was wird NICHT zur antikoagulatorischen Therapie verwendet ?

A) Apixaban

Frage

Was ist unter den genannten Entitäten die häufigste Einzeltodesursache der westlichen Welt?

✓ A) Plötzlicher Herztod

Frage

Herr Karl, 74 Jahre, kommt zur schon lange geplanten Knie-TEP-Operation (Knie Totalendoprothese). Beim Vorgespräch und in den mitgebrachten Unterlagen entdecken Sie bisher nicht bekannte Begleiterkrankungen. Welche veranlasst Sie, gegen das Drängen des Patienten, diesen Eingriff abzusetzen und zu verschieben?

✓ A) Zustand nach Herzinfarkt vor 3 Wochen

Frage

Herr Meyer ist 79 Jahre alt, hat einen Leistenbruch und soll deshalb operiert werden. Er hat keine kardialen Beschwerden. Wanderungen von ca. 2 bis 3 Stunden Dauer sind ohne Probleme möglich. Im Rahmen der präoperativen Untersuchung fällt ein Systolikum auf. Welche Aussage/n ist/sind richtig, welche falsch?

A) Eine Echokardiographie ist für die Operationsfreigabe indiziert.

Frage

Welches der genannten Arzneimittel ist zur Therapie einer chronischen Herzinsuffizienz NYHA III-IV AM WENIGSTEN geeignet?

A) Eplerenon

Frage

Was zählt zu den Poststreptokokkenerkrankungen?

A) Panarteriitis nodosa

Frage

Welche der Aussagen zur chronischen Herzinsuffizienz trifft am WENIGSTEN zu?

✓ A) Die medikamentöse Therapie nimmt eine untergeordnete Rolle in der Therapie

Frage

Bei welcher Erkrankung kommt es typisch nach dem sog. Anlaufschmerz zur Besserung bei Bewegung?

A) Phlegmone

Frage 638 · Seite 182 · MCQ (Single Answer)

Bei einem Patienten mit einer nachgewiesenen Streptococcus-gallolyticus- Endokarditis (Streptococcus-bovis-Endokarditis) oder -Bakteriämie sollte/n unbedingt welche Untersuchung/en durchgeführt werden?

A) Ergometrie

Frage

Wodurch ist die Gicht NICHT charakterisiert?

✓ **A) Ablagerung von sauren Mukopolysacchariden im Gelenk**

Frage

Bei der präoperativen Diagnostik für eine geplante Bypass-Operation wurde eine signifikante Belastungsischämie (17%) in der Szintigraphie festgestellt. Welches weitere Vorgehen ist indiziert?

A) Cardio-CT

Frage

Eine 61-jährige Patientin mit akutem Myokardinfarkt entwickelt plötzlich stärkste Dyspnoe. Sie auskultieren über dem Erb'schen Punkt ein neu aufgetretenes Holosystolikum. Welche Komplikation ist AM EHESTEN zu erwarten?

✓ **A) Ventrikelseptumdefekt**

Frage

Was ist KEIN DMARD (disease modifying antirheumatic drug)?

A) Leflunomid

Frage

Welche Antibiotika gibt man bei Clostridium difficile Infektion?

A) Richtig

Frage

Was ist die wichtigste therapeutische Maßnahme in der Behandlung von Diarrhoen?

A) Gabe von Loperamid und Opiaten zur Peristaltikhemmung

Frage

Bild auf Seite 184 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG (Papiervorlaufgeschwindigkeit 25 mm/Sekunde):

✓ **A) Vorhofflimmern**

Frage

Bild auf Seite 184 im Original-PDF vorhanden

Welches Therapeutikum ist bei blutiger Diarrhoe kontraindiziert?

✓ **A) Loperamid**

Frage

Bild auf Seite 184 im Original-PDF vorhanden

Welches Karzinom verursacht am häufigsten paraneoplastische Syndrome?

A) Mammakarzinom

Frage 648 · Seite 185 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Welche/s der folgenden klinischen Zeichen passt/passen zu einer inflammatorischen, durch Bakterien hervorgerufenen Colitis?

- A) Fieber und Allgemeinsymptome

Frage

Welche Infusionslösung hat den geringsten Volumeneffekt?

- A) 500 ml Elomel

Frage

Was trifft NICHT auf eine rheumatoide Arthritis zu?

- A) Schwanenhalsdeformität

Frage

Was kann eine akute Exazerbation einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung NICHT auslösen?

- A) Pulmonal Embolien

Frage

Vor Ihnen steht ein 32-jähriger Patient mit chronischen Rückenschmerzen. Welche Punkte sprechen dafür, diesen Patienten sofort zu einem Rheumatologen zu schicken, welche sprechen für primär physikalische oder andere Massnahmen?

- A) Überweisung zum Rheumatologen

Frage

Welche der genannten Therapien ist zur medikamentösen Erstlinientherapie bei PatientInnen mit chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter systolischer linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFrEF) am sinnvollsten?

- ✓ **A) Kombinationstherapie Beta-Blocker, ACE-Hemmer, SGLT-2-Inhibitor**

Frage

Folgende Werte wurden erhoben: Astrup (arteriell), Raumluft:- SaO₂ 89 %- pH 7,48 (7,38–7,45)- pCO₂ 34 mm Hg (35–45)- pO₂ 58,8 mm Hg (65–100)- HCO₃⁻ 22,9 mmol/l (23–25)- BE -3 Welche Störung liegt vor?

- ✓ **A) Respiratorische Alkalose**

Frage

Was führt zu KEINER Thrombophilie?

- A) Faktor-V-Leiden-Mutation

Frage

Wie werden die angeführten Medikamente therapeutisch entsprechend den geltenden Richtlinien eingesetzt?

- A) Koronare Herzerkrankung

Frage 660 · Seite 187 · MCQ (Single Answer)

Ein 72-jähriger Patient wird vom Notarzt wegen Angina pectoris und Schwindel in die Medizinische Notfallaufnahme gebracht. Der Patient hat eine zentrale Zyanose, hat eine Atemfrequenz von 40/min, eine Sauerstoffsättigung von 85% und einen Blutdruck von 70/30mmHg. Im EKG wird eine rhythmische Bretkomplextachykardie mit einer Frequenz von 170/min dokumentiert. Was ist die nächste therapeutische Maßnahme laut den geltenden klinischen Richtlinien?

A) Amiodaron (Sedacoron®) 300mg intravenös

Frage

Wann ist das Herzminutenvolumen bei einer Schwangeren am höchsten?

A) In der 8. Schwangerschaftswoche

Frage

Ein Patient kommt Sonntags in die Notfallambulanz. Sie stellen aufgrund der Anamnese den Verdacht einer leichten bis mittelschweren ambulant erworbener Pneumonie. Der Patient gibt an sich die vergangenen Wochen nur in Mitteleuropa aufgehalten zu haben. Welchen der folgenden Wirkstoffe verwenden Sie zur empirischen Antibiose?

A) Gentamicin (Klasse der Aminoglykoside)

Frage

Ein 63-jähriger Sportler gibt an, dass er in der neuen Saison nach den ersten 100 Höhenmetern beim Skitourengehen wegen Engegefühls hinter dem Brustbein anhalten müsse. Nach kurzer Pause würden die Beschwerden aufhören. Nach wenigen Höhenmetern würden die Beschwerden wieder auftreten. Welche der Diagnosen trifft am ehesten zu?

✓ **A) Angina pectoris**

Frage

Welche Art der Bildgebung eignet sich NICHT zum Nachweis einer Pulmonalembolie?

A) V/Q Szintigraphie

Frage

Welches der folgenden Symptome charakterisiert am ehesten eine typische Angina pectoris?

✓ **A) Belastungsabhängiger thorakaler Druck**

Frage

Eine 82-jährige Patientin mit bekannter KHK wurde nach Kammerflimmern defibrilliert. Was ist der sinnvollste Schritt um einen plötzlichen Herztod zu verhindern?

A) Klasse 1 Antiarrhythmikum

Frage

Ein 50-jähriger bekannter Patient mit bekannter chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter systolischer Auswurffraktion wird aufgrund von Leistungsschwäche elektiv vorstellig. Im EKG findet sich ein Sinusrhythmus sowie ein vorbekannter Linksschenkelblock mit einer QRS-Dauer von 125 ms. In der Echokardiographie zeigt sich eine systolische Auswurffraktion von 32 %. Von medikamentöser Seite nimmt der Patient bereits Ramipril und Bisoprolol jeweils in der höchsten Dosis. Was ist nach den aktuellen Empfehlungen am ehesten der nächste therapeutische Schritt?

A) Evaluation hinsichtlich kardialer Resynchronisationstherapie

Frage 672 · Seite 190 · MCQ (Single Answer)

Was sind die häufigsten Pathogene für die Entstehung von Sepsis?

- A) Mykoplasmen

Frage

Bild auf Seite 191 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG (Papiervorlaufgeschwindigkeit 25 mm/s; Eichung 10 mm = 1 mV):

- A) Sinustachykardie

Frage

Bild auf Seite 191 im Original-PDF vorhanden

Welche vasoaktive Substanz ist Mittel der Wahl im septischen Schock?

- A) Vasopressin

Frage

Welche systolische linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LVEF) charakterisiert die Herzinsuffizienz mit mäßiggradig eingeschränkter Ejektionsfraktion (HFmrEF)?

- A) LVEF 10-19 %

Frage

Vor Ihnen steht ein Patient mit chronischen Rückenschmerzen. Welche Punkte sprechen dafür, diesen Patienten auch zu einem Rheumatologen zu schicken, welche dagegen?

- A) Überweisung zum Rheumatologen

Frage

Welcher individuelle patientenspezifische Faktor bevorzugt die perkutane Konorarintervention (PCI) gegenüber der aortokoronaren Bypass-OP?

- A) Komplexe Mehrgefäß-koronare Herzerkrankung (KHK)

Frage

Welche der folgenden Aussagen zur Legionellen-Pneumonie ist/sind richtig, welche falsch?

- A) Legionellen sprechen als extrazelluläre Erreger gut auf Betalaktam Antibiotika an.

Frage

Welcher Steroiddosis wird für den therapierefraktären septischen Schock empfohlen?

- ✓ **A) Hydrocortison 200 mg/d**

Frage

Ein 64-jähriger Patient wird mit typischer Angina-pectoris-Symptomatik vorstellig. Wie hoch ist die Vortestwahrscheinlichkeit für eine stenosierende koronare Herzkrankheit (KHK)?

- A) 10 - 20 %

Frage

Wie hoch ist der physiologische PEEP beim Gesunden (definiert durch die anatomische Atemwegswiderstände (Larynx, Bronchiolen))?

- A) 0 mbar

Frage 686 · Seite 194 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Herr Moser ist 75 Jahre alt, erlitt bei einem Verkehrsunfall eine Oberschenkelhalsfraktur und soll deshalb möglichst rasch operiert werden. Er gibt keine kardialen Beschwerden an. Wanderungen von circa 2-3 Stunden Dauer sind möglich. Im Rahmen der präoperativen klinischen Untersuchung fällt ein 2/6 holosystolisches, spindelförmiges Herzgeräusch auf. In den bereits durchgeführten Aufnahmelaborwerten, dem Ruhe-EKG und dem Thoraxröntgen finden sich keine wesentlichen Auffälligkeiten. Welche Aussage/n ist/sind richtig beziehungsweise falsch?

- A) Ohne Echokardiographie ist eine Operationsfreigabe unmöglich

Frage

Bild auf Seite 195 im Original-PDF vorhanden

Ein 66-jähriger, bisher gesunder Patient hat vor 3 Tagen einen unkomplizierten Vorderwandinfarkt erlitten. Die Infarktausdehnung wird echokardiographisch als mittelgroß beschrieben. Der RR beträgt 130/85 mmHg, die Herzfrequenz 84/min. Welches der angeführten Medikamente ist am ehesten ENTBEHRLICH?

- A) ACE-Hemmer

Frage

Bild auf Seite 195 im Original-PDF vorhanden

Eine Endokarditis der Trikuspidalklappe mit anamnestischem Drogenabusus ist verdächtig für welchen der folgenden kausalen Erreger?

- A) Klebsiella pneumoniae

Frage

Bild auf Seite 195 im Original-PDF vorhanden

erkennen Sie auf dem vorliegenden EKG?

- A) Hyperkaliämie

Frage

Bild auf Seite 196 im Original-PDF vorhanden

Beschriften Sie das abgebildete echokardiographische Schnittbild:

✓ **A) 1:**

Frage

Was kann eine akute Exazerbation einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung NICHT auslösen?

- A) Inhalative Allergene

Frage

Der Dermatologe schickt Ihnen einen Patienten mit Psoriasis vulgaris. An was sollte man bei der Untersuchung denken?

- A) Enthesopathien (Achillessehne etc.)

Frage

Welche Aussage zum perioperativen Management von kardialen Medikamenten ist richtig?

- A) Die Therapie mit Ramipril soll auch am Operationstag fortgeführt werden.

Frage 695 · Seite 197 · MCQ (Single Answer)

Welche Aussage zur SARS-Cov-2-Infektion ist richtig?

- A) Die Schwere des Infektionsverlaufes ist unabhängig vom Alter.

Frage

Welche Aussage zur Herzbeteiligung bei Infektionen ist richtig?

- ✓ **A) Schwere Infektionserkrankungen können akute Koronarsyndrome auslösen.**

Frage

Welche Antibiotika sind Mittel der Wahl zur empirischen Therapie der Nativklappen-Endokarditis bei einem Patienten OHNE bekannte Allergien?

- ✓ **A) Aminopenizilline plus Betalactamaseinhibitor**

Frage

Welche der folgenden Aussagen zum perioperativen Management von kardialen Medikamenten ist/sind richtig, welche falsch?

- A) Die Therapie mit Valsartan soll auch am Operationstag fortgeführt werden.

Frage

Ein 47-jähriger kommt wegen Gelenksschmerzen zu Ihnen. Welche Befunde sprechen für die Diagnose einer Arthritis urica, welche dagegen?

- A) Spricht für die Diagnose

Frage

Welche Blutungen sind bei Patienten mit einer schweren Hämophilie A NICHT zu erwarten?

- A) Gelenksblutungen

Frage

Welche Aussage zur perioperativen Prophylaxe ist richtig?

- A) Auch bei längerer Operationsdauer (über 3 h) ist eine neuerliche Antibiotikagabe nicht

Frage

Durch welche Beschwerden manifestieren sich Vorhofseptumdefekte typischerweise im Erwachsenenalter?

- A) Palpitationen

Frage

Bei Patienten mit intensivpflichtiger, ambulant erworbener Pneumonie ohne Risikofaktoren sollte in Österreich unbedingt welche therapeutische Maßnahme erfolgen?

- A) Kombinationstherapie von mindestens drei Antibiotika

Frage

Ein 72-jähriger Patient wird mit typischer Crescendo-Angina-pectoris- Symptomatik bei bekannter Koronarer Herzkrankheit (KHK) vorgestellt. Zudem ist bei den Patienten der Troponin-Wert erhöht. Welche weitere Diagnostik ist bei den Patienten am sinnvollsten?

- A) Ergometrie

Frage 708 · Seite 200 · MCQ (Single Answer)

In welchem Altersbereich finden sich die meisten Hodgkin-Lymphome?

- A) ab 70

Frage

Eine 30-jährige Patientin (keine Vorerkrankungen, keine Medikation) klagt über Gelenksbeschwerden. Vor wenigen Wochen hatte sie einen Harnwegsinfekt. Wahrscheinlichste Diagnose?

- A) septische Arthritis

Frage

Eine 36-jährige Patientin klagt über Gelenksschwellung seit 3 Wochen. In der 1. Woche hatte sie einen Harnwegsinfekt mit Brennen beim Harnlassen, der antibiotisch behandelt wurde. Bei der Untersuchung sind insbesondere die Fingergrundgelenke vom 2. und 3. Finger rechts und vom 2. Finger links geschwollen und auch druckschmerzhaft. Im Labor zeigt sich eine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit, der Rheumafaktor ist mit 1:360 positiv. Welche ist die wahrscheinlichste Diagnose?

- A) Beginnende rheumatoide Arthritis (nicht sicher auszuschließen)

Frage

Wie ist Fieber unklarer Genese definiert?

- A) Ein über mindestens 3 Tage bestehendes Fieber mit Höchsttemperaturen über 40

Frage

Welcher ist der Leitkeim bei ambulant erworbenen Harnwegsinfekten?

- A) Staphylococcus aureus

Frage

Die Klassifikation der Gicht kann die Diagnose unterstützen. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

- A) Im Röntgenbild kann die Diagnose einer Gicht immer eindeutig erfolgen.

Frage

Bild auf Seite 202 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie die 4 EKGs! 1:

✓ **A) 2:**

Frage

Sie werden als Notarzt zu einem 68-jährigen Patienten wegen akuter Atemnot gerufen. Es besteht ein Zustand nach Myokardinfarkt vor 2 Jahren. Der Patient ist kaltschweißig, er hat einen arteriellen Blutdruck von 85/50 mmHg und einen rhythmischen Puls von 150/min. Im Notfall EKG finden Sie eine rhythmische Breitkomplextachykardie. Ordnen Sie die folgenden Aussagen als 'richtig' oder 'falsch' zu:

- A) Die Therapie der Wahl ist eine Kardioversion in Kurznarkose.

Frage 717 · Seite 203 · MCQ (Single Answer)

Welche der folgenden Substanzklassen hat den GERINGSTEN prognostischen Stellenwert in der Langzeittherapie nach einem akuten Myokardinfarkt?

A) ACE-Hemmer

Frage

Ein 63-jähriger Sportler gibt an, dass er in der neuen Saison nach den ersten 100 Höhenmetern beim Skitourengehen wegen eines Engegefühls hinter dem Brustbein anhalten müsse. Nach kurzer Pause würden die Beschwerden aufhören. Nach wenigen weiteren Höhenmetern würden die Beschwerden wieder auftreten. Welche der Diagnosen trifft am ehesten zu?

A) Exazerbierte chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Frage

Welches Verfahren ist der Goldstandard in der Beurteilung einer koronaren Herzkrankheit (KHK)?

A) Myokardperfusionsszintigraphie

Frage

Welche Klasse von Antibiotika ist das Mittel der ersten Wahl bei Verdacht auf Urosepsis mit Verdacht auf/Nachweis von ESBL(Extended-spectrum-Beta-Lactamase)- bildenden Bakterien?

✓ **A) Carbapeneme**

Frage

Welche Aussage zur Diagnose oder Klassifikation der rheumatoiden Arthritis ist richtig?(ACR = American College of Rheumatology)(ACPA = Antikörper gegen citrullinierte Peptide/Proteine) Die Diagnose der rheumatoiden Arthritis darf nur dann gestellt werden, wenn die Entzündungszeichen positiv, das heißt, erhöht sind. Die Klassifikation als rheumatoide Arthritis ist nur richtig, wenn entweder der Rheumafaktor oder die spezifischen ACPA als positiv nachgewiesen sind. Für die Diagnose der rheumatoiden Arthritis werden vor allem die Zahl und Lokalisation der Gelenke, die Entzündungszeichen, Rheumafaktor bzw. ccP-- Antikörper und die Dauer der Beschwerden herangezogen. Die Klassifikation der rheumatoiden Arthritis erfolgt heute nach den modifizierten ACR-Kriterien von 1987, wenn mehr als 4 von 7 Kriterien erfüllt sind. Andere mögliche Ursachen der Beschwerden müssen ausgeschlossen werden:

A) Die Klassifikation der rheumatoiden Arthritis basiert alleine auf dem Vorhandensein

Frage

Wann ist das Herzminutenvolumen bei einer Schwangeren am höchsten?

A) Am Ende des 1. Trimesters

Frage

Was ist KEIN typisches Symptom einer Lebensmittelintoxikation?

A) Fieber

Frage

Ein Patient klagt über seit mehreren Jahren bestehenden Rückenschmerzen. Welche Information ist für Sie vor der Ausstellung einer CT/MRT- Überweisung am WENIGSTEN relevant?

✓ **A) Bandscheibenvorfall mit CT bereits bewiesen**

Frage 726 · Seite 205 · MCQ (Single Answer)

Welche Patientengruppe profitiert am ehesten von der interventionellen Behandlung einer Mitralklappeninsuffizienz (MI) im Vergleich zu einem operativen Klappenersatz?

- ✓ **A) Patienten mit hohem operativen Risiko und mit hochgradiger MI**

Frage

Eine 63-jährige Patientin leidet an ausgeprägter Xerostomie und wacht sogar in der Nacht auf, um etwas zu trinken. Verschiedene Untersuchungen werden zur weiteren Abklärung veranlasst. Welche Befunde passen NICHT zur Diagnose des primären Sjögren-Syndroms?

- A) positive ANAs (= Antinukleäre Antikörper), Lymphom

Frage

Welche Aussage zur infektiösen Mononukleose ist FALSCH?

- A) Das Hauptmanifestationsalter liegt zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr.

Frage

Unter Voraussetzung der entsprechenden Symptomatik liegt ab welcher systolischen Auswurfraction (LVEF) definitionsgemäß eine chronische Herzinsuffizienz mit reduzierter systolischer Auswurfraction (HFrEF) vor?

- A) LVEF < 50 %

Frage

Was führt zu KEINER Thrombophilie?

- A) Protein C-Mangel

Frage

Im Vordergrund der klinischen Manifestationen stehen beim Sjögren-Syndrom die glandulären Manifestationen. Welche Manifestation zählt NICHT dazu?

- A) Die Keratokonjunktivitis sicca manifestiert sich klinisch als Xerophthalmie.

Frage

Welches der angeführten Herzklappenvitien hat das höchste Operationsrisiko für nicht-kardiale Operationen?

- A) Aortenklappeninsuffizienz Grad III

Frage

Welches der angeführten kongenitalen Vitien wird relativ häufig erst im Erwachsenenalter erstdiagnostiziert?

- A) Ventrikelseptumdefekt

Frage

Was ist die Methode der Wahl zum Nachweis einer Endokarditis?

- A) PETCT

Frage

Welche der Aussagen zum Myokardinfarkt trifft am ehesten zu?

- A) Die Therapie der Wahl des akuten Koronarsyndroms ist die systemische Thrombolyse.

Frage 739 · Seite 209 · MCQ (Single Answer)

Herr Lutz kommt in Ihre Praxis. Der 49-jährige Patient ist sehr konsequent mit seinen kardiovaskulären Untersuchungen, da sein Vater mit 52 an einem Herzinfarkt verstorben war. Sein LDL ist im empfohlenen Normbereich. Sein Blutdruck liegt laut seinem Messprotokoll bei 145/85 mmHg. Wie würden Sie Herrn Lutz nach aktuellen Leitlinien (2019) einstellen?

A) < 130/80

Frage

Welcher Parameter bzw. welches Symptom kommt sowohl bei den SIRS-Kriterien als auch beim quickSOFA-Score vor?

A) Hypotension

Frage

Welche der folgenden Aussagen zum perioperativen Management von kardialen Medikamenten ist/sind richtig, welche falsch?

A) Die bestehende Therapie mit Angiotensin-converting-enzyme-Hemmern soll am Tag

Frage

Frau Maria, 81 Jahre, kommt zur schon lange geplanten Knie-TEP-Operation (Knie-Totalendoprothese). Beim Vorgespräch und in den mitgebrachten Unterlagen entdecken Sie bisher nicht bekannte Begleiterkrankungen. Welche veranlasst Sie, gegen das Drängen der Patientin, diesen Eingriff abzusetzen und zu verschieben?

✓ A) AV-Block IIb° (Typ Mobitz II)

Frage

Welche Aussage/n zur Influenzaimpfung ist/sind richtig und welche falsch?

A) Die protektive Wirkung der Impfung gegenüber den verschiedenen

Frage

Ein 66-jähriger, bisher gesunder Patient hat vor 3 Tagen einen unkomplizierten Vorderwandinfarkt erlitten. Die Infarktausdehnung wird echokardiographisch als mittelgroß beschrieben. Der Patient wurde auf die Normalstation verlegt, der arterielle Blutdruck beträgt nur 90/60 mmHg, die Herzfrequenz 84/min. Welches der angeführten Medikamente kann entsprechend der geltenden Behandlungsrichtlinien am ehesten abgesetzt werden?

A) Acetylsalicylsäure

Frage

Ein 72-jähriger Patient wird vom Notarzt wegen Angina pectoris und Schwindel in die Medizinische Notfallaufnahme gebracht. Der Patient hat eine zentrale Zyanose, eine Atemfrequenz von 40/min, eine Sauerstoffsättigung von 85 % und einen Blutdruck von 70/30 mmHg. Im EKG wird eine rhythmische Bretkomplextachykardie mit einer Frequenz von 170/min dokumentiert. Was ist die nächste therapeutische Maßnahme laut den geltenden klinischen Richtlinien?

A) Metoprolol 5 mg intravenös

Frage 746 · Seite 211 · MCQ (Single Answer)

Für Österreich liegen keine Daten zur Epidemiologie der axialen Spondyloarthritis vor. Welche der folgenden Aussagen zur axialen Spondyloarthritis in Deutschland trifft zu?

- A) Der Mb. Bechterew betrifft vor allem Frauen im Verhältnis 9:1

Frage

Bild auf Seite 212 im Original-PDF vorhanden

Welches Verfahren ist der Goldstandard in der Beurteilung einer koronaren Herzkrankheit (KHK)?

- ✓ **A) Koronarangiographie**

Frage

Ein 58-jähriger Patient mit Zustand nach ST-Hebungsinfarkt (STEMI) der Vorderwand vor 2 Jahren und erfolgreicher perkutaner Koronarintervention des ramus interventricularis anterior. Subjektiv ist der Patient beschwerdefrei, eine rezente Ergometrie war bis 150 Watt unauffällig. Echokardiographisch besteht eine verminderte globale Pumpfunktion (LVEF = 38 %) bei Vorderwandakinesie. Der Patient möchte eine Medikamentenreduktion. Welche Therapie kann abgesetzt werden, da NICHT prognoseverbessernd?

- A) Statin

Frage

Bild auf Seite 214 im Original-PDF vorhanden

Welche der genannten Therapien ist zur medikamentösen Erstlinientherapie bei PatientInnen mit chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter systolischer linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFrEF) am sinnvollsten?

- ✓ **A) Kombinationstherapie Beta-Blocker, ACE-Hemmer, SGLT-2-Inhibitor**

Frage

. Noroviren sind häufige Erreger von Gastroenteritiden. Welche Aussage dazu ist FALSCH?

- A) Die Norovireninfektionen treten vor allem in der kalten Jahreszeit auf.

Frage

Welche der folgenden Substanzklassen hat den GERINGSTEN prognostischen Stellenwert in der Langzeit-Therapie nach einem akuten Myokardinfarkt?

- A) Beta-Blocker

Frage

Eine 21jährige Patientin berichtet über regelmäßige Schwellungen im Bereich der Metacarpophalangealgelenke seit 2 Jahren. Die Patientin wohnt leider auf einer entlegenen Hütte und kann arbeitsbedingt nur schwer bei Auftreten der Schwellung sofort in die Ambulanz kommen. Welche Aussage ist falsch?

- A) Subcutane Rheumaknoten findet man in der Frühphase der rheumatoiden Arthritis

Frage

Herr Müller ist 80 Jahre alt, hat einen Leistenbruch und soll deshalb operiert werden. Er gibt keine kardialen Beschwerden an. Wanderungen von ca. 2 bis 3 Stunden Dauer sind möglich. Im Rahmen der präoperativen klinischen Untersuchung fällt ein 3/6 holosystolisches, spindelförmiges Herzgeräusch auf. Welche Aussage/n ist/sind richtig, welche falsch?

- A) Der geplante operative Eingriff hat ein hohes kardiales Operationsrisiko.

Frage 763 · Seite 218 · MCQ (Single Answer)

Womit soll die initiale Flüssigkeitstherapie in der Sepsis erfolgen?

- A) Isotonem Kochsalz

Frage

Welche orale Antikoagulation soll bei PatientInnen mit mechanischen Herzklappen verwendet werden?

- A) Thrombozytenaggregationshemmung (z. B. Acetylsalicylsäure)

Frage

Was ist die häufigster Ursache von AKI (akute kidney injury) bei kritisch kranken Patienten?

- A) Interstitielle Nephritis

Frage

Mit welchem Parameter kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit bei niedrigem klinischen Risikoscore eine Pulmonalembolie AUSSCHLIEßEN ?

- A) Sauerstoffpartialdruck

Frage

Herr Moser ist 75 Jahre alt, erlitt bei einem Verkehrsunfall eine Oberschenkelhalsfraktur und soll deshalb möglichst rasch operiert werden. Er gibt keine kardialen Beschwerden an. Wanderungen von ca. 2 bis 3 Stunden Dauer sind möglich. Im Rahmen der präoperativen klinischen Untersuchung fällt ein 2/6 holosystolisches, spindelförmiges Herzgeräusch auf. In den bereits durchgeführten Aufnahmelaborwerten, dem Ruhe-EKG und dem Thorax-Röntgen finden sich keine wesentlichen Auffälligkeiten. Welche Aussage/n ist/sind richtig bzw. falsch?

- A) Die Operationsfreigabe ist ohne zusätzliche Voruntersuchungen möglich.

Frage

Was sind die häufigsten Pathogene für die Entstehung von Sepsis?

- ✓ A) **Grampositive Bakterien**

Frage

Welche orale Antikoagulation soll bei PatientInnen mit mechanischen Herzklappen verwendet werden?

- A) Xa-Antagonist (z.B. Rivaroxaban)

Frage

Was spricht für eine virale Gastroenteritis und was für eine bakterielle Ursache?

- A) Viraler Genese

Frage

Bei welcher der folgenden Begleiterkrankungen/Umstände ist die Einnahme von direkten oralen Antikoagulantien zugelassen?

- ✓ A) **Malignom**

Frage 796 · Seite 220 · MCQ (Single Answer)

An welche Differentialdiagnose muss man bei prolongierter wässriger Diarrhoe (Dauer über 10 Tage) nach einem Aufenthalt in einem nordafrikanischen Land denken?

A) Malaria

Frage

Welche/s Antibiotikum/Antibiotika ist/sind Mittel der Wahl zur empirischen Therapie der Nativklappen-Endokarditis bei einem Patienten OHNE bekannte Allergien?

✓ **A) Aminopenizilline plus Betalactamaseinhibitor**

Frage

Welcher Laborbefund ist NICHT typisch für eine Sepsis?

A) Thrombopenie (< 100.000/mm³)

Frage

Bei der Rechtsherzendokarditis (Trikuspidalklappe) nach i.v. Drogenabusus oder im Rahmen von katheterassoziierten Infektionen findet sich mit Abstand welcher Keim am häufigsten, der auch in der empirischen Therapie unbedingt berücksichtigt werden sollte?

A) Escherichia coli

Frage

Bild auf Seite 222 im Original-PDF vorhanden

Ein 52-jähriger Patient wird mit einer Sepsis infolge einer Bakteriämie (Pseudomonas aeruginosa spp. in Blutkultur) von einer Normalstation übernommen. Sie stellen folgende Hautveränderungen an den Beinen vor. Welchem Mottling-Score entspricht das Ausmaß der Veränderung?

A) Vier

Frage

Welche der Aussagen zum Myokardinfarkt trifft am ehesten zu?

✓ **A) Es kann im Rahmen des Infarktgeschehens zu einer akuten**

Frage

Welche antithrombozytäre Kombinationstherapie sollte als erste Wahl bei einer stabilen koronaren Herzerkrankung und perkutaner Koronarintervention initiiert werden?

A) Acetylsalicylsäure-Monotherapie

Frage

Welche Aussage zum plötzlichen Herztod trifft AM WENIGSTEN zu?

A) Ursächlich für den plötzlichen Herztod sind meist schnelle

Frage

Bei PatientInnen im Krankenhaus, vor allem unter antibiotischer Therapie, kommt es mit der Zeit zu einem Wechsel des Erregerspektrums, weshalb bei nosokomialen Pneumonien häufige Selektionskeime zu finden sind. Welche Erreger finden sich NICHT typisch bei nosokomialen Pneumonien?

✓ **A) Mykoplasmen**

Frage 806 · Seite 224 · MCQ (Single Answer)

Welches kardiale Medikament kann während der Schwangerschaft verwendet werden, weil bei üblicher Dosierung KEINE negativen Effekte für das Kind bekannt sind?

A) Amiodaron

Frage

Ambulant erworbene Pneumonien gehören zu den häufigsten, tödlich verlaufenden Infektionen in Europa. Was ist der bakterielle Haupterreger, der in jeder empirischen Therapie berücksichtigt werden sollte?

A) Staphylococcus aureus

Frage

Was ist KEIN Risikofaktor für die Entwicklung einer Aspirationspneumonie?

✓ **A) Bestehende Antibiotikatherapie**

Frage

Bei welcher Gerinnungsstörung können Prothrombinkomplexkonzentrate eingesetzt werden?

A) Faktor-V-Mutation vom Typ Leiden

Frage

Ein 68-jähriger Patient kommt wegen akuter Luftnot in die Notaufnahme. Bei der Erstuntersuchung finden Sie eine Sinustachykardie (110/min), erhöhte arterielle Blutdruckwerte (160/100 mmHG) und feinblasige pulmonale Rasselgeräusche. Welche Medikamente gehören zur Standardnotfalltherapie dieses Patienten?

A) Furosemid

Frage

Welche Gelenke sind bei der rheumatoiden Arthritis vor allem betroffen?

A) alle kleinen Fingergelenke

Frage

Ambulant erworbene Pneumonien gehören zu den häufigsten, tödlich verlaufenden Infektionen in Europa. Was ist der bakterielle Haupterreger, der in jeder empirischen Therapie berücksichtigt werden sollte?

A) Staphylococcus aureus

Frage

Bild auf Seite 226 im Original-PDF vorhanden

Was zeigt das abgebildete echokardiographische Schnittbild?

A) Parasternalen Querschnitt ohne Pathologie

Frage

Was ist das primäre Ziel der Katheterablation bei Vorhofflimmern?

A) atypisches, linksatriales Vorhofflattern zu verhindern

Frage 816 · Seite 227 · MCQ (Single Answer)

Welche der folgenden Medikamente sind die Medikamente 1. Wahl für die Embolieprophylaxe bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern und einem CHA₂DS₂-VASc- Score von > 2 nach geltenden Richtlinien?

A) keine medikamentöse Therapie erforderlich

Frage

Welche Medikamente werden zur Behandlung der Clostridium-difficile-assoziierten Diarrhoe eingesetzt?

A) Metronidazol

Frage

Welche Auswirkung hat die Gabe von unfraktioniertem Heparin auf die gemessenen Laborwerte?

A) Verlängerte Partielle Thromboplastinzeit (PTT) und erniedrigte Prothrombinzeit (PT)

Frage

Die von Ihnen vor einem chirurgischen Eingriff mit geringem Blutungsrisiko durchgeführte spezifische Gerinnungsanamnese zeigt keine Auffälligkeiten. Was benötigt man zur hämostaseologischen Freigabe für die OP noch?

A) Faktor VIII

Frage

Welche orale Antikoagulation soll bei PatientInnen mit mechanischen Herzklappen verwendet werden?

A) Es ist keine Antikoagulation notwendig.

Frage

Welche Aussage zu Formen der Herzinsuffizienz ist richtig?

✓ **A) Die arterielle Hypertonie ist die häufigste Ursache einer diastolischen**

Frage

Welcher Score beurteilt die operative Morbidität und Mortalität bei PatientInnen mit koronarer Herzerkrankung?

A) Ranson-Score

Frage

Eine 13-jährige Patientin mit Colitis ulcerosa soll von Azathioprin auf eine Biologika-Therapie umgestellt werden. Was sollte vorher unbedingt durchgeführt werden?

A) HIV-Test

Frage

Womit kann eine Pulmonalembolie bei niedriger Vortestwahrscheinlichkeit mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden?

A) Belastungs-EKG

Frage 826 · Seite 229 · MCQ (Single Answer)

Ambulant erworbene Pneumonien gehören zu den häufigsten, tödlich verlaufenden Infektionen in Europa. Was ist der bakterielle Haupterreger, der in jeder empirischen Therapie berücksichtigt werden sollte?

A) Mycobacterium tuberculosis

Frage

Welche Untersuchungsmodalitäten ist der Goldstandard in der Beurteilung einer Aortenklappenstenose?

A) Auskultation

Frage

Welche Aussage zu Formen der Herzinsuffizienz ist richtig?

A) Die systolische Funktionsstörung wird durch eine Füllungsstörung des Herzens

Frage

Welches der folgenden Organe gehört zum lymphatischen System?

A) Magen

Frage

Was ist KEINE typische Begleitkomplikation/Begleiterkrankung einer autosomal dominanten polyzystischen Nierenerkrankung?

✓ **A) Retroperitoneale Fibrose**

Frage

Das Erysipel ist eine Infektion, die primär durch hämolysierende Streptokokken hervorgerufen wird. Was ist das Mittel der Wahl bei Patienten ohne Allergien?

✓ **A) Penizillin**

Frage

Pat., i.v. Drogenabusus, sehr schlechter AZ, seit 3 Wochen Fieber, Echo bestätigt Endokarditis. Welcher Erreger ist am wahrscheinlichsten?

A) Chlamydien

Frage

Welche der folgenden Ursachen kann NICHT zu einer akuten Exazerbation einer chronischen Bronchitis führen?

A) Virusinfektion

Frage

Welche Aussage zu Formen der Herzinsuffizienz ist richtig?

A) Die systolische Funktionsstörung wird durch eine Füllungsstörung des Herzens

Frage

Was ist KEIN Kriterium zur Risikostratifizierung hinsichtlich eines plötzlichen Herztodes bei einer hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie?

A) Maximale linksventrikuläre Wandstärke

Frage 838 · Seite 232 · MCQ (Single Answer)

Bild auf Seite 232 im Original-PDF vorhanden

Welche Patientengruppe profitiert AM EHESTEN von der interventionellen Behandlung einer Mitralklappeninsuffizienz (MI) im Vergleich zu einem operativen Klappenersatz?

- A) Patienten mit hohem operativen Risiko und mit geringgradiger MI

Frage

Bild auf Seite 232 im Original-PDF vorhanden

Um was für einen Schnitt handelt es sich im Bild?

- A) Apikaler 2-Kammerblick

Frage

Bild auf Seite 232 im Original-PDF vorhanden

Ein 82-jähriger Patient mit hochgradiger symptomatischer Aortenklappenstenose und klarem Behandlungswunsch wird vorstellig. Zusätzlich hat der Patient eine mittelgradige COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und eine nicht dialysepflichtige Niereninsuffizienz. Welche Therapie ist am ehesten indiziert?

- ✓ **A) Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI)**

Frage

Welche Erkrankung kann ursächlich einer neurogenen Hypotension zu Grunde liegen?

- ✓ **A) Diabetes mellitus**

Frage

Welche Infusionslösung hat den geringsten Volumeneffekt?

- A) 500 ml Elomel

Frage

Wie ist Fieber unklarer Genese definiert?

- ✓ **A) Über 3 Wochen persistierendes Fieber über 38,3 Grad C**

Frage

Ein 48-jähriger Patient, 88 kg, 175 cm, musste wegen einer respiratorischen Insuffizienz bei bilateraler Pneumonie intubiert werden. Aus der Blutkultur wurden Klebsiella spp. gezüchtet. Der Patient ist analgosediert und wird druckkontrolliert beatmet. Der MAP (arterielle Mitteldruck) beträgt 65 mm Hg, die Herzfrequenz 108/min und der ZVD (zentralvenöser Druck) 12 mm Hg nach insgesamt 4500 ml Elomel unter steigendem Noradrenalinbedarf mit einer aktuellen Infusionsrate von 1,2 µg/kg/min. Das Serum-Laktat ist seit 4 Stunden leicht ansteigend und betrug zuletzt 32 mg/dl. Die ScvO₂ (zentralvenöse Sättigung) beträgt 63 % bei einer SaO₂ (arteriellen Sauerstoffsättigung) von 95 %. Der gemessene Herzindex (mittels PiCCO₂) beträgt 3,8 L/min/m² und die Hämoglobinkonzentration (Hb) 8,0 g/dl. Welche Maßnahme sollte man als Nächstes setzen?

- A) Zusätzliche Flüssigkeitsgabe (Kristalloid)

Frage

Welches Herzklappenvitium stellt bei Erwachsenen die häufigste Indikation zur Klappenintervention dar?

- A) Pulmonalklappenstenose

Frage 845 · Seite 234 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Wodurch sind Notfallaufnahmen bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern häufig verursacht?

A) Rhythmusstörungen

Frage

Welche systolische linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) charakterisiert die Herzinsuffizienz mit mäßig-gradig eingeschränkter Ejektionsfraktion (HFmrEF)?

A) LVEF 20–29

Frage

An welche Differentialdiagnose muss man bei prolongierter wässriger Diarrhoe (Dauer über 10 Tage) nach einem Aufenthalt in einem nordafrikanischen Land denken?

A) Hepatitis B

Frage

Verschiedene Bevölkerungsgruppen sind besonders gefährdet, an der Schweinegrippe (Influenza A/H1N1pdm09) zu versterben. Welche gehört NICHT dazu?

A) Asthmapatienten (z. B. unter medikamentöser Therapie)

Frage

Wann sollte eine antibiotische Therapie einer asymptomatischen Bakteriurie durchgeführt werden?

A) Bei Diabetikern

Frage

Welches kardiale Medikament kann während der Schwangerschaft verwendet werden, weil bei üblicher Dosierung KEINE negativen Effekte für das Kind bekannt sind?

A) Spironolacton

Frage

Ein 72-jähriger Patient wird mit typischer Crescendo-Angina-pectoris- Symptomatik bei bekannter koronarer Herzerkrankung (KHK) vorgestellt. Zudem ist bei dem Patienten der Troponin-Wert erhöht. Welche weitere Diagnostik ist bei dem Patienten am sinnvollsten?

A) Dobutamin-Stress-Echokardiographie

Frage

Wie hoch ist die Prävalenz der Aortenklappenstenose in der Altersgruppe der über 75-Jährigen?

A) 10 %

Frage

Welche systolische linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) charakterisiert die Herzinsuffizienz mit mäßig-gradig eingeschränkter Ejektionsfraktion (HFmrEF)?

A) LVEF 20–29 %

Frage

Welche Aussage zur rheumatoiden Arthritis trifft zu?

✓ **A) Eine rasche effektive Basistherapie entscheidet über den weiteren**

Frage 856 · Seite 236 · MCQ (Single Answer)

Womit soll die initiale Flüssigkeitstherapie in der Sepsis erfolgen?

- A) Isotonem Kochsal

Frage

Welche Untersuchungsmodalität ist der Goldstandard in der Beurteilung einer Aortenklappenstenose?

- A) Auskultation

Frage

Welches der folgenden Symptome charakterisiert am ehesten eine typische Angina pectoris?

- A) Punktueller thorakales Stechen

Frage

Welche Aussage zum plötzlichen Herztod trifft AM WENIGSTEN zu?

- A) Ursächlich für den plötzlichen Herztod sind meist schnelle

Frage

Welche Aussage zu Chinolonen ist FALSCH?

- A) Sie finden vor allem bei der Behandlung von abdominalen Infektionen Anwendung.

Frage

Was wird für die Therapie als 'pill in the pocket' bei paroxysmalem Vorhofflimmern bei Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung nach vorheriger Austestung unter Überwachung bei Erfolg empfohlen?

- A) Ibutilide

Frage

Die Nativklappen-Endokarditis wird in 80% - 90% der Fälle durch drei Erreger/Erregergruppen verursacht. Welcher Erreger gehört NICHT dazu?

- A) Streptokokken

Frage

Eine 25-jährige Patientin leidet an Xerophthalmie. Verschiedene Untersuchungen werden zur weiteren Abklärung veranlasst. Welche Befunde passen zur Klassifikation des primären Sjögren-Syndroms?

- A) positive SSA-Antikörper

Frage

Ein 25-jähriger Patient kommt wegen chronischer Rückenschmerzen in die Allgemeinpraxis. Die Schmerzen quälen ihn schon seit mehr als 4 Monaten. Unter welcher Bedingung muss dieser Patient NICHT primär an einen Rheumatologen zur weiteren Abklärung zugewiesen werden?

- A) Der Patient hatte schon öfter über eine Achillodynie beidseits geklagt und erinnert

Frage

In welcher EKG-Ableitung finden sich typischerweise KEINE ST-Streckenhebungen bei einem Hinterwandinfarkt?

- A) II

Frage 865 · Seite 239 · MCQ (Single Answer)

Welche der folgenden Untersuchungsmodalitäten hat den geringsten Stellenwert zur Diagnostik der Herzinsuffizienz?

- A) Lungenröntgen

Frage

Ein 65-jähriger Patient wird wegen seit einigen Wochen progredienter Belastungsdyspnoe ärztlich vorstellig. Welcher der folgenden laborchemischen Parameter ist zum Ausschluss einer kardialen Ursache der Beschwerden am ehesten geeignet?

- A) Myoglobin

Frage

Ordnen Sie die in der Therapie der Herzinsuffizienz verwendeten Medikamente entsprechend zu:

- A) Symptomlindernd

Frage

Bild auf Seite 240 im Original-PDF vorhanden

Welche Substanz ist bei der Behandlung des akuten Myokardinfarktes zur Risikoreduktion eines neuerlichen ischämischen Ereignisses am WENIGSTEN geeignet?

- A) Ticagrelor

Frage

Bild auf Seite 240 im Original-PDF vorhanden

Was stellen Sie in vorliegendem EKG fest?

- A) Kammerflimmern

Frage

Bild auf Seite 240 im Original-PDF vorhanden

Wie hoch ist der physiologische PEEP beim Gesunden (definiert durch die anatomischen Atemwegswiderstände (Larynx, Bronchiolen))?

- A) 3 mbar

Frage

Bild auf Seite 241 im Original-PDF vorhanden

Welche der folgenden Untersuchungsmodalitäten hat den geringsten Stellenwert zur Diagnostik der Herzinsuffizienz?

- A) Natriuretisches Peptid

Frage

Bild auf Seite 241 im Original-PDF vorhanden

Was sind häufige Erreger bei einer Nativklappenendokarditis?

- A) Pseudomonas aeruginosa

Frage

Welche Aussage zu den bei Diabetes mellitus eingesetzten SGLT2-Inhibitoren ist richtig?

- A) Haben in der Therapie nur eine untergeordnete Bedeutung.

Frage 876 · Seite 243 · MCQ (Single Answer)

Bild auf Seite 243 im Original-PDF vorhanden

Welche Substanz ist bei der Behandlung des akuten Myokardinfarktes zur Risikoreduktion eines neuerlichen ischämischen Ereignisses AM WENIGSTEN geeignet?

A) Prasugrel

Frage

Bild auf Seite 243 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG (Papiervorlaufgeschwindigkeit 25 mm/s; Eichung 10 mm = 1 mV):

A) Kammerflimmern

Frage

Bild auf Seite 243 im Original-PDF vorhanden

Welche der folgenden Medikamente sind die Medikamente 1. Wahl für die Embolieprophylaxe bei Vorhofflimmern und einem CHA₂-DS₂-VASc Score von >2 nach geltenden Richtlinien?

A) Richtig

Frage

Bei welcher der folgenden Begleiterkrankungen/Umstände ist die Einnahme von direkten oralen Antikoagulantien zugelassen?

A) Schwangerschaft/Stillzeit

Frage

Welches Medikament findet bei Vorhofflimmern als 'Pill in the pocket' Anwendung?

A) Flecainid

Frage

Ein 65-jähriger Patient wird wegen seit einigen Wochen progredienter Belastungsdyspnoe ärztlich vorstellig. Welcher der folgenden laborchemischen Parameter ist zum Ausschluss einer kardialen Ursache der Beschwerden am ehesten geeignet?

A) Myoglobin

Frage

Ein Patient mit dilatativer Kardiomyopathie berichtet von Dyspnoe bereits bei geringsten Belastungen. In der Blutdruckmessung ergibt sich ein niedrig-normaler Blutdruck. Aktuell erhält er die gelisteten Medikamente. Wie gehen Sie bzgl. der Medikamentenverordnung weiter vor?

A) Absetzen

Frage

Wann sollte eine antibiotische Therapie einer asymptomatischen Bakteriurie durchgeführt werden?

A) Bei dialysepflichtiger Niereninsuffizienz

Frage

Welche Wirkstoffe finden Anwendung in der Therapie der persistierenden pulmonalen Hypertonie (PPHN)?

A) Richtig

Frage 883 · Seite 245 · MCQ (Single Answer)

Als Komplikation einer Lungenentzündung kann ein Abszess auftreten. Welche Aussage zur Therapie von Abszessen ist FALSCH?

- A) Abszesse sind häufig Mischinfektionen, weshalb auch gegen Anaerobier wirksame

Frage

Wie ist Fieber unklarer Genese definiert?

- A) Ein über mindestens 3 Tage bestehendes Fieber mit Höchsttemperaturen über 40

Frage

Was findet man normalerweise NICHT bei einer Lebensmittelvergiftung?

- A) kurze Inkubationszeit

Frage

Ein 45-jähriger Mann kommt zu Ihnen mit tiefen Rückenschmerzen, die schubweise seit 2 Jahren immer wieder auftreten. Welche Information ist für Sie UNWICHTIG, bevor Sie weitere Untersuchungsschritte wie Labor und/oder Bildgebung veranlassen?

- ✓ **A) Der Patient arbeitet viel und schwer im Bergbau.**

Frage

Bild auf Seite 247 im Original-PDF vorhanden

Welche Erkrankung ist der wahrscheinlichste Grund für einen plötzlichen Herztod bei einem jungen Sportler?

- A) Koronargefäßruptur

Frage

Bild auf Seite 247 im Original-PDF vorhanden

Eine 69-jährige Patientin wird mit der Verdachtsdiagnose eines Nicht-ST- Streckenhebungsinfarkts (NSTEMI) vorgestellt. Der GRACE-Score beträgt 155 (= erhöhtes Risiko), die Patientin ist jedoch hämodynamisch und respiratorisch stabil ohne intermittierende ST-Hebungen. Wie schnell sollte laut aktuellen Leitlinien eine invasive Koronardiagnostik erfolgen?

- ✓ **A) Innerhalb von 24 Stunden**

Frage

Bild auf Seite 247 im Original-PDF vorhanden

Beschriften Sie das abgebildete echokardiographische Schnittbild:

- A) 1 + 5

Frage

Verschiedene Bevölkerungsgruppen sind besonders gefährdet, an der Schweinegrippe (Influenza A/H1N1pdm09) zu versterben. Welche gehört NICHT dazu?

- A) Immunsupprimierte (z.B. Transplantationspatienten)

Frage

Bild auf Seite 249 im Original-PDF vorhanden

Welchen Standardschnitt zeigt das vorliegende Echokardiogramm?

- A) Parasternaler Längsschnitt

Frage 894 · Seite 249 · MCQ (Single Answer)

Bild auf Seite 249 im Original-PDF vorhanden

Frau Meindl, eine 39-jährige Patientin, wird bei ihrem Hausarzt auf Grund von undulierenden Fieberschüben vorstellig. Diese bestehen seit circa 10 Tagen. In der klinischen Untersuchung fällt ein neu aufgetretenes Systolikum auf. Der Hausarzt stellt daher welche Verdachtsdiagnose?

✓ **A) eine Endokarditis**

Frage

Bild auf Seite 249 im Original-PDF vorhanden

Fallvignette, Patientin mit Mb. Bechterew auch extraartikulärer Befall. Welche Aussage zur TNF-alpha Therapie ist korrekt?

A) TNF-alpha Wirkung auf Nieren

Frage

Beurteile ob die gelisteten Medikamente zur Prognoseverbesserung bei KHK führen oder nur symptomatisch Einsatz finden?

A) prognoseverbessernd

Frage

Ein 64-jähriger Patient wird mit typischer Angina-pectoris-Symptomatik vorstellig. Wie hoch ist die Vortestwahrscheinlichkeit für eine stenosierende koronare Herzkrankheit (KHK)?

A) 10–20 %

Frage

Welche Aussage zum plötzlichen Herztod trifft am ehesten zu?

A) Die systolische Auswurfraction hat eine exzellente Sensitivität in der Vorhersage des

Frage

Bild auf Seite 251 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG (Papiervorlaufgeschwindigkeit 25 mm/Sekunde):

A) STEMI Seitenwand

Frage

Bild auf Seite 251 im Original-PDF vorhanden

Welche Methode eignet sich heute (2018) am besten um den Ursprungs Tumor bei paraneoplastischen Symptomen zu finden?

A) Sonographie

Frage

Bild auf Seite 251 im Original-PDF vorhanden

Die 45-jährige Patientin kommt mit einer zweiten spontan aufgetretenen proximalen Beinvenenthrombose zu Ihnen in die Ambulanz. Die erste Thrombose vor 3 Jahren wurde 3 Monate mit einem direkten oralen Antikoagulans behandelt. Wie lautet die Therapieempfehlung für das aktuelle thrombo-embolische Ereignis bei der Patientin mit niedrigem Blutungsrisiko?

A) 3 Monate Antikoagulation, anschließend Umstellung auf dauerhafte

Frage 902 · Seite 252 · MCQ (Single Answer)

Welche der folgenden Medikamente sind 1. Wahl bei Embolieprophylaxe bei VHF und einem CHA₂DS₂-VASc-Score von >2 nach geltenden Richtlinien?

A) UFH

Frage

Nach einer aortokoronaren 4-fach Bypass-Operation vor 10 Jahren wird eine 67-jährige Patientin wegen dokumentiertem Kammerflimmern defibrilliert und erfolgreich reanimiert. In der Kontrollkoronarangiographie sind alle Bypässe offen, es ist keine Koronarintervention notwendig. Was ist die wirksamste Maßnahme zur Sekundärprophylaxe des plötzlichen Herztodes?

A) Therapie mit einem Klasse 3 Antiarrhythmikum (z. B. Amiodaron)

Frage

Welche Aussage zu Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern ist richtig?

A) Ventrikelseptumdefekte führen zuerst zu einer Erweiterung der rechten Herzhöhlen.

Frage

Die therapeutischen Empfehlungen für die Behandlung der ambulant erworbenen Pneumonien richten sich nach der Schwere der Erkrankung. Manche PatientInnen müssen dabei direkt auf die Intensivstation aufgenommen werden. Welche der vorgeschlagenen Therapien sollte ein Patient/eine Patientin ohne bekannte Risikofaktoren für resistente Erreger unbedingt erhalten, um die Mortalitätswahrscheinlichkeit zu reduzieren?

A) Carbapenem Monotherapie

Frage

Was ist eine häufige typische Komplikation einer operativ korrigierten Fallot-Tetralogie im Langzeitverlauf?

A) Aortenklappenstenose

Frage

Für welche der genannten Diagnosen sind Anlauf- und Belastungsschmerzen typische Symptome?

✓ **A) Arthrose**

Frage

Welche der folgenden Aussagen zum perioperativen Management von kardialen Medikamenten ist richtig bzw. falsch?

A) Therapie mit AT-Rezeptorblockern am OP-Tag fortführen.

Frage

Ein 73-jähriger Mann mit gelegentlichen pektanginösen Beschwerden erlitt beim Wandern eine plötzliche Bewusstlosigkeit mit Sturz auf die rechte Körperhälfte. Bei Klinikaufnahme bestanden keine retrograde Amnesie und kein Hinweis auf einen zerebralen Krampfanfall. RR 140/70 mmHg, Puls rhythmisch 89/min, spindelförmiges raues Systolikum der Intensität 4/6 mit p. max. über 2. ICR rechts, Lunge physikalisch frei. Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

A) Papillarmuskelruptur

Frage 913 · Seite 254 · MCQ (Single Answer)

Welche Infusionslösung hat den geringsten Volumeneffekt?

- A) 500ml isotones Kochsalz

Frage

Die Klassifikation der Gicht kann die Diagnose unterstützen. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

- A) Beschwerdefreiheit zwischen den Gelenksattacken ist untypisch für die Gicht.

Frage

Bild auf Seite 255 im Original-PDF vorhanden

Welche vasoaktive Substanz wird bei septischem Schock bevorzugt eingesetzt?

- A) Dobutamin

Frage

Bild auf Seite 256 im Original-PDF vorhanden

Sie finden bei einem Patienten eine Riesenzellarteriitis. Welche weiteren Untersuchungen stellen Sie nun an?

- A) PET

Frage

Bild auf Seite 256 im Original-PDF vorhanden

Welche der folgenden Diagnosen ist im vorliegenden EKG ersichtlich?

- A) Rechtstyp

Frage

Bild auf Seite 256 im Original-PDF vorhanden

Was ist der wichtigste uropathogene Keim in Österreich?

- A) *Listeria monocytogenes*

Frage

Welche Aussage zum Management von Vorhofflimmern ist richtig?

- A) Die medikamentöse Therapie zur Kardioversion in Sinusrhythmus ist effektiver als die

Frage

Bei einer 60-jährigen Patientin mit bekannter Amyloidose erfolgt aufgrund einer zunehmenden Belastungsdyspnoe (NYHA III) eine Echokardiographie. Dabei zeigt sich eine ausgeprägte diastolische Funktionsstörung bei reduzierten Volumina des linken Ventrikels. Beide Vorhöfe sind deutlich dilatiert. Die Wandstärken sind grenzwertig hypertrophiert. Welche Form der Kardiomyopathie ist bei der Patientin am wahrscheinlichsten?

- A) Dilatative Kardiomyopathie

Frage

Welche der folgenden Untersuchungsmodalitäten hat den GERINGSTEN Stellenwert zur Diagnostik der Herzinsuffizienz?

- ✓ **A) D-Dimer**

Frage 922 · Seite 258 · MCQ (Single Answer)

Für Österreich liegen keine Daten zur Epidemiologie der axialen Spondyloarthritis vor. Welche der folgenden Aussagen zur axialen Spondyloarthritis in Deutschland trifft zu?

- ✓ **A) Die axiale Spondyloarthritis betrifft ca. 1,7 % der Bevölkerung.**

Frage

Ein 66-jähriger, bisher gesunder Patient hat vor 3 Tagen einen unkomplizierten Vorderwandinfarkt erlitten. Die Infarktausdehnung wird echokardiographisch als mittelgroß beschrieben. Der Patient wurde auf die Normalstation verlegt, der arterielle Blutdruck beträgt nur 90/60 mmHg, die Herzfrequenz 84/min. Welches der angeführten Medikamente kann entsprechend der geltenden Behandlungsrichtlinien am ehesten abgesetzt werden?

- A) ACE-Hemmer

Frage

Sie therapieren eine allein am Berg lebende Patientin, die an Diabetes mellitus Typ 2, Hyperlipidämie, rheumatoider Arthritis, Zustand nach Magenulkus und Bluthochdruck leidet. Welche Medikation ist NICHT zielführend?

- A) Enalapril 1x tgl., morgens

Frage

Welches der folgenden Symptome charakterisiert am ehesten eine typische Angina pectoris?

- A) Atemabhängiger Thoraxschmerz

Frage

Was ist der häufigste Vorhofseptumdefekt (ASD) Typ?

- A) Persistierendes Foramen ovale

Frage

Eine 69-jährige Patientin wird mit der Verdachtsdiagnose eines Nicht-ST- Streckenhebungsinfarkts (NSTEMI) vorstellig. Der GRACE-Score beträgt 155 (=erhöhtes Risiko), die Patientin ist jedoch hämodynamisch und respiratorisch stabil ohne intermittierende ST-Hebungen. Wie schnell sollte laut aktuellen Leitlinien eine invasive Koronardiagnostik erfolgen?

- A) Überhaupt nicht

Frage

Welche der angeführten Vitien haben ein hohes Risiko für ventrikuläre Rhythmusstörungen und somit den plötzlichen Herztod?

- A) Vorhofseptumdefekt

Frage

Ein 55-jähriger Patient wird in hämodynamisch und respiratorisch stabilem Zustand mit dem Verdacht auf einen Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt (NSTEMI) in der Notaufnahme vorstellig. Welche der Maßnahmen ist am wenigsten indiziert?

- A) Monitorisierung

Frage 931 · Seite 260 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Sie werden als diensthabende/r Internist*in zu einer 75-jährigen Dame gerufen, die wegen eines akuten Bandscheibenvorfalls eine internistische Freigabe für eine Notfalloperation benötigt. Unter welchen Bedingungen kann die Patientin ohne weitere, die Operation verzögernde Diagnostik für den Eingriff freigegeben werden?

A) Ordnen Sie die Aussagen entsprechend zu.

△ Keine

Frage 932 · Seite 261 · MCQ (Single Answer)

Welche der möglichen Antworten ist KEINE absolute Kontraindikation für eine präklinische systemische Fibrinolysetherapie bei Verdacht auf ST-Streckenhebungs- Myokardinfarkt?

A) Bekannte Hämophilie

Frage

Ein 82-jähriger Patient mit hochgradiger symptomatischer Aortenklappenstenose und klarem Behandlungswunsch wird vorstellig. Zusätzlich hat der Patient eine mittelgradige COPD und eine dialysepflichtige Niereninsuffizienz. Welche Therapie ist am ehesten indiziert?

A) Konservatives Management

Frage

Was führt zu einer Hemmung der Blutbildung?

A) Erythropoietin

Frage

Was sind absolute Kontraindikationen für eine präklinische systemische Fibrinolysetherapie bei Verdacht auf ST-Streckenhebungs-Myokardinfarkt?

A) Verdacht auf Aortendissektion oder bekannte Hämophilie

Frage

Welcher Score beurteilt die anatomische Komplexität von koronaren Läsionen?

A) Euro-Score II

Frage

Wie erfolgt die medikamentöse Behandlung einer Hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathie (HOCM)?

✓ **A) Betablocker**

Frage

Ein 69-jähriger Mann entwickelt rezidivierend auftretende, nicht flüchtige urtikarielle Exantheme, die mit Fieberschüben einhergehen. Antihistaminika sind wirkungslos. Laborchemisch ist eine monoklonale Gammopathie in IgM, ein erhöhtes CRP und eine Leukozytose nachweisbar. Ein Infektfokus kann nie als Ursache nachgewiesen werden. Welche der unten angeführten Differentialdiagnosen kommen in Betracht?

A) Chronisches Telogeneffluvium

Frage 941 · Seite 263 · MCQ (Single Answer)

Wann wird Prothrombinkomplex-Konzentrat eingesetzt?

- A) Eisenmangelanämie

Frage

Ein Patient hat seit zwei Tagen nach Teilnahme an einem Barbecue massiven z. T. blutigen Durchfall, Fieber bis 39,5°C, Tensemen. Im Labor zeigen sich erhöhte Entzündungszeichen, sowie in der Sonographie Kokarden im Dickdarm. Was ist der wahrscheinlichste kausale Erreger?

- A) Giardia lamblia

Frage

Welche Aussage zu Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern ist richtig?

- A) Typ-2-Vorhofseptumdefekte (ASD Typ 2) finden sich bei Fallot-Tetralogie häufig.

Frage

Welches Verfahren ist der Goldstandard in der Beurteilung einer koronaren Herzkrankheit (KHK)?

- A) Magnetresonanztomographie

Frage

Bild auf Seite 264 im Original-PDF vorhanden

Das Gesamtüberleben bei Morbus Hodgkin für alle Stadien ist kontinuierlich angestiegen. Bei wieviel Prozent liegt das Gesamtüberleben aktuell?

- A) < 30%

Frage

Bild auf Seite 264 im Original-PDF vorhanden

Welche Substanzklasse, die in der Diabetesbehandlung eingesetzt wird, kommt auf zunehmend in der Herzinsuffizienztherapie zur Anwendung, da damit eine Mortalitätsreduktion erreicht werden kann?

- A) GLP-1-Analoga

Frage

Eine 61-jährige Patientin mit akutem Myokardinfarkt entwickelt plötzlich stärkste Dyspnoe. Sie auskultieren über dem Erb'schen Punkt ein neu aufgetretenes Holosystolikum. Welche Komplikation ist am ehesten zu erwarten?

- A) Aneurysmaruptur der linken Koronararterie

Frage

Welche Eigenschaften treffen für direkte orale Antikoagulantien im Vergleich zu Vitamin-K-Antagonisten NICHT zu?

- A) Rascher Wirkeintritt

Frage

Bild auf Seite 266 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG (Papiervorlaufgeschwindigkeit 25 mm/Sekunde):

- A) Sinustachykardie

Frage 953 · Seite 267 · MCQ (Single Answer)

Bild auf Seite 267 im Original-PDF vorhanden

Welche Pathologie erkennen Sie im vorliegenden EKG?

- A) keine Pathologie erkennbar

Frage

Bild auf Seite 268 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG (Papiervorlaufgeschwindigkeit 25 mm/s; Eichung: 10 mm = 1 mV):

- ✓ **A) Posteriorlateralinfarkt**

Frage

Bild auf Seite 269 im Original-PDF vorhanden

Befunden Sie das abgebildete EKG:

- A) Sinustachykardie

Frage

Bild auf Seite 270 im Original-PDF vorhanden

Welche Pathologie lässt sich in folgendem EKG erkennen?

- A) AV Reentrytachykardie

Frage

Bild auf Seite 270 im Original-PDF vorhanden

Welche Substanzklasse, die in der Diabetesbehandlung eingesetzt wird, kommt auch zunehmend in der Herzinsuffizienz-Therapie zur Anwendung, da damit eine Mortalitätsreduktion erreicht werden kann?

- ✓ **A) SGLT2-Inhibitoren**

Frage

Ein 56-jähriger Mann mit akutem Myokardinfarkt entwickelt plötzlich stärkste Dyspnoe. Sie auskultieren über der Herzspitze ein neu aufgetretenes Holosystolikum mit Fortleitung in die Axilla. Welche Komplikation ist am ehesten zu erwarten?

- A) Ruptur der freien Wand

Frage

Ein 66-jähriger, bisher gesunder Patient hat vor 3 Tagen einen unkomplizierten Vorderwandinfarkt erlitten. Die Infarktausdehnung wird echokardiographisch als mittelgroß beschrieben. Der RR beträgt 130/85 mmHg, die Herzfrequenz 84/min. Welches der angeführten Medikamente ist am ehesten entbehrlich?

- ✓ **A) Kalziumantagonisten**

Frage

Nach einer aortokoronaren 4-fach Bypassoperation vor 10 Jahren wird eine 67-jährige Patientin wegen dokumentierten Kammerflimmern Defibrilliert und erfolgreich reanimiert. In der Kontrollkoronarangiographie sind alle Bypässe offen, es sind keine Koronarintervention notwendig. Was ist die wirksamste Maßnahme zu Sekundärprophylaxe des plötzlichen Herztodes?

- A) Implantation eines Herzschrittmachers

Frage 962 · Seite 271 · MCQ (Single Answer)

Ein 56-jähriger Mann mit akutem Myokardinfarkt entwickelt plötzlich stärkste Dyspnoe. Sie auskultieren über der Herzspitze ein neu aufgetretenes Holsystolikum mit Fortleitung in die Axilla. Welche Komplikation ist AM EHESTEN ehesten zu erwarten?

A) Ruptur der freien Wand

Frage

Welches der folgenden Antibiotika ist Mittel der ersten Wahl zur Behandlung einer Staphylokokken-Bakteriämie (Erreger ohne wesentliche Resistenzen)?

A) Azithromycin

Frage

Z. n. Spontaner Pulmonalembolie mit Lyse aufgrund kardialer Belastung, wie lange Antikoagulation bei niedrigem Blutungsrisiko ?

A) 12 Monate

Frage

Welches Herzklappenvitium stellt bei Erwachsenen die häufigste Indikation zur Klappenintervention dar?

✓ **A) Aortenklappeninsuffizienz**

Frage

Die Influenza ist oft ein Wegbegleiter für bakterielle Pneumonien, die mit einer hohen Letalität einhergehen. Weshalb führt eine Influenza Infektion zu einer erhöhten Inzidenz, vor allem von Pneumokokken-Infektionen?

A) Es gibt keine Interaktion zwischen Influenza und dem Risiko für

Frage

Bild auf Seite 273 im Original-PDF vorhanden

. Bei der Rechtsherzendokarditis (Trikuspidalklappe) nach i.v. Drogenabusus oder im Rahmen von katheter-assoziierten Infektionen findet sich mit Abstand welcher Keim am häufigsten, der auch in der empirischen Therapie unbedingt berücksichtigt werden sollte?

✓ **A) Staphylococcus aureus**

Frage

Welche/s der folgenden klinischen Symptome passt/passen zu Harnwegsinfekten und welche/s nicht?

A) Pollakisurie

Frage

Ein 48-jähriger Patient, 88 kg, 175 cm, musste wegen einer respiratorischen Insuffizienz bei bilateraler Pneumonie intubiert werden. Aus der Blutkultur wurden Klebsiella spp. gezüchtet. Der Patient ist analgosediert und wird druckkontrolliert beatmet. Der MAP (arterielle Mitteldruck) beträgt 65 mm Hg, die Herzfrequenz 108/min und der ZVD (zentralvenöser Druck) 12 mm Hg nach insgesamt 4500 ml Elomel unter steigendem Noradrenalinbedarf mit einer aktuellen Infusionsrate von 1,2 µg/kg/min. Das Serum-Laktat ist seit 4 Stunden leicht ansteigend und betrug zuletzt 32 mg/dl. Die ScvO₂ (zentralvenöse Sättigung) beträgt 63 % bei einer SaO₂ (arteriellen Sauerstoffsättigung) von 95 %. Der gemessene Herzindex (mittels PiCCO₂) beträgt 3,8 L/min/m² und die Hämoglobinkonzentration (Hb) 8,0 g/dl. Welche Maßnahme sollte man als Nächstes setzen?

A) Verabreichung von 20 % Albumin

Frage 977 · Seite 276 · MCQ (Multiple Answers)

Welche Aussage zu Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern ist richtig?

- ✓ A) Herzrhythmusstörungen sind häufige Ursachen für Aufnahmen in

Frage

Bild auf Seite 277 im Original-PDF vorhanden

Was ist die häufigste Ätiologie einer Sepsis?

- A) Pankreatitis

Frage

Welche Aussage zum plötzlichen Herztod trifft AM WENIGSTEN zu?

- A) Die Inzidenz des plötzlichen Herztodes ist vom Alter abhängig.

Frage

Für welche der genannten Diagnosen ist Morgensteifigkeit ein typisches Symptom?

- A) Coxarthrose

Frage

Bild auf Seite 279 im Original-PDF vorhanden

Was erkennen Sie auf dem vorliegenden EKG?

- A) Hinterwandinfarkt PI

Frage

Ein 30-jähriger Schifahrer wird nach einem Sturz in die Ambulanz eingeliefert. Sie finden einen erkälteten Mann vor, welcher über thorakale Schmerzen und Atemnot klagt und als Ursache für den Sturz ein 'Schwarzwerden vor den Augen' angibt. Welche der folgenden Diagnosen ist am wahrscheinlichsten?

- A) Lungenembolie

Frage

Was sind die häufigsten Pathogene für die Entstehung von Sepsis?

- A) Hefepilze

Frage

Die therapeutischen Empfehlungen für die Behandlung der ambulant erworbenen Pneumonien richten sich nach der Schwere der Erkrankung. Manche PatientInnen müssen dabei direkt auf die Intensivstation aufgenommen werden. Welche der vorgeschlagenen Therapien sollte ein Patient/eine Patientin ohne bekannte Risikofaktoren für resistente Erreger unbedingt erhalten, um die Mortalitätswahrscheinlichkeit zu reduzieren?

- A) Vancomycin plus Aminoglykosid

Frage

Wie hoch ist die Prävalenz der Aortenklappenstenose in der Altersgruppe der über 75-Jährigen?

- A) 0,5 - 1 %

Frage 991 · Seite 281 · MCQ (No Bold - Manual Review)

Wie werden die angeführten Medikamente therapeutisch entsprechend den geltenden Richtlinien eingesetzt?

A) Koronare Herzerkrankung

Frage

Wer kommt für Stammzellspende in Frage?

A) Jeder mündige Erwachsene ab dem Alter von mind. 21 Jahren, MHC

Frage

Welches Protein lagert sich bei der chronisch entzündlichen Amyloidose ab?

A) Beta-Microglobulin

Frage

Ein Patient liegt seit 1 Stunde mit Herzinfarktsymptomatik in einem peripheren Krankenhaus, das mindestens 3 Stunden von einem Herzzentrum entfernt ist. Im Elektrokardiogramm (EKG) zeigt sich ein Linksschenkelblock. Eine Besserung auf Nitrate konnte nicht erreicht werden. Was tun Sie?

A) D-Dimer und Troponin bestimmen und dann entscheiden.

Frage

Welche Chemotherapie zeigt bei Patienten mit Weichteilsarkom das beste Ansprechen?

A) Melphalan

Frage

Welches Arzneimittel sollte zuerst Linientherapie der symptomatischen Angina pectoris am ehesten verordnet werden?

✓ **A) Bisoprolol**

Frage

Welche Aussage zum plötzlichen Herztod trifft am ehesten zu?

A) Nicht-ischämische Kardiomyopathien sind die häufigste Ursache für den plötzlichen

Frage

Was sind die häufigsten Pathogene für die Entstehung von Sepsis?

A) Hefepilze

Frage

Welche Antibiotika werden zur Bekämpfung der Clostridium difficile-Infektion eingesetzt?

A) Ciprofloxacin

Frage

Welcher Laborbefund ist NICHT typisch für eine Sepsis?

A) D-Dimererhöhung (> 500 µU/L)

Frage

Ein 37-jähriger Patient ohne wesentliche Vorerkrankungen präsentiert sich mit seit 24 Stunden bestehendem hohem Fieber sowie Husten. In der Auskultation finden sich für Pneumonie verdächtige Rasselgeräusche im rechten Unterfeld, im Thorax- Röntgen bestätigt sich der Verdacht auf einer Lobärpneumonie, im Labor zeigen sich eine Leukozytose und massiv erhöhtes CRP (30-fach über dem Normalwert). Was ist der wahrscheinlichste Erreger dieser Pneumonie?

A) Escherichia coli

Frage 1002 · Seite 284 · MCQ (Single Answer)

Was sind die häufigsten Pathogene für die Entstehung von Sepsis?

✓ **A) Grampositive Bakterien**

Frage

Welche Aussage zu Formen der Herzinsuffizienz ist richtig?

A) Die systolische Funktionsstörung wird durch eine Füllungsstörung des Herzens

Frage

Durch welche Erkrankung kann es zu einer sekundär neurogen orthostatische Hypotonie kommen?

A) Nierenarterienstenose

Frage

Herr Müller ist 80 Jahre alt, hat einen Leistenbruch und soll deshalb operiert werden. Er gibt keine kardialen Beschwerden an. Wanderungen von circa 2-3 Stunden Dauer sind möglich. Im Rahmen der präoperativen klinischen Untersuchungen fällt ein 3/6 holosystolisches, spindelförmiges Herzgeräusch auf. Welche Aussage/n ist/sind richtig, welche falsch?

A) Der geplante operative Eingriff hat ein hohes kardiales Operationsrisiko

Frage

Was ist unter den genannten Entitäten die häufigste Einzeltodesursache der westlichen Welt?

A) Suizid

Frage

Durch welche Beschwerden manifestieren sich Vorhofseptumdefekte typischerweise im Erwachsenenalter?

A) Angina pectoris

Frage

Ab welchem Durchmesser besteht eine Verschlussindikation bei Vorhofseptumdefekt (ASD)?

A) > 2 cm

Frage

Was zeigt ein typisches EKG (Elektrokardiogramm) bei einem ASD (Vorhofseptumdefekt)?

A) hohe P-Wellen

Frage

Welche Aussage zum plötzlichen Herztod trifft am WENIGSTEN zu?

A) Nicht-ischämische Kardiomyopathien sind für rund 15% aller Fälle eines plötzlichen

Frage

Ein 55-jähriger Patient wird in hämodynamisch und respiratorisch stabilem Zustand mit dem Verdacht auf einen Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt (NSTEMI) in der Notaufnahme vorstellig. Welche der Maßnahmen ist AM WENIGSTEN indiziert?

A) Monitorisierung

Frage 1010 · Seite 287 · Matching (No Bold - Manual Review)

Sie werden als Notarzt zu einem 68-jährigen Patienten wegen akuter Atemnot gerufen. Es besteht ein Zustand nach Myokardinfarkt vor 2 Jahren. Der Patient ist kaltschweißig, er hat einen arteriellen Blutdruck von 85/50 mmHg und einen rhythmischen Puls von 150/min. Im Notfall EKG finden Sie eine rhythmische Breitenkomplextachykardie. Ordnen Sie die folgenden Aussagen als 'richtig' oder 'falsch' zu:

A) Verdachtsdiagnose ventrikuläre Tachykardie

Frage

Sie befragen eine 50-jährige Patientin in der Ambulanz nach den klassischen Risikofaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung. Welche der folgenden Angaben der Patientin ist definitionsgemäß KEIN klassischer Risikofaktor?

A) Rauchen von 10 Zigaretten/Tag und Jahr seit 20 Jahren

Frage

Welche Aussage zur akuten Tracheobronchitis ist FALSCH?

A) Auskultatorisch lässt sich häufig ein verlängertes Expirium feststellen.

Frage

Endokarditis Verdacht, welche Aussage trifft zu:

A) Bei einer unauffälligen TTE kann eine Endocarditis ausgeschlossen werden

Frage

Ein Kind wird nach Sturz auf den Kopf auf die Intensivstation aufgenommen, nach ein paar Tagen bemerken Sie als behandelnder Arzt eine Hyperkapnie im arteriellen Astrup. Das Kind wird augenscheinlich hypoventiliert. Welche Aussage trifft zu?

A) Vasokonstriktion → verminderter extracerebraler Blutfluss → vermehrter

Frage

Frau Meindl, eine 39-jährige Patientin, wird bei ihrem Hausarzt auf Grund von undulierenden Fieberschüben vorgestellt. Diese bestehen seit circa 10 Tagen. In der klinischen Untersuchung fällt ein neu aufgetretenes Systolikum auf. Der Hausarzt stellt daher welche Verdachtsdiagnose?

A) eine Aortenisthmusstenose

Frage

Was ist das Mittel der Wahl bei Patienten mit schwerer Clostridium-difficile- assoziierter Diarrhoe?

A) Chinolon der 3. Generatio

Frage

Welcher Gerinnungsfaktor wird x-chromosomal vererbt ?

A) von-Willebrand-Fakto

Frage

Welche Aussage zum Management von Vorhofflimmern ist richtig?

A) Vitamin-K-Antagonisten haben weniger zerebrale Blutungskomplikationen als direkte

Frage 1019 · Seite 289 · MCQ (Single Answer)

Es gibt einige Risikofaktoren, welche die Wahrscheinlichkeit auf das Vorhandensein einer Infektion mit einem multiresistenten Erreger im Rahmen einer Urosepsis erhöhen. Welcher Faktor gehört NICHT dazu?

A) Patientenalter

Frage

Welches der folgenden Symptome charakterisiert am ehesten eine typische Angina pectoris?

A) Bewegungsabhängiger Brustschmerz

Frage

Wie lange gilt das Autofahrverbot für Patienten nach ICD-Implantation als Sekundärprävention?

A) 24 Monate

Frage

Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe ist eine der häufigsten nosokomial erworbenen Infektionen. Welche Aussage zur Clostridium difficile assoziierten Diarrhoe ist FALSCH?

A) Metronidazol oder Vancomycin (oral) sind Mittel der Wahl zur Behandlung der leichten

Frage

Wie werden die angeführten Medikamente therapeutisch entsprechend den geltenden Richtlinien eingesetzt?

A) Herzinsuffizienz

Frage

Ablation bei Vorhofflimmern Was ist das Therapieziel?

A) Verschluss linkes Herzohr

Frage

Ein 73-jähriger Mann mit gelegentlichen pektangiosen Beschwerden erlitt beim Wandern eine plötzliche Bewusstlosigkeit mit Sturz auf die rechte Körperhälfte. Bei Klinikaufnahme bestanden keine retrograde Amnese und kein Hinweis auf einen zerebralen Krampfanfall. RR 140/70mmHg, Puls rhythmisch 89/min, spindelförmiges raues Systolikum der Intensität 4/6 mit p. max. über 2. ICR rechts, Lunge physikalisch frei. Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

A) Lungenarterienembolie

Frage

Die Riesenzellarteritis umfasst nicht nur die Temporalarteritis. Welche diagnostischen Maßnahmen werden zur Diagnostik empfohlen?

A) High resolution-Techne-99m-Tc-Szintigraphie

Frage

Blutungen großflächig in Haut, Weichteile, Gelenke?

✓ **A) von Willebrand Syndrom**

Frage 1029 · Seite 291 · MCQ (Single Answer)

Sie sind Aufnahmearzt in einem kleineren Krankenhaus. Es wird ein 47-jähriger Mann mit seit 1 Stunde andauerndem akuten Thoraxschmerz, starkem Schwitzen und Übelkeit sowie Atemnot eingeliefert. Im EKG zeigt sich ein Linksschenkelblock. Nitrolinguaspray führt zu keiner Besserung der Beschwerden. Aufgrund der Wettersituation ist ein rascher Transfer in das nächste Zentralkrankenhaus nur bodengebunden möglich (erwartete Transferzeit ca. drei Stunden). Was ist von den genannten Maßnahmen die zielführendste?

A) Thoraxröntgen und danach entscheiden

Frage

Bei einem Patienten mit Verdacht auf Endokarditis wurde eine Blutkultur angelegt und der Erreger bestimmt. Es handelt sich um Staphylococcus aureus. Welches Antibiotikum wenden sie NICHT an?

A) Cefazolin

Frage

Welches Herzklappenvitium stellt bei Erwachsenen die häufigste Indikation zur Klappenintervention dar?

A) Mitralklappenstenose

Frage

Welche Untersuchungsmodalität ist der Goldstandard in der Beurteilung einer Aortenklappenstenose?

A) Auskultation

Frage

Welches Verfahren ist der Goldstandard in der Beurteilung einer koronaren Herzkrankheit (KHK)?

A) Dobutamin-Stress-Echokardiographie

Frage

Welche Antibiotikaklasse verwenden Sie zur empirischen Therapie bei Nativklappenendokarditis?

✓ **A) Aminopenicilline (+BLI)**

Frage

Welche Aussage zur Nierenarterienstenose ist richtig?

A) Tritt sie in jungen Jahren (20-30) auf, ist meist eine Atherosklerose auslösender

Frage

Bei welchem Herzfehler sollte von einer Schwangerschaft abgeraten werden?

A) operativ korrigierte Fallot Tetralogie

Frage

Welche Medikamente wirken bei der KHK prognoseverbessernd und welche sind symptomlindernd?

A) Prognoseverbessernd

Frage

Welche der genannten Therapien ist zur medikamentösen Erstlinientherapie bei Patientinnen mit chronischer Herzinsuffizienz und reduziert der systolische linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFrEF) am sinnvollsten?

A) Acetylsalicylsäure-Monotherapie

Frage 1044 · Seite 295 · MCQ (Single Answer)

Was ist die Methode der Wahl zum Nachweis einer Endokarditis?

✓ A) Echokardiographie

Frage

Was sind wichtig zu klärende Fragen bei einer 30-jährigen Frau mit Beckenschmerzen?

A) Richtig

Frage

Was ist KEIN Kriterium zur Risikostratifizierung hinsichtlich eines plötzlichen Herztodes bei einer hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie?

A) Maximale linksventrikuläre Wandstärke

Frage

Welcher Steroiddosis wird für den therapierefraktären septischen Schock empfohlen?

✓ A) Hydrocortison 200 mg/d

Frage

Welches Arzneimittel sollte zur Erstlinientherapie der symptomatischen Angina pectoris am ehesten verordnet werden?

A) Verapamil

Frage

Welche der folgenden Aussagen zur Legionellen-Pneumonie ist/sind richtig, welche falsch?

A) Bei Legionellen-Pneumonien findet sich häufig eine Hyponatriämie; bis zu 50 % der

Frage

Welches der beim Herz-Kreislaufstillstand differentialdiagnostischen 'H' gehört NICHT zu den klassischen 4 H der Reanimatologie?

A) Hypovolämie

Frage

Welche Untersuchungsmodalität dient der Diagnostik bei axialer Spondyloarthritis in frühem Stadium?

A) Sonografie

Frage

Herr Meyer ist 79 Jahre alt, hat einen Leistenbruch und soll deshalb operiert werden. Er hat keine kardialen Beschwerden. Wanderungen von ca. 2 bis 3 Stunden Dauer sind ohne Probleme möglich. Im Rahmen der präoperativen Untersuchung fällt ein Systolikum auf. Welche Aussagen sind richtig bzw. falsch?

A) Der geplante operative Eingriff hat ein hohes kardiales Operationsrisiko.

Frage

Was ist sehr UNTYPISCH für eine Anamnese bei Patient*innen mit aggressivem Lymphom?

A) vergrößerte tastbare Lymphknoten

Frage 1056 · Seite 298 · MCQ (Single Answer)

Welche Aussage zum perioperativen Management von kardialen Medikamenten ist richtig?

✓ **A) Die bestehende Therapie mit Betablockern soll perioperativ fortgeführt werden.**

Frage

Wann sollte ein ASD verschlossen werden?

A) Eisenmenger

Frage

Bei welchen Herzkrankheiten / congenitalen Vitien ist von einer geplanten Schwangerschaft abzuraten?

A) Richtig

Frage

Zu Ihnen kommt ein Patient mit Rückenschmerzen. Wie sind seine Befunde zuzuordnen?

A) entzündlich

Frage

Welche Gelenke sind bei der rheumatoiden Arthritis vor allem betroffen?

✓ **A) Die Metacarpophalangealgelenke und die proximalen Interphalangealgelenke**

Frage

Welche/s der folgenden klinischen Symptome passt/passen zu Harnwegsinfekten und welche/s nicht?

A) Polyurie

Frage

Wann ist eine Abklärung der Kardiovaskuläre-Risikofaktoren indiziert?

A) Rheumatoide Arthritis

Frage

Welches der angeführten Herzklappenvitien hat das höchste Operationsrisiko für nicht-kardiale Operationen?

✓ **A) Aortenklappeninsuffizienz Grad III**

Frage

Welche der angeführten Vitien haben ein hohes Risiko für ventrikuläre Rhythmusstörungen und somit den plötzlichen Herztod?

A) hochgradige Mitralklappeninsuffizienzen

Frage

Herr Müller ist 80 Jahre alt, hat einen Leistenbruch und soll deshalb operiert werden. Er gibt keine kardialen Beschwerden an. Wanderungen von ca. 2 bis 3 Stunden Dauer sind möglich. Im Rahmen der präoperativen klinischen Untersuchung fällt ein 3/6 holosystolisches, spindelförmiges Herzgeräusch auf. Welche Aussage/n ist/sind richtig, welche falsch?

A) Ohne Herzkatheteruntersuchung ist eine Operationsfreigabe unmöglich.

Frage 1069 · Seite 301 · MCQ (Single Answer)

Welche Patientengruppe profitiert am ehesten von der interventionellen Behandlung einer Mitralklappeninsuffizienz (MI) im Vergleich zu einem operativen Klappenersatz?

A) Patienten mit niedrigem operativen Risiko und mit geringgradiger MI

Frage

Wann muss bei einem asymptomatischen Harnwegsinfekt (HWI) mit Bakteriurie NICHT antibiotisch therapiert werden?

A) Bei Patienten mit Diabetes mellitus.

Frage

Welche Substanzklasse, die in der Diabetesbehandlung eingesetzt wird, kommt auch zunehmend in der Herzinsuffizienz-Therapie zur Anwendung, da damit eine Mortalitätsreduktion erreicht werden kann?

A) Glinide

Frage

Ein 65-jähriger Patient wird wegen seit einigen Wochen progredienter Belastungsdyspnoe ärztlich vorstellig. Welcher der folgenden laborchemischen Parameter ist zum Ausschluss einer kardialen Ursache der Beschwerden am ehesten geeignet?

A) Myoglobin

Frage

Was trifft auf Vorhofflimmern zu und was nicht?

A) richtig

Frage

Welche Aussage/n zur Mykoplasmen-Pneumonie ist/sind richtig und welche falsch?

A) Das typische Bild der Mykoplasmeninfektion ist die Lobärpneumonie mit hohen

Frage

Welche vasoaktive Substanz ist Mittel der Wahl im septischen Schock?

A) Dobutamin

Frage

Welches Klappenvitium hat unter den genannten die höchste Prävalenz in der Altersgruppe der über 75-jährigen?

✓ **A) Mitralklappeninsuffizienz**