

As aventuras de Alice no país das convergências;  
ou,  
Meu depoimento de Topologia Geral

© 2025 por Renan M. Mezabarba<sup>†</sup>

Última atualização: 19 de dezembro de 2025.

<sup>†</sup>Copyright © 2025 de Renan Maneli Mezabarba. Autorizo reprodução e distribuição do texto para fins não-lucrativos desde que a autoria seja citada. Sugestões, correções, etc. podem ser enviadas para (preferencialmente) <rmmezabarba@gmail.com> ou <rmmezabarba@uesc.br>.



DRAFT (RMM 2025)

*I knew who I was this morning, but I've changed a few times since then<sup>†</sup>.*

Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*, 1865.

---

<sup>†</sup>Eu sabia quem eu era de manhã, mas desde então já mudei algumas vezes.



# Sumário

## **Prefácio** p. 9

## **1 Pela toca do coelho** p. 13

### **1.1 Essencial: métricas, sequências e topologias**

#### **1.1.1 Da reta à convergência uniforme** p. 13

#### **1.1.2 Métricas não bastam** p. 16

#### **1.1.3 A topologia de um espaço métrico** p. 20

#### **1.1.4 Sequências não bastam** p. 24

#### **1.1.5 Exercícios adicionais** p. 27

### **1.2 Extras**

#### **1.2.1 Normas e produtos internos** p. 28

#### **1.2.2 Ordens e ordinais** p. 32

#### **1.2.3 A linguagem de categorias: funtores** p. 38

#### **1.2.4 Exercícios adicionais** p. 46

## **2 A lagoa de lágrimas** p. 49

### **2.1 Essencial: convergência em espaços topológicos**

#### **2.1.1 Como generalizar sequências** p. 49

§1 Um mínimo sobre redes p. 50, §2 Um mínimo sobre filtros p. 53, §3 Redes ou filtros convergentes? p. 57, §4 A condição de Hausdorff p. 58, §5 Comparação de topologias (e subespaços) p. 61, §6 Exercícios adicionais p. 62

#### **2.1.2 Como “evitar” redes e filtros** p. 63

§1 Aderência e interior p. 64, §2 Bases locais e o primeiro axioma de enumerabilidade p. 69, §3 Bases “globais” e o segundo axioma de enumerabilidade p. 75, §4 Topologias fracas e produtos p. 79, §5 Exercícios adicionais p. 84

### **2.2 Extras**

#### **2.2.1 Revisão: produtos generalizados e uplas** p. 88

#### **2.2.2 A linguagem de categorias: objetos universais e dualidade** p. 90

#### **2.2.3 Um pouco mais sobre filtros** p. 93

§1 O que filtros filtram? p. 94, §2 Ordenando filtros p. 95, §3 Filtros maximais p. 96, §4 Filtros sobre ordens e o Teorema de Rasiowa-Sikorski p. 100, §5 Exercícios adicionais p. 102

#### **2.2.4 Manipulação das redes** p. 103

§1 Sincronização de domínios p. 103, §2 Misturas e colagens p. 104, §3 Redes de redes p. 106

2.2.5	<b>Álgebra Topológica: primeiros contatos</b>	p. 110
	§1 Grupos topológicos p. 110, §2 Anéis topológicos p. 116, §3 Corpos e espaços vetoriais topológicos p. 121, §4 Exercícios adicionais p. 125	
2.2.6	<b>Topologias fracas em Análise Funcional</b>	p. 128
	§1 Seminormas e convexidade local p. 128, §2 Dualidades e as topologias fraca e fraca-estrela p. 131, §3 Exercícios adicionais p. 131	
2.2.7	<b>A topologia de Zariski</b>	p. 131
3	<b>Uma corrida em comitê e...</b>	p. 133
3.1	<b>Essencial:... uma história compacta</b>	
3.1.1	<b>Principais manifestações topológicas</b>	p. 133
	§1 Coberturas abertas e famílias de fechados p. 134, §2 Projeções fechadas e tubos p. 139, §3 Ultrafiltros e compacidade p. 141, §4 Sub-redes e compacidade p. 144	
3.1.2	<b>O Teorema de Tychonoff: algumas demonstrações</b>	p. 147
	§1 Duas provas via coberturas abertas p. 148, §2 Uma prova com projeções p. 153, §3 A demonstração com ultrafiltros p. 154, §4 Uma prova com redes p. 154	
3.1.3	<b>Compacidade em espaços métricos</b>	p. 156
	§1 As caracterizações tradicionais p. 156, §2 O caso normado e o Lema de Riesz p. 160	
3.1.4	<b>Compacidade local</b>	p. 162
3.1.5	<b>Exercícios adicionais</b>	p. 162
3.2	<b>Extras</b>	
3.2.1	<b>Espaços de Lindelöf e sigma-compactos</b>	p. 165
3.2.2	<b>Álgebra Topológica: compacidade</b>	p. 165
3.2.3	<b>Compactos em Análise Funcional</b>	p. 165
	§1 O Teorema de Arzelà-Ascoli p. 165, §2 O Teorema de Banach-Alaoglu p. 165, §3 O Teorema de Eberlein-Šmulian p. 165	
3.2.4	<b>Compacidade em Teoria de Modelos</b>	p. 165
3.2.5	<b>Manifestações do Lema do Ultrafiltro</b>	p. 165
4	<b>Bill paga o pato</b>	p. 167
4.1	<b>Essencial: mais propriedades topológicas</b>	
4.1.1	<b>Homeomorfismos</b>	p. 167
	§1 Exercícios adicionais p. 167	
4.1.2	<b>Axiomas de separação</b>	p. 167
4.1.3	<b>Conexidade</b>	p. 167
4.1.4	<b>Compactificações</b>	p. 167
4.2	<b>Extras</b>	
4.2.1	<b>Paracompacidade e metrizabilidade</b>	p. 167
4.2.2	<b>Os racionais e o Conjunto de Cantor</b>	p. 167
4.2.3	<b>Completude no sentido de Čech</b>	p. 167
4.2.4	<b>Topologia Conjuntista?!</b>	p. 168
	§1 Compacidade avançada p. 168, §2 Funções cardinais p. 168	

5	Conselho de uma Lagarta	p. 169
5.1	Essencial: gastronomia topológica	
5.1.1	Topologias fortes	p. 169
5.1.2	Coprodutos	p. 169
5.1.3	Quocientes	p. 169
5.2	Extras	
5.2.1	Limites e colimites	p. 169
5.2.2	Espaços pró-finitos	p. 169
6	Porco e pimenta	p. 171
6.1	Essencial: espaços uniformes	
6.2	Extras	
6.2.1	Completamento de espaços uniformes	p. 171
6.2.2	A integral de Haar	p. 171
6.2.3	A reta real revisitada	p. 171
6.2.4	A integral de Lebesgue	p. 171
7	Um chá maluco	p. 173
7.1	Essencial: espaços de funções	
7.2	Extras	
7.2.1	A convergência contínua	p. 173
8	O campo de croqué da Rainha	p. 175
8.1	<i>Extravaganza</i> das convergências	
8.2	A convergência uniforme como você nunca viu	
9	A história da Tartaruga Falsa	p. 177
9.1	Essencial: um pouco de Topologia Algébrica	
9.2	Extras	
10	A Quadrilha da Lagosta	p. 179
10.1	Essencial: categorias topológicas	
10.2	Extras	
11	Quem roubou as tortas?	p. 181
11.1	Essencial: topologia sem pontos	
11.2	Extras	

## **12 O depoimento de Alice** p. 183

### **12.1 Alguns exercícios**

#### **12.1.1 (\*)** p. 183

**Cap. 1** p. 183, **Cap. 2** p. 184

#### **12.1.2 (\*\*)** p. 184

**Cap. 1** p. 184

#### **12.1.3 (\*\*\*)** p. 187

**Cap. 1** p. 187, **Cap. 2** p. 187

### **12.2 Verificações diversas ao longo do texto**

#### **12.2.1 (\*)** p. 188

**Cap. 1** p. 188, **Cap. 2** p. 188

#### **12.2.2 (\*\*)** p. 189

**Cap. 1** p. 189

#### **12.2.3 (\*\*\*)** p. 190

**Cap. 1** p. 190, **Cap. 2** p. 191

### **12.3 Outras sugestões**

**Lista de símbolos e siglas** p. 195

**Referências Bibliográficas** p. 199

**Índice Remissivo** p. 201



# Prefácio

Como muitas pessoas parecem ignorar prefácios em livros de Matemática, tentarei ser bastante breve. Conseguirei? Não<sup>†</sup>. Em contrapartida, *você*<sup>‡</sup> provavelmente não o lerá, então estamos quites.

O presente texto é fruto da reestruturação de um manuscrito não publicado, *Fundamentos de Topologia Geral* [20], cuja redação se estendeu por tanto tempo (2017 –  $\infty$ ) que, ao *final*, percebi não ser mais a mesma pessoa de quando comecei a escrevê-lo. Parte dessa metamorfose vem do fato de que redigir esses “manuais” é, entre outras coisas, meu método de estudo favorito — e aprender acarreta transformação<sup>††</sup>. Outro motivo foi a docência, que me permitiu conhecer melhor o público potencial e perceber que, na prática, meu manuscrito original parecia mais um caderno pessoal de receitas. O último motivo pode ter sido a vida, que me tornou mais pragmático com as notações.

Mas vamos ao que interessa: o que você encontrará aqui?

Primeiro, convém explicar que os títulos dos capítulos (e do próprio livro) são referências diretas a “Alice no País das Maravilhas”<sup>‡‡</sup>. Péssima ideia, eu sei. Ainda assim, seguir essa estrutura narrativa me obrigou a apresentar as ideias de modo mais convidativo a princípio (“Oh! Veja só um Coelho Branco correndo com um relógio!”) para, depois de conquistar a curiosidade, revelar o verdadeiro pano de fundo (“Você já percebeu como a sociedade é arbitrária e caótica?”).

Aqui, o Coelho Branco será a noção de *convergência*, mas não se assuste: *ela* não será apresentada desde o princípio de forma abstrata e idealista por meio de *filtros* e *redes*, como em [20], mas de modo modesto e quase tradicional, dentro de um contexto *metrizável*. Armadilha? ~~Óbvio~~ Talvez. Mas foi a maneira menos traumática que encontrei para promover o uso de convergência *fora* do contexto métrico, o tipo de coisa que eu mais gosto de fazer (em Matemática). Eu não conseguiria escrever este texto de outra forma. Afinal, parafraseando o Professor Elon Lages Lima em seu *Elementos de Topologia Geral*, “este livro constitui meu depoimento pessoal sobre que Topologia Geral gostaria que fosse sabida por todos os matemáticos” e, devo acrescentar, matemáticas.

É claro que essa estrutura narrativa poderia ser empregada sem referências explícitas à obra de Lewis Carroll, mas o resultado ficaria esteticamente menos interessante. Assim, para compensar o caos oriundo da minha futilidade e tornar o trabalho simultaneamente *navegável* e útil (tanto para estudantes independentes quanto para docentes sem tempo), cada capítulo tem duas partes excessivamente organizadas.

---

<sup>†</sup>Esta obra é contraindicada para pessoas com intolerância a sarcasmo, ironia ou notas de rodapé.

<sup>‡</sup>Esta é a forma que encontrei de escrever sem assumir o gênero de quem lê.

<sup>††</sup>Como já diria Heráclito, *ninguém prova duas vezes o mesmo teorema*.

<sup>‡‡</sup>De Lewis Carroll, segundo a tradução de Maria Luiza X. Borges, de 2013, pela editora Zahar. Há também uma referência indireta a “Frankenstein; ou, O Prometeu Moderno”, de Mary Shelley.

A primeira parte, **Essencial**, reúne os tópicos que considero *essenciais* para um curso *intenso* de Topologia Geral destinado a *pessoas familiarizadas com Matemática Abstrata*, distribuídos linearmente em *ordem de urgência*. Diversas (sub) seções podem ser omitidas para uma versão *menos intensa*. Se for o seu caso, os títulos (quase) autoexplicativos das (sub(sub...)) seções devem ajudar na escolha do que omitir. E não se preocupe: como eu já aprendi a usar `\label` e `\ref`, você saberá para onde ir caso perca algum pré-requisito menos óbvio pelo caminho. Por sua vez, a segunda parte, **Extras**, traz discussões adicionais que considero importantes, embora menos urgentes. Elas vão desde revisões de alguns pré-requisitos até aprofundamentos dos tópicos essenciais tratados nos capítulos correspondentes. Use-as como preferir.

Para navegar por esse emaranhado de subseções, é importante saber nadar... por precaução. Explicitamente, assume-se que você tenha (alguma) familiaridade com teoremas e exemplos clássicos de Análise Real, pois isso pressupõe que você saiba o que são *grupos*, *anéis* e *corpos*, *espaços vetoriais*, *morfismos entre essas estruturas*, relações de *ordem* e de *equivalência*, além de não ter medo de Teoria (Axiomática) dos Conjuntos. Essa exigência não visa apenas os aspectos operacionais, mas também as questões *psicológicas*: quem cumpre esse pré-requisito já teve seu primeiro contato com as noções de convergência em cenários mais amigáveis, o que diminui o trauma ao reencontrá-las em situações hostis. Por outro lado, *em teoria*, é *possível* acompanhar o texto sem ter feito um curso de Análise, mas isto demandará bem mais resiliência de quem tentar.

Agora, independentemente de sua bagagem, fica o pedido: não *ignore* os exercícios! Estes estão distribuídos ao longo de todo o texto, classificados em três grandes classes<sup>†</sup> descritas a seguir.

- (★) Verificações que, na prática, dependem apenas dos pré-requisitos. É possível que você já tenha visto muitos dos exercícios nesta classe, ou que consiga resolvê-los mentalmente, de modo *contemplativo* e quase automático. Quando for este o caso, você *pode* avançar sem grandes preocupações — mas faça isso por sua conta e risco.
- (\*) Problemas que envolvem assuntos fora do escopo dos pré-requisitos. Consistem na adaptação de argumentos previamente apresentados ou supostamente conhecidos. Se for o seu primeiro contato com o assunto, não os evite — mas se algum deles parecer muito difícil, avance e retorne depois de um tempo.
- (\*\*\*) As questões deste grupo são *epistemologicamente* mais complexas do que as anteriores pois suas soluções não dependem apenas de técnicas previamente apresentadas, mas sobretudo de sua *disposição* para perceber padrões implícitos. Elas tendem a se tornar triviais após a introdução de algum conceito numa seção posterior do material. Não se preocupe caso não consiga resolver algumas delas (ou todas) — mas não perca a oportunidade de se divertir tentando.

Você também encontrará diversas perguntas do tipo “(por quê?)★”, “(certo?!)\*”, ... distribuídas ao longo do texto, bem como pedidos da forma “(verifique!)\*”, “(perceba!)\*”, etc. Estas passagens visam escancarar que você *deveria*, pelo menos, refletir sobre as perguntas antes de avançar, afinal de contas, não se estuda Matemática como se lê um romance. Trate tais intervenções como exercícios, por gentileza.

---

<sup>†</sup>Há mais variações, como ★/n com  $n \geq 2$ , para exercícios *ridiculamente fáceis*, ou ★<sup>n</sup> com  $n \geq 4$ , para exercícios *ridiculamente difíceis*, mas estas são bem menos frequentes. Em tempo: a classificação é subjetiva e depende apenas do meu julgamento. Você é livre para julgar os exercícios fáceis como difíceis, e vice-versa.

Alguns avisos finais.

- O objetivo deste texto não é te ensinar *tudo* sobre espaços métricos<sup>†</sup>. Aqui você encontrará um mínimo sobre espaços métricos, o que espero ser suficiente para que você tenha um bom curso de Topologia Geral.
- O objetivo deste texto não é te ensinar *tudo* sobre Análise Funcional. Aqui você encontrará um mínimo do assunto, o que espero ser suficiente para motivar e contextualizar alguns resultados importantes de Topologia Geral.
- O objetivo deste texto não é te ensinar *tudo* sobre... acho que já deu para entender.

Com isso dito, é importante destacar que o objetivo deste texto também não é te ensinar *tudo* sobre Topologia Geral: na melhor das hipóteses, essa é uma tentativa de *transmitir* o máximo possível do pouco que eu aprendi. Apesar disso, espero que seja material suficiente para te convencer do quão maravilhoso pode ser estudar Topologia Geral.

Por fim, os agradecimentos — que se referem tanto ao presente material quanto ao apócrifo [20]. No universo das coisas que não atrapalharam, destaca-se uma lista importante de elementos *maximais* que me ajudaram, direta ou indiretamente, na dolorosa (re) redação deste texto.

- Minha família, pois para escrever é preciso existir<sup>‡</sup>.
- As professoras Lúcia Junqueira e Ofélia Alas, por existirem e serem quem são.
- Os professores Marcelo Dias Passos e Rodrigo Roque Dias, que de certa forma foram os responsáveis por eu escolher esta área.
- Os professores Alexandre/“Sasha” Ananin (*in memoriam*), Carlos Grossi, Eduardo Tengan, Leandro Aurichi e Samuel Gomes da Silva, pela inspiração literária.
- Minhas primeiras cobaias, dentre as quais destaco: Alex Pereira, Galvão e Leonardo Cavenaghi — além da minha *leitora constante*, Pryscilla Silva<sup>††</sup>. A leitura cuidadosa de Caio “*the evil*” Oliveira, nas primeiras etapas da redação, merece atenção especial, bem como uma pontuação adequada. :)
- A falta de juízo e coragem de Gisele Paula, que usou parte deste material com (pelo menos) uma de suas turmas de Topologia Geral na UFPR — seus comentários me levaram a reformular o apócrifo [20], o que contribuiu indiretamente para a publicação de [21]. Aproveito para registrar minhas desculpas para com a turma.
- Thales Paiva, meu consultor especial de Topologia Algébrica (e amigo de longa data).
- *Meus* estudantes da UFES (sob o risco de cometer injustiças, não posso deixar de mencionar Fabíola Loterio, João Perim, Lucca Dias e Pedro Schineider).

---

<sup>†</sup>Em particular, não espere por *muitos* exercícios básicos ou discussões sobre noções topológicas elementares restritas à reta real. A suposição de que você já sabe o mínimo de Análise Real será levada à sério. Embora isso possa ter como efeito colateral o *gatekeeping*, quero apenas manter o número de páginas abaixo de  $\aleph_0$ .

<sup>‡</sup>Exceto para divindades e outras entidades fictícias, como Bourbaki e Stephen King, respectivamente.

<sup>††</sup>Não só por isso (ಠ\_ಠ)

- A *turma* da disciplina Topologia II (de 2023), ministrada na UESC, composta por João Santos, Gabriel França, Hellen Pinheiro, Lucas Brasil, Rodrigo Monteiro e Thiago Castro — além do sempre entusiasmado Prof. Germán Ferrer. Esse foi o estopim para que eu aceitasse os espaços de convergência como parte oficial dos meus interesses acadêmicos. A turma de 2025, composta por Samilla Santana e Ismar Santos, também me ajudou a consolidar diversas ideias.
- Artur Tomita, Brenno Barbosa, Hugo (tanto o Botós quanto o Ribeiro), Ivo Terek, Júlio Barcyszyn, Luiz Felipe Garcia, Marcos Mercandeli Rodrigues, Pedro Pimenta e Victor Ronchim — por incentivarem esta loucura todas as vezes em que toquei no assunto.
- O professor Eric Schechter, por ter escrito o *HAF* [30].
- O teorista de tipos Varkor, por ter criado o *quiver*<sup>†</sup>.
- Thiago Dourado, pelas enfáticas palavras de incentivo após a publicação de [21]: elas foram um dos principais combustíveis para a reestruturação deste trabalho.

Renan M. Mezabarba

Ilhéus-BA, 19 de dezembro de 2025.

**P.S.:** Sempre que possível, leia as notas de rodapé. E não se preocupe, eu pesei a mão deliberadamente neste Prefácio.

**P.P.S.:** Traçados ~~deste tipo~~ são resquícios (intencionais) dos meus tempos de entusiasta da Desciclopédia. É provável que este recurso gráfico-narrativo seja ~~censurado~~ suprimido numa eventual versão impressa. *C'est la vie.*

---

<sup>†</sup><https://q.uiver.app/>.

# Capítulo 1

## Pela toca do coelho

Este primeiro capítulo encapsula dois objetivos. Um deles é revisar notações e noções básicas que serão utilizadas ao longo do texto, mostrando o (mínimo do) que você deveria saber antes de avançar para os demais capítulos a fim de ter uma jornada menos dolorosa. O outro é mais nobre, e faz referência direta ao título: motivar a introdução de *espaços topológicos* como uma ferramenta *necessária*, e não como um mero acidente útil<sup>‡</sup>. Evidentemente, você pode pular este capítulo (e retornar ao sentir falta de alguma definição, discussão introdutória, etc.).

### 1.1 Essencial: métricas, sequências e topologias

#### 1.1.1 Da reta à convergência uniforme

Ao estudar Análise Real, uma das primeiras definições *novas* que se encontra é, possivelmente, a de *sequência convergente*.

**Definição 1.1.1.** Uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de números reais **converge** na *reta real*, denotada por  $\mathbb{R}$ , se existe  $L \in \mathbb{R}$  tal que para qualquer  $\varepsilon > 0$  é possível encontrar  $N \in \mathbb{N}$  de maneira que  $|x_n - L| < \varepsilon$  sempre que  $n \geq N$ . Em tal situação, dizemos que a sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **converge para** o número real  $L$ , ou que  $L$  é *um limite* da sequência. ¶

Secretamente, a definição acima estabelece uma *relação binária*<sup>††</sup>  $\rightarrow_{\mathbb{R}}$  entre  $\text{Fun}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ , o conjunto das ~~funções~~ sequências  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ , e o conjunto  $\mathbb{R}$ . Explicitamente:

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} L \Leftrightarrow L \text{ é um limite da sequência } (x_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Geralmente após estudar propriedades operatórias desta relação de convergência, são discutidas as funções *compatíveis* com tal relação, xingadas de *funções contínuas*. Voltaremos a elas em breve, não se preocupe.

O tempo passa, as dimensões aumentam e, mais cedo ou mais tarde, alguém te conta que muito do que você fez em Análise poderia *ter sido feito* num *espaço métrico*, simplesmente trocando as ocorrências de  $|x - y| < \varepsilon$  por  $d(x, y) < \varepsilon$ . Recordar é viver:

**Definição 1.1.2.** Um **espaço métrico** é um par  $(X, d)$ , onde  $X$  é um conjunto e  $d$  é uma função da forma  $X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ , chamada de **métrica**, satisfazendo as quatro condições a seguir:

<sup>‡</sup>Não que as duas situações sejam mutuamente excludentes.

<sup>††</sup>Lembre-se: uma **relação binária**  $R$  entre os conjuntos  $X$  e  $Y$  é, formalmente, um subconjunto  $R \subseteq X \times Y$ . No entanto, em vez de escrever  $(x, y) \in R$ , grafa-se  $x R y$  por questões psicológicas.

- (i) (*não negatividade*)  $d(x, y) \geq 0$ ;
- (ii) (*discernimento*)  $d(x, y) = 0$  sse<sup>†</sup>  $x = y$ ,
- (iii) (*simetria*)  $d(x, y) = d(y, x)$  e
- (iv) (*desigualdade triangular*)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

para quaisquer  $x, y, z \in X$ . Com isso dito, não se preocupe: geralmente iremos nos referir a  $(X, d)$  por seu apelido,  $X$ , e deixaremos seu sobrenome, a métrica  $d$ , subentendida. ¶

Como dito antes, ao trocar “ $|x_n - L| < \varepsilon$ ” por “ $d(x_n, L) < \varepsilon$ ” na Definição 1.1.1, obtém-se a definição de convergência num espaço métrico. Explicitamente, uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  num espaço métrico  $X$  **converge** para um ponto  $L \in X$  se para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $d(x_n, L) < \varepsilon$  sempre que  $n \geq N$ . Como no caso real, isto define uma relação  $\rightarrow_d$  entre as sequências de  $\text{Fun}(\mathbb{N}, X)$  e os pontos de  $X$ , o que permite interpretar as funções contínuas entre espaços métricos como aquelas que são compatíveis com suas relações de convergência subjacentes.

**Proposição 1.1.3.** *Seja  $f: X \rightarrow Y$  uma função entre espaços métricos  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$ . Para um ponto  $x \in X$  fixado, as duas afirmações a seguir são equivalentes:*

- (i) *para toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  vale a implicação*

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{d_X} x \Rightarrow (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{d_Y} f(x);$$

- (ii) *para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que  $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$  sempre que  $d_X(x, y) < \delta$ .*

**Exercício 1.1.1** (★). Prove a proposição anterior. Dica: faça (i)  $\Rightarrow$  (ii) pela contrapositiva, i.e., supondo que (ii) falha, obtenha uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  que converge para  $x$  em  $X$ , mas tal que  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  não converge para  $f(x)$  em  $Y$ ; para (ii)  $\Rightarrow$  (i), use o  $\delta > 0$  da hipótese para obter  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $d_X(x_n, x) < \delta$  sempre que  $n \geq N$ ; se parecer abstrato demais, finja que  $X = Y = \mathbb{R}$  e perceba que, no fundo, trata-se de um exercício de Análise Real. ■

**Definição 1.1.4.** Sob as hipóteses acima, dizemos que  $f$  é **contínua em  $x$**  se qualquer uma das condições (i) ou (ii) anteriores for satisfeita. Dizemos que  $f$  é **contínua** se  $f$  for contínua em todos os pontos de seu domínio. ¶

Justificar o apelo dos espaços métricos é relativamente fácil: abrangência e simplicidade. Essencialmente, ao reescrever o que já se fazia no contexto de  $\mathbb{R}$ , é possível estender diversos resultados para uma gama bem grande de contextos mais selvagens<sup>‡</sup>. Talvez o exemplo fundamental para ilustrar este ponto seja o da *convergência uniforme* entre funções. Para mais alguns exemplos, confira a Subseção 1.2.1.

**Definição 1.1.5.** Seja  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de funções da forma  $X \rightarrow \mathbb{R}$ , onde  $X$  é um conjunto fixado. Dizemos que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **converge uniformemente** para uma função  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  se para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  para quaisquer  $n \geq N$  e  $x \in X$ . Daqui em diante, tal situação será abreviada com  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_u f$ . ¶

<sup>†</sup>Abreviação para “se, e somente se”.

<sup>‡</sup>Por isso é tão fundamental que você tenha cursado Análise Real: os truques clássicos com desigualdades usados em Análise serão reciclados corriqueiramente, de modo que se você não tiver familiaridade com a coisa, tudo parecerá mais difícil do que realmente é.



Você certamente já estudou convergência uniforme em Análise Real e sabe o quão importante e exigente! ela é. O que você pode não saber é o seguinte: ela é induzida por uma métrica em  $\text{Fun}(X, \mathbb{R})$ .

**Proposição 1.1.6.** A função  $\rho: \text{Fun}(X, \mathbb{R}) \times \text{Fun}(X, \mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty)$  dada por

$$\rho(f, g) := \min \left\{ 1, \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)| \right\}$$

é uma métrica em  $\text{Fun}(X, \mathbb{R})$  com a seguinte propriedade:  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_\rho f$  se, e somente se,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_u f$ .

*Demonstração.* As condições (i), (ii) e (iii) na definição de métrica são automáticas, mas se discordar, verifique-as ( $\star$ ). Para a desigualdade triangular, note que para funções  $f, g, h \in \text{Fun}(X, \mathbb{R})$  e um ponto  $z \in X$ , temos

$$|f(z) - g(z)| \leq |f(z) - h(z)| + |h(z) - g(z)| \leq \sup_{x \in X} |f(x) - h(x)| + \sup_{x \in X} |h(x) - g(x)|,$$

acarretando

$$\underbrace{\sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|}_{\alpha} \leq \underbrace{\sup_{x \in X} |f(x) - h(x)|}_{\beta} + \underbrace{\sup_{x \in X} |h(x) - g(x)|}_{\gamma}.$$

Para encerrar esta primeira parte, basta notar que para  $\alpha, \beta, \gamma \in [0, +\infty]$ , a desigualdade  $\alpha \leq \beta + \gamma$  acarreta

$$\min\{1, \alpha\} \leq \min\{1, \beta + \gamma\} \leq \min\{1, \beta\} + \min\{1, \gamma\}$$

onde a última desigualdade vale em geral<sup>†</sup>.

Para o restante, vamos começar assumindo  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_\rho f$  e fixando  $\varepsilon > 0$ . Pela hipótese, existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\rho(f_n, f) < \min\{\frac{1}{2}, \varepsilon\}$  sempre que  $n \geq N$ . Pela definição de  $\rho$ , resulta  $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  e, conseqüentemente,  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  para quaisquer  $n \geq N$  e  $x \in X$ . Para a recíproca, basta tomar  $N' \in \mathbb{N}$  tal que  $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$  para quaisquer  $n \geq N'$  e  $x \in X$ , pois daí  $\rho(f_n, f) < \varepsilon$ . Os detalhes ficam por sua conta ( $\star$ ).  $\square$

Pode parecer bobagem, mas esse tipo de observação permite reciclar resultados e, em tal processo, ampliar o alcance dos argumentos. Por exemplo, o *Teorema de Arzelà-Ascoli*, que dá condições para que certas sequências de funções contínuas tenham subsequências uniformemente convergentes, nada mais é do que uma reinterpretação de uma das caracterizações de *compacidade* em espaços métricos. Assim, saber que uma certa noção de convergência é oriunda de uma métrica é, *quase sempre*, uma boa notícia para quem pratica Análise.

<sup>†</sup>Como  $\beta, \gamma \geq 0$ , há dois casos:  $1 \geq \beta + \gamma \geq \beta, \gamma$ , e daí  $\min\{1, \beta + \gamma\} = \beta + \gamma = \min\{1, \beta\} + \min\{1, \gamma\}$ ;  $1 < \beta + \gamma$ , acarretando  $\min\{1, \beta + \gamma\} = 1$ , de modo que a única forma de a desigualdade desejada falhar seria com  $\beta, \gamma < 1$ , mas neste caso  $\min\{1, \beta\} + \min\{1, \gamma\} = \beta + \gamma \geq 1$

### 1.1.2 Métricas não bastam

Para a infelicidade de algumas pessoas, nem toda noção de convergência razoável pode ser induzida por uma métrica. Esta subseção se dedica a apresentar uma dessas situações, num contexto bastante natural. Ela se baseia na exposição de Preuss [28] com alguns argumentos adaptados de Kechris [19].

Se você estudou convergência uniforme, então (provavelmente) também estudou convergência pontual. Por via das dúvidas, não custa lembrar.

**Definição 1.1.7.** Seja  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de funções da forma  $X \rightarrow \mathbb{R}$ , onde  $X$  é um conjunto fixado. Dizemos que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **converge pontualmente** para uma função  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  se para quaisquer  $\varepsilon > 0$  e  $x \in X$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  para todo  $n \geq N$ . Daqui em diante, tal situação será abreviada com  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$ . ◻

A convergência pontual lembra a convergência uniforme, mas é bem menos restritiva: para ocorrer  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$ , basta que se tenha  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} f(x)$  para qualquer  $x \in X$ . Na prática, para cada  $x \in X$  e  $\varepsilon > 0$  fixados, deve existir algum  $N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}$  tal que uma condição é satisfeita. Por outro lado, na convergência uniforme, para um  $\varepsilon > 0$  fixado, um mesmo  $N \in \mathbb{N}$  deve satisfazer a condição independentemente do ponto  $x$  escolhido. Se isso lhe parecer estranho, é sinal de que precisa revisar algumas coisas de Análise. Por aqui, prosseguiremos.

Apesar de ser tecnicamente menos exigente em sua definição, a convergência pontual costuma ser mais *selvagem* do que a convergência uniforme. Para ilustrar isso, provaremos o próximo

**Teorema 1.1.8.** *Não existe métrica  $d$  em  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  que induza a convergência pontual.*

Mais precisamente, fixada qualquer métrica  $d$  em  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , a equivalência

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d f \Leftrightarrow (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$$

deverá ser falsa para alguma sequência  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de funções reais e uma função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . A demonstração desse teorema será uma *desculpa* para revisar alguns conceitos úteis — mas se você estiver com muita pressa, avance para a Observação 1.1.18, pág. 19.

**Definição 1.1.9.** Fixados um conjunto  $X$  e um subconjunto  $S \subseteq X$ , a correspondência  $\chi_{X,S}: X \rightarrow \{0, 1\}$  dada por  $\chi_{X,S}(x) := 1$  sse  $x \in S$  será chamada de **função característica de  $S$  em  $X$** . Quando  $X$  estiver claro pelo contexto, escreveremos apenas  $\chi_S$ . ◻

**Lema 1.1.10.** *Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , existe uma função  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e uma sequência  $(g_{m,n})_{m \in \mathbb{N}}$  de funções contínuas do tipo  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tais que  $(g_{m,n})_{m \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f_n$  e  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p \chi_{\mathbb{Q}}$ .*

*Demonstração.* Como  $\mathbb{Q}$  é enumerável, podemos escrever  $\mathbb{Q} = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  com  $a_i \neq a_j$  sempre que  $i \neq j$ . Fazendo  $F_n := \{a_j : j \leq n\}$  e  $f_n := \chi_{F_n}$ , segue sem grandes dificuldades que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p \chi_{\mathbb{Q}}$  (certo?)\*. Agora, basta observar que cada  $f_n$  é limite pontual de uma sequência de funções contínuas, trabalho que também será seu (\*). ◻

**Exercício 1.1.2 (\*)**. Conclua a demonstração. Dica: perceba que, a menos de indução, você só precisa saber que para um ponto  $r \in \mathbb{R}$  qualquer, existe uma sequência  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de ~~triângulos~~ funções contínuas da forma  $\mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ , com  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p \chi_{\{r\}}$ ; também será útil observar que  $\chi_{S \cup S'} = \chi_S + \chi_{S'}$  sempre que  $S \cap S' = \emptyset$ . ◼



Para o passo seguinte, convém revisar certas noções típicas de Análise sob a luz dos espaços métricos<sup>†</sup>.

**Definição 1.1.11.** O **fecho** de um subconjunto  $S$  de um espaço métrico  $X$  é o conjunto

$$\overline{S} := \{x \in X : \text{existe } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \text{Fun}(\mathbb{N}, S) \text{ tal que } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d x\}.$$

Diremos que  $S$  é **fechado** se ocorrer  $\overline{S} = S$ . ¶

**Exercício 1.1.3** (\*). Mostre que se  $F$  e  $G$  são fechados, então  $F \cap G$  é fechado. Dica: note que a definição já te dá, quase de graça,  $\overline{F \cap G} \subseteq \overline{F} \cap \overline{G}$ . ■

**Lema 1.1.12.** O fecho de  $S$  é fechado, i.e.,  $\overline{\overline{S}} = \overline{S}$ .

*Demonstração.* Sequências constantes asseguram  $S \subseteq \overline{S}$  para qualquer  $S$ , acarretando  $\overline{S} \subseteq \overline{\overline{S}}$  (concorda?)\*. Para a inclusão oposta, tomamos  $x \in \overline{\overline{S}}$  arbitrário a fim de obter uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $\overline{S}$  com  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d x$ . Para tanto, observe que por  $x \in \overline{S}$  temos, a princípio, uma sequência  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de pontos em  $S$  com  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d x$ . Agora, por  $y_n \in S$ , existe  $x_n \in S$  satisfazendo  $d(y_n, x_n) < \frac{1}{2^{n+1}}$  (por quê?)\*, e justamente a sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tem a propriedade procurada: para qualquer  $n \in \mathbb{N}$ , verifica-se

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, y_n) + d(y_n, x),$$

de modo que para  $\varepsilon > 0$  fixado, basta tomar  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{2^N} < \varepsilon$  com  $d(y_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$  sempre que  $n \geq N$ . □

**Corolário 1.1.13.** Se existe uma métrica  $d$  em  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  que induz a convergência pontual, então  $\chi_{\mathbb{Q}}$  é limite pontual de funções contínuas.

*Demonstração.* Fazendo  $S := \{f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f \text{ é contínua}\}$  e assumindo que  $d$  existe, o Lema 1.1.12 assegura que  $\chi_{\mathbb{Q}} \in \overline{S}$ , donde o restante segue do lema anterior. □

Como veremos em breve, o *problema* do corolário anterior é o seguinte: se  $\chi_{\mathbb{Q}}$  fosse limite pontual de funções contínuas, então  $\chi_{\mathbb{Q}}$  seria descontínua num conjunto *relativamente pequeno* de  $\mathbb{R}$ .

**Observação 1.1.14.** A fim de evitar *spoilers*, algumas noções topológicas importantes serão camufladas nas próximas demonstrações. Assim, se você achar que já viu algo parecido antes, saiba que sua memória/intuição está boa. E não se preocupe: tudo será revisto de forma limpa com ferramentas topológicas, oportunamente. △

**Lema 1.1.15.** Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função. Se existe uma sequência  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de funções contínuas da forma  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  com  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$ , então existe uma sequência  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de subconjuntos fechados de  $\mathbb{R}$  tais que

$$D(f) := \{x \in \mathbb{R} : f \text{ é descontínua em } x\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n,$$

onde nenhum  $F_n$  contém um intervalo aberto não vazio.

<sup>†</sup>Futuramente elas serão generalizadas para outros contextos, não se preocupe.

*Demonstração* (adaptada de Kechris [19]). O passo mais difícil é mostrar que, sob as presentes condições,  $f^{-1}[(\alpha, \beta)]$  se expressa como reunião enumerável de fechados, para quaisquer  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  com  $\alpha < \beta$ . Vamos assumir que tal fato é conhecido por enquanto.

Considere então  $\mathcal{B} := \{I_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma *enumeração* de todos os intervalos abertos de  $\mathbb{R}$  da forma  $(p, q)$ , com  $p, q \in \mathbb{Q}$  e  $p < q$ , o que pode ser feito pois  $\mathbb{Q}$  é enumerável<sup>†</sup>. Agora, para um subconjunto  $S \subseteq \mathbb{R}$  qualquer, vamos denotar por  $i(S)$  o interior de  $S$  a reunião de todos os intervalos abertos de  $\mathbb{R}$  contidos em  $S$ . Provemos o seguinte:

▮ **Afirmção.** A função  $f$  é descontínua em  $x \in \mathbb{R}$  se, e somente se, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x \in f^{-1}[I_n] \setminus i(f^{-1}[I_n])$ .

*Prova da Afirmção.* Lembre-se de que  $f$  é descontínua em  $x$  sse existe  $\varepsilon > 0$  tal que para qualquer  $\delta > 0$ , existe  $y \in \mathbb{R}$  com  $|x - y| < \delta$  e  $|f(y) - f(x)| \geq \varepsilon$ . Assim, assumindo  $f$  descontínua em  $x$  e tomando o  $\varepsilon > 0$  assegurado, a propriedade arquimediana de  $\mathbb{R}$  garante  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f(x) \in I_n \subseteq (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ , mostrando que  $x \in f^{-1}[I_n]$ . Por outro lado,  $x \notin i(f^{-1}[I_n])$ , caso contrário existiria algum  $\delta > 0$  com  $(x - \delta, x + \delta) \subseteq f^{-1}[I_n]$  e, consequentemente,  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$  valeria sempre que  $|x - y| < \delta$  (percebeu?)<sup>\*</sup>. Portanto,  $x \in f^{-1}[I_n] \setminus i(f^{-1}[I_n])$ .

Reciprocamente, se  $x \in f^{-1}[I_n] \setminus i(f^{-1}[I_n])$ , então  $f$  é descontínua em  $x$ . Com efeito, tomando  $\varepsilon > 0$  tal que  $(f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon) \subseteq I_n$ , note que por  $x \notin i(f^{-1}[I_n])$ , para qualquer  $\delta > 0$  deve-se  $(x - \delta, x + \delta) \not\subseteq f^{-1}[I_n]$ , donde segue que algum  $y$  satisfaz  $|x - y| < \delta$  com  $f(y) \notin I_n$  e, consequentemente,  $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$ . ▮

Agora, pela suposição feita no começo desta demonstração,  $f^{-1}[I_n]$  se expressa como reunião enumerável de fechados, digamos  $(F_{n,j})_{j \in \mathbb{N}}$ , enquanto a definição de  $i(f^{-1}[I_n])$  permite mostrar que  $G_n := \mathbb{R} \setminus i(f^{-1}[I_n])$  é fechado (lembra?)<sup>\*</sup>. Logo,

$$f^{-1}[I_n] \setminus i(f^{-1}[I_n]) = \left( \bigcup_{j \in \mathbb{N}} F_{n,j} \right) \cap (\mathbb{R} \setminus i(f^{-1}[I_n])) = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (F_{n,j} \cap G_n)$$

é reunião enumerável de fechados (pelo exercício anterior). Para encerrar, basta observar que, para quaisquer  $n, j \in \mathbb{N}$ ,  $F_{n,j} \cap G_n$  não contém intervalos abertos não vazios: se  $I \subseteq \mathbb{R}$  fosse intervalo aberto tal que  $I \subseteq F_{n,j} \cap G_n$  e  $x \in I$ , então  $I$  testemunharia que  $x \notin G_n$  (por quê?)<sup>\*</sup>, uma contradição. Portanto, a família<sup>‡</sup> de fechados procurada é  $\{F_{n,j} \cap G_n : n, j \in \mathbb{N}\}$ , a menos de re-enumeração. Resta a parte difícil, não é mesmo? ▮

**Exercício 1.1.4** (\*). Considere  $f_n$  e  $f$  como no lema anterior.

- Para  $c \in \mathbb{R}$  qualquer, mostre que  $f(x) \geq c$  sse para todo  $n \in \mathbb{N}$  existe  $m > n$  tal que  $f_m(x) > c - \frac{1}{2^n}$ . Conclua que  $f^{-1}[[c, +\infty)) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m > n} f_m^{-1}[(c - \frac{1}{2^n}, +\infty))$ .
- Para  $m \in \mathbb{N}$ , mostre que  $f_m^{-1}[I]$  é reunião de intervalos abertos sempre que  $I$  é um intervalo aberto. Dica:  $f_m$  é contínua.
- Mostre que  $f^{-1}[(\alpha, \beta)]$  é reunião enumerável de fechados. Dica: lembre-se (ou note...) que se  $I \subseteq \mathbb{R}$  é reunião de intervalos abertos, então  $\mathbb{R} \setminus I$  é fechado; depois, expresse  $(\alpha, \beta) = \mathbb{R} \setminus ((-\infty, \alpha] \cup [\beta, +\infty))$  e utilize os dois itens anteriores<sup>††</sup>. ▮

<sup>†</sup>Explicitamente: a função  $\pi: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathcal{B}$  que faz  $\pi(p, q) := (p, q)$  se  $p < q$  e  $\pi(p, q) := (0, 1)$  caso contrário, é sobrejetora, acarretando em  $|\mathcal{B}| \leq |\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}|$ ; portanto, existe uma bijeção entre  $\mathbb{N}$  e  $\mathcal{B}$ , dado que  $\mathcal{B}$  é infinito e  $|\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$ . Acostume-se o quanto antes com esse tipo de argumento.

<sup>‡</sup>Neste texto, as expressões “família”, “coleção” e “conjunto” serão tratadas como sinônimos.

<sup>††</sup>Você também vai precisar das Leis de De Morgan para interseções e reuniões quaisquer. Não sabe do que se trata? Parabéns! Acabou de descobrir algo que precisa revisar!

**Corolário 1.1.16.** *Se existe uma métrica  $d$  em  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  que induz a convergência pontual, então existe uma sequência  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de fechados de  $\mathbb{R}$  tal que*

- (i)  $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ ;
- (ii)  $i(F_n) = \emptyset$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , i.e., nenhum  $F_n$  contém um intervalo aberto não vazio.

*Demonstração.* Em vista do lema anterior, tudo segue por valer  $D(\chi_{\mathbb{Q}}) = \mathbb{R}$ , i.e., a função característica dos racionais é descontínua em todos os pontos da reta (lembra?)\*.  $\square$

São justamente os dois itens acima que se revelam incompatíveis com a (*completude* da) reta real. Antes de prosseguir, recorde-se do seguinte

**Exercício 1.1.5** (\*). Mostre que intervalos fechados são fechados em  $\mathbb{R}$ . Explicitamente: para  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $\overline{[a, b]} = [a, b]$ . Dica: monotonicidade.  $\blacksquare$

**Teorema 1.1.17** (de Baire, em  $\mathbb{R}$ ). *Se  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência de fechados de  $\mathbb{R}$  tal que  $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ , então existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $i(F_n) \neq \emptyset$ , i.e., pelo menos um dos fechados  $F_n$  contém um intervalo aberto não vazio.*

*Demonstração.* Primeiro, observe que se  $I \subseteq \mathbb{R}$  é um intervalo aberto não vazio de  $\mathbb{R}$  e  $F \subseteq \mathbb{R}$  é um fechado com  $i(F) = \emptyset$ , então não apenas vale  $I \setminus F \neq \emptyset$  (evidente, certo?)\*, mas também  $i(I \setminus F) \neq \emptyset$ , i.e.,  $I \setminus F$  contém um intervalo aberto não vazio: para  $x \in I \setminus F$  fixado, algum  $r > 0$  satisfaz  $(x - r, x + r) \subseteq I \setminus F$ , caso contrário, para cada  $n \in \mathbb{N}$  poderíamos tomar  $x_n \in F$  com  $|x_n - x| < \frac{1}{2^n}$ , acarretando  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} x$  e, consequentemente,  $x \in F$ . Com isso em mente, vamos assumir  $i(F_n) = \emptyset$  para todo  $n$ .

Dessa forma, começando com  $I_0 := (-1, 1)$  e  $F_0$ , existem  $x_0 \in I_0 \setminus F_0$  e  $r_0 \in \mathbb{R}$  com  $0 < r_0 < 1$  tais que  $[x_0 - r_0, x_0 + r_0] \subseteq I_0 \setminus F_0$  (percebeu?)\*. Reaplicando o raciocínio, desta vez com  $I_1 := (x_0 - r_0, x_0 + r_0)$  e  $F_1$ , existem  $x_1 \in I_1$  e  $r_1 \in \mathbb{R}$ , com  $0 < r_1 < \frac{1}{2}$ , tais que  $[x_1 - r_1, x_1 + r_1] \subseteq I_1 \setminus F_1$ . Procedendo recursivamente, obtemos uma sequência  $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de números reais com  $0 < r_n < \frac{1}{2^n}$  para todo  $n$ , bem como uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  satisfazendo  $[x_{n+1} - r_{n+1}, x_{n+1} + r_{n+1}] \subseteq (x_n - r_n, x_n + r_n)$  e  $[x_n - r_n, x_n + r_n] \cap F_n = \emptyset$  para todo  $n$ .

Como  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência de Cauchy<sup>†</sup> (certo?)\*, existe um ponto  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} x$ . E este é justamente o ponto que não pertence a  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ . De fato, por  $J_n := [x_n - r_n, x_n + r_n]$  ser fechado e  $(x_m)_{m \geq n}$  ser uma subsequência de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  totalmente contida em  $J_n$ , resulta que  $x \in J_n$  (percebeu?)\* e, consequentemente,  $x \notin F_n$ . Como  $n$  foi arbitrário, a conclusão desejada segue pela *contrapositiva* (por quê?)\*.  $\square$

*Demonstração do Teorema 1.1.8.* Ora, a existência de uma métrica como no enunciado violaria as consequências do teorema anterior (cf. Corolário 1.1.16).  $\square$

**Observação 1.1.18** (Roteiro alternativo). Há um caminho bem mais simples<sup>‡</sup> para provar o Teorema 1.1.8, que pode ser útil para quem está com pressa (ou com preguiça). A coisa toda se baseia no seguinte:

<sup>†</sup>Lembre-se: “ser **de Cauchy**” significa que para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $|x_m - x_n| < \varepsilon$  sempre que  $m, n \geq N$ . Uma das propriedades fundamentais de  $\mathbb{R}$  é, justamente, que toda sequência de Cauchy converge. Mas você já viu isso em Análise Real, certo? Em tempo: sequências de Cauchy em espaços métricos são definidas de maneira análoga.

<sup>‡</sup>Eu conheci esse argumento na obra de Buskes e van Rooji [9], meses depois de ter redigido o roteiro anterior. Como acredito que ambos os argumentos tenham seus méritos, mantive os dois.

**Exercício 1.1.6** (★). Num espaço métrico  $(X, d)$ , mostre que uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge para um ponto  $p \in X$  sse  $(d(x_n, p))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$  em  $\mathbb{R}$ . ■

Com o resultado acima em mãos, suponha que  $d$  seja uma métrica em  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  que induza a convergência pontual. Observe que para qualquer sequência injetiva  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de números reais, a sequência correspondente  $(\chi_{\{x_n\}})_{n \in \mathbb{N}}$  em  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  converge pontualmente para a função nula  $\underline{0}_{\mathbb{R}}$ : afinal, para  $r \in \mathbb{R}$  fixado, ou  $r \notin \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ , e daí  $\chi_{\{x_n\}}(r) = 0$  para todo  $n$ , ou existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $r = x_N$ , e daí  $\chi_n(r) = 0$  para todo  $n > N$ . Logo, pelo exercício anterior,  $(d(\chi_{\{x_n\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$  em  $\mathbb{R}$ .

Consequentemente, para cada  $n \in \mathbb{N}$ , a coleção  $S_n := \{x \in \mathbb{R} : d(\chi_{\{x\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}) > \frac{1}{2n}\}$  é finita, caso contrário existiria uma sequência injetiva  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de números reais em  $S_n$ , o que se mostra incompatível com a observação no final do parágrafo anterior. No entanto, por  $d$  ser métrica e  $\chi_{\{x\}} \neq \underline{0}_{\mathbb{R}}$  para qualquer  $x \in \mathbb{R}$ , resulta  $d(\chi_{\{x\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}) > 0$ , acarretando  $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$ , donde se concluiria que  $\mathbb{R}$  é enumerável! Absurdo.  $\triangle$

### 1.1.3 A topologia de um espaço métrico

Num primeiro momento, a subseção anterior explicitou a ineficácia das métricas para englobar noções razoáveis de convergência, o que sugere a busca por estruturas mais gerais. Dado que o apego às distâncias nos levou à noção de métrica, precisamos nos ater a comportamentos mais sutis ou indiretos que estejam presentes nas convergências que conhecemos a fim de identificar alguma boa *estrutura*.

No caso de um espaço métrico  $(X, d)$ , por exemplo, para uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  e um ponto  $x \in X$ , a ocorrência ou falha de “ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d x$ ” depende de *testemunhas* bem específicas.

**Definição 1.1.19.** Fixados um ponto  $x \in X$  num espaço métrico  $(X, d)$  e um número real  $r > 0$ ,

$$B_d(x, r) := \{y \in X : d(x, y) < r\}$$

indica a  **$d$ -bola aberta de centro  $x$**  e raio  $r$ . Naturalmente, quando a métrica  $d$  estiver clara pelo contexto,  $d$ -bolas abertas serão chamadas meramente de *bolas abertas*, e o subíndice  $d$  poderá ser esquecido. ¶

**Exercício 1.1.7** (★). Para uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  num espaço métrico  $(X, d)$  e um ponto  $x \in X$ , mostre que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d x$  sse para toda *bola aberta*  $B$  com  $x \in B$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $x_n \in B$  sempre que  $n \geq N$ . Dica: observe que se  $B = B_d(y, r)$  e  $x \in B$ , então  $\varepsilon := r - d(x, y) > 0$  satisfaz  $B_d(x, \varepsilon) \subseteq B_d(y, r)$ . ■

O exercício anterior assegura que as bolas abertas são testemunhas de convergência em espaços métricos, no seguinte sentido: uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge para um ponto  $x$  sse *toda* bola aberta  $B$  em torno de  $x$  contém *algum rabo* da sequência, i.e., se para algum  $N \in \mathbb{N}$  ocorrer  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq B$ . Vamos usar tal propriedade para *caracterizar* as *testemunhas* de convergência em espaços métricos.

**Definição 1.1.20.** Um subconjunto  $S$  de um espaço métrico  $X$  será chamado de  **$d$ -aberto** (em  $X$  ou de  $X$ ) se para todo  $x \in S$  e toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  com  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d x$  existir  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq S$ . Como de costume, o sufixo  $d$  será abandonado sempre que não houver risco de confusão. ¶

**Observação 1.1.21.** Em outras palavras,  $S$  é  $d$ -aberto sse  $S$  é testemunha de convergência de todos os seus pontos.  $\triangle$

Os abertos usuais da reta real, que você conheceu em seus cursos de Análise, são abertos de  $\mathbb{R}$  no sentido acima ao considerarmos a métrica de  $\mathbb{R}$  induzida pelo valor absoluto. Talvez fique mais fácil de acreditar depois da próxima

**Proposição 1.1.22.** *Num espaço métrico  $X$ , um subconjunto  $A \subseteq X$  é aberto se, e somente se, para todo  $x \in A$  existe  $r > 0$  tal que  $B_d(x, r) \subseteq A$ . Em particular, bolas abertas são abertas.*

*Demonstração.* Se não existe tal  $r > 0$  para algum  $a \in A$ , então para cada  $n \in \mathbb{N}$  é possível obter  $a_n \in B(a, \frac{1}{2^n}) \setminus A$ , de maneira que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência em  $X$  que converge para  $a$ , mas com  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \cap A = \emptyset$ . Logo,  $A$  não é aberto. Por outro lado, se tal  $r > 0$  existe e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$  para algum  $x \in A$ , então existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq B(x, r) \subseteq A$ , mostrando que  $A$  é aberto. A parte final é automática.  $\square$

**Exercício 1.1.8** ( $\star$ ). Mostre que um subconjunto de um espaço métrico  $X$  é aberto em  $X$  sse é reunião de bolas abertas. Dica:  $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$  e, se  $A$  é aberto, então para cada  $x \in A$  existe  $r_x > 0$  com  $B(x, r_x) \subseteq A$ .  $\blacksquare$

**Observação 1.1.23.** Em Análise Real, você aprendeu que “aberto  $\neq$  intervalo aberto”. Como as bolas abertas de um espaço métrico fazem o mesmo papel dos intervalos abertos de  $\mathbb{R}$  (percebeu?)<sup>\*</sup>, a mesma lição se mantém: nem todo aberto de um espaço métrico é uma bola aberta, embora toda bola aberta seja aberta. Em tempo: você também deve ter aprendido que *conjuntos não são portas*, i.e., “ser fechado” não é sinônimo de “não ser aberto”, e vice-versa. Nunca se esqueça: o dicionário não tem a última palavra aqui — apenas as definições interessam!  $\triangle$

Consequentemente, tanto as noções de convergência de sequências quanto continuidade de funções entre espaços métricos podem ser reformuladas em termos de abertos. Mais precisamente:

**Teorema 1.1.24.** *Sejam  $X$  e  $Y$  espaços métricos,  $f: X \rightarrow Y$  uma função,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência em  $X$  e  $x \in X$  um ponto.*

- (i) *Ocorre  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$  se, e somente se, para todo  $A \subseteq X$  aberto com  $x \in A$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq A$ .*
- (ii) *A função  $f$  é contínua em  $x$  se, e somente se, para todo aberto  $V \subseteq Y$  tal que  $f(x) \in V$  existe  $U \subseteq X$  aberto com  $x \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ .*
- (iii) *A função  $f$  é contínua se, e somente se,  $f^{-1}[V]$  é aberto em  $X$  sempre que  $V \subseteq Y$  é aberto em  $Y$ .*

**Exercício 1.1.9** ( $\star$ ). Prove o teorema anterior. Dica: para uma solução clássica, reviva seus argumentos de Análise Real por meio da Proposição 1.1.22, mas se quiser ter um vislumbre do futuro, tente aplicar explicitamente *apenas* a Definição 1.1.20 (e perceba que, em quase todos os itens, isso funcionará somente numa das direções!).  $\blacksquare$

O teorema acima mostra que, para lidar com convergência e continuidade em espaços métricos, basta entender o comportamento das sequências e funções com respeito aos abertos dos espaços em questão. Evidentemente, isto não dispensa as métricas, posto que elas são usadas na descrição dos abertos, mas sugere que essa *estrutura adicional* é a verdadeira responsável pelas propriedades de convergências em espaços métricos.

**Exemplo 1.1.25.** Em Geometria Analítica, você aprendeu que a *distância* entre dois pontos  $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$  se mede por meio da fórmula

$$d_2((a, b), (c, d)) := \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2},$$

conhecida como **distância** (ou *métrica*) **euclidiana**<sup>†</sup>. As bolas abertas segundo esta métrica são, geometricamente, “bolas” no sentido usual (faça um desenho?)<sup>\*</sup>.

No entanto, a métrica euclidiana não é a única disponível em  $\mathbb{R}^2$ . Podemos definir, por exemplo,

$$d_\infty((a, b), (c, d)) := \max\{|a - c|, |b - d|\},$$

chamada de *métrica do máximo*, evidentemente uma métrica (certo?)<sup>\*</sup> no sentido da Definição 1.1.2. As bolas abertas segundo esta métrica são quadrados ou, mais precisamente, produtos cartesianos entre intervalos abertos de mesmo comprimento (são?)<sup>\*</sup>.

Outra métrica comum é a **zero-um** (ou *métrica discreta*), em que a distância entre pontos distintos é definida como sendo 1 (e como 0 quando os pontos são iguais, obviamente). Diferente dos casos anteriores, as bolas abertas segundo esta métrica são *pontos* e o próprio  $\mathbb{R}^2$ : para  $x \in \mathbb{R}^2$  e  $0 < r < 1$ ,  $B(x, r) = \{x\}$ , enquanto  $B(x, s) = \mathbb{R}^2$  para qualquer  $s \geq 1$ .

Embora todas as métricas acima sejam diferentes entre si, duas delas têm em comum algo que a outra não tem: a *topologia*. Explicitamente,  $d_2$  e  $d_\infty$  determinam os mesmos abertos (quais?)<sup>‡</sup>, enquanto a métrica discreta induz uma família diferente de abertos: todo subconjunto de  $\mathbb{R}^2$  é aberto segundo a métrica zero-um (certo?)<sup>\*</sup>, mas nenhum subconjunto finito de  $\mathbb{R}^2$  pode ser aberto com respeito às outras duas métricas (por quê?)<sup>\*</sup>. Em particular, o teorema anterior assegura que podemos trocar a métrica euclidiana pela métrica do máximo para tratar de qualquer problema sobre convergência ou continuidade, posto que tais noções dependem apenas dos abertos induzidos pelas métricas. ▲

A questão agora se torna abstrair as propriedades *fundamentais* da família dos abertos de um espaço métrico a fim de utilizar tais propriedades como definição para a estrutura *ideal* para estudar convergências. A fim de não poluir a argumentação com  $\varepsilon$ s e  $\delta$ s desnecessários, vamos dar um passo um pouco mais ousado<sup>††</sup>.

Fixado um conjunto  $X$ , seja  $L$  uma relação binária entre  $\text{Fun}(\mathbb{N}, X)$  e  $X$ . Porém, em vez de escrever  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} L x$  para indicar que  $((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, x) \in L$ , vamos utilizar a notação mais sugestiva  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_L x$ . Trata-se apenas de uma generalização do método já empregado para introduzir, por exemplo, as noções de convergência uniforme e pontual entre funções. Portanto, nada novo sob o sol.

**Definição 1.1.26.** Sob as condições acima, diremos que um subconjunto  $S \subseteq X$  é  **$L$ -aberto** (em  $X$ ) se para todo  $x \in S$  e toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  com  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_L x$  existir  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq S$ . ¶

Sim. Esta é uma generalização da Definição 1.1.20, em que o mesmo critério foi utilizado para definir os abertos de um espaço métrico. A diferença é que desta vez não se exigiu que  $L$  fosse a *convergência* induzida por uma métrica em  $X$ . Dois motivos justificam este afrouxamento:

<sup>†</sup>Isto será revisado com um pouco mais de calma, mas não muita, na Subseção 1.2.1.

<sup>‡</sup>Pense no Exercício 1.1.8 com carinho ( $\star\star$ ).

<sup>††</sup>Em certo sentido, seguindo os rastros do próprio Fréchet (cf. [8]).



- (i) queremos encontrar propriedades que permitam descrever, por exemplo, a convergência pontual, que foge do escopo das métricas;
- (ii) nenhuma hipótese adicional é necessária para demonstrar o próximo

**Teorema 1.1.27.** *Sob as condições acima, a família  $\mathcal{T}_L$  formada pelos subconjuntos  $L$ -abertos de  $X$ , tem as seguintes propriedades:*

- (i)  $\emptyset, X \in \mathcal{T}_L$ , i.e.,  $\emptyset$  e  $X$  são  $L$ -abertos;
- (ii) se  $U, V \in \mathcal{T}_L$ , então  $U \cap V \in \mathcal{T}_L$ , i.e., a interseção (finita) de  $L$ -abertos é  $L$ -aberta;
- (iii) se  $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}_L$ , então  $\bigcup \mathcal{U} \in \mathcal{T}_L$ , i.e., a reunião (arbitrária)<sup>†</sup> de  $L$ -abertos é  $L$ -aberta.

*Demonstração.* Para que  $\emptyset$  não fosse  $L$ -aberto, deveria existir  $x \in \emptyset$  tal que... Portanto,  $\emptyset \in \mathcal{T}_L$ . Por sua vez, se  $x \in X$  e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_L x$ , então  $\{x_n : n \geq 0\} \subseteq X$  trivialmente, mostrando que  $X$  é  $L$ -aberto. Agora, se  $U, V \in \mathcal{T}_L$  e  $y \in U \cap V$  é tal que  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_L y$ , então existem  $M, N \in \mathbb{N}$  tais que  $\{y_n : n \geq M\} \subseteq U$  e  $\{y_n : n \geq N\} \subseteq V$ , de modo que ao tomar  $O := \max\{M, N\}$  obtemos  $\{y_n : n \geq O\} \subseteq U \cap V$ , ou seja,  $U \cap V \in \mathcal{T}_L$ . Para encerrar, se  $z \in \bigcup \mathcal{U}$  e  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_L z$ , então para algum  $U \in \mathcal{U}$  temos  $z \in U$ , assegurando a existência de  $N' \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_n : n \geq N'\} \subseteq U \subseteq \bigcup \mathcal{U}$ .  $\square$

**Definição 1.1.28.** Uma **topologia**  $\mathcal{T}$  num conjunto  $X$  é uma família de subconjuntos de  $X$ , chamados de  **$\mathcal{T}$ -abertos**, satisfazendo as condições (i), (ii) e (iii) no teorema anterior. O par  $(X, \mathcal{T})$  é chamado de **espaço topológico**, embora frequentemente a topologia  $\mathcal{T}$  seja omitida, como de costume; em tais situações, os membros da topologia serão xingados de *abertos* de (ou em)  $X$ .  $\P$

Toda a discussão feita até aqui já mostra que *topologias* permitem descrever convergência e continuidade do contexto métrico clássico já que, por meio da topologia dos abertos induzidos por uma métrica, todo espaço métrico é, *naturalmente*, um espaço topológico. Para encerrar esta subseção com uma boa notícia, vamos ver que a convergência pontual também é induzida por uma topologia, no seguinte sentido.

**Definição 1.1.29.** Sejam  $(X, \mathcal{T})$  um espaço topológico,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência em  $X$  e  $x \in X$  um ponto. Diremos que a sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$   **$\mathcal{T}$ -converge para**  $x \in X$ , abreviado como  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} x$ , se para todo  $\mathcal{T}$ -aberto  $U \subseteq X$  tal que  $x \in U$  existir  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq U$ .  $\P$

**Proposição 1.1.30.** *Existe uma topologia  $\mathcal{T}$  em  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  tal que*

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f \Leftrightarrow (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} f.$$

*Demonstração.* Para  $S \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  e  $r > 0$ , considere

$$B(f; S; r) := \{g \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : |f(x) - g(x)| < r \text{ para todo } x \in S\}.$$

Vamos definir  $\mathcal{T}$  da seguinte forma: diremos que  $\mathcal{A} \subseteq \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  é  $\mathcal{T}$ -aberto se para todo  $f \in \mathcal{A}$  existirem um subconjunto finito  $S \subseteq \mathbb{R}$  e um número real  $r > 0$  tais que  $B(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$ . Verificar que isto de fato define uma topologia será problema seu (mas confira o próximo exercício para receber algumas dicas)<sup>\*</sup>. Tratem-se do que interessa.

<sup>†</sup>Se você preferir escrever  $\mathcal{U} := \{U_i : i \in \mathcal{I}\}$  para algum conjunto de índices  $\mathcal{I}$ , saiba que  $\bigcup \mathcal{U}$  é a mesma coisa que  $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$ .

Primeiro, se  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$  e  $\mathcal{A} \subseteq \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  é um  $\mathcal{T}$ -aberto com  $f \in \mathcal{A}$ , então existem  $S := \{s_0, \dots, s_m\}$  e  $r > 0$  tais que  $B(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$ . Da convergência pontual, existem  $N_i \in \mathbb{N}$  tais que  $|f_n(s_i) - f(s_i)| < r$  sempre que  $n \geq N_i$ , para todo  $i \leq m$ . Logo, com  $N := \max\{N_0, \dots, N_m\}$ , resulta  $f_n \in B(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$  sempre que  $n \geq N$ , i.e.,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} f$ . Para a recíproca, a fim de concluir que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$ , basta aplicar a definição de *convergência topológica* para  $\mathcal{T}$ -abertos da forma  $B(f; \{x\}; \varepsilon)$  para cada  $x \in \mathbb{R}$ . Os detalhes ficam por sua conta ( $\star$ ).  $\square$

**Exercício 1.1.10** ( $\star$ ). Para  $f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $S, T \subseteq \mathbb{R}$  e  $s, t \in \mathbb{R}$  com  $s, t > 0$ , mostre que  $B(f; S \cup T; \min\{s, t\}) \subseteq B(f; S; s) \cap B(f; T; t)$ . Use isso para concluir que a família  $\mathcal{T}$  definida na demonstração anterior é, de fato, uma topologia.  $\blacksquare$

**Corolário 1.1.31.** *Uma topologia  $\mathcal{T}$  como a da última proposição não é metrizable, i.e., não pode ser induzida por uma métrica.*

*Demonstração.* O contrário violaria o Teorema 1.1.8.  $\square$

**Observação 1.1.32** (Opcional). Numa narrativa usual, seria preferível reaproveitar a Definição 1.1.26 e, em vez de  $\mathcal{T}$ , considerar  $\mathcal{T}_{\rightarrow_p}$ , i.e., declarar como abertos todos os subconjuntos  $\mathcal{A}$  de  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  para os quais  $\{f_n : n \geq N\} \subseteq \mathcal{A}$  para algum  $N$  sempre que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$  com  $f \in \mathcal{A}$ . Neste caso, a direção “ $\Rightarrow$ ” vale por construção, enquanto “ $\Leftarrow$ ” segue pois os subconjuntos da forma  $B(f; S; r)$  também são  $\mathcal{T}_{\rightarrow_p}$ -abertos.

**Exercício 1.1.11** ( $\star$ ). Mostre que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$  sse  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}_{\rightarrow_p}} f$  sob as condições anteriores. Dica: se  $S \subseteq \mathbb{R}$  é finito e  $r > 0$ , então  $B(f; S; r)$  é  $\mathcal{T}_{\rightarrow_p}$ -aberto, i.e., se  $h \in B(f; S; r)$  e  $(h_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p h$ , então  $\{h_n : n \geq N\} \subseteq B(f; S; r)$  para algum  $N \in \mathbb{N}$ .  $\blacksquare$

Com isso dito, convém mencionar que o protagonismo dado à topologia  $\mathcal{T}$  se deve a motivos que ainda serão revelados. Mas para atizar sua curiosidade, pergunte-se o seguinte: será que todo  $\mathcal{T}_{\rightarrow_p}$ -aberto é  $\mathcal{T}$ -aberto?  $\triangle$

### 1.1.4 Sequências não bastam

Talvez você tenha percebido que a definição de convergência topológica foi inspirada pelo item (i) do Teorema 1.1.24, o que sugere utilizar o item (ii) para definir o significado de continuidade de funções entre espaços topológicos.

**Definição 1.1.33.** Uma função  $f: X \rightarrow Y$  entre espaços topológicos  $(X, \mathcal{T}_X)$  e  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  é **contínua num ponto**  $p \in X$  se para todo  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V \subseteq Y$  tal que  $f(p) \in V$  existe um  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U \subseteq X$  com  $p \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ . Dizemos que  $f$  é **contínua** se  $f$  for contínua em todos os pontos de seu domínio.  $\P$

A próxima proposição é, em certo sentido, sintoma de que a definição é boa (compare com o terceiro item do supracitado Teorema 1.1.24).

**Proposição 1.1.34.** *Para uma função  $f: X \rightarrow Y$  entre espaços topológicos, as duas afirmações a seguir são equivalentes:*

- (i) a função  $f$  é contínua;
- (ii) para todo  $V \subseteq Y$ , tem-se  $f^{-1}[V]$  aberto em  $X$  sempre que  $V$  for aberto em  $Y$ .



*Demonstração.* Se vale (i) e  $p \in f^{-1}[V]$ , então a hipótese garante  $U_p \subseteq X$  aberto em  $X$  tal que  $p \in U_p$  com  $U_p \subseteq f^{-1}[V]$  (percebeu?)\*. Logo,

$$f^{-1}[V] = \bigcup_{p \in f^{-1}[V]} \{p\} \subseteq \bigcup_{p \in f^{-1}[V]} U_p \subseteq f^{-1}[V],$$

mostrando que  $f^{-1}[V]$  é reunião de abertos de  $X$  e, portanto, é aberto em  $X$  (viu?)\*. Como nada precisa ser feito nas situações em que  $f^{-1}[V] = \emptyset$ , acabou: temos (ii). Por outro lado, assumindo a validade de (ii), basta tomar  $U := f^{-1}[V]$  na definição de continuidade no ponto  $p$ . Os detalhes restantes ficam por sua conta (\*).  $\square$

Contudo, há uma rota alternativa aqui, com potencial para trazer problemas “metodológicos”: em vez de usar o Teorema 1.1.24 como inspiração para definir continuidade *topológica*, poderíamos ter usado a inesquecível Proposição 1.1.3, que caracteriza continuidade de funções entre espaços métricos como preservação de convergência de sequências. A fim de respeitar a precedência, vamos dar outro nome para a noção correspondente de continuidade.

**Definição 1.1.35.** Uma função  $f: X \rightarrow Y$  entre espaços topológicos  $(X, \mathcal{T}_X)$  e  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  é **sequencialmente contínua num ponto**  $p \in X$  se  $(f(p_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}_Y} f(p)$  sempre que  $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$  for uma sequência em  $X$  que  $\mathcal{T}_X$ -converge para  $p$ . Como de costume, diremos que  $f$  é **sequencialmente contínua** se  $f$  for sequencialmente contínua em todos os pontos de seu domínio.  $\blacksquare$

Os argumentos *de sempre* permitem que você resolva o próximo

**Exercício 1.1.12 (\*)**. Sob as hipóteses anteriores, mostre que se  $f$  é contínua (num ponto  $p$ ), então  $f$  é sequencialmente contínua (no ponto  $p$ ).  $\blacksquare$

O problema alertado é o que dá nome a esta subseção: sequências não bastam, no sentido de que a recíproca do exercício anterior pode ser falsa!

**Exemplo 1.1.36.** Seja  $\mathcal{Z} := \{f \in \text{Fun}([0, 1], [0, 1]) : f \text{ é Riemann-integrável}\}$ . Mesmo que você não se lembre das caracterizações de funções Riemann-integráveis, é *gramaticalmente* óbvia a boa definição da função

$$F: \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \mapsto \int_0^1 f(t) dt$$

onde  $\int_0^1 f(t) dt$  denota a *integral de Riemann* da função  $f$ .

Algo bem menos óbvio é o *fato* de que tal função é *sequencialmente contínua* com respeito à *convergência pontual*, i.e., se  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  for uma sequência de funções do tipo  $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , todas Riemann-integráveis, com  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$ , onde  $f$  também é função Riemann-integrável do tipo  $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 f(t) dt.$$

Ao adaptar a definição da topologia  $\mathcal{T}$  utilizada na demonstração da Proposição 1.1.30 para o presente contexto, mostra-se que existe uma topologia  $\mathcal{T}$  em  $\mathcal{Z}$  segundo a qual a função  $F: \mathcal{Z} \rightarrow [0, 1]$  se revela sequencialmente contínua “de verdade”: *basta* declarar

$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}$  como  $\mathcal{T}$ -aberto sse para todo  $f \in \mathcal{A}$  existirem um subconjunto finito  $S \subseteq [0, 1]$  e  $r > 0$  tais que

$$B_{\mathcal{Z}}(f; S; r) := \{g \in \mathcal{Z} : |f(x) - g(x)| < r \text{ para todo } x \in S\} \subseteq \mathcal{A}.$$

Se não lhe parecer óbvio: verifique (\*).

Quer saber qual a parte engraçada? A função  $F$  não é contínua<sup>†</sup>! Por exemplo, fixada uma função  $f \in \mathcal{Z}$  com  $\int_0^1 f(t) dt > 0$  e tomando  $V := (0, +\infty)$ , não há  $\mathcal{T}$ -aberto  $\mathcal{A}$  em torno de  $f$  tal que  $F[\mathcal{A}] \subseteq V$ . Com efeito, se  $\mathcal{A}$  é  $\mathcal{T}$ -aberto com  $f \in \mathcal{A}$ , então existem um subconjunto finito  $S \subseteq [0, 1]$  e um número real  $r > 0$  com  $B_{\mathcal{Z}}(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$ . Daí, ao definir  $g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  fazendo  $g(x) := f(x) \cdot \chi_S(x)$ , resulta que  $g \in B_{\mathcal{Z}}(f; S; r)$  com  $F(g) = 0 \notin V$ . Para o caso em que  $\int_0^1 f(t) dt = 0$  basta considerar  $V := (-\infty, 1)$  e fazer  $g := f \cdot \chi_{[0,1] \setminus S}$ . Verifique os detalhes (\*). ▲

**Observação 1.1.37** (Cuidado!). O fato utilizado no exemplo anterior tem nome: trata-se do *Teorema da Convergência Dominada de Arzelà*, que depende fortemente da hipótese de limitação uniforme — implicitamente presente em nosso contexto, na suposição de que o contradomínio das funções é  $[0, 1]$ . Sem a limitação uniforme, não é possível assegurar que as integrais convirjam para a integral do limite pontual das funções. Caso se interesse por sua demonstração, confira [1, 31]. △

**Exemplo 1.1.38.** Há um exemplo bem mais simples do mesmo fenômeno, embora possa parecer artificial. Para um conjunto  $X$  não enumerável, fixe  $p \in X$  e considere  $\mathcal{T}$  a família dos subconjuntos  $A \subseteq X$  que satisfazem uma das duas condições a seguir:

- (i)  $p \notin A$ ;
- (ii)  $p \in A$  e  $X \setminus A$  é enumerável.

Após verificar que isto define de fato uma topologia em  $X$  (verificou?)\*, note que se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência em  $X$  com  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ , então existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $x_n = p$  para todo  $n \geq N$ : como  $A := \{x \in X : x = p \text{ ou } x \notin \{x_n : n \in \mathbb{N}\}\}$  satisfaz a condição (ii) e, portanto, é um  $\mathcal{T}$ -aberto em torno de  $p$ , a convergência da sequência garante o  $N$  desejado. Em particular, a função  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por  $f(x) := \chi_{\{p\}}(x)$ , é sequencialmente contínua em  $p$  (percebeu?)\*. No entanto,  $f$  não é contínua em  $p$ . De fato, o aberto  $V := (0, +\infty)$  é tal que  $f(p) \in V$ , mas todo  $\mathcal{T}$ -aberto  $A \subseteq X$  com  $p \in A$  satisfaz  $f[A] \not\subseteq V$ , já que  $A \setminus \{p\} \neq \emptyset$ . ▲

**Exercício 1.1.13** (\*). Por que foi *preciso* assumir  $X$  não enumerável? ■

**MORAL DA HISTÓRIA:** a generalidade dos axiomas de topologia permite descrever todas as noções de convergência vistas até agora, mas o preço a pagar é descobrir que neste novo contexto topológico, sequências são restritivas demais para lidar com continuidade. A alternativa mais comum para tratar esse problema é esquecê-lo: abraça-se a linguagem topológica dos abertos para investigar problemas de Análise, enquanto as sequências convergentes se tornam uma lembrança feliz de tempos mais simples, e que vez ou outra podem ser utilizadas — a depender da situação. Embora tenha seus méritos<sup>‡</sup>, esta abordagem invisibiliza uma oportunidade *maravilhosa*: generalizar as próprias sequências. É isto o que será feito no próximo capítulo.

<sup>†</sup>Exibir uma função  $F: \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ , sequencialmente contínua mas descontínua, é um problema bem mais delicado. Confira a resposta de Brian M. Scott, em <https://math.stackexchange.com/a/53932/128988>, caso queira saber o porquê.

<sup>‡</sup>A linguagem topológica é, realmente, muito adequada para diversos problemas de Análise. Ela só não é a única linguagem.

### 1.1.5 Exercícios adicionais

**Exercício 1.1.14.** Fixados um ponto  $x \in X$  num espaço métrico  $(X, d)$  e um número real  $r > 0$ ,

$$B_d[x, r] := \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$$

indica a  $d$ -bola fechada de centro  $x$  e raio  $r$ . Mostre que bolas fechadas são fechadas (de acordo com a Definição 1.1.11). ■

**Exercício 1.1.15** (\*). Mostre que o conjunto das partes de  $X$ , indicado por  $\wp(X)$  e que tem como membros todos os subconjuntos de  $X$ , é uma topologia em  $X$ . Além disso, mostre que existe uma métrica  $d$  em  $X$  satisfazendo  $\mathcal{T}_{\rightarrow_d} = \wp(X)$ , i.e., tal que todo subconjunto de  $X$  é  $d$ -aberto. Dica: para a segunda parte, você quer uma métrica tal que conjuntos da forma  $\{x\}$  sejam bolas abertas, para qualquer  $x \in X$ . ■

**Observação 1.1.39.** Nesse contexto, a família  $\wp(X)$  é usualmente chamada de **topologia discreta** de  $X$ , enquanto todo conjunto com sua topologia discreta é chamado de **espaço... discreto**. △

**Exercício 1.1.16** (\*). Para um conjunto  $X$ , declare  $A \subseteq X$  como aberto se, e somente se,  $A = \emptyset$  ou  $X \setminus A$  for finito. Mostre que isto define uma topologia em  $X$ . Sob quais condições essa topologia não é discreta? Observação: esta topologia costuma ser chamada de (topologia) **cofinita** no conjunto  $X$ . ■

**Exercício 1.1.17** (\*). Mostre que se  $\mathfrak{F}$  é uma família não vazia de topologias num conjunto  $X$ , então  $\bigcap \mathfrak{F}$  é uma topologia em  $X$ . Ao considerar uma topologia  $\mathcal{T} \in \mathfrak{F}$  qualquer, mostre que a função identidade  $\text{Id}_X : X \rightarrow X$  é uma função contínua do espaço  $(X, \bigcap \mathfrak{F})$  no espaço  $(X, \mathcal{T})$ .<sup>†</sup> ■

**Exercício 1.1.18** (\*). Dê exemplos de que a interseção infinita de abertos de um espaço topológico pode não ser aberta. Dica: ao se restringir à topologia da reta real, este exercício se torna um problema de Análise, que você provavelmente já resolveu. ■

**Exercício 1.1.19** (\*). Mostre que  $\mathbb{Q}$  não é interseção enumerável de abertos de  $\mathbb{R}$ . Dica: encare o Teorema de Baire até que ele te encare de volta. ■

## 1.2 Extras

Muitos exemplos interessantes que serão abordados nos próximos capítulos escapam do contexto típico de uma disciplina de Análise Real. Os mais comuns dependem de noções básicas de Análise Funcional, como espaços normados e com produto interno. Outros, um pouco mais sofisticados, costumam utilizar *ordinais*, objetos elementares de Teoria dos Conjuntos, mas relativamente desconhecidos fora desse nicho. Esses dois tipos de animais serão (brevemente) apresentados para você nesta seção, que pode ser omitida a depender de sua bagagem (ou pressa). Haverá também uma rápida introdução à *linguagem das categorias*, cujo poder *unificador* será frequentemente utilizado ao longo do texto.

<sup>†</sup>Se você preferir escrever  $\mathfrak{F} := \{\mathcal{T}_i : i \in \mathcal{I}\}$  para algum conjunto de índices  $\mathcal{I}$ , saiba que  $\bigcap \mathfrak{F}$  é a mesma coisa que  $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{T}_i$ .

### 1.2.1 Normas e produtos internos

*Normas e produtos internos* buscam, respectivamente, generalizar o *valor absoluto* e a *multiplicação* da reta para o contexto de *espaços vetoriais*. No que segue,  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ , de modo que assume-se certa familiaridade com artimanhas básicas.

**Definição 1.2.1.** Uma **norma** num  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $X$  é uma função  $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, +\infty)$  tal que

- (i)  $\|x\| = 0$  se, e somente se,  $x = 0$ ,
- (ii)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$  e
- (iii)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

para quaisquer  $x, y \in X$  e  $\lambda \in \mathbb{K}$ . O par  $(X, \|\cdot\|)$  é chamado de **espaço normado**, mas valem os mesmos abusos de linguagem de sempre envolvendo conjuntos com estruturas adicionais. ¶

**Definição 1.2.2.** Um **produto interno** num  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $X$  é uma função do tipo  $X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ , geralmente denotada por  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ , tal que

- (i)  $\langle x, x \rangle > 0$  se  $x \neq 0$ ,
- (ii)  $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ ,
- (iii)  $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \cdot \langle x, y \rangle$  e
- (iv)  $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ ,

para quaisquer  $x, y, z \in X$  e  $\lambda \in \mathbb{K}$ . O par  $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  costuma ser chamado de... **espaço com produto interno**. Você já sabe o restante do aviso. ¶

Antes de apresentar exemplos, convém estabelecer alguns fatos básicos.

**Lema 1.2.3** (Cauchy-Schwarz). *Se  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  é produto interno em  $X$ , então  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$  para quaisquer  $x, y \in X$ , onde  $\|u\| := \sqrt{\langle u, u \rangle}$  para qualquer  $u \in X$ .*

*Demonstração* (frequentemente atribuída a Paul Halmos). Primeiro, com  $\mathbb{K} := \mathbb{R}$ , note que para  $x, y \neq 0$ ,

$$0 \leq \left\| \frac{x}{\|x\|} \pm \frac{y}{\|y\|} \right\|^2 = 1 + 1 \pm 2 \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \Leftrightarrow \pm \langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\|,$$

pois  $\|x\| \|y\| \geq 0$  e  $\frac{\langle z, z \rangle}{\|z\|^2} = 1$  para qualquer  $z \neq 0$ . Os detalhes ficam por sua conta (\*).

Com  $\mathbb{K} := \mathbb{C}$ , note que para  $\alpha \in \mathbb{C}$  satisfazendo  $|\alpha| = 1$ , o mesmo tipo de raciocínio resulta em

$$0 \leq \left\| \frac{x}{\|x\|} - \alpha \frac{y}{\|y\|} \right\|^2 = 2 - 2\Re \left( \alpha \cdot \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \right),$$

onde  $\Re(a + bi) := a - bi$  é a **parte real** do número complexo  $a + bi$ . Tomando  $\alpha := \frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{|\langle x, y \rangle|}$ , segue que  $\alpha \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle| \in \mathbb{R}$ , de modo que a última linha se reescreve como

$$0 \leq 2 - 2\Re \left( \frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \right) = 2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|},$$

donde a desigualdade desejada segue<sup>†</sup>. □

<sup>†</sup>Pode ser útil recordar que para  $z \in \mathbb{C}$  se verifica  $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ .

**Corolário 1.2.4.** *Todo produto interno induz uma norma.*

**Proposição 1.2.5.** *Normas induzem métricas.*

**Exercício 1.2.1** (★). Prove as duas afirmações anteriores. Dica: para a primeira, use a sugestão notacional do lema e, para a segunda, faça  $d_{\|\cdot\|}(x, y) := \|x - y\|$ . ■

**Observação 1.2.6.** A menos de menção contrária, as normas e métricas que você usou no exercício anterior serão sempre consideradas em espaços com produtos internos ou normados, respectivamente. Nas frequentes ocasiões em que um espaço admitir mais de uma estrutura, símbolos adicionais serão empregados para distinguir as métricas, normas, etc. △

**Exemplo 1.2.7** (Normas euclidianas). Em  $\mathbb{K}^n$ , a regra

$$\|x\|_2 := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

induz uma norma, onde  $x := (x_1, \dots, x_n)$ , usualmente chamada de **norma euclidiana**. Ela é induzida pelo produto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  em  $\mathbb{K}^n$  dado por

$$\langle x, y \rangle := x_1 \overline{y_1} + \dots + x_n \overline{y_n},$$

que na falta de apelido melhor é chamado de (*produto interno*) **canônico** em  $\mathbb{K}^n$ . Se for sua primeira vez vendo essas coisas, certifique-se de que não menti (★). ▲

**Exemplo 1.2.8** (Integrais de Riemann). Você já deve ter visto em algum curso de Análise Real que se  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua e  $\int_a^b |f(t)| dt = 0$ , então  $f = 0$ . Esta é a parte mais difícil na verificação de que

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_1: C([a, b], \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \int_a^b |f(t)| dt \end{aligned}$$

define uma norma no  $\mathbb{R}$ -espaço vetorial  $C([a, b], \mathbb{R})$  composto pelas funções contínuas da forma  $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Em contextos semelhantes<sup>†</sup>, normas desse tipo costumam ser chamadas de **normas  $L_1$** . De modo similar, a regra

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(t)g(t) dt$$

define um produto interno em  $C([a, b], \mathbb{R})$ . Faça as contas para verificar as afirmações anteriores, mas só se quiser (★). ▲

**Exemplo 1.2.9** (Funções limitadas). O  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial

$$\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X) := \left\{ f \in \text{Fun}(X, \mathbb{K}) : \sup_{x \in X} |f(x)| < +\infty \right\},$$

composto pelas **funções limitadas** da forma  $X \rightarrow \mathbb{K}$ , vem de fábrica com uma norma: precisamente, a função  $\|\cdot\|_{\infty}: \mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X) \rightarrow [0, +\infty)$  que a cada  $f \in \mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$  associa o número  $\|f\|_{\infty} := \sup_{x \in X} |f(x)|$ , que passa a ser xingado de **norma do supremo** de  $f$ .

<sup>†</sup>Geralmente ao trocar a integral de Riemann pela *integral de Lebesgue*.

Dentre os espaços elementares, este é possivelmente o principal exemplo de um *espaço de Banach*: enquanto espaços métricos **completos** são aqueles nos quais toda sequência de Cauchy converge, um espaço normado é **de Banach** se a métrica induzida por sua norma é completa<sup>†</sup>. No presente caso, a completude de  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$  decorre, essencialmente, da completude de  $\mathbb{K}$  com respeito à sua norma usual  $|\cdot|$ . Verificar todas essas afirmações é um bom exercício de revisão (\*), mesmo se você já tiver feito isso alguma vez na sua vida<sup>‡</sup>. ▲

**Observação 1.2.10.** Embora a completude de  $(\mathbb{C}, |\cdot|)$  tenha sido assumida implicitamente, pode ser útil frisar que isto segue do exemplo anterior com  $\mathbb{K} := \mathbb{R}$  e  $X := \{1, 2\}$ . De fato, neste caso,  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}(X)$  é o espaço  $\mathbb{R}^2$  com a *norma do máximo*, enquanto  $(\mathbb{C}, |\cdot|)$  é *isomorficamente isométrico* a  $(\mathbb{R}^2, |\cdot|_2)$ . Isto será retomado oportunamente, não se preocupe. Em tempo: note que  $\mathbb{R}^n$  é um espaço de Banach com a norma do máximo. △

**Exemplo 1.2.11** (Espaços e subespaços de sequências). Ao tomar  $X := \mathbb{N}$  no último exemplo,  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$  se torna o *espaço das sequências limitadas*<sup>††</sup>, que por sua vez tem subespaços vetoriais muito naturais:

- (i)  $c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N}) := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N}) : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge em } \mathbb{K}\}$ , o subespaço das sequências convergentes, usualmente indicado apenas pela letra  $c$ ;
- (ii)  $c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N}) := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N}) : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{K}} 0\}$ , o subespaço das sequências que convergem para 0, usualmente indicado apenas como  $c_0$ ;
- (iii)  $c_{\mathbb{K},00}(\mathbb{N}) := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N}) : \text{existe } N \in \mathbb{N} \text{ tal que } x_n = 0 \text{ para todo } n \geq N\}$ , o subespaço das sequências *quase nulas*, i.e., que a partir de um certo índice assumem valor 0.

Um bom teste para saber se você precisa revisar Análise: se as inclusões

$$c_{\mathbb{K},00}(\mathbb{N}) \subsetneq c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N}) \subsetneq c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N}) \subsetneq \mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$$

não lhe parecerem óbvias mesmo com  $\mathbb{K} := \mathbb{R}$ , revise, pois são apenas fatos elementares de Análise Real — que você *deveria saber*. Em particular,  $c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N})$  e  $c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$  tornam-se espaços de Banach com a norma do supremo, pois (cf. Exercício 1.2.3) ambos são fechados em  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$  (certo?)<sup>\*</sup>. Por outro lado,  $c_{\mathbb{K},00}(\mathbb{N})$  não pode ser fechado em  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$  (cf. Exercício 1.2.4). ▲

**Observação 1.2.12.** É lícito perguntar por que enfatizar completude num texto de Topologia Geral, dado que não se trata de uma *propriedade topológica*<sup>‡‡</sup>. Como veremos, nos contextos certos, a completude tem manifestações topológicas (e.g., na caracterização de compacidade em espaços métricos) e, reciprocamente, a topologia também determina quais espaços *podem ter métricas completas compatíveis* (cf. Subseção 4.2.3). △

Uma das vantagens dos espaços normados é que, ao lidar apenas com as *transformações lineares*, a noção de continuidade se revela algo bem mais simples.

<sup>†</sup>Enquanto um espaço **de Hilbert** é um espaço com produto interno cuja norma induzida o torna um espaço de Banach.

<sup>‡</sup>Se for sua  $(n+2)$ -ésima vez fazendo este exercício, para algum  $n \in \mathbb{N}$ , troque  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$  por  $\mathcal{B}_E(X)$ , onde  $(E, \|\cdot\|)$  é um  $\mathbb{K}$ -espaço de Banach (adivinhar a definição de  $\mathcal{B}_E(X)$  faz parte do exercício!).

<sup>††</sup>Geralmente denotado por  $l^\infty$ .

<sup>‡‡</sup>*Spoiler*: enquanto a reta real é um espaço métrico completo com sua métrica usual, o intervalo  $(0, 1)$  não é; ainda assim, ambos são *homeomorfos*.



**Proposição 1.2.13.** Para uma transformação linear  $T: X \rightarrow Y$  entre espaços normados  $X$  e  $Y$ , são equivalentes:

- (i)  $T$  é contínua;
- (ii)  $T$  é contínua em 0;
- (iii) existe  $r > 0$  tal que  $\|T(x)\| \leq r \cdot \|x\|$  para todo  $x \in X$ .

*Demonstração.* Para (ii)  $\Rightarrow$  (iii), é mais conveniente usar a definição de continuidade em termos de  $\varepsilon$ 's e  $\delta$ 's. Como  $T$  é contínua em  $0 \in X$ , para  $\varepsilon := 1$  existe  $\delta > 0$  tal que

$$\|T(x)\| = \|T(x) - T(0)\| < 1$$

sempre que  $\|x\| = \|x - 0\| < \delta$ . Logo, para qualquer  $x \neq 0$  em  $X$  e  $\delta'$  com  $0 < \delta' < \delta$  temos  $u := \frac{\delta'}{\|x\|} \cdot x$  satisfazendo  $\|u\| < \delta$  (certo!?)<sup>\*</sup>, de modo que

$$\|T(u)\| = \left\| T\left(\frac{\delta'}{\|x\|}x\right) \right\| = \frac{\delta'}{\|x\|} \|T(x)\| < 1 \Rightarrow \|T(x)\| < \frac{1}{\delta'} \|x\|.$$

Para (iii)  $\Rightarrow$  (i), a linearidade de  $T$  dá  $\|T(x) - T(y)\| = \|T(x - y)\| \leq r\|x - y\|$  e, assim,  $\|T(x) - T(y)\| < \varepsilon$  sempre que  $\|x - y\| < \frac{\varepsilon}{r}$ . Por fim, é óbvio que (i)  $\Rightarrow$  (ii).  $\square$

**Corolário 1.2.14.** Duas normas,  $\|\cdot\|$  e  $\|\cdot\|'$  sobre um  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $X$  induzem a mesma topologia em  $X$  se, e somente se, existem números reais  $r, R > 0$  tais que  $r\|x\| \leq \|x\|' \leq R\|x\|$  para todo  $x \in X$ . Em particular, se duas normas induzem a mesma topologia, então uma é completa se, e somente se, a outra também é.

*Demonstração.* Chamando por  $\mathcal{T}$  e  $\mathcal{T}'$  as topologias induzidas por  $\|\cdot\|$  e  $\|\cdot\|'$ , respectivamente, note que  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$  sse  $\text{Id}_X: (X, \|\cdot\|') \rightarrow (X, \|\cdot\|)$  é contínua. De fato, a inclusão  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$  quer dizer que todo  $\mathcal{T}$ -aberto é  $\mathcal{T}'$ -aberto, o que por sua vez significa que  $A = \text{Id}_X^{-1}[A]$  é  $\mathcal{T}'$ -aberto sempre que  $A$  é  $\mathcal{T}$ -aberto, i.e., a transformação linear  $\text{Id}_X$  é contínua com respeito às topologias indicadas. Portanto, tudo segue da proposição anterior (além do fato de que  $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$  sse  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$  e  $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$ ). Para o restante, observe que, sob as hipóteses dadas, uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  é de Cauchy com respeito à norma  $\|\cdot\|$  sse é de Cauchy com respeito à norma  $\|\cdot\|'$ . Os detalhes ficam por sua conta ( $\star$ ).  $\square$

A condição (iii) na Proposição 1.2.13 define, secretamente, uma norma *especial* em  $\text{TLin}_{\mathbb{K}}(X, Y)$ , o espaço das transformações  $\mathbb{K}$ -lineares contínuas entre  $X$  e  $Y$ . Primeiro, note que para *qualquer* transformação linear  $T: X \rightarrow Y$ , ao definir os valores em  $[0, +\infty]$

- (i)  $A_T := \inf\{r > 0 : \|T(x)\| \leq r\|x\| \text{ para todo } x \in X\}$ ,
- (ii)  $B_T := \sup\{\|T(x)\| : x \in X \text{ e } \|x\| \leq 1\}$ ,
- (iii)  $C_T := \sup\{\|T(x)\| : x \in X \text{ e } \|x\| = 1\}$  e
- (iv)  $D_T := \sup\left\{\frac{\|T(x)\|}{\|x\|} : x \in X \text{ e } x \neq 0\right\}$ ,

verifica-se  $A_T = B_T = C_T = D_T$  (verifique!)<sup>\*</sup>, de modo que a proposição anterior se reescreve como “ $T$  é contínua sse  $A_T < +\infty$ ”. Isto mostra que a correspondência

$$\begin{aligned} \|\cdot\|: \text{TLin}_{\mathbb{K}}(X, Y) &\rightarrow [0, +\infty) \\ T &\mapsto A_T \end{aligned} \tag{1.1}$$

é, de fato, uma função. Mostrar que isto realmente define uma norma em  $\text{TLin}_{\mathbb{K}}(X, Y)$  será problema seu ( $\star$ ). Ela costuma ser xingada de **norma de operador**.

**Exercício 1.2.2** (\*). Mostre que se  $T \in \text{TLin}_{\mathbb{K}}(X, Y)$ , então  $\|T(x)\| \leq \|T\|\|x\|$  para todo  $x \in X$ . ■

**Observação 1.2.15** (Normas não bastam). Infelizmente, em situações bastante corriqueiras da Análise Funcional, normas não são capazes de capturar todas as nuances topológicas de espaços importantes, o que obriga adotar noções mais flexíveis do que normas... Você já imagina onde isto vai chegar, não é mesmo?

Em vez de uma norma no  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $X$ , pede-se uma topologia em  $X$  que torne as operações de soma  $X \times X \xrightarrow{+} X$  e multiplicação  $\mathbb{K} \times X \xrightarrow{\cdot} X$  contínuas. Isto traz algumas complicações para lidar com espaços de funções lineares e contínuas, mas a generalidade obtida compensa a dor e dá emprego a pessoas como eu. Como seria desonesto demais tratar de *espaços vetoriais topológicos* agora, dado que ainda nem nos familiarizamos com a *topologia produto*, convém esperar. Mas o aviso foi dado. △

**Exercício 1.2.3** (\*). Para um espaço métrico  $X$ , mostre que se  $F \subseteq X$  é completo com a métrica herdada de  $X$ , então  $F$  é fechado em  $X$ . Reciprocamente, mostre que se  $X$  é completo e  $F \subseteq X$  é fechado, então  $F$  é completo. Dica: lembre-se de que em espaços métricos, limites, quando existem, são únicos. ■

**Exercício 1.2.4** (\*). Seja  $X$  um  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial normado.

- Mostre que se  $Y \subseteq X$  é subespaço vetorial próprio, então  $Y$  não contém bolas abertas de  $X$ . Dica: faça um desenho primeiro.
- Mostre que se  $X$  tem dimensão infinita enumerável, então  $X$  não é espaço de Banach. Dica: refaça a demonstração do Teorema de Baire (cf. Teorema 1.1.17), mas troque  $\mathbb{R}$  por um espaço de Banach; lembre-se também que *todo*  $\mathbb{K}$ -espaço normado com dimensão finita é, necessariamente, de Banach<sup>†</sup>.
- Mostre que  $c_{\mathbb{K},00}(\mathbb{N})$  não é de Banach, independentemente da norma considerada. ■

## 1.2.2 Ordens e ordinais

Você certamente já estudou as relações binárias que usualmente são chamadas de *ordens*. A princípio, temos dois tipos clássicos: as *parciais*, que abstraem as propriedades do símbolo “ $\leq$ ” usado na escola, e as *estritas*, que fazem a mesma coisa com o símbolo “ $<$ ”, razão pela qual variações desses símbolos (ou os próprios!) são utilizados nas discussões em contexto abstrato. Dado que existe uma bijeção *óbvia* entre ordens parciais e estritas sobre um conjunto  $X$ , ambos os tipos serão chamados simplesmente de *ordens*, com a suposição tácita de que símbolos do tipo “ $\leq$ ” (como  $\preceq$ ,  $\sqsubseteq$ , etc.) devem ser tratados como ordens parciais, enquanto as variações do tipo “ $<$ ” (como  $\prec$ ,  $\sqsubset$ , etc.) devem ser tratados como as variações estritas dos primeiros, e vice-versa. Outras terminologias básicas, como *mínimos*, *máximos*, *ínfimos* e *supremos* serão assumidas como conhecidas. Se precisar revisar<sup>‡</sup>, procure qualquer livro de Análise que trate do assunto, e.g. [22].

**Observação 1.2.16.** Neste texto, a exceção fica por conta da inclusão, “ $\subseteq$ ”, cuja variação estrita não será indicada por “ $\subset$ ”, mas sim por “ $\subsetneq$ ”. △

<sup>†</sup>Isto será redemonstrado oportunamente, não se preocupe.

<sup>‡</sup>Teste: se você não sabe a diferença entre elemento mínimo e minimal numa ordem, é melhor revisar.



**Definição 1.2.17.** Um subconjunto  $I$  de uma ordem  $(\mathbb{P}, \leq)$  é chamado de **intervalo** se  $y \in I$  sempre que  $x, y, z \in \mathbb{P}$  satisfazem  $x \leq y \leq z$  com  $x, z \in I$ . ¶

Todos os tipos de intervalo que você conhece na reta real são exemplos imediatos de intervalos. Dado que os intervalos *abertos* da reta são usados para definir uma topologia, talvez seja possível utilizar intervalos numa ordem para fazer algo parecido.

**Definição 1.2.18.** Numa ordem  $(\mathbb{P}, \leq)$ , para  $p \in \mathbb{P}$  fixado, os subconjuntos da forma

$$(-\infty, p)_{\mathbb{P}} := \{x \in \mathbb{P} : x < p\} \quad (1.2)$$

$$(p, +\infty)_{\mathbb{P}} := \{x \in \mathbb{P} : p < x\} \quad (1.3)$$

serão chamados de **intervalos fundamentais**. Um subconjunto  $I \subseteq \mathbb{P}$  será chamado de **intervalo aberto** se  $I$  for interseção finita de intervalos fundamentais. ¶

**Observação 1.2.19.** As definições de outros intervalos típicos, como  $(a, b]_{\mathbb{P}}$ ,  $(a, b)_{\mathbb{P}}$ , etc. serão assumidas conhecidas. △

**Exercício 1.2.5** (\*). Mostre que as nomenclaturas acima são condizentes com a definição de intervalo. Mais precisamente: mostre que tanto intervalos fundamentais quanto intervalos abertos são intervalos. Dica: para a segunda parte, note (i.e., prove!)\* que a interseção de intervalos é intervalo. ■

**Exemplo 1.2.20.** A notação introduzida acima não traz novidades caso se tome  $\mathbb{P} := \mathbb{R}$  com sua ordenação usual. Uma ilustração mais interessante se obtém com  $\mathbb{P} := (0, 3] := \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 3\}$  e sua ordenação usual. Neste caso, com  $p := 1$  por exemplo,  $(-\infty, 1)_{\mathbb{P}} = (0, 1)$ , enquanto  $(1, +\infty)_{\mathbb{P}} = (1, 3]$ . Em geral, se  $\mathbb{P}$  é ordem que tem mínimo  $p_0$  ou máximo  $p_1$ , então tanto  $[p_0, p)_{\mathbb{P}}$  quanto  $(p, p_1]_{\mathbb{P}}$  são intervalos abertos em  $\mathbb{P}$ , para qualquer  $p \in \mathbb{P}$ .

CUIDADO: na *reta estendida*  $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ , que tem os pontos  $-\infty$  e  $+\infty$  como mínimo e máximo, respectivamente, temos  $(-\infty, a)_{\overline{\mathbb{R}}} = [-\infty, a)$  e  $(b, +\infty)_{\overline{\mathbb{R}}} = (b, +\infty]$  para quaisquer  $a, b \in \mathbb{R}$ . ▲

**Exemplo 1.2.21.** Seja  $\mathbb{P} := \mathbb{N} \cup \{\heartsuit\}$ , onde  $\heartsuit$  indica algum objeto não pertencente a  $\mathbb{N}$ , que declaramos como máximo de  $\mathbb{P}$  numa ordem  $\leq$  que estende a ordenação usual dos naturais<sup>†</sup>: assim,  $n < \heartsuit$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Em  $\mathbb{P}$ , os intervalos fundamentais não vazios são da forma

$$\begin{aligned} (-\infty, m+1)_{\mathbb{P}} &= \{0, \dots, m\} \\ (n, +\infty)_{\mathbb{P}} &= \{k \in \mathbb{N} : n < k\} \cup \{\heartsuit\} \end{aligned}$$

para quaisquer  $m, n \in \mathbb{N}$ . Consequentemente,  $\{n\}$  é intervalo aberto para qualquer  $n \in \mathbb{N}$ , enquanto os únicos intervalos abertos em torno de  $\heartsuit$  são da forma  $(n, +\infty)_{\mathbb{P}}$ . Convém aproveitar a oportunidade para avisar: neste texto,  $0 \in \mathbb{N}$ . ▲

**Observação 1.2.22.** Os dois últimos exemplos explicitam que “ser intervalo aberto” depende da ordem  $\mathbb{P}$  em que se considera o subconjunto, já que  $\{n\}$  não é intervalo aberto em  $\mathbb{R}$ , por exemplo. Para um exemplo menos óbvio, considere os intervalos  $[0, 2)$  e  $(4, 6)$  em  $\mathbb{R}$  e faça  $\mathbb{P} := [0, 2) \cup [4, 6)$ . Com a ordem herdada de  $\mathbb{R}$ , o subconjunto  $I := (1, 2) \cup [4, 5)$  é um intervalo aberto de  $\mathbb{P}$ , a saber  $I = (-\infty, 5)_{\mathbb{P}} \cap (1, +\infty)_{\mathbb{P}}$ , mas  $I$  não é sequer um intervalo de  $\mathbb{R}$ . △

<sup>†</sup>Se você tiver maturidade suficiente para usar “ $\infty$ ” sem pensar que se trata, necessariamente, do mesmo símbolo usado em Cálculo, também pode.

**Definição 1.2.23.** A **topologia da ordem** num conjunto ordenado  $(\mathbb{P}, \leq)$  é definida da seguinte forma:  $A \subseteq \mathbb{P}$  é declarado aberto se, e somente se, para todo  $a \in A$  existe um intervalo aberto  $I \subseteq \mathbb{P}$  tal que  $a \in I$  com  $I \subseteq A$ . ◻

A topologia da ordem<sup>†</sup> costuma gerar exemplos interessantes ao ser considerada sobre *ordinais*, que nada mais são do que representantes *canônicos* dos conjuntos bem ordenados. Embora a discussão dos pormenores possa ser exaustiva, uma breve pincelada no assunto já será suficiente para suas aparições futuras. Para entrar no clima, vamos começar *pelo começo*.

**Definição 1.2.24.** Dizemos que  $(\mathbb{B}, \leq)$  é uma **boa ordem** (ou que  $\mathbb{B}$  é um conjunto **bem ordenado** por  $\leq$ , etc.) se  $(\mathbb{B}, \leq)$  for uma ordem em que todo subconjunto não vazio de  $\mathbb{B}$  tem menor elemento. ◻

**Observação 1.2.25** (Indução e recursão em boas ordens). Argumentos por indução não são exclusividade de  $\mathbb{N}$ , mas sim um artifício disponível em qualquer conjunto bem ordenado. Explicitamente, *se  $(\mathbb{B}, \leq)$  é uma boa ordem e  $X \subseteq \mathbb{B}$  for tal que, para qualquer  $c \in \mathbb{B}$ , tenha-se  $c \in X$  sempre que  $\{b \in \mathbb{B} : b < c\} \subseteq X$ , então  $X = \mathbb{B}$* : caso contrário,  $\mathbb{B} \setminus X$  seria um conjunto não vazio sem menor elemento. Consequentemente, também é possível definir funções *recursivamente* em domínios bem ordenados — e *Teoremas de Recursão* são apenas resultados que asseguram a boa definição de funções assim. Por exemplo, chamando por  $\mathbb{V}$  a **classe de todos os conjuntos**, para cada boa ordem  $(\mathbb{B}, \leq)$  e cada função de classe  $\mathcal{F}: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ , existe uma única *função*  $f: \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{V}$  tal que  $f(b) = \mathcal{F}((f(a) : a < b))$  para todo  $b \in \mathbb{B}$ . Esta versão deve dar conta de todas as funções definidas recursivamente no texto. Para mais detalhes, confira [21]. ◻

A boa ordem favorita das pessoas costuma ser  $(\mathbb{N}, \leq)$  com sua ordem usual, mas todo esse protagonismo costuma ofuscar a existência de *inúmeras* outras boas ordens.

**Proposição 1.2.26.** Se  $(\mathbb{B}, \leq)$  é uma boa ordem e  $u' \notin \mathbb{B}$ , então existe uma boa ordem  $(\mathbb{B}', \leq')$  tal que

- (i)  $\mathbb{B} \subsetneq \mathbb{B}'$ ,
- (ii)  $x \leq y \Leftrightarrow x \leq' y$  para quaisquer  $x, y \in \mathbb{B}$ , e
- (iii)  $u'$  é o maior elemento de  $\mathbb{B}'$ .

*Demonstração.* Basta fazer  $\mathbb{B}' := \mathbb{B} \cup \{u'\}$  e definir  $\leq'$  como  $\leq$  para pares de elementos em  $\mathbb{B}$ , enquanto  $b < u'$  para todo  $b \in \mathbb{B}$ . É evidente que  $(\mathbb{B}', \leq')$  ainda é uma boa ordem (certo?)\*. ◻

**Observação 1.2.27.** Como  $\leq'$  é a única extensão possível de  $\leq$  com as propriedades acima, não há risco em abandonar o apóstrofo e indicá-la por  $\leq$ . ◻

Assim, a ordem  $\mathbb{P}$  do Exemplo 1.2.21 é uma boa ordem que estende  $\mathbb{N}$ : ela consiste na ordem dos números naturais com um máximo (*artificialmente*)<sup>‡</sup> adicionado. Ela serve como *primeiro* exemplo de boa ordem com um elemento *limite* não trivial.

<sup>†</sup>Você verificou que a definição, de fato, satisfaz os critérios para ser uma topologia? (★)

<sup>‡</sup>O que não é artificial?

**Definição 1.2.28.** Sejam  $(\mathbb{B}, \leq)$  uma boa ordem e  $b \in \mathbb{B}$  um elemento. Dizemos que  $b$  é um **elemento sucessor** em  $\mathbb{B}$  se existe  $a \in \mathbb{B}$  tal que  $b = \min\{c \in \mathbb{B} : a < c\}$ . Caso contrário,  $b$  é dito um **elemento limite**.  $\P$

Em outras palavras,  $b$  é um elemento sucessor se  $b$  for *sucessor* de algum  $a \in \mathbb{B}$ , no sentido usual. Dessa forma, em  $\mathbb{N}$  por exemplo, todo  $n \in \mathbb{N}$  com  $n > 0$  é sucessor, enquanto 0 é o único limite, posto que  $0 = \min \mathbb{N}$ . Já em  $\mathbb{P} := \mathbb{N} \cup \{\heartsuit\}$ , o elemento  $\heartsuit$  também é limite, posto que se  $\alpha < \heartsuit$ , então  $\alpha \in \mathbb{N}$  e daí  $\alpha + 1 \in \mathbb{N}$  é o sucessor de  $\alpha$ . Podemos reaplicar o raciocínio a  $\mathbb{P}$ , obtendo  $\mathbb{P}'$ ,  $\mathbb{P}''$ ,  $\mathbb{P}'''$ , ..., mas isto obrigaria a introdução de novos símbolos  $\heartsuit'$ ,  $\heartsuit''$ ,  $\heartsuit'''$ . Isto pode ser feito de maneira bem mais econômica com a linguagem de ordinais.

A única hipótese exigida sobre o elemento  $u'$  na última proposição foi que  $u'$  não poderia ser um elemento de  $\mathbb{B}$ . Ocorre que sob os domínios de ZFC, todo conjunto  $X$  satisfaz  $X \notin X$  por conta do *Axioma da Fundação*. Assim, seria formalmente aceitável definir  $\mathbb{B}' := \mathbb{B} \cup \{\mathbb{B}\}$ . Como isso pode ser confuso para quem não tem o hábito de tratar *conjuntos* como *elementos* de outros *conjuntos*, convém exemplificar o fenômeno ainda mais devagar<sup>†</sup>.

Começando com  $\mathbb{B} := \emptyset$ , temos  $\emptyset \notin \emptyset$  e  $\emptyset' := \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$  (certo?)\*. Escrevendo  $\tilde{0} := \emptyset$ , parece razoável fazer  $\tilde{1} := \emptyset'$ , pois assim  $\tilde{1} = \{\tilde{0}\}$ . Com isso, torna-se irresistível fazer  $\tilde{2} := \tilde{1}'$ , pois daí  $\tilde{2} := \tilde{1}' = \tilde{1} \cup \{\tilde{1}\} = \{\tilde{0}\} \cup \{\tilde{1}\} = \{\tilde{0}, \tilde{1}\}$ .

Note que com tal construção, a relação de pertinência ordena naturalmente os elementos de  $\tilde{2}$ , já que  $\tilde{0} \in \tilde{1}$ . Mais ainda, a pertinência faz do novo elemento o maior. Por exemplo, definindo  $\tilde{3} := \tilde{2}'$ , obtemos  $\tilde{3} = \{\tilde{0}, \tilde{1}, \tilde{2}\}$  com  $\tilde{0} \in \tilde{1} \in \tilde{2}$ .

Procedendo recursivamente, chega-se ao conjunto

$$\omega := \{\tilde{n} : n \in \mathbb{N}\},$$

bem ordenado pela relação de pertinência. Dado que o conjunto  $\omega$  acima satisfaz os Axiomas de Peano, entusiastas da Teoria dos Conjuntos costumam ignorar o “til” e tratar  $\omega$  como *o conjunto dos números naturais*, prática que será mantida aqui ocasionalmente<sup>‡</sup>. Por valer  $n' = n + 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , nada mais *natural* do que escrever  $\omega + 1 := \omega \cup \{\omega\}$ ,  $\omega + 2 := \omega + 1 \cup \{\omega + 1\}$ , etc. Todos esse animais são exemplos de *ordinais*.

**Definição 1.2.29.** Um conjunto  $\alpha$  é chamado de (**número**) **ordinal** se  $(\alpha, \in)$  for uma boa ordem<sup>††</sup> tal que  $x \subseteq \alpha$  para todo  $x \in \alpha$ .  $\P$

A definição acima captura a essência do procedimento feito nos exemplos anteriores, no sentido de que todas as boas ordens  $0, 1, 2, \dots, \omega, \omega + 1, \omega + 2, \dots$  são ordinais.

De modo geral, um ordinal qualquer tem como elementos todos os ordinais *anteriores*. Assim, ao escrever  $\alpha < \beta$  em vez de  $\alpha \in \beta$  para ordinais, resulta que para qualquer ordinal  $\gamma$  se verificam as identidades

$$\gamma = \{\alpha : \alpha \text{ é ordinal e } \alpha < \gamma\} \text{ e } \gamma + 1 = \{\alpha : \alpha \text{ é ordinal e } \alpha \leq \gamma\}.$$

<sup>†</sup>Mas supere logo esta limitação. Afinal de contas, topologias são conjuntos de subconjuntos de um conjunto — e foi você quem decidiu estudar este assunto.

<sup>‡</sup>Mas nem sempre. Não precisa agradecer.

<sup>††</sup>A ordem aqui deve ser entendida no sentido *estrito*, i.e., “ $x \in y$ ” deve ser interpretado como “ $x < y$ ”. Nesse contexto, a versão parcial da relação de ordem dada pela pertença em ordinais fica a cargo da inclusão, ou seja: para  $x, y \in \alpha$  com  $\alpha$  ordinal, temos  $x \subseteq y$  se, e somente se,  $x \in y$  ou  $x = y$ .

Além disso, vale a *tricotomia para ordinais*, i.e.: se  $\alpha$  e  $\beta$  são ordinais, então  $\alpha = \beta$ ,  $\alpha < \beta$  ou  $\beta < \alpha$ . Na verdade, mais do que isso é verdade: a *classe* de todos os ordinais é bem ordenada pela relação de pertinência, no sentido de que qualquer classe não vazia de ordinais admite menor elemento. Para mais detalhes, confira [21].

**Observação 1.2.30.** Pode ser menos ofensivo utilizar a notação de intervalos para representar ordinais. Assim, em vez de  $\gamma$  e  $\gamma + 1$ , podemos escrever  $[0, \gamma)$  e  $[0, \gamma]$ , respectivamente. Isto será feito sempre que considerarmos ordinais como espaços topológicos com as topologias induzidas por suas ordens, exceto nos contextos em que outros tipos de intervalos também estiverem envolvidos explicitamente. Em particular,  $[0, \omega] = \mathbb{N} \cup \{\omega\}$ , e você pode pensar em  $\omega$  como sendo o elemento  $\heartsuit$  do Exemplo 1.2.21.  $\triangle$

Embora possa parecer um jeito esquisito de lidar com boas ordens, ordinais capturam a *essência* delas, num sentido bastante difícil de discordar:

**Teorema 1.2.31.** *Para uma boa ordem  $(\mathbb{B}, \leq)$  qualquer, existe um único ordinal  $\beta$  tal que  $(\mathbb{B}, <)$  e  $(\beta, \in)$  são isomorfos. Além disso, o isomorfismo<sup>†</sup> é único.*

*Ideia da prova.* Se  $\mathbb{B} \neq \emptyset$ , defina  $f(\min \mathbb{B}) := \emptyset$  e, supondo  $f(b)$  definido para todo  $b < c$ , faça  $f(c) := \{f(b) : b < c\}$ . Pelo *Teorema da Recursão* (cf. Observação 1.2.25), esta função está bem definida. Com alguma paciência e ferramentas *adequadas*<sup>‡</sup>, mostra-se que  $\text{im}(f)$  é o ordinal procurado, enquanto  $f$  é o único isomorfismo possível.  $\square$

Isto deve ser suficiente para te convencer da existência do ordinal  $\omega_1$ : o *primeiro ordinal não enumerável*. Duvida?

**Proposição 1.2.32.** *Existe  $\omega_1$ .*

*Demonstração* (opcional). Seja  $X$  o seu conjunto não enumerável favorito<sup>††</sup>. Pelo Axioma da Escolha<sup>‡‡</sup>, existe  $\preceq$  uma boa ordem sobre  $X$ . Considere então

$$T := \{x \in X : \{y \in X : y \prec x\} \text{ é não enumerável}\}.$$

Temos dois casos:  $T = \emptyset$  ou  $T \neq \emptyset$ . Se ocorrer o primeiro, defina  $\omega_1$  como o único ordinal isomorfo a  $(X, \prec)$ . Para o segundo caso, basta escolher  $\tilde{x} := \min T$  e definir  $\omega_1$  como o único ordinal isomorfo a  $((-\infty, \tilde{x})_X, \prec)$ , onde  $(-\infty, \tilde{x})_X := \{x \in X : x \prec \tilde{x}\}$ . Em qualquer um dos cenários, se  $\alpha < \omega_1$ , então  $\{\beta : \beta < \alpha\}$  é enumerável, pois o contrário violaria a escolha de  $\omega_1$ . Portanto,  $\omega_1$  é o primeiro ordinal não enumerável.  $\square$

E por que alguém se importaria em discutir  $\omega_1$  num curso de Topologia Geral?

**Lema 1.2.33.** *Se  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é sequência de ordinais enumeráveis, então  $\sup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n < \omega_1$ .*

*Demonstração* (opcional). Primeiro, note que se  $\mathcal{K}$  é uma coleção de ordinais, então  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{K}} \alpha = \sup \mathcal{K}$ , no sentido de que  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{K}} \alpha$  é o menor ordinal a limitar superiormente todos os ordinais de  $\mathcal{K}$ . Como todo ordinal é um coleção de ordinais e toda coleção de ordinais é bem ordenada pela pertinência, segue que  $(\bigcup_{\alpha \in \mathcal{K}} \alpha, \in)$  é bem ordenado. Agora, se  $y \in \bigcup_{\alpha \in \mathcal{K}} \alpha$ , então  $y \in \beta$  para algum  $\beta \in \mathcal{K}$ , acarretando  $y \subseteq \beta \subseteq \bigcup_{\alpha \in \mathcal{K}} \alpha$ . Portanto,  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{K}} \alpha$  é ordinal.

<sup>†</sup>Neste contexto: bijeção crescente.

<sup>‡</sup>*Spoiler.* Por *indução na boa ordem* de  $\mathbb{B}$  (cf. Observação 1.2.25), mostra-se que  $f(b)$  é ordinal para cada  $b \in \mathbb{B}$ . Como todo conjunto de ordinais é bem ordenado pela relação de pertinência e a condição “ $y \in \text{im}(f) \Rightarrow y \subseteq \text{im}(f)$ ” vale por construção, acabou. Para mais detalhes, confira [21].

<sup>††</sup>Pode ser  $\mathbb{R}$ ,  $\wp(\mathbb{N})$ ,  $\wp(\mathbb{R})$ , etc.

<sup>‡‡</sup>A prova sem o Axioma da Escolha não é mais difícil, porém é mais técnica.

Consequentemente, no caso específico do enunciado,  $\alpha := \sup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n$  é uma reunião enumerável de conjuntos enumeráveis e, por conseguinte, é enumerável. Se ocorresse  $\omega_1 \in \alpha$ , teríamos  $\omega_1 \subseteq \alpha$ , o que implicaria em  $\omega_1$  ser enumerável. Portanto,  $\alpha < \omega_1$ .  $\square$

**Proposição 1.2.34.** *Não existe sequência  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $[0, \omega_1)$  tal que  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \omega_1$  em  $[0, \omega_1]$ . Apesar disso, se  $V \subseteq [0, \omega_1]$  é um aberto tal que  $\omega_1 \in V$ , então  $V \cap [0, \omega_1) \neq \emptyset$ .*

*Demonstração.* Dizer que  $\alpha_n \in [0, \omega_1)$  equivale a dizer que  $\alpha_n < \omega_1$  e, consequentemente,  $\alpha_n$  é ordinal enumerável. Agora, se  $\gamma < \omega_1$ , então  $(\gamma, \omega_1]$  é um intervalo aberto em torno de  $\omega_1$  no sentido da Definição 1.2.18, de modo que se a sequência convergir para  $\omega_1$ , então existirá  $N \in \mathbb{N}$  com  $\gamma < \alpha_n$  para todo  $n \geq N$ . Em outras palavras, mostrou-se que nenhum ordinal menor do que  $\omega_1$  limita a (imagem da) sequência superiormente, donde segue que  $\omega_1 = \sup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n$ , violando o último lema. Isto prova a primeira parte da proposição. Para o restante, note que se  $V$  é um aberto com  $\omega_1 \in V$ , então existe um intervalo aberto da forma  $(\beta, \omega_1] \subseteq V$  para algum  $\beta < \omega_1$  (notou mesmo?)\*. Como  $\beta$  é enumerável, temos  $\beta + 1 := \beta \cup \{\beta\}$  enumerável, i.e.,  $\beta + 1 < \omega_1$ , acarretando em  $\beta + 1 \in [0, \omega_1) \cap V$ .  $\square$

Assim, se você lembra da definição de *ponto aderente*<sup>†</sup>,  $[0, \omega_1]$  nos dá um exemplo de espaço em que  $\omega_1$  é ponto aderente ao conjunto  $[0, \omega_1)$ , mas de tal forma que nenhuma sequência em  $[0, \omega_1)$  converge para  $\omega_1$ , contrariando a intuição métrica que herdamos da Análise Real. Quer mais?

**Proposição 1.2.35.** *Se  $f: [0, \omega_1) \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua, então existe um ordinal  $\alpha < \omega_1$  tal que  $f(\beta) = f(\alpha)$  para todo  $\beta \in (\alpha, \omega_1)$ .*

*Demonstração.* Vamos “desempacotar” algumas informações codificadas nas exigências analíticas<sup>‡</sup>. Primeiro, buscamos  $\alpha < \omega_1$  tal que se  $\alpha < \beta < \omega_1$ , então  $|f(\alpha) - f(\beta)| = 0$ . Um modo alternativo de dizer a mesma coisa consiste em pedir

$$|f(\alpha) - f(\beta)| < \frac{1}{2^n}$$

para todo  $n \in \mathbb{N}$  e  $\beta \in (\alpha, \omega_1)$ . Parece bobo, mas isto reduz o problema de encontrar um  $\alpha$  satisfazendo todas essas exigências ao problema de encontrar, para cada  $n \in \mathbb{N}$ , um  $\alpha_n < \omega_1$  satisfazendo apenas

$$|f(\alpha_n) - f(\beta)| < \frac{1}{2^n}$$

para todo  $\beta \in (\alpha_n, \omega_1)$ , pois daí basta tomar  $\alpha := \sup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n$  (entendeu?)\*.

Agora, supor que isto não pode ser feito para todo  $n \in \mathbb{N}$  significa o seguinte: existe  $m \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $\alpha < \omega_1$ , algum  $\beta_\alpha \in (\alpha, \omega_1)$  satisfaz  $|f(\alpha) - f(\beta_\alpha)| \geq \frac{1}{2^m}$ .

Isso permite definir sequências  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  e  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  num zigue-zague maroto: começamos com  $x_0 := 0$  e  $y_0 := \beta_{x_0}$ , depois  $x_1 := \beta_{y_0}$  e  $y_1 := \beta_{x_1}$ ; supondo  $x_0, \dots, x_n$  e  $y_0, \dots, y_{n-1}$  definidos para algum  $n$ , colocamos  $y_n := \beta_{x_n}$  e  $x_{n+1} := \beta_{y_n}$ . Dessa forma, para todo  $n \in \mathbb{N}$  se asseguram as desigualdades

$$x_n < y_n < x_{n+1} \quad \text{e} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \frac{1}{2^m} := 2\varepsilon.$$

<sup>†</sup>Se você não lembra, não se preocupe: isto será retomado em breve.

<sup>‡</sup>E para evitar confusões, fica o aviso de que, ao longo da demonstração, a notação de intervalo será empregada apenas para subconjuntos do ordinal  $\omega_1 := [0, \omega_1)$ .



Ocorre que sob tais condições,  $f$  não pode ser contínua no ponto  $\gamma := \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$ . Com efeito, não há aberto  $V \subseteq [0, \omega_1]$  com  $\gamma \in V$  tal que  $|f(v) - f(\gamma)| < \varepsilon$  para todo  $v \in V$ : ora, se existisse, então teríamos  $(\delta, \gamma] \subseteq V$  para algum  $\delta < \gamma$  (certo?)\*, donde a definição de  $\gamma$  garantiria um  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $x_n \in (\delta, \gamma]$  para todo  $n \geq N$  (por quê?)\*, acarretando

$$|f(x_n) - f(y_n)| \leq |f(x_n) - f(\gamma)| + |f(\gamma) - f(y_n)| < \varepsilon + \varepsilon = \frac{1}{2^m},$$

o que contraria a escolha de  $x_n$  e  $y_n$ . Portanto,  $f$  é descontínua em  $\gamma$  (percebeu *mesmo?*)\*, como desejado.  $\square$

**Corolário 1.2.36.** *Existe uma função  $f: [0, \omega_1] \rightarrow \mathbb{R}$  descontínua mas sequencialmente contínua.*

*Demonstração.* Basta fazer  $f(\alpha) := 0$  para  $\alpha < \omega_1$  e  $f(\omega_1) \neq 0$ . Completar os detalhes será sua responsabilidade (\*).  $\square$

Já deu para notar que ordinais, como  $\omega_1$ , serão boas fontes de (contra)exemplos para os problemas tratados neste texto. Portanto, acostume-se. Outros ordinais ou *cardinais* importantes, como  $\aleph_\omega$ , serão introduzidos quando forem necessários. Para mais detalhes, você pode conferir [21], ou o Vencedor do Jabuti 2025 [13].

**Exercício 1.2.6** (\*). Seja  $(\mathbb{P}, \leq)$  uma ordem.

- Mostre que se  $\mathbb{P}$  é uma boa ordem e  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$  é uma função, então  $\text{im}(f)$  tem menor elemento. Conclua que, neste caso, não existe função  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$  *estritamente decrescente*, i.e., tal que se  $m, n \in \mathbb{N}$  com  $m < n$ , então  $f(m) > f(n)$ .
- Suponha que  $\mathbb{P}$  seja *ordem total*<sup>†</sup>, mas que não seja boa ordem. Mostre que existe uma função  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$  *estritamente decrescente*. Dica: recursão + Axioma da Escolha.  $\blacksquare$

### 1.2.3 A linguagem de categorias: funtores

Na última subseção, a partir de um *conjunto ordenado*  $(\mathbb{P}, \leq)$ , construímos um *espaço topológico*  $(\mathbb{P}, \mathcal{T}_\leq)$ , onde  $\mathcal{T}_\leq$  é a topologia definida pelos intervalos abertos de  $\mathbb{P}$  com respeito à ordem  $\leq$ . Em outras palavras, definiu-se uma “função”  $\mathcal{T}_\bullet: \text{POSET} \rightarrow \text{TOP}$  entre as *classes* POSET e TOP, onde POSET indica a classe de todas as ordens (parciais) e TOP indica a classe de todos os espaços topológicos. Esse tipo de situação típica nos coloca diante de uma oportunidade: investigar se  $\mathcal{T}_\bullet$  respeita a *estrutura categórica das classes* ou, em linguagem profissional, tentar descobrir se  $\mathcal{T}_\bullet$  é um *funtor*.

A coisa toda é mais simples do que parece. Por exemplo, se  $G$  e  $H$  são grupos e  $f: G \rightarrow H$  é uma função, podemos nos perguntar se  $f$  é *compatível* com as operações de  $G$  e  $H$ , i.e., se  $f(xy) = f(x)f(y)$  para quaisquer  $x, y \in G$ . Tradicionalmente, casos afirmativos são chamados de *homomorfismos de grupos*. No caso de POSET e TOP, ambas as classes vêm de fábrica com certos tipos de “operações” — não entre seus *objetos*, mas sim entre certas *setas* funções existentes entre os seus objetos, ou seja, a composição — de modo que um funtor é uma *função* compatível com essas operações.

<sup>†</sup>Aquelas em que vale a *tricotomia*, i.e., quaisquer dois elementos são (iguais ou) comparáveis.

**Definição 1.2.37.** Uma categoria  $\mathcal{C}$  é um par  $(\text{Obj}(\mathcal{C}), \text{Arr}(\mathcal{C}))$ , onde  $\text{Obj}(\mathcal{C})$  e  $\text{Arr}(\mathcal{C})$  são, respectivamente, a **classe dos objetos** de  $\mathcal{C}$  e a **classe das flechas** (ou **setas** ou **morfismos**) de  $\mathcal{C}$ , com as propriedades a seguir.

(C<sub>1</sub>) Existem *funções de classe*  $\text{dom}(\bullet): \text{Arr}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathcal{C})$  e  $\text{cod}(\bullet): \text{Arr}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathcal{C})$  que a cada seta  $f \in \text{Arr}(\mathcal{C})$  associam os objetos  $\text{dom}(f)$  e  $\text{cod}(f)$ , respectivamente xingados de **domínio** e **codomínio** da seta  $f$ . Escreve-se  $f: a \rightarrow b$  ou  $a \xrightarrow{f} b$  a fim de abreviar a expressão “ $\text{dom}(f) = a$  e  $\text{cod}(f) = b$ ”.

(C<sub>2</sub>) Para quaisquer  $a, b, c \in \text{Obj}(\mathcal{C})$  existe uma correspondência de classes

$$\circ: \mathcal{C}(b, c) \times \mathcal{C}(a, b) \rightarrow \mathcal{C}(a, c)$$

a **composição**, onde  $\mathcal{C}(x, y)$  denota, para cada  $x, y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ , a subclasse de  $\text{Arr}(\mathcal{C})$  composta por todas as setas  $f$  da forma  $x \rightarrow y$ , i.e.,

$$\mathcal{C}(x, y) := \{f \in \text{Arr}(\mathcal{C}) : \text{dom}(f) = x \text{ e } \text{cod}(f) = y\}, \quad (1.4)$$

a subclasse dos **morfismos de  $x$  para  $y$** . Mais precisamente, se  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow c$  são setas da categoria  $\mathcal{C}$ , então existe uma terceira seta,  $g \circ f: a \rightarrow c$ .

(C<sub>3</sub>) A composição é associativa, no seguinte sentido<sup>†</sup>: se  $f: a \rightarrow b$ ,  $g: b \rightarrow c$  e  $h: c \rightarrow d$  são setas da categoria  $\mathcal{C}$ , então  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ .

(C<sub>4</sub>) Para cada objeto  $a \in \text{Obj}(\mathcal{C})$  existe uma seta  $\text{id}_a \in \mathcal{C}(a, a)$  tal que  $f \circ \text{id}_a = f$  e  $\text{id}_a \circ g = g$  para quaisquer setas  $f, g \in \mathcal{C}$  com  $\text{dom}(f) = a$  e  $\text{cod}(g) = a$ .  $\P$

**Exemplo 1.2.38** (Casos clássicos). Classes de conjuntos dotados de estruturas adicionais constituem as situações típicas de categorias ao considerarmos como setas ou morfismos as funções compatíveis com as estruturas.

- (i) SET, a **categoria dos conjuntos**, é a categoria cujos objetos são conjuntos e cujas setas são funções. Composições são feitas do modo usual e as identidades são as funções identidade de sempre. Note que tudo funciona por conta das propriedades de composição de funções que você aprendeu na escola.
- (ii) GROUP, a **categoria dos grupos**, é a categoria cujos objetos são grupos e cujas setas são os (homo) morfismos de grupos. Composições e identidades são as usuais — e tudo funciona pois você já verificou, no seu passado, que a função identidade de um grupo é um homomorfismo de grupos, bem como já viu que a composição de homomorfismos de grupos é um homomorfismo de grupos. **Em tempo:** *daqui em diante, o sufixo “homo” será abandonado.*
- (iii) As **categorias RING (dos anéis com unidade<sup>‡</sup>)**, **CRING (dos anéis comutativos e com unidade)**,  **${}_K\text{VECT}$  (dos espaços vetoriais sobre o corpo  $K$ )**, etc. são definidas de modo análogo a GROUP. Em particular: quando tratarmos de morfismos de anéis comutativos com unidade, assumiremos que a unidade é preservada; além disso, como de costume, morfismos entre  $K$ -espaços vetoriais serão chamados de funções  *$K$ -lineares*.

<sup>†</sup>Note que a igualdade “faz sentido” pois  $g \circ f: a \rightarrow c$  e  $h \circ g: b \rightarrow d$  existem e, consequentemente, também existem  $h \circ (g \circ f)$  e  $(h \circ g) \circ f$ .

<sup>‡</sup>A menos de menção explícita, todos os anéis aqui serão considerados com unidade.

- (iv) TOP, a **categoria dos espaços topológicos**, é a categoria cujos objetos são espaços topológicos e cujas setas são funções contínuas. Composições e identidades são, novamente, as de sempre, e tudo funciona pois composição de funções contínuas é contínua (certo?)\* e funções identidades são contínuas (de acordo?)\*. ▲

Apesar da ênfase dada aos objetos na nomenclatura usual das categorias, deve-se ter em mente que são as setas quem determinam, de fato, a categoria. Para citar um exemplo básico: há pelo menos dois modos naturais de considerar uma categoria que tem espaços métricos como objetos. Na primeira, que denotaremos por  $\text{MET}_{\text{CONT}}$ , setas são funções contínuas. Na segunda, que denotaremos por  $\text{MET}_{\text{DIST}}$ , setas são **isometrias**<sup>†</sup>. Pode parecer bobagem, mas não é: por exemplo, na primeira,  $\mathbb{R}$  e o intervalo aberto  $(0, 1)$  são *isomorfos* ao considerarmos as topologias induzidas por suas métricas usuais, o que não acontece na segunda ao considerarmos as mesmas métricas. Mas o que é *isomorfismo* numa categoria? A única coisa que poderia ser:

**Definição 1.2.39.** Dois objetos  $a$  e  $b$  de uma categoria  $\mathcal{C}$  são  **$\mathcal{C}$ -isomorfos** se existem setas  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow a$  tais que  $g \circ f = \text{id}_a$  e  $f \circ g = \text{id}_b$ . Em tais situações,  $f$  e  $g$  são chamadas de  **$\mathcal{C}$ -isomorfismos**. ¶

**Exercício 1.2.7** (\*). Agora que já sabe a definição, verifique as afirmações anteriores, i.e., mostre que  $\mathbb{R}$  e  $(0, 1)$  são  $\text{MET}_{\text{CONT}}$ -isomorfos, mas não são  $\text{MET}_{\text{DIST}}$ -isomorfos. Dica: a primeira parte é um exercício básico de Análise Real, enquanto a segunda segue quase que imediatamente da definição de isometria. ■

**Observação 1.2.40.** Sim: **homeomorfismos** são, precisamente, os isomorfismos da categoria TOP. Voltaremos a eles em breve, não tenha pressa. △

Em outras palavras, as setas de uma categoria codificam, em certo sentido, os critérios para determinar quando dois de seus objetos são *indistinguíveis* (cf. Exercício 1.2.12). Mudar as setas acarreta mudar tais critérios, de modo que objetos antes equivalentes podem deixar de ser. E aqui, a *indistinguíbilidade* deve ser entendida no contexto da *linguagem categórica*, aquela cujas afirmações tratam apenas de objetos e setas da categoria, o único tipo de informação a que temos acesso nesse nível de generalidade. Porém, ainda é cedo para ilustrar a ideia. Há coisas mais urgentes para *corrigir*, como a crença típica de que setas são funções.

**Exemplo 1.2.41.** Uma ordem parcial  $(\mathbb{P}, \leq)$  pode ser interpretada como uma categoria: objetos de  $\mathbb{P}$  são os elementos de  $\mathbb{P}$ , enquanto uma seta  $x \rightarrow y$  existe sse  $x \leq y$ . Assim, na prática, as setas de  $\mathbb{P}$  apenas atestam a existência de relação entre objetos: aqui, a reflexividade de  $\leq$  se traduz nas setas identidades, enquanto a transitividade de  $\leq$  assegura a boa definição das composições, cuja associatividade segue pois entre quaisquer dois objetos há, no máximo, uma seta. Em particular, dois objetos  $x, y \in \mathbb{P}$  são  $\mathbb{P}$ -isomorfos sse  $x = y$ . ▲

**Observação 1.2.42.** Talvez você tenha a impressão que a antissimetria não foi importante no último exemplo. E é realmente este o caso. Uma **pré-ordem**  $(\mathbb{P}, \leq)$  é, justamente, uma *ordem não necessariamente antissimétrica*, i.e., assume-se apenas que  $\leq$  é reflexiva e transitiva. Ao repetir aqui as ponderações do exemplo anterior, segue que  $x$  e  $y$  são  $\mathbb{P}$ -isomorfos sse  $x \leq y$  e  $y \leq x$ . △

<sup>†</sup>É o que nome sugere:  $f: X \rightarrow Y$  é uma isometria entre os espaços métricos  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  se  $d_Y(f(a), f(b)) = d_X(a, b)$  para quaisquer  $a, b \in X$ .



**Exemplo 1.2.43.** Fixado um anel<sup>†</sup>  $A$ ,  $\text{Matr}(A)$  é a categoria cujos objetos são números naturais não nulos e cujas setas são matrizes com coeficientes em  $A$ ! Mais precisamente: uma seta  $m \xrightarrow{f} n$  é uma matriz  $f := (a_{ij})$  de  $m$  linhas e  $n$  colunas com  $a_{i,j} \in A$  para quaisquer  $i, j$ , enquanto a composição entre duas setas  $f: m \rightarrow n$  e  $g: n \rightarrow k$  é definida via produto de matrizes, i.e.,  $g \circ f := f \cdot a$ . Pelo que você já aprendeu em Álgebra Linear ou Geometria Analítica,  $\text{Matr}(A)$  é uma categoria (certo?)\*. ▲

**Observação 1.2.44.** Em geral, quando as setas de uma categoria são dadas por certos tipos de funções entre seus objetos, todo isomorfismo é um morfismo bijetor. Mas a recíproca pode ser falsa a depender da categoria. Ao final desta subseção você encontrará exercícios sobre isso (se quiser praticar). △

Em certo sentido, a próxima definição apenas amplia a gama de exemplos de setas que não são funções, pelo menos não no sentido clássico.

**Definição 1.2.45.** Dadas categorias  $\mathcal{C}$  e  $\mathcal{D}$ , dizemos que um par de correspondências  $\mathcal{F}_0: \text{Obj}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathcal{D})$  e  $\mathcal{F}_1: \text{Arr}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Arr}(\mathcal{D})$  define um **funtor (covariante)**  $\mathcal{F}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  se:

- (i)  $\text{dom}(\mathcal{F}_1(f)) = \mathcal{F}_0(\text{dom}(f))$  e  $\text{cod}(\mathcal{F}_1(f)) = \mathcal{F}_0(\text{cod}(f))$  para toda seta  $f \in \text{Arr}(\mathcal{C})$ ;
- (ii)  $\mathcal{F}_1(f \circ g) = \mathcal{F}_1(f) \circ \mathcal{F}_1(g)$  sempre que a seta  $f \circ g$  estiver definida em  $\mathcal{C}$ ;
- (iii)  $\mathcal{F}_1(\text{id}_c) = \text{id}_{\mathcal{F}_0(c)}$  para todo  $c \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ .

Se, em vez de (i) e (ii), valerem

- (i)'  $\text{dom}(\mathcal{F}_1(f)) = \mathcal{F}_0(\text{cod}(f))$  e  $\text{cod}(\mathcal{F}_1(f)) = \mathcal{F}_0(\text{dom}(f))$  para toda seta  $f \in \text{Arr}(\mathcal{C})$ ,  
e
- (ii)'  $\mathcal{F}_1(f \circ g) = \mathcal{F}_1(g) \circ \mathcal{F}_1(f)$  sempre que a seta  $f \circ g$  estiver definida em  $\mathcal{C}$ ,

$\mathcal{F}$  será dito um funtor **contravariante**. ¶

**Observação 1.2.46.** No dia a dia, escreve-se tanto  $\mathcal{F}(a)$  quanto  $\mathcal{F}(f)$  para um objeto  $a$  ou para uma seta  $f$ , respectivamente, sem os subíndices 0 e 1. A distinção feita na definição teve apenas propósitos didáticos e, futuramente, será abandonada. △

**Exemplo 1.2.47.** Das suas aulas de Cálculo, você deve lembrar que se  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  são funções contínuas, então as funções  $f + g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f \cdot g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  são contínuas. Dado que funções constantes também são contínuas, é um exercício elementar de Álgebra verificar que  $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  é um anel comutativo ( $\star$ ).

O que talvez você não saiba é que as considerações acima permanecem válidas para quaisquer funções contínuas da forma  $X \rightarrow \mathbb{R}$ , onde  $X$  é meramente um espaço topológico. Você pode verificar isto agora ( $\star$ ) ou apenas assumir como um *fato* enquanto espera pela demonstração, que será apresentada oportunamente (mas em contexto bem mais geral).

Obtemos assim uma correspondência  $\mathcal{F}_0: \text{Obj}(\text{TOP}) \rightarrow \text{Obj}(\text{CRING})$ , que a cada espaço topológico  $X$  associa o anel comutativo  $C(X, \mathbb{R})$ . Ou seja: já temos *metade* de um funtor  $\text{TOP} \rightarrow \text{CRING}$ . Falta determinar como uma função contínua  $f: X \rightarrow Y$  induz um morfismo de anéis  $\mathcal{F}_1(f)$  entre  $C(X, \mathbb{R})$  e  $C(Y, \mathbb{R})$ , ou vice-versa, e é justamente aqui onde o *apelo categórico* começa a dar as caras.

<sup>†</sup>Não precisa ser comutativo, mas se quiser pode.





Figura 1.1: Funtores covariantes respeitam a *direção* das setas sobre as quais agem, enquanto os contra-variantes invertem as setas.

Dada a generalidade dos objetos considerados, o morfismo de anéis  $\mathcal{F}_1(f)$  deve ser definido da maneira mais natural e ampla possível, de modo a não fazer referência a particularidades dos espaços  $X$  e  $Y$  considerados. A princípio, há duas formas de iniciar o procedimento:

- (i) fixada uma função contínua  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ , precisamos definir outra função contínua  $\mathcal{F}_1(f)(\varphi): Y \rightarrow \mathbb{R}$ ;
- (ii) fixada uma função contínua  $\psi: Y \rightarrow \mathbb{R}$ , precisamos definir outra função contínua  $\mathcal{F}_1(f)(\psi): X \rightarrow \mathbb{R}$ .



Para decidir qual dos dois procedimentos tem *mais* chances de dar certo, basta lembrar que, antes de qualquer outra coisa, fixou-se uma função contínua  $f: X \rightarrow Y$ . Enquanto a primeira abordagem não sugere uma maneira óbvia de usar  $\varphi$  e  $f$  para definir uma função contínua  $Y \rightarrow \mathbb{R}$ , a segunda explicita que para  $\psi: Y \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f: X \rightarrow Y$  contínuas, a função  $\psi \circ f: X \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua. Em outras palavras, obtemos uma função<sup>†</sup>

$$\mathcal{F}_1(f): C(Y, \mathbb{R}) \rightarrow C(X, \mathbb{R})$$

$$\psi \mapsto \psi \circ f$$

O próximo passo é verificar se  $\mathcal{F}_1(f)$  é realmente uma seta em  $\text{CRING}$ , i.e., um morfismo de anéis. Como esta pode ser sua primeira vez com esse tipo de verificação, ela será apresentada aqui — mas não se acostume.

<sup>†</sup>Sim: trata-se de uma função que *age* sobre um conjunto de funções. Para evitar problemas com isso, lembre-se sempre de não confundir “ $f(x)$ ” com “ $f$ ”. É importante que você se acostume com esse tipo de procedimento, pois muito do que será feito nos capítulos avançados envolve *espaços de funções*.

- Denotando por  $\underline{1}_Y: Y \rightarrow \mathbb{R}$  a função constante 1, elemento neutro multiplicativo de  $C(Y, \mathbb{R})$ , temos  $\mathcal{F}_1(f)(\underline{1}_Y)(x) := (\underline{1}_Y \circ f)(x) = \underline{1}_Y(f(x)) = 1$ , mostrando que  $\mathcal{F}_1(f)(\underline{1}_Y) = \underline{1}_X$ , i.e.,  $\mathcal{F}_1(f)$  levou a *unidade* do domínio na *unidade* do codomínio.
- Para  $\psi, \psi': Y \rightarrow \mathbb{R}$  funções contínuas<sup>†</sup>,  $x \in X$  e  $*$   $\in \{+, \cdot\}$ , temos

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1(f)(\psi * \psi')(x) &:= ((\psi * \psi') \circ f)(x) = (\psi * \psi')(f(x)) = \psi(f(x)) * \psi'(f(x)) = \\ &= (\psi \circ f)(x) * (\psi' \circ f)(x) = (\mathcal{F}_1(f)(\psi) * \mathcal{F}_1(f)(\psi'))(x),\end{aligned}$$

mostrando que  $\mathcal{F}_1(f)(\psi * \psi') = \mathcal{F}_1(f)(\psi) * \mathcal{F}_1(f)(\psi')$ .

Os cálculos acima mostram que  $\mathcal{F}_1(f): C(Y, \mathbb{R}) \rightarrow C(X, \mathbb{R})$  é um morfismo de anéis, com a função contínua  $f: X \rightarrow Y$  fixada. É no próximo passo, i.e., ao fazer  $f$  variar, que mostraremos a natureza funtorial da correspondência que estamos definindo — contravariante em virtude da inversão das setas. Apenas duas coisas precisam ser verificadas:

- Para  $X$  espaço topológico e  $\text{Id}_X: X \rightarrow X$  a função identidade, valem as igualdades  $\mathcal{F}_1(\text{Id}_X) = \text{id}_{\mathcal{F}_0(X)} = \text{Id}_{C(X, \mathbb{R})}$  pois

$$\mathcal{F}_1(\text{Id}_X)(\varphi) := \varphi \circ \text{Id}_X = \varphi = \text{Id}_{C(X, \mathbb{R})}(\varphi)$$

para qualquer  $\varphi \in C(X, \mathbb{R})$ .

- Para espaços topológicos  $X, Y$  e  $Z$  e funções contínuas  $g: X \rightarrow Y$  e  $f: Y \rightarrow Z$ , temos

$$\mathcal{F}_1(f \circ g)(\rho) := \rho \circ (f \circ g) = (\rho \circ f) \circ g = \mathcal{F}_1(g)(\rho \circ f) = (\mathcal{F}_1(g) \circ \mathcal{F}_1(f))(\rho)$$

para qualquer  $\rho \in C(Z, \mathbb{R})$ . Portanto,  $\mathcal{F}_1(f \circ g) = \mathcal{F}_1(g) \circ \mathcal{F}_1(f)$ .

Mostramos assim que as correspondências  $\mathcal{F}_0$  e  $\mathcal{F}_1$  definem, de fato, um funtor contravariante  $\mathcal{F}: \text{TOP} \rightarrow \text{CRING}$ , usualmente denotado por  $C(\bullet, \mathbb{R})$ . Como você já deve imaginar, em vez de  $\mathcal{F}_0(X)$ , escreve-se apenas  $C(X, \mathbb{R})$  para um espaço topológico  $X$ , bem como  $C(f, \mathbb{R})$  em vez de  $\mathcal{F}_1(f)$  para uma função contínua  $f: X \rightarrow Y$ . ▲

Pode parecer uma verificação árdua, principalmente se for sua primeira vez com funtores, mas um olhar atento mostra que os “cálculos” foram *quase triviais*<sup>‡</sup>. A dificuldade, se existente, está na distinção das diversas *camadas* de informação. Mas não se preocupe, com o tempo você se acostuma. Além disso, muitas vezes as camadas são bem mais simples.

**Exemplo 1.2.48.** Existem funtores *triviais*  $\text{MET}_{\text{CONT}} \rightarrow \text{TOP}$  e  $\text{MET}_{\text{DIST}} \rightarrow \text{TOP}$ : no *nível de objetos*, os funtores *levam* um espaço métrico  $(X, d)$  ao espaço topológico  $(X, \mathcal{T}_{\rightarrow_d})$ , i.e., ao espaço que tem os pontos de  $X$  com a topologia induzida pela métrica  $d$ ; no *nível de setas*, os funtores *levam* uma seta  $f: X \rightarrow Y$  nela mesma, o que faz sentido pois, na primeira categoria, as setas já são funções contínuas por hipótese e, na segunda, as setas são isometrias, que em particular são funções contínuas ( $\star$ ). Daí, não é difícil ver que todas as exigências para ser funtor (covariante) são satisfeitas ( $\star$ ). ▲

<sup>†</sup>Por favor: nem faria sentido pensar que  $\psi'$  é a derivada de  $\psi$  aqui, dado que não há estruturas adicionais definidas sobre  $Y$ . Portanto, não pergunte se  $\psi'$  é a derivada de  $\psi$ .

<sup>‡</sup>Dado que a sociedade tem se mostrado cada vez mais sensível e amedrontada pelo uso das palavras, prefiro não arriscar um julgamento de valor explícito quanto ao grau de dificuldade de trivialidades.

A grande pergunta é: para que isso tudo?

**Exercício 1.2.8** (Faça só se for sua primeira vez com funtores  $(\star)$ ). Mostre que se  $X$  e  $Y$  são espaços topológicos homeomorfos (i.e., isomorfos em  $\text{TOP}$ ), então os anéis  $C(X, \mathbb{R})$  e  $C(Y, \mathbb{R})$  são isomorfos em  $\text{CRING}$ . ■

**Proposição 1.2.49.** *Seja  $\mathcal{F}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  um funtor (covariante ou contravariante). Se  $a, b \in \text{Obj}(\mathcal{C})$  são  $\mathcal{C}$ -isomorfos, então  $\mathcal{F}(a)$  e  $\mathcal{F}(b)$  são  $\mathcal{D}$ -isomorfos.*

*Demonstração.* Sejam  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow a$  setas tais que  $f \circ g = \text{id}_b$  e  $g \circ f = \text{id}_a$ . Se  $\mathcal{F}$  for covariante, então

$$\text{id}_{\mathcal{F}(b)} = \mathcal{F}(\text{id}_b) = \mathcal{F}(f \circ g) = \mathcal{F}(f) \circ \mathcal{F}(g) \quad \text{e} \quad \text{id}_{\mathcal{F}(a)} = \mathcal{F}(\text{id}_a) = \mathcal{F}(g \circ f) = \mathcal{F}(g) \circ \mathcal{F}(f),$$

mostrando que  $\mathcal{F}(a)$  e  $\mathcal{F}(b)$  são  $\mathcal{D}$ -isomorfos (por favor!)\*<sup>2</sup>. O caso em que  $\mathcal{F}$  é contravariante é “ocitnêdi”\*(?otrec). □

Assim, num primeiro momento, funtores permitem *empurrar* problemas de uma categoria para outra de modo sistemático. Se sua intenção for apenas mostrar que dois espaços topológicos não são homeomorfos, por exemplo, isto pode ser feito mais facilmente por meio de um funtor  $\mathcal{F}: \text{TOP} \rightarrow \mathcal{C}$ , onde (espera-se que)  $\mathcal{C}$  é alguma categoria cujos objetos são mais simples do que espaços topológicos: se os objetos  $\mathcal{F}(X)$  e  $\mathcal{F}(Y)$  não forem  $\mathcal{C}$ -isomorfos, então  $X$  e  $Y$  não podem ser homeomorfos<sup>†</sup>! A depender da sorte, podemos encontrar funtores que não apenas possibilitam empurrar problemas, mas também *puxar* soluções de volta! Todavia, é cedo para abordar essa perspectiva.

Por ora, podemos retornar ao problema que iniciou esta subseção: o processo de associar uma ordem parcial  $(\mathbb{P}, \leq)$  ao espaço topológico  $(\mathbb{P}, \mathcal{T}_{\leq})$  é funtorial? A motivação para esta pergunta está no próximo

**Exercício 1.2.9**  $(\star)$ . Mostre que se  $(\mathbb{P}, \leq)$  e  $(\mathbb{P}', \leq')$  são ordens (parciais) isomorfas em  $\text{POSET}^{\dagger}$ , então  $(\mathbb{P}, \mathcal{T}_{\leq})$  e  $(\mathbb{P}', \mathcal{T}_{\leq}')$  são espaços topológicos homeomorfos. Dica: mostre que se  $f: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  é um *isomorfismo de ordens*<sup>††</sup>, então  $f$  também é um homeomorfismo entre  $(\mathbb{P}, \mathcal{T}_{\leq})$  e  $(\mathbb{P}', \mathcal{T}_{\leq}')$  e, para isso, note que se  $I \subseteq \mathbb{P}'$  é intervalo fundamental, então  $f^{-1}[I]$  é intervalo fundamental em  $\mathbb{P}$ . ■

Trata-se do mesmo fenômeno observado na (tese da) última proposição, a menos de encontrarmos o funtor  $\mathcal{F}$  que faz o trabalho. *Mas, se no exercício anterior, a mesma função no papel de isomorfismo também fez o papel de homeomorfismo, então o funtor procurado deve simplesmente mandar uma função crescente  $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  para ela mesma!* Em outras palavras: toda função crescente é contínua? Suspiro...

**Exemplo 1.2.50** (Nunca se esqueça do básico). Considere  $\mathbb{P} := [0, 2]$  e  $\mathbb{P}' := [0, 4]$  com suas ordens herdadas de  $\mathbb{R}$ . A função  $f: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$  dada por

$$f(x) := \begin{cases} 2x, & \text{se } x \in [0, 1) \\ 2x + 1, & \text{se } x \in [1, 2] \end{cases}$$

é claramente crescente e descontínua em 1 (Cálculo 1?)\*. ▲

<sup>†</sup>Esta ideia aparentemente simples é um dos métodos centrais na *Topologia Algébrica*.

<sup>††</sup>Por padrão,  $\text{POSET}$  é a categoria cujos objetos são ordens parciais e cujas setas são funções crescentes, com composição e identidades usuais. Se for seu primeiro contato com categorias, verifique que  $\text{POSET}$  é categoria  $(\star)$ .

<sup>†††</sup>Isto é, um  $\text{POSET}$ -isomorfismo, ou seja: uma bijeção crescente cuja inversa é crescente.

**Exercício 1.2.10** (\*). Por que os métodos empregados no último exercício falham com a função do exemplo anterior? ■

Enquanto o “problema” acima nos ensina que nem todo sintoma é sinal de uma doença, o próximo exemplo é um pouco mais pessimista.

**Exemplo 1.2.51** (As vezes você só precisa fazer o exame certo). Vamos considerar outro tipo de seta sobre uma subclasse de objetos de  $\text{POSET}$ , mais adequadas para o tipo de topologia que convencionamos usar em ordens neste texto<sup>†</sup>. Em vez de ordens parciais quaisquer, vamos considerar apenas *ordens totais*, i.e., aquelas em que quaisquer dois elementos são comparáveis. Setas serão as funções entre ordens totais que preservem supremos e ínfimos<sup>‡</sup>, com composições e identidades usuais. Vamos chamar por  $\text{TOSET}_{\text{CONT}}$  a categoria com esses objetos e setas.

Sob tais condições, a correspondência

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{T}, \leq) & \xrightarrow{\quad} & (\mathbb{T}, \mathcal{T}_{\leq}) \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ (\mathbb{T}', \leq') & \xrightarrow{\quad} & (\mathbb{T}', \mathcal{T}_{\leq'}) \end{array}$$

define um funtor  $\mathcal{T}_{\bullet}: \text{TOSET}_{\text{CONT}} \rightarrow \text{TOP}$ . Com efeito, note primeiramente que o diagrama acima indica que o funtor  $\mathcal{T}_{\bullet}$  não altera o conjunto subjacente do espaço topológico e tampouco a função entre eles. Assim, na prática, tudo se resume ao próximo lema. ▲

**Lema 1.2.52.** *Se  $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}'$  preserva supremos e ínfimos, então  $f$  é contínua.*

*Demonstração.* Primeiro, observe que  $f$  é crescente, pois  $a \leq b$  em  $\mathbb{T}$  sse  $b = \sup \{a, b\}$ , e daí  $f(b) = \sup \{f(a), f(b)\}$ , i.e.,  $f(b) \geq f(a)$ . Agora, para  $I := (\beta, +\infty)_{\mathbb{T}'}$ , e  $\alpha \in f^{-1}[I]$ , existe  $t \in \mathbb{T}$  tal que  $\alpha \in (t, +\infty)_{\mathbb{T}}$  com  $(t, +\infty)_{\mathbb{T}} \subseteq f^{-1}[I]$ . Se isto não ocorresse, teríamos  $\alpha = \min f^{-1}[I]$  e  $\sup \{t \in \mathbb{T} : t < \alpha\} = \alpha$ . De fato:

- $\alpha = \min f^{-1}[I]$  pois, se algum  $\gamma \in f^{-1}[I]$  fosse tal que  $\alpha \not\leq \gamma$ , então a totalidade da ordem daria  $\gamma < \alpha$ , e daí  $\alpha \in (\gamma, +\infty)_{\mathbb{T}} \subseteq f^{-1}[I]$ , com a última inclusão assegurada em virtude de  $f$  ser crescente e valer  $\beta < f(\gamma)$ ;
- se  $\alpha$  não fosse supremo de  $\{t \in \mathbb{T} : t < \alpha\}$ , então existiria  $\gamma = \max \{t \in \mathbb{T} : t < \alpha\}$ , acarretando em  $\alpha \in (\gamma, +\infty)_{\mathbb{T}} \subseteq f^{-1}[I]$  (por quê?)\*.

Consequentemente,  $\beta < f(\alpha) = \sup_{t < \alpha} f(t)$  enquanto  $f(t) \leq \beta$  para todo  $t < \alpha$  (percebeu?)\*, acarretando  $\beta < f(\alpha) \leq \beta$ . Absurdo. Portanto, pela arbitrariedade de  $\alpha$ , segue que  $f^{-1}[I]$  é  $\mathcal{T}_{\leq}$ -aberto em  $\mathbb{T}$ . Analogamente, mostra-se que  $f^{-1}[(-\infty, c)_{\mathbb{T}'}]$  é  $\mathcal{T}_{\leq}$ -aberto para qualquer  $c \in \mathbb{T}'$ . Daí, não é difícil concluir que  $f$  é contínua. □

**Exercício 1.2.11** (\*). Certifique-se de que concluiu a demonstração anterior! Dica: a preservação de ínfimos é importante na parte do “analogamente...”. ■

**Observação 1.2.53.** Um *desafio* proposto por Rígille Menezes, no Twitter<sup>††</sup>, fez com que eu atentasse para a não functorialidade (óbvia) da correspondência  $\text{POSET} \rightarrow \text{TOP}$ . A “solução” sugerida acima, também observada por Schechter [30]<sup>‡‡</sup>, foi adaptada da discussão realizada em <https://math.stackexchange.com/questions/2542202>. △

<sup>†</sup>Diferente do que a Definição 1.2.18 pode ter sugerido, há vários tipos de topologias razoáveis que podem ser consideradas sobre ordens. Para mais detalhes, confira [29].

<sup>‡</sup>Ou seja, se  $\alpha = \sup A$ , então  $f(\alpha) = \sup f[A]$ , e  $f(\beta) = \inf f[B]$  sempre que  $\beta = \inf B$ .

<sup>††</sup><https://twitter.com/impression28/status/1225141899494817793>.

<sup>‡‡</sup>Embora com argumentações bem mais gerais, que você pode conferir na Seção 15.45 de [30].

As considerações acima não encerram o tipo de uso que será feito de categorias neste texto. Contudo, para um primeiro contato, está bom. Ao longo do texto, conceitos categóricos adicionais serão apresentados conforme forem necessários. Até lá!

**Exercício 1.2.12** (\*). Mostre que a relação de  $\mathcal{C}$ -isomorfismo entre objetos de uma categoria  $\mathcal{C}$  define uma *relação de equivalência* na classe de objetos de  $\mathcal{C}$ . ■

**Exercício 1.2.13** (\*). Mostre que um morfismo bijetor de grupos, anéis ou espaços vetoriais é um isomorfismo nas categorias correspondente. ■

**Exercício 1.2.14** (\*). Mostre que uma bijeção contínua entre espaços topológicos pode não ser um homeomorfismo. Dica: para um exemplo modesto, recorra ao seu caderno de Análise Real; para um exemplo divertido (\*), considere duas normas espertas sobre  $C([0, 1], \mathbb{R})$  e investigue a função identidade. ■

### 1.2.4 Exercícios adicionais

**Exercício 1.2.15** (\*). Para um  $\mathbb{K}$ -espaço normado  $X$ ,  $X^* := \text{TLin}_{\mathbb{K}}(X, \mathbb{R})$  indicará o espaço dos funcionais  $\mathbb{K}$ -lineares contínuos de  $X$ , chamado de **espaço dual topológico**<sup>†</sup> de  $X$ .

- a) Mostre que a norma de operadores definida em (1.1) (pág. 31) faz de  $X^*$  um espaço de Banach<sup>‡</sup>.
- b) Sejam  $\text{Norm}_{\mathbb{K}}$  e  $\text{Ban}_{\mathbb{K}}$  a **categoria dos  $\mathbb{K}$ -espaços normados** e dos **espaços de  $\mathbb{K}$ -Banach**, respectivamente, cujas setas são transformações lineares contínuas. Mostre que a correspondência  $\bullet^*: \text{Norm}_{\mathbb{K}} \rightarrow \text{Ban}_{\mathbb{K}}$  define um funtor contravariante, enquanto a *composição*  $\bullet^* \circ \bullet^*$  define um funtor covariante. Observação: “adivinhar” como definir os funtores no nível de setas faz parte do exercício. ■

**Observação 1.2.54.** O espaço  $(X^*)^*$  costuma ser chamado de **bidual topológico** de  $X$ . Por simplicidade, denota-se simplesmente por  $X^{**}$ . △

**Exercício 1.2.16** (\*). Ignorando questões de fundamentos, mostre como definir uma categoria cujos objetos são categorias e cujas setas são funtores. ■

**Exercício 1.2.17** (\*). Existe métrica em  $[0, \omega_1]$  cuja topologia induzida coincida com a topologia da ordem? ■

**Exercício 1.2.18** (\*). Para ordens totais  $\mathbb{T}$  e  $\mathbb{T}'$ , mostre que se  $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}'$  for contínua e crescente, então  $f$  preserva supremos e ínfimos. ■

**Exercício 1.2.19** (\*). Para uma sequência  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$  e uma função limitada  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ , mostre que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\|\cdot\|_{\infty}} f$  sse  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_u f$ . ■

**Exercício 1.2.20** (\*). Num espaço topológico  $X$ , dizemos que um subconjunto  $S$  de  $X$  é um  $\mathbf{G}_{\delta}$  se existe uma família enumerável  $\mathcal{A}$  de abertos de  $X$  tal que  $S = \bigcap \mathcal{A}$ . Mostre que se  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência de funções contínuas da forma  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é tal que  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , então  $f^{-1}[C]$  é um  $\mathbf{G}_{\delta}$  em  $\mathbb{R}$  sempre que  $C \subseteq \mathbb{R}$  é fechado. ■

<sup>†</sup>A princípio, o termo “topológico” se deve ao fato de considerarmos apenas os funcionais lineares contínuos. Sim: em dimensão infinita, há funcionais lineares descontínuos. Veremos isso oportunamente, não se preocupe.

<sup>‡</sup>Na verdade,  $(\text{TLin}_{\mathbb{K}}(X, Y), \|\cdot\|)$  é de Banach sempre que  $Y$  também é. Fica o convite para provar esta versão.

**Exercício 1.2.21** (Fechados encaixantes – versão métrica  $(\star\star)$ ). Seja  $X$  um espaço métrico cuja métrica é  $d$ .

- a) Suponha que  $d$  seja completa e considere  $(F_n)_n$  uma sequência decrescente de subconjuntos (não vazios) e fechados de  $X$ . Mostre que se  $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$ , então existe um único ponto em  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ , onde, para  $S \subseteq X$ ,  $\text{diam}(S) := \sup\{d(x, y) : x, y \in S\}$  indica o **diâmetro** de  $S$ . Dica: note que se  $x_n \in F_n$  para cada  $n$ , então  $(x_n)_n$  é de Cauchy.
- b) Suponha que para toda sequência decrescente  $(F_n)_n$  de fechados não vazios de um espaço métrico  $X$  satisfazendo  $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$  se tenha um único ponto na interseção  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ . Mostre que  $X$  é completo. Dica: para uma sequência de Cauchy  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  no espaço, considere os fechados  $F_n := \overline{\{x_m : m \geq n\}}$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ . ■





# Capítulo 2

## A lagoa de lágrimas

No segundo capítulo da obra de Lewis Carroll, Alice encontra uma portinhola que leva a um jardim magnífico, mas inacessível devido ao tamanho da protagonista. Embora descubra maneiras de alterar sua estatura, ela não consegue usá-las corretamente para entrar no jardim e, por conta disso, chora, gerando assim a *lagoa de lágrimas*. Aqui, o jardim pode ser pensado como a Topologia Geral com seus belos teoremas. Por conseguinte, sequências convergentes fazem o papel da portinhola, já que elas restringem o acesso a tais técnicas tão maravilhosas. Finalmente, as lágrimas serão ~~suas~~ causadas pelas ferramentas que usaremos para arrombar a porta, dentre as quais se destacam as *redes* e os *filtros*<sup>‡</sup>, protagonistas deste capítulo.

### 2.1 Essencial: convergência em espaços topológicos

#### 2.1.1 Como generalizar sequências

Se você enfrentou o capítulo anterior, pode ter sentido falta de um resultado básico acerca de limites na reta ou em espaços métricos: a *unicidade*. Foi proposital. As provas usuais de unicidade de limites explicitam muito claramente o que os conjuntos de índices precisam ter para servirem como *parâmetros* de convergência.

**Exemplo 2.1.1** (Unicidade de limites de sequências reais). *Se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência em  $\mathbb{R}$  tal que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} L$  e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} L'$ , então  $L = L'$ . Para provar isso, basta assegurar que  $|L - L'| < \varepsilon$  para todo  $\varepsilon > 0$ . Por um lado, para  $\gamma > 0$  fixado, existe  $N_L \in \mathbb{N}$  tal que  $|x_n - L| < \gamma$  sempre que  $n \geq N_L$ . Por outro lado, também existe  $N_{L'} \in \mathbb{N}$  tal que  $|x_n - L'| < \gamma$  sempre que  $n \geq N_{L'}$ . Daí, como existe  $N \in \mathbb{N}$  com  $N_L, N_{L'} \leq N$ , segue que*

$$|L - L'| \leq |L - x_N| + |x_N - L'| < \gamma + \gamma = 2\gamma$$

donde a afirmação original segue com  $\gamma := \frac{\varepsilon}{2}$ . ▲

**Exemplo 2.1.2** (Unicidade de limites em Cálculo I). Agora, volte ao seu curso de Cálculo I e recorde da notação

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L, \tag{2.1}$$

onde, por exemplo,  $f$  é uma função da forma  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e tanto  $p$  quanto  $L$  são números reais.

---

<sup>‡</sup>Se preferir não usar tais recursos, repense a escolha por este texto avance de uma vez para a Subseção 2.1.2.

Neste caso, os símbolos acima abreviam o seguinte: *para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que  $|f(x) - L| < \varepsilon$  sempre que  $0 < |x - p| < \delta$* . A depender do cuidado de quem lhe deu aula, o uso da notação especial para o número  $L$  deve ter sido justificada mais ou menos assim: se  $L$  e  $L'$  satisfazem a condição, pode-se tomar  $\delta, \delta' > 0$  tais que

$$0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad 0 < |x - p| < \delta' \Rightarrow |f(x) - L'| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Certamente, existe algum  $x' \in \mathbb{R}$  satisfazendo  $0 < |x' - p| < \tilde{\delta}$ , onde  $\tilde{\delta} := \min\{\delta, \delta'\}$ , donde segue que  $|L - L'| \leq |L - f(x')| + |f(x') - L'| < \varepsilon$ , como desejado. ▲

O ponto de atenção aqui não é a unicidade dos limites nos dois contextos, mas sim a semelhança nos métodos empregados para provar a unicidade. No primeiro exemplo, o número  $N$  escolhido satisfaz as duas exigências ( $N \geq N_L$  e  $N \geq N_{L'}$ ), o que permite concluir que tanto  $|x_N - L|$  quanto  $|x_N - L'|$  são *suficientemente pequenos*. Já no segundo exemplo, o fato de podermos tomar um mesmo ponto  $x'$  cumprindo as duas exigências ( $|x' - p| < \delta$  e  $|x' - p| < \delta'$ ) permitiu concluir que tanto  $|f(x') - L|$  quanto  $|f(x') - L'|$  são *suficientemente pequenos*.

MORAL DA HISTÓRIA: o conjunto de índices que *parametriza* os pontos que se aproximam do limite é *ordenado* por um tipo de relação em que quaisquer dois índices podem ser melhorados por um terceiro. Assim, para generalizar sequências, basta trocar  $\mathbb{N}$  por um conjunto dotado de uma relação parecida.

## §1 Um mínimo sobre redes

**Definição 2.1.3.** Diremos que uma pré-ordem<sup>†</sup> não vazia  $(\mathbb{D}, \preceq)$  é **dirigida**, ou que o conjunto  $\mathbb{D}$  é **dirigido** pela pré-ordem  $\preceq$ , se para quaisquer  $a, b \in \mathbb{D}$  existe  $c \in \mathbb{D}$  com  $a, b \preceq c$ . Em tais situações, diz-se que  $c$  é *melhor* do que  $a$  e  $b$  ou, se quiser soar mais profissional,  $c$  *refina*  $a$  e  $b$ . ¶

Conjuntos não vazios e totalmente ordenados, como  $(\mathbb{N}, \leq)$  ou outras boas ordens, são claramente dirigidos (concorda?)\*.

**Exemplo 2.1.4.** Para um ponto  $p \in \mathbb{R}$  fixado, sejam  $\mathbb{R}_p := \mathbb{R} \setminus \{p\}$  e a relação binária  $\preceq$  em  $\mathbb{R}_p$  onde  $x \preceq y$  sse  $|y - p| \leq |x - p|$ . Não é difícil se convencer de que  $\preceq$  é uma pré-ordem sobre  $\mathbb{R}_p$  (verifique?)\*. Para ver que  $(\mathbb{R}_p, \preceq)$  é dirigido, apenas note que se  $x, y \in \mathbb{R}_p$ , então ocorre  $x \preceq y$  ou  $y \preceq x$ , já que  $|x - y|$  e  $|y - x|$  são elementos de um conjunto totalmente ordenado. ▲

**Exercício 2.1.1** ( $\star/3$ ). Mostre que  $(\mathbb{R}_p, \preceq)$  não é uma ordem parcial. ■

**Exemplo 2.1.5** (Importante). Fixados um *espaço topológico*<sup>‡</sup>  $(X, \mathcal{T})$  e um ponto  $p \in X$ , a coleção

$$\mathcal{T}_p := \{V \in \mathcal{T} : p \in V\}, \quad (2.2)$$

formada pelos abertos de  $X$  em torno de  $p$ , torna-se um conjunto dirigido com a relação de inclusão reversa, i.e., ao declarar  $V \preceq U$  sse  $U \subseteq V$ . Como  $\preceq$  é claramente reflexiva e transitiva, resta apenas a condição de refinamento, que segue pois  $p \in U \cap V \subseteq U, V$  sempre que  $U, V \in \mathcal{T}_p$ . Futuramente, xingaremos a família  $\mathcal{T}_p$  de *pré-filtro de abertos em torno de  $p$* . ▲

<sup>†</sup>Lembre-se: uma *pré-ordem* é uma relação binária *reflexiva* e *transitiva* (cf. Observação 1.2.44).

<sup>‡</sup>Se você decidiu pular o primeiro capítulo mesmo sem saber o que é *espaço topológico*... repense suas escolhas retorne para a Definição 1.1.28, na página 23.

Haverá mais exemplos, não se preocupe. Agora, vamos ao que interessa.

**Definição 2.1.6.** Para um conjunto dirigido  $(\mathbb{D}, \preceq)$ , uma função  $\varphi: \mathbb{D} \rightarrow X$  será chamada de **rede**<sup>†</sup> em  $X$ . ◻

**Observação 2.1.7** (Quem é  $\mathbb{D}$ ?). O uso excessivo de sequências na escola pode fazer com que algumas pessoas demorem a perceber a *flexibilidade* da definição acima. Enquanto uma sequência em  $X$  é uma função da forma  $\mathbb{N} \rightarrow X$ , onde  $\mathbb{N}$  indica o conjunto dos números naturais (com sua ordenação de sempre), uma rede em  $X$  é uma função da forma  $\mathbb{D} \rightarrow X$ , onde  $\mathbb{D}$  indica um<sup>‡</sup> conjunto dirigido. Como existe uma *infinitude* de conjuntos dirigidos, a conclusão inevitável é que uma infinitude de conjuntos pode ocupar o papel de  $\mathbb{D}$  na definição de rede! Em outras palavras,  $\mathbb{D}$  muda com o contexto. △

Consonante com as notações adotadas para sequências, uma rede  $\varphi$  que faz  $\varphi(d) := x_d$  para cada  $d \in \mathbb{D}$  será denotada como  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ , ou apenas  $(x_d)_d$  quando o conjunto dirigido  $\mathbb{D}$  estiver *muito* claro pelo contexto. Como a ideia é substituir sequências por redes na investigação de convergência, a próxima definição é inevitável.

**Definição 2.1.8.** Uma rede  $\varphi := (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$  num espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$   **$\mathcal{T}$ -converge** para um ponto  $p \in X$  se para todo  $\mathcal{T}$ -aberto  $V \subseteq X$  com  $p \in V$  existir  $D \in \mathbb{D}$  tal que  $\varphi(d) := x_d \in V$  para todo  $d \succeq D$ . Em tais situações, diremos que  $\varphi$  é  *$\mathcal{T}$ -convergente*, e o ponto  $p$  será chamado de (um)  *$\mathcal{T}$ -limite* de  $\varphi$ . Como de costume, isto será abreviado com  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ , exceto nas situações em que a topologia for clara pelo contexto, caso em que todas as menções a  $\mathcal{T}$  serão omitidas. ◻

**Observação 2.1.9** (Atos políticos). A escolha de notação é um ato político. É por essa razão que prefiro escrever “ $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ ” em vez de “ $x_d \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ ”: para reforçar o *posicionamento* de que a noção de convergência estabelece uma relação binária entre as redes e os pontos do espaço — e não meramente entre os pontos do espaço. Apesar disso, você é livre para escrever com a segunda notação, principalmente em ocasiões públicas. △

**Exemplo 2.1.10.** Sequências convergentes são, claramente, subcasos de redes convergentes. Para os limites usuais do Cálculo 1, como o apresentado no Exemplo 2.1.2, a relação  $\preceq$  sobre  $\mathbb{R}_p := \mathbb{R} \setminus \{p\}$  do Exemplo 2.1.4 é tal que

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L \text{ no sentido usual} \Leftrightarrow (f(x))_{x \in \mathbb{R}_p} \rightarrow L,$$

já que em  $\mathbb{R}_p$ ,  $b \preceq a$  sse  $|p - a| \leq |p - b|$ , i.e.,  $a$  é melhor do que  $b$  sse  $a$  é melhor do que  $b$  quando o assunto é estar próximo de  $p$ . Não é difícil definir conjuntos dirigidos que permitam traduzir limites laterais, limites no infinito, integrais de Riemann, etc., mas isto não será feito aqui. Caso tenha curiosidade, confira [3, 22]. ▲

**Observação 2.1.11** (O conjunto dirigido importa). A sequência  $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  costuma ser o primeiro exemplo de sequência *divergente*, i.e., tal que não existe ponto (na reta) para o qual a sequência convirja. Embora você já deva saber disso, convém revisar uma das formas de argumentar sem usar *subsequências*<sup>††</sup>. Fixado um ponto  $L \in \mathbb{R}$  arbitrário, o aberto  $A := (L - \frac{1}{2}, L + \frac{1}{2})$  é tal que para qualquer  $N \in \mathbb{N}$ , existe  $N' > N$  com  $(-1)^{N'} \notin A$ : basta tomar  $N' := N + 1$  (certo?)\*.

<sup>†</sup>A terminologia anglófona é *net*.

<sup>‡</sup>Artigo indefinido... Lembra?

<sup>††</sup>Nada contra subsequências, mas usá-las aqui atrapalharia a ilustração.

Esse argumento evidencia que a ordenação dos índices *também* é responsável pela divergência da sequência. Duvida? Pois bem: com o conjunto dirigido  $\mathcal{N} := (\mathbb{N} \setminus \{0\}, \preceq)$ , onde  $m \preceq n$  sse  $m$  divide  $n$  (verifique as condições da Definição 2.1.3!)\*, note que  $((-1)^n)_{n \in \mathcal{N}} \rightarrow 1$ : basta observar que  $(-1)^n = 1$  para todo  $n \succeq 2$  (observou?)\*.  $\triangle$

**Exercício 2.1.2** (\*). Mostre que se  $\mathbb{D}$  é um conjunto dirigido que tem elemento máximo  $\tilde{d}$ , então qualquer rede  $\varphi: \mathbb{D} \rightarrow X$  converge para  $\varphi(\tilde{d})$ . MORAL DA HISTÓRIA: conjuntos dirigidos interessantes não têm máximos.  $\blacksquare$

As considerações acima ilustram a grande vantagem das redes sobre as sequências: sua definição admite *qualquer* conjunto dirigido como domínio de índices, ao mesmo tempo em que emprega uma escrita familiar. É justamente isso o que possibilita empurrar as limitações sequenciais para ~~debaixo do tapete~~ o conjunto dirigido no próximo

**Teorema 2.1.12.** Para espaços topológicos  $(X, \mathcal{T}_X)$  e  $(Y, \mathcal{T}_Y)$ , uma função  $f: X \rightarrow Y$  e um ponto  $p \in X$ , são equivalentes:

- (i)  $f$  é contínua em  $p$ , i.e., para todo  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V \subseteq Y$  tal que  $f(p) \in V$ , existe um  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U \subseteq X$  com  $p \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ ;
- (ii)  $(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}_Y} f(p)$  para qualquer rede  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$  em  $X$  satisfazendo  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p$ .

*Demonstração.* O argumento de sempre dá conta de (i)  $\Rightarrow$  (ii): se  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p$  e  $V \subseteq Y$  é um  $\mathcal{T}_Y$ -aberto em torno de  $f(p)$ , então (i) assegura um  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U$  em torno de  $p$  com  $f[U] \subseteq V$ , enquanto a convergência de  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$  garante  $D \in \mathbb{D}$  tal que  $\{x_d : d \succeq D\} \subseteq U$ , donde segue que  $\{f(x_d) : d \succeq D\} \subseteq V$  (percebeu?)\*. Ou seja,  $(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}_Y} f(p)$ .

Para a recíproca, podemos *imitar* uma das possíveis soluções para o Exercício 1.1.1 (cf. pág. 183), procedendo pela contrapositiva. Se  $f$  não é contínua em  $p$ , então para *algum*  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V \subseteq Y$  em torno de  $f(p)$ , tem-se  $f[U] \not\subseteq V$  para todo  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U \subseteq X$  em torno de  $p$ . Em outras palavras, para cada  $U \in \mathcal{T}_p$  existe  $x_U \in U$  com  $f(x_U) \notin V$ , onde  $\mathcal{T}_p$  é definido como em (2.2) (cf. Exemplo 2.1.5). Percebeu o que acabamos de fazer?

Como  $\mathcal{T}_p$  é dirigido pela inclusão reversa<sup>†</sup>, é legítimo considerar a rede  $(x_U)_{U \in \mathcal{T}_p}$ . Mas não é só isso:  $(x_U)_{U \in \mathcal{T}_p} \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p$ . Com efeito, fixado qualquer  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $W \subseteq X$  em torno de  $p$ , o próprio  $W$  é um elemento do conjunto dirigido  $\mathcal{T}_p$ , de modo que  $x_U \in W$  para todo  $U \succeq W$ , pois isto equivale a  $U \subseteq W$  (e escolhamos  $x_U \in U$ !). Por fim, temos  $(f(x_U))_{U \in \mathcal{T}_p} \not\rightarrow_{\mathcal{T}_Y} f(p)$ , pois não há  $\tilde{U} \in \mathcal{T}_p$  tal que  $\{f(x_U) : U \succeq \tilde{U}\} \subseteq V$ , afinal de contas,  $f(x_U) \notin V$  para todo  $U \in \mathcal{T}_p$ . Portanto, negamos (ii).  $\square$

Nas situações em que for seguro omitir o conjunto dirigido, você pode escrever  $f \circ \varphi$  para indicar a rede  $(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}}$ , onde  $\varphi := (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ . Assim, por exemplo, o item (ii) se reescreve assim:  $f \circ \varphi \rightarrow_{\mathcal{T}_Y} f(p)$  para toda rede  $\varphi$  em  $X$  tal que  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p$ . Isto costuma tornar a redação bem mais limpa — e a prova do próximo corolário deve servir como ilustração adicional.

**Corolário 2.1.13.** Se  $f: X \rightarrow Y$  é contínua em  $p \in X$  e  $g: Y \rightarrow Z$  é contínua em  $f(p) \in Y$ , então  $g \circ f$  é contínua em  $p$ . Em particular, composição de funções contínuas é contínua.

*Demonstração.* Se  $\varphi$  é uma rede em  $X$  tal que  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p$ , então  $f \circ \varphi \rightarrow_Y f(p)$  em virtude da continuidade de  $f$ , enquanto a continuidade de  $g$  acarreta  $g \circ (f \circ \varphi) \rightarrow_{\mathcal{T}_Z} g(f(p))$ . Acabou.  $\square$

**Exercício 2.1.3** (\*). Prove o corolário anterior sem usar redes.  $\blacksquare$

<sup>†</sup>“Mas não era para ser  $\mathbb{D}$ ?!”. Leia a Observação 2.1.7 (ou releia com mais atenção desta vez).

## §2 Um mínimo sobre filtros

Enquanto redes empregam conjuntos dirigidos *alienígenas* ao espaço topológico na tarefa de *parametrizar* situações de convergência no espaço, filtros capturam o comportamento dos pontos parametrizados e jogam fora o conjunto de índices, tornando a coisa toda *intrínseca*. Isto fará sentido em breve.

**Definição 2.1.14.** Sejam  $X$  um conjunto e  $\mathcal{F} \neq \emptyset$  uma família de subconjuntos de  $X$ . Dizemos que  $\mathcal{F}$  é um **filtro** de  $X$  (em  $X$ ) se as duas condições abaixo forem satisfeitas:

- (i)  $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$ ;
- (ii)  $A \in \mathcal{F}$  e  $A \subseteq B \subseteq X \Rightarrow B \in \mathcal{F}$ .

O filtro  $\mathcal{F}$  será chamado de (filtro) **próprio** se  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ . Em particular,  $X = \emptyset$  não admite filtros próprios. ¶

**Exemplo 2.1.15** (Importante: *filtro de vizinhanças*). A família  $\mathcal{T}_p$  utilizada na demonstração do último teorema é *quase* um filtro. Dado que topologias são fechadas por interseções finitas, a primeira exigência na definição anterior é automaticamente satisfeita em  $\mathcal{T}_p$ . No entanto, a segunda condição falha (por favor!)\*<sup>10</sup>. Um modo prático de corrigir o problema é considerar, precisamente, a família de todos os subconjuntos que contêm algum membro de  $\mathcal{T}_p$ .

**Definição 2.1.16.** Para um espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$  e um ponto  $p \in X$ , denota-se por  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  a família dos subconjuntos de  $X$  que contêm *algum* aberto em torno de  $p$ . Explicitamente,

$$\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}} := \{N \subseteq X : \text{existe } A \in \mathcal{T}_p \text{ tal que } A \subseteq N\}. \quad (2.3)$$

Os membros de  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  serão chamados de  **$\mathcal{T}$ -vizinhanças** de  $p$  e, por sua vez,  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  será chamado de **filtro de  $\mathcal{T}$ -vizinhanças de  $p$** . Como de costume, as menções a  $\mathcal{T}$  serão omitidas quando a topologia estiver clara pelo contexto. ¶

A família  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  merece ser chamada de filtro pois é um filtro:

- $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}} \neq \emptyset$  pois  $X$  é uma  $\mathcal{T}$ -vizinhança de  $p$ ;
- é fechada por interseções finitas, pois se  $N_1, N_2 \in \mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$ , então existem testemunhas  $A_1, A_2 \in \mathcal{T}_p$  com  $A_i \subseteq N_i$ , acarretando  $A_1 \cap A_2 \in \mathcal{T}_p$  com  $A_1 \cap A_2 \subseteq N_1 \cap N_2$ , i.e.,  $N_1 \cap N_2 \in \mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$ .
- se  $N \in \mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  e  $N \subseteq S$ , então existe  $A \in \mathcal{T}_p$  com  $A \subseteq N$ , acarretando  $A \subseteq S$ , i.e.,  $S \in \mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$ .

Por fim, não deve ser difícil perceber que  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  é um filtro próprio (perceba!)\*. ▲

Situações como a do exemplo anterior são tão frequentes que merecem ser abstraídas a fim de facilitar futuras reciclagens. Como Schechter [30], diremos que uma família  $\mathcal{G}$  de subconjuntos de  $X$  é um **pré-filtro** sempre que o seu “*fecho para cima*”  $(\mathcal{G})^\uparrow$  for um filtro próprio em  $X$ , onde

$$(\mathcal{G})^\uparrow := \{S \subseteq X : \text{existe } G \in \mathcal{G} \text{ tal que } G \subseteq S\}. \quad (2.4)$$

Em tais situações, dizemos que o filtro  $(\mathcal{G})^\uparrow$  é **gerado** pelo pré-filtro  $\mathcal{G}$ , razão pela qual algumas referências preferem xingar pré-filtros de **bases de filtros**. Uma formulação alternativa é a seguinte:



**Proposição 2.1.17.** *Uma família  $\mathcal{G}$  de subconjuntos de  $X \neq \emptyset$  é um pré-filtro se, e somente se,  $\emptyset \notin \mathcal{G}$  e para quaisquer  $G, H \in \mathcal{G}$  existe  $I \in \mathcal{G}$  com  $I \subseteq G \cap H$ .*

*Demonstração.* Se  $\mathcal{G}$  é pré-filtro, então por  $(\mathcal{G})^\uparrow$  ser filtro próprio não ocorre  $\emptyset \in (\mathcal{G})^\uparrow$ . Logo, não existe  $G \in \mathcal{G}$  com  $G \subseteq \emptyset$ . Como o único  $G$  que *poderia* estar contido em  $\emptyset$  é o próprio conjunto vazio, conclui-se que  $\emptyset \notin \mathcal{G}$ . Analogamente, se  $G, H \in \mathcal{G}$ , então  $G, H \in (\mathcal{G})^\uparrow$  e, por  $(\mathcal{G})^\uparrow$  ser filtro, obtemos  $G \cap H \in (\mathcal{G})^\uparrow$ , o que por sua vez garante a existência de uma testemunha  $I \in \mathcal{G}$  com  $I \subseteq G \cap H$  (pela definição de  $(\mathcal{G})^\uparrow$ ). A recíproca, por sua vez, consiste em mostrar que  $(\mathcal{G})^\uparrow$  satisfaz as condições para ser um filtro próprio sempre que  $\mathcal{G}$  tem as propriedades elencadas no enunciado, um bom exercício para quem nunca trabalhou com essas coisas (entendeu a indireta?)\*.  $\square$

**Exercício 2.1.4** (\*). Mostre que se  $\mathcal{G}$  é um pré-filtro em  $X$ , então  $(\mathcal{G})^\uparrow$  é o *menor* filtro próprio em  $X$  que contém  $\mathcal{G}$ , i.e., se  $\mathcal{F}$  é filtro próprio em  $X$  e  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ , então  $(\mathcal{G})^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$ .  $\blacksquare$

**Exemplo 2.1.18** (Rabos<sup>†</sup>). Sequências e, mais geralmente, redes, induzem (pré-) filtros de maneira muito natural, por meio de seus *rabos*. Mais precisamente, fixada uma rede  $\varphi$  em  $X$  e um índice  $D \in \text{dom}(\varphi)$ , dizemos que o conjunto

$$\varphi[D^\uparrow] := \{\varphi(d) : d \succeq D\}$$

é um **rabo da rede**. E daí?  $\blacktriangle$

**Exercício 2.1.5** (\*). Mostre que  $\{\varphi[D^\uparrow] : D \in \text{dom}(\varphi)\}$  é um pré-filtro em  $X$ . Dica: o domínio de uma rede é um conjunto dirigido.  $\blacksquare$

**Definição 2.1.19.** Para um conjunto  $X \neq \emptyset$  e uma rede  $\varphi$  em  $X$ , denotamos por  $(\varphi)^\uparrow$  o filtro próprio em  $X$  gerado pelo pré-filtro dos rabos de  $\varphi$ . Por falta de nome melhor<sup>‡</sup>,  $(\varphi)^\uparrow$  será chamado de **filtro induzido pela rede**  $\varphi$ . Nas situações em que se escreve  $\varphi := (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ , usa-se, por economia,  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}^\uparrow$  ou  $(x_d)_d^\uparrow$  em vez de  $(\varphi)^\uparrow$ .  $\P$

A relação de filtros com convergência de redes (ou a própria *natureza convergente* dos filtros) deve ficar mais evidente com a próxima

**Proposição 2.1.20.** *Para um espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$ , um ponto  $p$  e uma rede  $\varphi$  em  $X$ , são equivalentes:*

- (i)  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ ;
- (ii)  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}} \subseteq (\varphi)^\uparrow$ .

*Demonstração.* Podemos reescrever a definição de convergência da seguinte forma:

$$\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p \Leftrightarrow \text{para todo } V \in \mathcal{T}_p \text{ existe } D \in \text{dom}(\varphi) \text{ tal que } \varphi[D^\uparrow] \subseteq V \quad (2.5)$$

que, por conta da definição de  $(\varphi)^\uparrow$ , equivale a  $\mathcal{T}_p \subseteq (\varphi)^\uparrow$ . Como  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  é o menor filtro próprio em  $X$  a conter  $\mathcal{T}_p$  (certo?)\* e  $(\varphi)^\uparrow$  é sempre um filtro próprio, o resultado segue.  $\square$

**Exercício 2.1.6** (\*). Denotando por  $\mathcal{N}_0$  o filtro de vizinhanças de 0 em  $\mathbb{R}$  com a topologia usual, mostre que  $\mathcal{N}_0 \subseteq ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}^\uparrow$ .  $\blacksquare$

<sup>†</sup>Ou caudas (para pessoas com pouco senso de humor).

<sup>‡</sup>Referências anglôfonas costumam chamar  $(\varphi)^\uparrow$  de *eventuality filter*. No entanto, o sentido corriqueiro da palavra “eventual” não torna adequado o seu uso como tradução, do meu ponto de vista pelo menos.



A inclusão obtida da equivalência em (2.5) pode parecer contraintuitiva quando vista pela primeira vez: *embora* para todo  $V \in \mathcal{T}_p$  se verifique  $\varphi[D^\dagger] \subseteq V$  para algum índice  $D \in \text{dom}(\varphi)$ , a conclusão é que  $\mathcal{T}_p \subseteq (\varphi)^\dagger$  em vez de  $(\varphi)^\dagger \subseteq \mathcal{T}_p$ . No entanto, trata-se de um fenômeno típico de filtros. Para não alongar demais a discussão<sup>†</sup>:

**Proposição 2.1.21.** *Para pré-filtros  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  de um conjunto  $X$ , são equivalentes:*

- (i)  $(\mathcal{A})^\dagger \subseteq (\mathcal{B})^\dagger$ ;
- (ii) *para todo  $A \in \mathcal{A}$  existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $B \subseteq A$ .*

**Exercício 2.1.7** (\*). Prove a proposição anterior. Dica: basta abrir as definições, sem esquecer que  $\mathcal{A} \subseteq (\mathcal{A})^\dagger$ . ■

A interpretação visual da última proposição é mais interessante do que sua demonstração, pois ela revela como a inclusão de filtros determina uma *noção de convergência*. Primeiro, filtros próprios, de modo geral, são famílias de subconjuntos de  $X$  que parecem convergir para algum lugar: note que se  $\mathcal{F}$  é filtro próprio e  $A, B \in \mathcal{F}$ , então  $A \cap B \in \mathcal{F}$ , e se  $C \in \mathcal{F}$ , então  $A \cap B \cap C \in \mathcal{F}$ , e se... de modo que quanto mais elementos de  $\mathcal{F}$  interceptarmos, maior será a precisão da *região* para a qual  $\mathcal{F}$  converge.

**Exercício 2.1.8** (\*). Com as notações do Exercício 2.1.6, mostre que  $\bigcap_{N \in \mathcal{N}_0} N = \{0\}$ . ■

Agora, se  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  são pré-filtros em  $X$  satisfazendo a condição (ii) da última proposição, então os membros de  $\mathcal{G} := (\mathcal{B})^\dagger$  devem *convergir* para a mesma região para a qual o filtro  $\mathcal{F} := (\mathcal{A})^\dagger$  converge: afinal de contas, se  $F \in \mathcal{F}$  está (contido) numa *região*  $R$ , então algum  $B \in \mathcal{B}$  está contido em  $F$ , logo  $B$  também está (contido) na *região*  $R$ .




Figura 2.1: Se dentro de todo quadrilátero há uma elipse e os quadriláteros “convergem” para uma região, então *obrigatoriamente* as elipses convergem para a mesma região.

Com tudo isso dito, a Proposição 2.1.20 torna a próxima definição bastante razoável.

**Definição 2.1.22.** Um filtro próprio<sup>‡</sup>  $\mathcal{F}$  num espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$   $\mathcal{T}$ -converge para um ponto  $p \in X$  se  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}} \subseteq \mathcal{F}$ . Em tais situações, diremos que  $\mathcal{F}$  é  $\mathcal{T}$ -convergente, e o ponto  $p$  será chamado de (*um*)  $\mathcal{T}$ -limite de  $\mathcal{F}$ . Como de costume, isto será abreviado com  $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ , exceto... você já sabe o restante. ¶

Vantagens imediatas da definição acima? Nos livramos dos conjuntos dirigidos de índices alienígenas e, como brinde, temos um modo explícito de comparar filtros uns com os outros (a inclusão), o que pode ter implicações interessantes no estudo de convergência (terá). Evidentemente, existem desvantagens: como funções interagem com filtros?

<sup>†</sup>Mas se quiser alongar um pouco, confira a Subseção 2.2.3 §2.

<sup>‡</sup>Incluir o filtro impróprio  $\wp(X)$  na definição não traria qualquer vantagem, posto que  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}} \subseteq \wp(X)$  trivialmente. Em outras palavras,  $\wp(X)$  convergiria para todos os pontos. Veja também a Observação 2.1.25.

Enquanto uma rede  $\varphi: \mathbb{D} \rightarrow X$  e uma função  $h: X \rightarrow Y$  induzem naturalmente a rede  $h \circ \varphi: \mathbb{D} \rightarrow Y$ , não é (tão) imediato como induzir um filtro próprio  $h(\mathcal{F})$  em  $Y$  a partir de um filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$ . Trata-se de algo imprescindível para mostrar que filtros podem substituir sequências na descrição de continuidade em espaços topológicos, da mesma forma que redes foram usadas no Teorema 2.1.12.

**Lema 2.1.23.** *Se  $\mathcal{A}$  é um pré-filtro em  $X \neq \emptyset$  e  $h: X \rightarrow Y$  é uma função, então a família  $h\mathcal{A} := \{h[A] : A \in \mathcal{A}\}$  é um pré-filtro em  $Y$ .*

*Demonstração.* Usaremos a caracterização da Proposição 2.1.17. Como  $\emptyset \notin \mathcal{A}$ , temos  $\emptyset \notin h\mathcal{A}$  (pois  $Y \neq \emptyset$ !). Além disso, dado que  $h[A \cap B] \subseteq h[A] \cap h[B]$  para quaisquer subconjuntos  $A, B \subseteq X$ , segue que se  $A, B \in \mathcal{A}$ , então algum  $C \in \mathcal{A}$  satisfaz  $C \subseteq A \cap B$ , acarretando  $h[C] \subseteq h[A] \cap h[B]$ .  $\square$

**Definição 2.1.24.** Para um conjunto  $X \neq \emptyset$ , um filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$  e uma função  $h: X \rightarrow Y$ , indicaremos por  $h(\mathcal{F})$  o filtro gerado pelo pré-filtro  $h\mathcal{F}$  do lema anterior<sup>†</sup>, i.e.,  $h(\mathcal{F}) := (h\mathcal{F})^\dagger$ , que será chamado de **imagem do filtro  $\mathcal{F}$  pela função  $h$** . Explicitamente,  $B \in h(\mathcal{F})$  se, e somente se, existe  $F \in \mathcal{F}$  tal que  $h[F] \subseteq B$ .  $\P$

**Observação 2.1.25** (Opcional: e se  $X = \emptyset$ ?). Para o desinteressante caso em que  $X = \emptyset$ ,  $h = \emptyset$  é a única função que tem  $\emptyset$  como domínio e  $Y$  como codomínio. Neste caso, repetir a construção sugerida pelo lema com o único filtro de  $\emptyset$ , a saber  $\mathcal{F} = \{\emptyset\}$ , daria  $h\mathcal{F} = \{h[\emptyset]\} = \{\emptyset\}$ , e daí  $(h\mathcal{F})^\dagger = \wp(Y)$ . Isto não afeta o próximo teorema, posto que  $\emptyset$  não tem pontos e tampouco filtros próprios que convirjam para os seus pontos, tornando ambas as condições verdadeiras por vacuidade<sup>‡</sup>.  $\triangle$

**Exercício 2.1.9** (\*). Mostre que  $h(\mathcal{F}) = \{B \subseteq Y : f^{-1}[B] \in \mathcal{F}\}$ .  $\blacksquare$

**Teorema 2.1.26.** *Para espaços topológicos  $(X, \mathcal{T}_X)$  e  $(Y, \mathcal{T}_Y)$ , uma função  $f: X \rightarrow Y$  e um ponto  $p \in X$ , são equivalentes:*

- (i)  *$f$  é contínua em  $p$ , i.e., para todo  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V \subseteq Y$  tal que  $f(p) \in V$ , existe um  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U \subseteq X$  com  $p \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ ;*
- (ii)  *$f(\mathcal{G}) \rightarrow_{\mathcal{T}_Y} f(p)$  para qualquer filtro próprio  $\mathcal{G}$  em  $X$  satisfazendo  $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p$ .*

*Demonstração.* Assumindo (i), precisamos mostrar que  $\mathcal{N}_{f(p), \mathcal{T}_Y} \subseteq f(\mathcal{G})$ , o que a princípio significa apenas que todo  $N \in \mathcal{N}_{f(p), \mathcal{T}_Y}$  também satisfaz  $N \in f(\mathcal{G})$ . Ora, se  $N \in \mathcal{N}_{f(p), \mathcal{T}_Y}$ , então existe um  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V \subseteq Y$  com  $f(p) \in V$  e  $V \subseteq N$ , e daí (i) se aplica, assegurando um  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U \subseteq X$  com  $p \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ . Dado que  $\mathcal{G} \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p$  por hipótese, temos  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}_X} \subseteq \mathcal{G}$ , e assim  $U \in \mathcal{G}$ , acarretando  $N \in f(\mathcal{G})$  (por quê?)<sup>\*</sup>.

Reciprocamente, ao assumir (ii), basta trocar  $\mathcal{G}$  por  $\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}_X}$  para obter (i). Os detalhes ficam por sua conta (\*).  $\square$

<sup>†</sup>Você certamente já notou que todo filtro próprio é um pré-filtro (certo?)<sup>\*/2</sup>.

<sup>‡</sup>Não por coincidência, este mesmo *quase problema* estava implícito no Teorema 2.1.12, mas lá a condição (ii) também é válida por vacuidade, já que não existem redes em  $\emptyset$  (afinal de contas, conjuntos dirigidos são não vazios por definição).

### §3 Redes ou filtros convergentes?

A pergunta no título é motivada pelas discussões anteriores, que mostraram como as noções de convergência de rede e de filtro permitem reinterpretar continuidade em espaços topológicos como a preservação de convergência, algo que se perde quando se restringe a noção de convergência apenas a sequências. Mas afinal: redes ou filtros?

RESPOSTA: Tanto faz. Ou quase isso.

**Teorema 2.1.27** (Bruns e Schmidt [7]). *Para todo filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$ , existe uma rede  $R(\mathcal{F})$  em  $X$  tal que  $(R(\mathcal{F}))^\uparrow = \mathcal{F}$ .*

*Demonstração.* Vamos definir

- (i) um conjunto dirigido  $\mathbb{D}$ , e
- (ii) uma rede  $\mathbb{D} \rightarrow X$  cujos rabos sejam, precisamente, os membros de  $\mathcal{F}$ .

Num primeiro momento, pode-se pensar em considerar  $\mathbb{D} := (\mathcal{F}, \supseteq)$ , i.e., tomar  $\mathcal{F}$  como conjunto dirigido pela inclusão inversa (cf. Exemplo 2.1.5). No entanto, isto traz o problema de definir a rede: neste caso, o mais natural seria *escolher*  $x_F \in F$  para cada  $F \in \mathcal{F}$ . No entanto, isto garante apenas que todo membro de  $\mathcal{F}$  contém um rabo de  $(x_F)_{F \in \mathcal{F}}$  e, conseqüentemente,  $(x_F)_{F \in \mathcal{F}}^\uparrow \subseteq \mathcal{F}$  (cf. Proposição 2.1.21).

Em vez disso, vamos definir  $\mathbb{D}_{\mathcal{F}} := \{(x, F) \in X \times \mathcal{F} : x \in F\}$ , com a relação binária  $\preceq$  dada por

$$(x, F) \preceq (y, G) \Leftrightarrow G \subseteq F.$$

Parece a mesma coisa, mas não é: em  $\mathbb{D}_{\mathcal{F}}$ , a segunda coordenada decide quando um elemento é melhor do que outro, enquanto a primeira coordenada permanece aparentemente inútil (mas espere!). Neste caso, é justamente por  $\mathcal{F}$  ser próprio que  $\mathbb{D}_{\mathcal{F}}$  é dirigido<sup>†</sup>: se  $(x, F), (y, G) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$ , então  $F \cap G \in \mathcal{F}$  com  $F \cap G \neq \emptyset$ , donde segue que existe  $z \in F \cap G$  e, conseqüentemente,  $(x, F), (y, G) \preceq (z, F \cap G)$ .

A malandragem da primeira coordenada nos elementos de  $\mathbb{D}_{\mathcal{F}}$  se revela agora, no momento de definir a rede: faremos  $R(\mathcal{F})(x, F) := x$  para cada  $(x, F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$ . Como  $(x, F) \preceq (y, G)$  sse  $G \subseteq F$ , resulta que

$$R(\mathcal{F}) \left[ (x, F)^\uparrow \right] = F$$

para quaisquer  $F \in \mathcal{F}$  e  $x \in F$  (checou?)\*. Portanto,  $(R(\mathcal{F}))^\uparrow = \mathcal{F}$  (por quê?)\*.  $\square$

Para sintetizar a relação entre redes e filtros, vamos chamar por  $\text{Net}(X)$  a “coleção” de todas as redes em  $X$ , e por  $\text{Fil}^*(X)$  o conjunto de todos os filtros próprios em  $X$ . Ao longo desta subseção, obtivemos correspondências

$$\begin{array}{ccc} (\bullet)^\uparrow : \text{Net}(X) \rightarrow \text{Fil}^*(X) & & R(\bullet) : \text{Fil}^*(X) \rightarrow \text{Net}(X) \\ \varphi \mapsto (\varphi)^\uparrow & \text{e} & \mathcal{F} \mapsto R(\mathcal{F}) \end{array}$$

que se comportam *muito bem* com relação à convergência: temos  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p$  sse  $(\varphi)^\uparrow \rightarrow_{\mathcal{T}} p$  (cf. Proposição 2.1.20) e, pelo modo como definimos  $R(\bullet)$ , também temos  $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$  sse  $R(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{T}} p$  (percebeu?)\*.

Na prática diária, enquanto a descrição do filtro  $(\varphi)^\uparrow$  será bastante importante, a definição da rede  $R(\mathcal{F})$  pode ser completamente esquecida: o que realmente interessa é saber que, para um filtro próprio  $\mathcal{F}$ , existe *alguma* rede  $\rho$  tal que  $(\rho)^\uparrow = \mathcal{F}$ .

<sup>†</sup>Se você ainda não percebeu que  $\preceq$  é reflexiva e transitiva: perceba! ( $\star$ )

**Observação 2.1.28** (Importante, mas nem tanto). O conjunto  $\text{Fil}^*(X)$  é subconjunto legítimo de  $\wp(\wp(X))$ , afinal de contas, cada  $\mathcal{F} \in \text{Fil}^*(X)$  é uma família de subconjuntos de  $X$ , i.e.,  $\mathcal{F} \subseteq \wp(X)$  ou, equivalentemente,  $\mathcal{F} \in \wp(\wp(X))$ . Por outro lado, de um ponto de vista estritamente técnico (regido por ZFC),  $\text{Net}(X)$  não é um conjunto.

Essencialmente, isto se deve à ausência de uma restrição forte sobre quais objetos podem ser os domínios de redes em  $X$ : basta ser um conjunto dirigido. Ora, se  $\text{Net}(X)$  fosse um conjunto, então  $\text{dom}(\text{Net}(X)) := \{A : A \text{ é domínio de uma rede em } X\}$  também seria um conjunto. No entanto, *todos* os conjuntos pertenceriam a  $\text{dom}(\text{Net}(X))$  (por quê?)\*, acarretando que esta é, na verdade, a classe  $\mathbb{V}$  de todos os conjuntos. Em outras palavras:  $\text{Net}(X)$  é grande demais para ser um conjunto legítimo.

Como ninguém liga para isso no fim do dia<sup>†</sup>, usaremos a classe  $\text{Net}(X)$  sem dor na consciência. A única relevância desta observação, neste texto, está na constatação de que  $(\bullet)^\dagger$  e  $R(\bullet)$  não podem ser inversas uma da outra, pois se fossem teríamos um conjunto em bijeção com uma *classe própria* (cf. [21]).  $\triangle$

## §4 A condição de Hausdorff

Para ilustrar o uso de redes e filtros nas questões de convergência em espaços topológicos, vamos voltar para o problema que iniciou esta seção: a unicidade dos limites. Por que ainda não provamos que se  $\varphi$  é uma rede num espaço topológico  $X$  tal que  $\varphi \rightarrow x$  e  $\varphi \rightarrow y$ , então  $x = y$ ? A resposta é muito simples: em geral, isto é falso.

**Exemplo 2.1.29.** Considere  $X$  um conjunto infinito munido de sua topologia cofinita (cf. Exercício 1.1.16) e seja  $(x_n)_n$  uma sequência injetiva em  $X$ , i.e., tal que  $x_n \neq x_m$  se  $n \neq m$ . Mostraremos que  $(x_n)_n \rightarrow p$ , para qualquer  $p \in X$ . Ora, se  $V \subseteq X$  é um aberto que contém  $p$ , então  $X \setminus V$  é um conjunto finito, e  $N := \max(\{m \in \mathbb{N} : x_m \notin V\} \cup \{0\})$  é tal que  $x_n \in V$  para todo  $n \geq N$ .  $\blacktriangle$

Como nossa intuição é tipicamente *euclidiana*, o exemplo acima parece... contraintuitivo, já que na vida *real*, uma sequência converge para, no máximo, um ponto. Ao revisar o Exemplo 2.1.1, em que se provou isso, note que em vez do argumento numérico utilizado, poderíamos observar que se  $L \neq L'$ , então  $|L - L'| = 2r$  para algum  $r > 0$ , e daí usar o fato de que os intervalos  $(L - r, L + r)$  e  $(L' - r, L' + r)$  são disjuntos (checou?)\* para concluir que se  $(x_n)_n \rightarrow_{\mathbb{R}} L$ , então  $(x_n)_n \not\rightarrow_{\mathbb{R}} L'$ : como existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $x_n \in (L - r, L + r)$  para todo  $n \geq N$ , também ocorre  $x_n \notin (L' - r, L' + r)$ , donde segue que  $(x_n)_n \not\rightarrow_{\mathbb{R}} L'$  (entendeu?)\*.

**Exercício 2.1.10** (\*). Mostre que se  $\varphi$  é uma rede num espaço métrico  $X$  tal que  $\varphi \rightarrow p$  e  $\varphi \rightarrow q$ , então  $p = q$ . Dica: troque os intervalos abertos por bolas abertas no argumento anterior.  $\blacksquare$

O exercício anterior sugere que a existência de abertos disjuntos *separando* pontos distintos tenha algo a ver com unicidade de limites, o que se fortalece com a observação de que, no Exemplo 2.1.29, quaisquer dois abertos não vazios se interceptam (observe!)\*. Topologicamente, chegamos à solução ótima.

**Definição 2.1.30.** Dizemos que  $X$  é um **espaço de Hausdorff** (ou espaço  $T_2$ )<sup>‡</sup> se para quaisquer pontos distintos  $x, y \in X$  existem abertos disjuntos  $U, V \subseteq X$  tais que  $x \in U$  e  $y \in V$ .  $\blacksquare$

<sup>†</sup>Vide tudo o que se faz em Teoria de Categorias, por exemplo.

<sup>‡</sup>O subíndice “2” no termo “ $T_2$ ” sugere variações da condição de Hausdorff. Isto será abordado oportunamente.

CUIDADO! Ser de Hausdorff não significa *apenas* que existem abertos disjuntos no espaço. [OFENSA CENSURADA] Releia a definição até perceber, por gentileza.

**Teorema 2.1.31.** *Para um espaço topológico  $X$ , as afirmações a seguir são equivalentes:*

- (i)  $X$  é espaço de Hausdorff;
- (ii) para toda rede  $\varphi \in \text{Net}(X)$ , se  $\varphi \rightarrow x$  e  $\varphi \rightarrow y$ , então  $x = y$ ;
- (iii) para todo filtro próprio  $\mathcal{F} \in \text{Fil}^*(X)$ , se  $\mathcal{F} \rightarrow x$  e  $\mathcal{F} \rightarrow y$ , então  $x = y$ .

*Demonstração.* A implicação (i)  $\Rightarrow$  (ii) será problema seu (\*). Para (ii)  $\Rightarrow$  (iii), o Teorema 2.1.27 assegura a existência de uma rede  $\rho \in \text{Net}(X)$  com  $(\rho)^\uparrow = \mathcal{F}$ , de modo que se  $\mathcal{F} \rightarrow x$  e  $\mathcal{F} \rightarrow y$ , então  $\rho \rightarrow x$  e  $\rho \rightarrow y$  (cf. Proposição 2.1.20), donde (ii) acarreta  $x = y$ . Para (iii)  $\Rightarrow$  (i), fazemos

$$\mathcal{H} := \{N \cap N' : N \in \mathcal{N}_x \text{ e } N' \in \mathcal{N}_y\}$$

para certos  $x, y \in X$  distintos, a fim de definir  $\mathcal{F} := (\mathcal{H})^\uparrow$ . Dado que  $\mathcal{F}$  é um filtro (por quê?)\* que satisfaz  $\mathcal{N}_x, \mathcal{N}_y \subseteq \mathcal{F}$  (pois  $X \in \mathcal{N}_x \cap \mathcal{N}_y$ , percebeu?)\*, a hipótese (iii) impede que  $\mathcal{F}$  seja próprio, i.e.,  $\emptyset \in \mathcal{F}$ . Logo, existem  $U, V \subseteq X$  abertos com  $x \in U$ ,  $y \in V$  e  $U \cap V \subseteq \emptyset$  (por quê?)\*. Portanto,  $X$  é de Hausdorff.  $\square$

**Observação 2.1.32** (Opcional: roteiros adicionais). Se a vida te obrigar a escolher entre filtros ou redes, você precisará de outros argumentos para provar as partes interessantes do teorema anterior, a saber, (ii)  $\Rightarrow$  (i) ou (i)  $\Rightarrow$  (iii), respectivamente.

Para (ii)  $\Rightarrow$  (i), proceda pela contrapositiva: se  $x, y \in X$  são pontos distintos que testemunham a falha da condição de Hausdorff, então

$$\mathbb{W} := \{W \subseteq X : W \in \mathcal{T}_x \cap \mathcal{T}_y\}$$

é um conjunto dirigido com a relação de inclusão inversa, tal que para qualquer  $W \in \mathbb{W}$  existe  $x_W \in W$ , donde segue que  $(x_W)_{W \in \mathbb{W}}$  é uma rede em  $X$  que converge tanto para  $x$  quanto para  $y$ . Para (i)  $\Rightarrow$  (iii), note que se  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}$  e  $\mathcal{N}_y \subseteq \mathcal{F}$  com  $x \neq y$  num espaço de Hausdorff  $X$ , então  $\mathcal{F}$  não é filtro próprio, pois os abertos disjuntos  $U$  e  $V$  existentes por hipótese, digamos que com  $x \in U$  e  $y \in V$ , são tais que  $U \in \mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}$  e  $V \in \mathcal{N}_y \subseteq \mathcal{F}$ , acarretando  $\emptyset = U \cap V \in \mathcal{F}$ . Por fim, não custa observar que (iii)  $\Rightarrow$  (ii) também é uma consequência imediata da Proposição 2.1.20. Completar os poucos detalhes omitidos acima ficará por sua conta (\*).  $\triangle$

Revelamos, portanto, que o escopo da unicidade de limites garantida pela condição de Hausdorff abrange bem mais do que sequências. E se você ainda tiver alguma esperança de que sequências bastariam para fazer o trabalho: esqueça.

**Exemplo 2.1.33** (Compare com o Exemplo 1.1.38). Para um conjunto  $X$  não enumerável, considere  $\mathcal{S}$  a família dos subconjuntos  $A \subseteq X$  tais que  $X \setminus A$  é enumerável, que costuma ser xingada de *topologia<sup>†</sup> coenumerável*. Sem grandes esforços, pode-se mostrar que se  $\varphi := (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência em  $X$  tal que  $x_n \rightarrow_{\mathcal{S}} x$  para algum  $x \in X$ , então existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $x_n = x$  para todo  $n \geq N$  (por quê?)\*. Consequentemente, se  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{S}} x$  e  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{S}} y$ , então  $x = y$ . No entanto,  $(X, \mathcal{S})$  não é espaço de Hausdorff por um motivo muito forte: quaisquer dois abertos não vazios de  $X$  tem interseção não vazia (por quê?)\*.  $\blacktriangle$

<sup>†</sup>Se não percebeu que se trata de uma topologia, verifique! (\*).



**Definição 2.1.34.** Para um espaço de Hausdorff  $(X, \mathcal{T})$  e um filtro próprio  $\mathcal{F}$ , denotamos por  $\lim_{\mathcal{T}} \mathcal{F}$  o único ponto de  $X$ , se existir, tal que  $\mathcal{F} \rightarrow \lim \mathcal{F}$ . Para uma rede  $\varphi$  em  $X$ , fazemos  $\lim_{\mathcal{T}} \varphi := \lim_{\mathcal{T}} (\varphi)^\uparrow$ . Em particular, para  $\varphi := (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ , também podemos escrever  $\lim_{d \in \mathbb{D}} x_d := \lim \varphi$ , etc.  $\blacksquare$

**Corolário 2.1.35** (das discussões anteriores). *Uma função  $f: X \rightarrow Y$  entre espaços de Hausdorff é contínua se, e somente se,*

$$f \left( \lim_{\mathcal{T}_X} \varphi \right) = \lim_{\mathcal{T}_Y} (f \circ \varphi)$$

para toda rede convergente  $\varphi \in \mathbf{Net}(X)$ .

*Demonstração.* Trata-se apenas da reformulação do Teorema 2.1.12 com as notações de limite introduzidas acima, garantidas pela condição de Hausdorff.  $\square$

**Observação 2.1.36.** Se você for do time que prefere escrever redes com índices explícitos e omitir topologias, a identidade no último corolário se torna ainda mais familiar:

$$f \left( \lim_{d \in \mathbb{D}} x_d \right) = \lim_{d \in \mathbb{D}} f(x_d). \quad \triangle$$

**Exercício 2.1.11** (Opcional  $(\star)$ ). Nas condições anteriores, mostre que  $f$  é contínua sse  $f(\lim_{\mathcal{T}_X} \mathcal{G}) = \lim_{\mathcal{T}_Y} f(\mathcal{G})$  para todo filtro convergente  $\mathcal{G} \in \mathbf{Fil}^*(X)$ .  $\blacksquare$

**Observação 2.1.37** (Importante:  $\lim \mathcal{F}$  e  $\lim \varphi$  sem Hausdorff). As abreviações do tipo “ $\lim \mathcal{F}$ ” e afins podem ser usadas na ausência da condição de Hausdorff, mas em tais situações o significado delas é outro. Para um espaço  $X$  (não necessariamente de Hausdorff) e um filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$ , faz-se

$$\lim_{\mathcal{T}} \mathcal{F} := \{x \in X : \mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{T}} x\},$$

com definição análoga para o caso de redes. Note que se  $X$  for de Hausdorff, então  $\lim \mathcal{F} = \emptyset$  ou  $\lim \mathcal{F} = \{x\}$  para um único  $x \in X$ , o que em certo sentido mostra que não há risco em usar a mesma notação para os dois contextos.

Em particular, para cada espaço topológico  $Z$ , obtemos funções

$$\begin{array}{ccc} \lim_{\mathcal{T}}: \mathbf{Fil}^*(Z) \rightarrow \wp(Z) & & \lim_{\mathcal{T}}: \mathbf{Net}(Z) \rightarrow \wp(Z) \\ & \text{e} & \\ \mathcal{F} \mapsto \lim_{\mathcal{T}} \mathcal{F} & & \varphi \mapsto \lim_{\mathcal{T}} \varphi \end{array}$$

que permitem descrever completamente as funções contínuas entre quaisquer espaços topológicos. Para facilitar futuras referências, isto será destacado a seguir.  $\triangle$

**Corolário 2.1.38** (das discussões anteriores). *Para uma função  $f: X \rightarrow Y$  entre espaços topológicos  $X$  e  $Y$ , são equivalentes:*

- (i)  $f$  é contínua;
- (ii)  $f[\lim_{\mathcal{T}_X} \varphi] \subseteq \lim_{\mathcal{T}_Y} (f \circ \varphi)$  para toda rede  $\varphi \in \mathbf{Net}(X)$ ;
- (iii)  $f[\lim_{\mathcal{T}_X} \mathcal{G}] \subseteq \lim_{\mathcal{T}_Y} f(\mathcal{G})$  para todo filtro próprio  $\mathcal{G} \in \mathbf{Fil}^*(X)$ .

*Demonstração.* Basta notar (e você vai notar, certo?)\* que a implicação

$$\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}_X} p \Rightarrow f \circ \varphi \rightarrow_{\mathcal{T}_Y} f(p)$$

se reescreve como “se  $p \in \lim_{\mathcal{T}_X} \varphi$ , então  $f(p) \in \lim_{\mathcal{T}_Y} (f \circ \varphi)$ ” (e por que basta?)\*.  $\square$

**PROVOCAÇÃO:** você percebeu que as funções do tipo  $\lim_{\bullet}: \mathbf{Net}(\bullet) \rightarrow \wp(\bullet)$  fizeram com as topologias a mesma coisa que as topologias fizeram com as métricas?

## §5 Comparação de topologias (e subespaços)

Para encerrar este primeiro contato com as noções de convergência em espaços topológicos, veremos como elas permitem reinterpretar as relações de inclusão entre topologias definidas sobre um mesmo conjunto.

**Definição 2.1.39.** Dadas duas topologias  $\mathcal{S}$  e  $\mathcal{T}$  sobre um conjunto  $X$ , é muito comum encontrar textos que se referem à inclusão “ $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$ ” das seguintes formas:

- (i)  $\mathcal{S}$  é *mais fraca*, ou *mais grossa*, do que  $\mathcal{T}$ , e
- (ii)  $\mathcal{T}$  é *mais forte*, ou *mais fina*, do que  $\mathcal{S}$ .

Uma vez que o símbolo “ $\subseteq$ ” tem cumprido bem o seu papel, você pode ~~arriscar~~ optar por ignorar esta definição. Contudo, ela esconde uma interpretação alternativa muito útil, razão pela qual ela não será completamente abandonada por aqui.

**Proposição 2.1.40.** Para um espaço  $X$  e um subconjunto  $A \subseteq X$ , são equivalentes:

- (i)  $A$  é aberto em  $X$ ;
- (ii) sempre que um filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$  converge para um ponto de  $A$ , tem-se  $A \in \mathcal{F}$ ;
- (iii) sempre que uma rede  $\varphi$  em  $X$  converge para um ponto de  $A$ , existe  $D \in \text{dom}(\varphi)$  tal que  $\varphi[D^\uparrow] \subseteq A$ .

*Demonstração.* Se  $A \subseteq X$  é aberto e  $\mathcal{F} \rightarrow p$  com  $p \in A$ , então  $A \in \mathcal{F}$  pois  $A \in \mathcal{N}_p$  e  $\mathcal{N}_p \subseteq \mathcal{F}$ , i.e., (i)  $\Rightarrow$  (ii). Por sua vez, assumindo (ii) e tomando  $\varphi$  tal que  $\varphi \rightarrow p \in A$ , temos  $(\varphi)^\uparrow \rightarrow p$ , donde a condição (ii) assegura  $A \in (\varphi)^\uparrow$  e isto significa, exatamente, a condição (iii). Por fim, faremos (iii)  $\Rightarrow$  (i) pela contrapositiva.

Se  $A$  não é aberto, então existe  $p \in A$  tal que  $U \not\subseteq A$  para todo subconjunto  $U \subseteq X$  aberto em  $X$  com  $p \in U$  (por quê?)\*. Logo, para cada aberto  $U$  em torno de  $p$ , existe  $x_U \in U \setminus A$ . Posto que  $\mathbb{A} := \{U \subseteq X : U \text{ é aberto em torno de } p\}$  é dirigido pela inclusão inversa, segue que  $(x_U)_{U \in \mathbb{A}}$  é uma rede em  $X$  que converge para  $p$  (por quê?)\*, mas tal que nenhum de seus rabos intercepta  $A$ . Em particular, não vale (iii).  $\square$

**Observação 2.1.41** (Opcional: para quem prefere filtros). Se for do seu interesse ignorar redes, você precisará de um argumento direto para (ii)  $\Rightarrow$  (i). Neste caso, ainda pela contrapositiva, a existência do ponto  $p \in A$  para o qual  $U \not\subseteq A$  sempre que  $U$  é um aberto de  $X$  em torno de  $p$  permite mostrar que

$$\mathcal{G} := \{S \subseteq X : \text{existe } U \subseteq X \text{ aberto em torno de } p \text{ tal que } U \setminus A \subseteq S\}$$

é um filtro próprio em  $X$  com  $X \setminus A \in \mathcal{G}$  e  $\mathcal{G} \rightarrow p$  (por quê?)\*. Portanto, (ii) não vale.  $\triangle$

**Corolário 2.1.42.** Para topologias  $\mathcal{S}$  e  $\mathcal{T}$  sobre um conjunto  $X$ , são equivalentes:

- (i)  $\mathcal{T}$  é *mais forte* do que  $\mathcal{S}$ , i.e.,  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$ ;
- (ii)  $\text{Id}_X: (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{S})$  é contínua;
- (iii)  $\lim_{\mathcal{T}} \varphi \subseteq \lim_{\mathcal{S}} \varphi$  para toda rede  $\varphi$  em  $X$ ;
- (iv)  $\lim_{\mathcal{T}} \mathcal{F} \subseteq \lim_{\mathcal{S}} \mathcal{F}$  para todo filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$ .



**Exercício 2.1.12** (\*). Prove o corolário anterior. Dica: use a proposição anterior apenas se você quiser fazer (iii)  $\Rightarrow$  (i) ou (iv)  $\Rightarrow$  (i) diretamente e com elegância. ■

Portanto,  $\mathcal{T}$  ser mais forte do que  $\mathcal{S}$  não significa apenas que  $\mathcal{T}$  tem mais abertos do que  $\mathcal{S}$ , mas também que ela é tão forte com respeito a  $\mathcal{S}$  que, se algo converge com respeito a  $\mathcal{T}$ , então também convergirá com respeito a  $\mathcal{S}$ .

**Observação 2.1.43.** Um fenômeno similar ao ocorrido na prova da Proposição 2.1.20 costuma confundir iniciantes: quando uma topologia  $\mathcal{T}$  é mais forte do que uma topologia  $\mathcal{S}$  em  $X$ , os  $\mathcal{S}$ -abertos são, invariavelmente, resultado da reunião de  $\mathcal{T}$ -abertos (por quê?)\*, o que sugere pensar nos subconjuntos  $\mathcal{T}$ -abertos como sendo, individualmente, menores do que os  $\mathcal{S}$ -abertos. Embora se trate, mais uma vez, de um reflexo do comportamento dos filtros<sup>†</sup>, você pode preferir pensar em grãos de café: quanto mais fina a moagem, mais forte/intenso o sabor do elixir da vida.  $\triangle$

Antes de finalizar, é útil mencionar, mesmo que brevemente, a noção de *subespaço topológico*, a fim de evitar confusões com o uso múltiplo do símbolo de inclusão<sup>‡</sup>.

**Proposição 2.1.44.** Se  $(X, \mathcal{T})$  é espaço topológico e  $Y \subseteq X$ , então  $\mathcal{T}_Y := \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}$  é uma topologia em  $Y$  tal que a inclusão  $i: Y \rightarrow X$  é contínua. Além disso,  $\mathcal{T}_Y$  é a topologia mais fraca com tal propriedade, i.e., se  $\mathcal{S}$  for outra topologia em  $Y$  tal que  $i: (Y, \mathcal{S}) \rightarrow (X, \mathcal{T})$  é contínua, então  $\mathcal{T}_Y \subseteq \mathcal{S}$ .

*Demonstração.* Mostrar que  $\mathcal{T}_Y$  é uma topologia será problema seu (\*). Agora, se  $\mathcal{S}$  é uma topologia como no enunciado, então  $i^{-1}[U] \in \mathcal{S}$  para todo  $U \in \mathcal{T}$ , mas  $i^{-1}[U] = U \cap Y$  (certo?)\*, donde a inclusão desejada segue.  $\square$

**Definição 2.1.45.** Dizemos que  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  é **subespaço topológico** de  $(X, \mathcal{T})$ . ¶

A menos de menção explícita contrária, todo subconjunto de um espaço topológico será considerado com sua respectiva topologia induzida e, por conseguinte, será automaticamente considerado um subespaço topológico: isso evitará repetições desnecessárias da expressão “subespaço topológico”, que tornariam o texto mais carregado do que já é.

## §6 Exercícios adicionais

**Exercício 2.1.13** (\*). Para um espaço topológico  $X$  e um ponto  $p \in X$ , mostre que  $\text{ult}(p) := \{S \subseteq X : p \in S\}$  é um filtro próprio em  $X$  tal que  $\text{ult}(p) \rightarrow p$ . ■

**Exercício 2.1.14** (\*). Para uma rede  $\varphi$  num espaço  $X$ , mostre que  $(\varphi)^\dagger = \text{ult}(p)$  se, e somente se, existe  $D \in \text{dom}(\varphi)$  tal que  $\varphi(d) = p$  para todo  $d \succeq D$ . Em particular, redes constantes convergem. Conclua que funções constantes (entre espaços topológicos) são contínuas. ■

**Exercício 2.1.15** (\*). Mostre que toda ordem total é um espaço de Hausdorff com a topologia da ordem (cf. Definição 1.2.23). ■

**Exercício 2.1.16** (\*). Mostre que o resultado anterior é falso sem a hipótese de totalidade da ordem. Dica:  $Y$ . ■

<sup>†</sup>A ser explorado, com mais calma, na Subseção 2.2.3§2.

<sup>‡</sup>Se tem placa, tem história.

**Exercício 2.1.17** (\*). Sejam  $(X, \mathcal{T})$  um espaço topológico,  $Y \subseteq X$  um subconjunto de  $X$ ,  $\varphi \in \text{Net}(Y)$  uma rede em  $Y$  e  $y \in Y$  um ponto. Mostre que  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}_Y} y$  sse  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} y$ . ■

**Exercício 2.1.18** (\*). Mostre que se  $X$  é de Hausdorff e  $Y \subseteq X$ , então  $Y$  é de Hausdorff. JARGÃO: a condição de Hausdorff é *hereditária* para subespaços. ■

**Exercício 2.1.19** (\*). Sejam  $X$  e  $Y$  espaços topológicos,  $f: X \rightarrow Y$  uma função e  $S \subseteq X$ . Geralmente, a frase “ $f$  é contínua em  $S$ ” admite duas interpretações:

(i)  $f$  é contínua em cada ponto de  $S$ ;

(ii) a restrição  $f|_S$  é contínua.

a) Mostre que (i)  $\Rightarrow$  (ii). Em particular, se  $f$  é contínua, então  $f|_S$  é contínua.

b) Mostre que se  $S$  for aberto, então (ii)  $\Rightarrow$  (i).

c) Mostre que se  $S$  não for aberto, então a implicação (ii)  $\Rightarrow$  (i) pode ser falsa. ■

**Exercício 2.1.20** (\*). Mostre que  $f: X \rightarrow Y$  é contínua sse  $f: X \rightarrow \text{im}(f)$  é contínua, onde  $\text{im}(f)$  tem a topologia de subespaço herdada de  $Y$ . ■

**Exercício 2.1.21** (\*). Para um espaço métrico  $(X, d)$  e um subconjunto  $Y$ , denote por  $d_Y$  a métrica em  $Y$  induzida por  $d$ . Mostre que  $\mathcal{T}_d|_Y = \mathcal{T}_{d_Y}$ , i.e., a topologia de  $Y$  enquanto subespaço de  $(X, \mathcal{T}_d)$  coincide com a topologia induzida pela métrica  $d_Y$ . Dica: perceba que  $B_{d_Y}(y, r) = B_d(y, r) \cap Y$  para quaisquer  $y \in Y$  e  $r > 0$ . ■

**Exercício 2.1.22** (\*). Mostre que uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  num espaço métrico  $X$  é de Cauchy sse a rede  $(d(x_m, x_n))_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$  converge para 0 em  $\mathbb{R}$ , onde  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  está dirigido pela relação  $\preceq$  dada por  $(m, n) \preceq (m', n') \Leftrightarrow m \leq m' \text{ e } n \leq n'$ . ■

**Exercício 2.1.23** (\*). Sejam  $(x_a)_{a \in \mathbb{A}}$  e  $(y_a)_{a \in \mathbb{A}}$  redes em  $\mathbb{R}$  tais que  $x_a \rightarrow x$  e  $y_a \rightarrow y$ , para  $x, y \in \mathbb{R}$ .

a) Mostre que se existir  $A \in \mathbb{A}$  tal que  $x_a \leq y_a$  para todo  $a \succeq A$ , então  $x \leq y$ .

b) Mostre que se  $x < y$ , então existe  $A' \in \mathbb{A}$  tal que  $x_a < y_a$  para todo  $a \succeq A'$ . ■

**Exercício 2.1.24** (\*). Sejam  $X$  e  $Y$  conjuntos não vazios e  $f: X \rightarrow Y$  uma função.

a) Mostre que  $f(\varphi)^\dagger = (f \circ \varphi)^\dagger$  para qualquer rede  $\varphi$  em  $X$ .

b) Conclua que ambas as condições (ii) nos Teoremas 2.1.12 e 2.1.26 são equivalentes sem utilizar a definição usual de continuidade via abertos (Definição 1.1.33). ■

## 2.1.2 Como “evitar” redes e filtros

AVISO. Se você pulou a subseção anterior por algum tipo de aversão a redes ou filtros (ou por qualquer outro motivo), saiba que você perdeu, entre outras coisas<sup>†</sup>:

- a condição de Hausdorff (cf. Definição 2.1.30);
- a definição de subespaço topológico (cf. Definição 2.1.45).

Embora redes e filtros funcionem muito bem na tarefa de recuperar as ideias de convergência em espaços topológicos, existem alternativas que não dependem (explicitamente) dessas ferramentas e, ainda assim, preservam parte do significado de *convergir*.

<sup>†</sup>Sim, pretendo deixar o texto legível até para quem prefere não usar redes ou filtros. Não, não espere que eu faça isso de bom humor.

### §1 Aderência e interior

Intuitivamente, convergir significa estar *arbitrariamente* próximo. Quando uma sequência converge para um ponto, por exemplo, *todo* aberto em torno do ponto contém rabos da sequência. Assim, se a ideia é nos livrarmos de filtros, redes e sequências mas manter a ideia de proximidade arbitrária, uma alternativa é a seguinte:

**Definição 2.1.46.** Para um espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$  e um subconjunto  $S \subseteq X$ , diremos que um ponto  $p \in X$  é  **$\mathcal{T}$ -aderente ao conjunto  $S$**  (ou “...de  $S$ ”) se para todo  $\mathcal{T}$ -aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $p$  ocorrer  $V \cap S \neq \emptyset$ . Menções a  $\mathcal{T}$  serão omitidas quando a topologia estiver clara pelo contexto.  $\blacksquare$

**Proposição 2.1.47.** Para espaços topológicos  $(X, \mathcal{T}_X)$  e  $(Y, \mathcal{T}_Y)$ , uma função  $f: X \rightarrow Y$  e um ponto  $p \in X$ , são equivalentes:

- (i)  $f$  é contínua em  $p$  (cf. Definição 1.1.33);
- (ii)  $f(p)$  é  $\mathcal{T}_Y$ -aderente a  $f[S]$  sempre que  $p$  é  $\mathcal{T}_X$ -aderente a  $S$ , para qualquer subconjunto  $S \subseteq X$

*Demonstração.* Assumindo (i), com  $p$   $\mathcal{T}_X$ -aderente a  $S$ , vamos mostrar que  $f(p)$  é  $\mathcal{T}_Y$ -aderente a  $f[S]$ . Para isso, dado um  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V \subseteq Y$  em torno de  $f(p)$ , precisamos mostrar que  $V \cap f[S] \neq \emptyset$ . Ora, por (i), existe um subconjunto  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U \subseteq X$  tal que  $p \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ . Pela hipótese acerca de  $p$ , existe  $s \in U \cap S$ , acarretando  $f(s) \in V \cap f[S]$ .

A recíproca será feita pela contrapositiva: assumindo  $f$  descontínua em  $p$ , obtaremos  $S \subseteq X$  com  $p$   $\mathcal{T}_X$ -aderente a  $S$  mas tal que  $f(p)$  não seja  $\mathcal{T}_Y$ -aderente a  $f[S]$ . Ora, a falha de (i) assegura um  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V \subseteq Y$  em torno de  $f(p)$  tal que  $f[U] \not\subseteq V$  para todo  $U \subseteq X$  que for  $\mathcal{T}_X$ -aberto em torno de  $p$ . Em outras palavras, para todo  $\mathcal{T}_X$ -aberto  $U$  em torno de  $p$ , existe  $x_U \in U$  tal que  $f(x_U) \notin V$ . Consequentemente,  $S := \{x_U : U \text{ é } \mathcal{T}_X\text{-aberto em torno de } p\}$  tem  $p$  como ponto  $\mathcal{T}_X$ -aderente, enquanto o  $\mathcal{T}_Y$ -aberto  $V$  testemunha que  $f(p)$  não é  $\mathcal{T}_Y$ -aderente a  $f[S]$ , já que  $f[S] \cap V = \emptyset$  por construção (percebeu?)<sup>\*</sup>.  $\square$

Quem tem aversão a usos desnecessários do Axioma da Escolha pode preferir, na recíproca da última demonstração, considerar

$$S := \{x \in X : \text{existe } \mathcal{T}_X\text{-aberto } U \text{ em torno de } p \text{ tal que } x \in U \text{ e } f(x) \notin V\}.$$

Dessa forma, ainda se tem  $p$  aderente a  $S$  (certo?)<sup>\*</sup> e  $f[S] \cap V = \emptyset$ . A opção por escolher  $x_U \in U$  para cada  $U$  buscou apenas sugerir que redes convergentes estão escondidas na definição de aderência (cf. Definição 1.1.11). Na verdade, filtros também estão.

**Proposição 2.1.48.** Para um espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$ , um subconjunto  $S \subseteq X$  e um ponto  $p \in X$ , as afirmações a seguir são equivalentes:

- (i)  $p$  é  $\mathcal{T}$ -aderente a  $S$ ;
- (ii) existe uma rede  $\varphi \in \text{Net}(S)$  tal que  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ ;
- (iii) existe um filtro próprio  $\mathcal{F} \in \text{Fil}^*(X)$  tal que  $S \in \mathcal{F}$  e  $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ .

**Exercício 2.1.25** (\*). Demonstre a proposição acima<sup>†</sup>. Dica: para (i)  $\Rightarrow$  (ii), construa uma rede marota  $(x_U)_{U \in \mathcal{T}_p}$ , para (ii)  $\Rightarrow$  (iii) faça  $\mathcal{F} := (\varphi)^\dagger$  e, para (iii)  $\Rightarrow$  (i), note que  $S \cap V \in \mathcal{F}$  para todo  $V \in \mathcal{T}_p$ . ■

A proposição acima caracteriza os pontos aderentes de um conjunto de modo análogo ao que se fez na Definição 1.1.11 para definir o *fecho* no caso métrico. A mesma coisa será feita aqui, mas com menos pressa do que no primeiro capítulo.

**Definição 2.1.49** (Aderência, fechados e fechos). Seja  $(X, \mathcal{T})$  um espaço topológico.

- (i) A  $\mathcal{T}$ -**aderência** (ou apenas **aderência**)<sup>‡</sup> de um subconjunto  $S \subseteq X$  é o conjunto

$$\text{ad}_{\mathcal{T}}(S) := \{x \in X : x \text{ é } \mathcal{T}\text{-aderente ao conjunto } S\}.$$

- (ii) Um subconjunto  $F \subseteq X$  é  $\mathcal{T}$ -**fechado** (ou *fechado em  $X$* , ou *fechado de  $X$* , etc.) se  $\text{ad}_{\mathcal{T}}(F) = F$ .
- (iii) O  $\mathcal{T}$ -**fecho** de um subconjunto  $S \subseteq X$ , denotado por  $\text{cl}_{\mathcal{T}}(S)$  (ou  $\bar{S}$  quando a topologia de  $X$  for clara pelo contexto) é o menor  $\mathcal{T}$ -fechado de  $X$  que contém  $S$ , i.e.,  $\text{cl}_{\mathcal{T}}(S)$  é  $\mathcal{T}$ -fechado,  $S \subseteq \text{cl}_{\mathcal{T}}(S)$  e  $\text{cl}_{\mathcal{T}}(S) \subseteq F$  sempre que  $F \subseteq X$  é um  $\mathcal{T}$ -fechado satisfazendo  $S \subseteq F$ . ¶

Se você já estudou Topologia Geral, pode ter achado estranha a distinção entre  $\text{ad}(S)$  e  $\bar{S}$ , entre outras coisas. Foi proposital, não se preocupe: há uma *agenda*<sup>††</sup> por trás disso, que será lentamente revelada a fim de não gerar pânico.

**Teorema 2.1.50.** Num espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$ , a identidade

$$\text{ad}_{\mathcal{T}}(S) = \text{cl}_{\mathcal{T}}(S)$$

se verifica para todo subconjunto  $S \subseteq X$ .

Com as definições adotadas, três coisas devem ser mostradas:

- (i)  $S \subseteq \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$ ;
- (ii)  $\text{ad}_{\mathcal{T}}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S)) = \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$ , i.e.,  $\text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$  é  $\mathcal{T}$ -fechado, e
- (iii)  $\text{ad}_{\mathcal{T}}(S) \subseteq F$  para todo  $\mathcal{T}$ -fechado  $F$  tal que  $S \subseteq F$ .

Isto será feito de três formas diferentes.

*Demonstração (via abertos).* Se  $x \in S$  e  $V \subseteq X$  é um aberto de  $X$  em torno de  $x$ , então (obviamente)  $V \cap S \neq \emptyset$ , mostrando que  $x \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$ . Da arbitrariedade do ponto  $x$  tomado, resulta (i). Com (i) provado, temos  $\text{ad}_{\mathcal{T}}(S) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{T}}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S))$ , de modo que para mostrar (ii), basta verificar a inclusão oposta: se  $x \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S))$  e  $V \subseteq X$  é um aberto de  $X$  em torno de  $x$ , então existe  $y \in V \cap \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$  e, por conseguinte,  $V \cap S \neq \emptyset$  (posto que  $y \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$  e  $V$  é um aberto em torno de  $y$ ). Finalmente, se  $S \subseteq F$  para um  $\mathcal{T}$ -fechado  $F$  e  $x \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$ , então  $x \in F$ . De fato, o contrário daria  $x \notin \text{ad}_{\mathcal{T}}(F)$  (pois  $\text{ad}_{\mathcal{T}}(F) \subseteq F$  por hipótese)<sup>‡‡</sup>, o que depende da existência de um  $\mathcal{T}$ -aberto  $V$  em torno de  $x$  tal que  $V \cap F = \emptyset$ , mas isto implica em  $V \cap S = \emptyset$ , impossibilitando a ocorrência de  $x \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$ . □

<sup>†</sup>Se quiser praticar, faça também as implicações (ii)  $\Rightarrow$  (i) e (iii)  $\Rightarrow$  (ii) diretamente.

<sup>‡</sup>...quando a topologia estiver...

<sup>††</sup>No sentido político do termo.

<sup>‡‡</sup>*Spoiler*: se você *já sabe* que  $F$  é fechado sse  $X \setminus F$  é aberto, basta tomar  $V := X \setminus F$ . Se você não sabe, espere.

*Demonstração (via redes).* A inclusão em (i) segue pois redes constantes convergem para as constantes. Como na demonstração anterior, a igualdade em (ii) seguirá da inclusão  $\text{ad}_{\mathcal{T}}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S)) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$  (e você não se arrependerá de lembrar a prova do Lema 1.1.12).

Para  $x \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S))$ , existe uma rede  $\psi \in \mathbf{Net}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S))$  com  $\psi \rightarrow_{\mathcal{T}} x$ . A fim de simplificar o próximo passo<sup>†</sup>, note que para cada  $\mathcal{T}$ -aberto  $V$  em torno de  $x$ , existe um índice  $\alpha_V \in \text{dom}(\psi)$  tal que  $\psi(\alpha) \in V \cap \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$  para todo  $\alpha \succeq \alpha_V$ , o que em particular assegura a existência de (pelo menos) um ponto em  $V \cap S$ , que chamaremos de  $\varphi(V)$ . Dessa forma, a rede  $\varphi: \mathcal{T}_x \rightarrow X$  é tal que  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} x$  com  $\varphi(V) \in S$  para todo  $V \in \mathcal{T}_x$ , i.e.,  $x \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$ .

Por fim, se  $F$  é  $\mathcal{T}$ -fechado com  $S \subseteq F$  e  $x \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$ , então  $x \in F$ : por um lado, existe uma rede  $\varphi$  em  $S$  tal que  $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} x$ ; por outro lado, se  $x \notin F$ , então  $x \notin \text{ad}_{\mathcal{T}}(F)$ , o que assegura um  $\mathcal{T}$ -aberto  $V$  em torno de  $x$  com  $V \cap F = \emptyset$ , contrariando o fato de termos tomado  $\varphi$  em  $S$  (percebeu?)<sup>\*</sup>.  $\square$

*Demonstração (via filtros).* Esta será por sua conta ( $\star$ ).  $\square$

**Exemplo 2.1.51** (Como sempre, sequências não bastam). Em geral, não é possível caracterizar o fecho de um conjunto num espaço topológico em termos de sequências convergentes. Para se convencer disso<sup>‡</sup>, considere  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  com a topologia  $\mathcal{T}$  definida na demonstração da Proposição 1.1.30, e defina

$$\mathcal{C} := \{\chi_S \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : \mathbb{R} \setminus S \text{ é finito}\},$$

ou seja,  $f \in \mathcal{C}$  sse  $f(x) \in \{0, 1\}$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , com  $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}$  finito.

Denotando por  $\underline{0}_{\mathbb{R}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  a função nula, não é difícil perceber que  $\underline{0}_{\mathbb{R}} \in \overline{\mathcal{C}}$ . De fato, se  $\mathcal{A} \subseteq \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  é um  $\mathcal{T}$ -aberto em torno de  $\underline{0}_{\mathbb{R}}$ , então existe uma “bola”  $B := B(\underline{0}_{\mathbb{R}}; F; r)$  contida em  $\mathcal{A}$  para algum subconjunto finito  $F \subseteq \mathbb{R}$  e um número real  $r > 0$ . Logo,  $\chi_{\mathbb{R} \setminus F} \in \mathcal{C} \cap B \subseteq \mathcal{C} \cap \mathcal{A}$ .

Por outro lado, não há sequência de funções  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $\mathcal{C}$  com  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{P}} \underline{0}_{\mathbb{R}}$  pois, em geral, para *qualquer* sequência  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $\mathcal{C}$ , o conjunto

$$L((g_n)_{n \in \mathbb{N}}) := \{x \in \mathbb{R} : (g_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} 0\}$$

é, *no máximo*, enumerável. Com efeito, para cada  $n \in \mathbb{N}$  existe um subconjunto finito  $F_n \subseteq \mathbb{R}$  tal que  $g_n = \chi_{\mathbb{R} \setminus F_n}$ , de modo que se  $x \in L((g_n)_{n \in \mathbb{N}})$ , então  $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ : caso contrário,  $g_n(x) = 1$  para todo  $n$ . Como  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$  é enumerável<sup>††</sup>, o resultado segue.  $\blacktriangle$

**Exercício 2.1.26** ( $\star$ ). Por que a enumerabilidade de  $L((g_n)_{n \in \mathbb{N}})$  impede a ocorrência de  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \underline{0}_{\mathbb{R}}$  em  $(\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \mathcal{T})$ ?  $\blacksquare$

**Exercício 2.1.27** ( $\star$ ). Mostre que se  $X$  é espaço métrico, então  $p \in X$  é ponto aderente a  $S \subseteq X$  sse existe sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $S$  com  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow p$ . Conclua que, neste caso, um subconjunto  $F \subseteq X$  é fechado segundo a Definição 1.1.11 sse  $F$  é fechado segundo a Definição 2.1.49.  $\blacksquare$

Assim, no presente contexto, o termo “fechado” passa a ter um *sabor algébrico*, no sentido de que  $F$  é *fechado* quando é “fechado por convergência”. Analogamente, o “fecho” de  $S$  é o conjunto *gerado* a partir de  $S$  por convergência. Porém, por vivermos num mundo repleto de portas, também é natural nos perguntarmos por relações com o termo “aberto”. Elas existem e se devem, essencialmente, ao próximo lema.

<sup>†</sup>É possível argumentar usando apenas a caracterização de ponto aderente via redes, mas ainda é cedo para discutir *limites de limites*. Caso tenha se interessado, confira a Subseção 2.2.4 §3.

<sup>‡</sup>Você também pode conferir a Proposição 1.2.34, que apresenta um exemplo no contexto de ordinais.

<sup>††</sup>O argumento também funcionaria com  $\mathcal{E} := \{\chi_S \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : \mathbb{R} \setminus S \text{ é enumerável}\}$  (certo?)<sup>\*</sup>.



**Lema 2.1.52.** *Nas condições anteriores, são equivalentes:*

- (i)  $p \notin \overline{S}$ , i.e., existe um  $\mathcal{T}$ -aberto  $V$  em torno de  $p$  com  $V \cap S = \emptyset$
- (ii) sempre que um filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$   $\mathcal{T}$ -converge para  $p$ , tem-se  $X \setminus S \in \mathcal{F}$ ;
- (iii) sempre que uma rede  $\varphi$  em  $X$   $\mathcal{T}$ -converge para  $p$ , existe  $D \in \text{dom}(\varphi)$  satisfazendo  $\varphi[D^\uparrow] \subseteq X \setminus S$ .

**Exercício 2.1.28** (\*). Prove o lema anterior. Dica: para (i)  $\Rightarrow$  (ii), note que  $V \subseteq X \setminus S$ ; para (ii)  $\Rightarrow$  (iii), use  $\mathcal{F} := (\varphi)^\uparrow$ ; para (iii)  $\Rightarrow$  (i), use a caracterização de aderência via redes. ■

As condições (i), (ii) e (iii) acima são análogas às condições (i), (ii) e (iii) na Proposição 2.1.40 que caracteriza abertos por meio de convergência<sup>†</sup>, com a diferença de que, na proposição, o aberto  $A$  deve satisfazer as condições para todos os seus pontos, enquanto, no lema atual,  $X \setminus S$  satisfaz as condições apenas com respeito ao ponto  $p$ . É quase como se  $p$  acreditasse que  $X \setminus S$  é um aberto em torno de si.

**Definição 2.1.53.** Para um espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$  e um subconjunto  $S \subseteq X$ , diremos que um ponto  $p \in X$  é  **$\mathcal{T}$ -interior** ao conjunto  $S$  (ou “...de  $S$ ”) se existe um  $\mathcal{T}$ -aberto  $V$  em torno de  $p$  com  $V \subseteq S$ . O  **$\mathcal{T}$ -interior** (ou apenas **interior**) de  $S$  é o conjunto

$$\text{int}_{\mathcal{T}}(S) := \{x \in X : x \text{ é } \mathcal{T}\text{-interior ao conjunto } S\}.$$
 ¶

Para certificar-se de que você entendeu as discussões que motivaram a definição acima, faça o próximo

**Exercício 2.1.29** (\*). Mostre que  $\text{int}(S)$  é o maior aberto de  $X$  contido em  $S$ . Em particular, conclua que  $A$  é aberto em  $X$  sse  $\text{int}(A) = A$ . ■

**Observação 2.1.54** (Opcional: “inerência”). Houve uma quebra de simetria na *dualização* dos conceitos anteriores. De fato, para ser fiel com a Definição 2.1.49, deveríamos ter dado nomes separados para

- a coleção dos pontos interiores a  $S$ , que podemos chamar de *inerência* de  $S$ ,
- e o maior aberto de  $X$  contido em  $S$ , que podemos chamar de *interior* de  $S$ .

É claro que, por conta do exercício anterior (que faz o papel do Teorema 2.1.50), esta quebra é inofensiva. Mas fica o aviso: nem sempre será assim... △

Finalmente, a relação entre abertos e fechados é apenas reflexo da relação entre aderência e *inerência* interior.

**Teorema 2.1.55.** *Um ponto  $p$  é interior a  $S$  se, e somente se, não é aderente a  $X \setminus S$ , i.e.,*

$$\text{int}(S) = X \setminus \overline{X \setminus S}.$$

*Demonstração.* Basta trocar (\*) “ $S$ ” por “ $X \setminus S$ ” no item (i) do Lema 2.1.52. □

<sup>†</sup>A analogia entre as condições (i) se dá pois  $V \cap S = \emptyset$  sse  $V \subseteq X \setminus S$ , enquanto  $A$  é aberto sse para todo  $x \in A$  existe um aberto  $B$  de  $X$  em torno de  $x$  com  $B \subseteq A$  (certo?)\*.

**Corolário 2.1.56.** *Um subconjunto  $S$  de um espaço topológico  $X$  é aberto em  $X$  se, e somente se,  $X \setminus S$  é fechado em  $X$ .*

*Demonstração.* Se  $S$  é aberto, então  $S = \text{int}(S) = X \setminus \overline{X \setminus S}$ , acarretando  $X \setminus S = \overline{X \setminus S}$ , i.e.,  $X \setminus S$  é fechado. A recíproca é idêntica (mas faça!)\*.  $\square$

**Corolário 2.1.57.** *A família  $\mathfrak{F}(\mathcal{T})$ , formada pelos  $\mathcal{T}$ -fechados de um espaço topológico  $X$ , tem as seguintes propriedades:*

- (i)  $\emptyset, X \in \mathfrak{F}(\mathcal{T})$ , i.e.,  $\emptyset$  e  $X$  são  $\mathcal{T}$ -fechados;
- (ii) se  $F, G \in \mathfrak{F}(\mathcal{T})$ , então  $F \cup G \in \mathfrak{F}(\mathcal{T})$ , i.e., a reunião (finita) de  $\mathcal{T}$ -fechados é  $\mathcal{T}$ -fechada;
- (iii) se  $\mathcal{F} \subseteq \mathfrak{F}(\mathcal{T})$  é não vazia, então  $\bigcap \mathcal{F} = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \in \mathfrak{F}(\mathcal{T})$ , i.e., a interseção (arbitrária) de uma família não vazia de fechados é fechada.

*Demonstração.* Segue das Leis de De Morgan e dos axiomas de topologia em combinação com o corolário anterior. Completar os detalhes será sua tarefa (\*).  $\square$

**Observação 2.1.58** (Roteiros alternativos). Os resultados anteriores mostram diversas formas diferentes por meio das quais podemos abordar problemas topológicos.

- Em vez de definir fechados por meio de pontos aderentes, seria lícito definir “fechado = complementar de aberto”. Neste caso, o fecho de um subconjunto  $S$ , definido como o menor fechado que contém  $S$ , pode ser construído como a interseção de todos os fechados que contém  $S$ . Para recuperar a noção de ponto aderente daí, basta observar que

$$x \in \overline{S} \Leftrightarrow x \in F \text{ para todo fechado } F \subseteq X \text{ tal que } S \subseteq F,$$

enquanto  $x$  não é aderente a  $S$  sse algum aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $x$  não intercepta  $S$  sse existe um fechado  $F$  com  $S \subseteq F$  tal que  $x \notin F$  (percebeu?)\*.

- Em vez de definir fechados a partir de abertos, poderíamos considerar fechados axiomáticamente, como uma família com as propriedades do último corolário, para daí definir “aberto = complementar de fechado”. A Subseção 2.2.7 apresenta um exemplo em que esse tipo de abordagem surge naturalmente.
- Em vez de definir abertos em função de fechados ou vice-versa, poderíamos começar com um operador  $c: \wp(X) \rightarrow \wp(X)$  com as propriedades esperadas do operador  $\text{ad}(\bullet)$  (cf. Exercício 2.1.46), a saber

- (i)  $S \subseteq c(S)$ ,
- (ii)  $c(c(S)) = c(S)$ ,
- (iii)  $c(\emptyset) = \emptyset$ , e
- (iv)  $c(S \cup T) = c(S) \cup c(T)$

para quaisquer  $S, T \subseteq X$ , para daí definir “ $F$  é fechado sse  $c(F) = F$ ”.

- Em vez de... já deu para entender.

O ponto essencial é que, independentemente do roteiro seguido, não só é permitido como recomendável transitar entre eles, pois isso costuma revelar diferentes aspectos de um mesmo conceito ou objeto. Para ilustrar isso (e concluir esta subsubseção!), vejamos a noção de *densidade*<sup>†</sup>.  $\triangle$

<sup>†</sup>Se você sabe o que são funções cardinais: não, ainda não se trata da “função cardinal densidade”.



**Definição 2.1.59.** Um subconjunto  $D$  de um espaço topológico  $X$  é **denso** (em  $X$ ) se  $\overline{D} = X$ . O espaço é dito **separável**<sup>†</sup> se admitir um subconjunto enumerável e denso. ¶

O conjunto dos números racionais costuma ser o primeiro exemplo não óbvio de subespaço denso de um espaço (neste caso,  $\mathbb{R}$ ), já que qualquer (intervalo) aberto não vazio contém um número racional (ou seja, aderência via abertos). Um exemplo mais sofisticado é fornecido pelo *Teorema da Aproximação de Weierstrass*, segundo o qual qualquer função contínua  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  é limite uniforme de funções polinomiais da forma  $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  (ou seja, aderência via convergência na norma do supremo, cf. Exercício 1.2.19). Mais exemplos de conjuntos densos aparecerão ao longo de todo o texto, não se preocupe. Conhecer *bons* subconjuntos densos está para a Topologia assim como conhecer *bons* geradores está para a Álgebra. Duvida?

**Proposição 2.1.60.** *Sejam  $f, g: X \rightarrow Y$  funções contínuas. Se  $D \subseteq X$  é denso,  $Y$  é de Hausdorff e  $f|_D = g|_D$ , então  $f = g$ .*

*Demonstração (via abertos e filtros).* Se  $f \neq g$ , então existe  $x \in X$  com  $f(x) \neq g(x)$ . Por  $Y$  ser de Hausdorff, existem abertos disjuntos  $U, V \subseteq Y$  com  $f(x) \in U$  e  $g(x) \in V$ . Como  $f$  e  $g$  são contínuas,  $f^{-1}[U]$  e  $g^{-1}[V]$  são abertos de  $X$  em torno de  $x$ . Finalmente, por  $D$  ser denso...

- ... (via abertos) temos  $x$  aderente a  $D$ , donde segue que existe  $d \in f^{-1}[U] \cap g^{-1}[V]$ , acarretando  $f|_D \neq g|_D$ . Portanto, o resultado segue pela contrapositiva.
- ... (via filtros) existe um filtro próprio  $\mathcal{H} \in \text{Fil}^*(X)$  com  $D \in \mathcal{H}$  e  $\mathcal{H} \rightarrow x$ , i.e.,  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{H}$ , acarretando  $D \cap f^{-1}[U] \cap g^{-1}[V] \neq \emptyset$ , donde segue  $f|_D \neq g|_D$  (percebeu?)\*. Portanto, o resultado segue pela contrapositiva. □

*Demonstração (via redes).* Queremos mostrar que  $f(x) = g(x)$  para qualquer  $x \in X$ . Dado que  $D$  é denso em  $X$ , existe uma rede  $\varphi \in \text{Net}(D)$  com  $\varphi \rightarrow x$  em  $X$ , que pela hipótese de coincidência em  $D$  satisfaz  $f \circ \varphi = g \circ \varphi$ . Por fim, da continuidade de  $f$  e  $g$ , resulta

$$f(x) = f(\lim \varphi) = \lim_{d \in \text{dom}(\varphi)} f(\varphi(d)) = \lim_{d \in \text{dom}(\varphi)} g(\varphi(d)) = g(\lim \varphi) = g(x). \quad \square$$

## §2 Bases locais e o primeiro axioma de enumerabilidade

*Bases locais* constituem o modo mais comum de *usar* filtros sem *mencionar* filtros.

**Definição 2.1.61.** Sejam  $(X, \mathcal{T})$  um espaço topológico,  $p \in X$  um ponto e  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$  uma família de  $\mathcal{T}$ -vizinhanças de  $p$  (cf. Definição 2.1.16). Diremos que  $\mathcal{C}$  é **base local de  $\mathcal{T}$ -vizinhanças em torno de  $p$**  (ou apenas “... em  $p$ ”, “... de  $p$ ”, “... para  $p$ ”, etc.)<sup>‡</sup> se para toda  $\mathcal{T}$ -vizinhança  $V$  de  $p$  existir  $C \in \mathcal{C}$  com  $C \subseteq V$ . Se, adicionalmente, todos os membros de  $\mathcal{C}$  forem  $\mathcal{T}$ -abertos, diremos apenas que  $\mathcal{C}$  é **base local** em  $p$ . ¶

Moralmente, os membros de uma base local de vizinhanças são testemunhas que atestam quando algum subconjunto do espaço é vizinhança do ponto. Em outras palavras, é algo que já usamos diversas vezes na descrição de espaços topológicos!

<sup>†</sup>Por razões históricas: o termo foi cunhado por Fréchet no mesmo artigo em que espaços métricos foram introduzidos, com uma motivação bastante *real*: quaisquer dois números reais distintos  $x < y$  podem ser *separados* por um número racional  $r$ , i.e.,  $x < r < y$ . Uma discussão mais longa pode ser encontrada em <https://mathoverflow.net/questions/51494/why-the-name-separable-space>.

<sup>‡</sup>Há ainda quem prefira *sistema fundamental de vizinhanças*, e.g., [2].

**Exemplo 2.1.62** (Fundamental: bolas abertas). Num espaço métrico  $X$ , as bolas abertas centradas num ponto  $p$  constituem uma base local em torno do ponto com relação à topologia induzida pela métrica (certo?)\*. Apesar disso, há outras bases locais disponíveis. Podemos considerar, por exemplo, as coleções

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &:= \{B(p, r) : r \in \mathbb{Q} \text{ e } r > 0\}, \\ \mathcal{B} &:= \left\{ B\left(p, \frac{1}{2^n}\right) : n \in \mathbb{N} \right\} \text{ ou} \\ \mathcal{C} &:= \left\{ B\left[p, \frac{1}{2^n}\right] : n \in \mathbb{N} \right\}.\end{aligned}$$

As famílias  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  são bases locais em torno de  $p$ , essencialmente pelo mesmo motivo (qual?)\*. Por sua vez,  $\mathcal{C}$  é base local de vizinhanças fechadas (cf. Exercício 1.1.14), por *refinar* e ser *refinada* pela base local  $\mathcal{B}$ : dada uma vizinhança  $V$  de  $p$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  com  $B(p, \frac{1}{2^N}) \subseteq V$  (pois  $\mathcal{B}$  é base local), mas como  $B(p, \frac{1}{2^{N+1}}) \subseteq B[p, \frac{1}{2^{N+1}}] \subseteq B(p, \frac{1}{2^N})$ , o resultado segue (por quê?)\*.

Em particular, enquanto  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  são enumeráveis, a base local que iniciou este exemplo, a saber,  $\mathcal{D} := \{B(p, r) : r \in (0, +\infty)\}$ , é (possivelmente)<sup>†</sup> não enumerável. MORAL DA HISTÓRIA: a unicidade de cardinalidade de *bases* (de Hamel) de espaços vetoriais não se aplica para bases locais, apesar da infeliz coincidência terminológica. ▲

**Exercício 2.1.30** (Adiável (\*)). É verdade que  $\overline{B(p, r)} = B[p, r]$  em qualquer espaço métrico? E num espaço normado? ■

**Exemplo 2.1.63** (Ordens (cf. Subseção 1.2.2)). Numa ordem  $\mathbb{P}$  dotada de mínimo  $p_0$ , a família de intervalos

$$\mathcal{I}_{p_0} := \{[p_0, p) : p > p_0\}$$

é uma base local em  $\mathbb{P}$ , com situação análoga para um máximo (se existir). Já para um ponto que não é extremo, a situação muda de acordo com a ordem.

Para  $\mathbb{P} := \mathbb{N}$  com  $n > 0$ , por exemplo,  $\mathcal{I}_n := \{\{n\}\}$  é base local em  $n$ : neste caso,  $\{n\}$  é um (intervalo) aberto em torno de  $n$ , a saber  $\{n\} = [0, n+1)_{\mathbb{N}} \cap (n-1, +\infty)_{\mathbb{N}}$  (cf. Definição 1.2.18) e, claramente, todo aberto  $V \subseteq \mathbb{N}$  em torno de  $n$  é tal que  $\{n\} \subseteq V$ .

Já para  $\mathbb{P} := [0, \omega_1)$ , onde  $\omega_1$  é o primeiro ordinal não enumerável (cf. Observação 1.2.30 e Proposição 1.2.32),  $\mathcal{I}_\omega := \{(n, \omega] : n < \omega\}$  é uma base local no ponto  $\omega$ . De fato, tais intervalos são abertos pois  $(n, \omega] = (n, \omega+1)$ , enquanto a definição da topologia em  $\mathbb{P}$  pede que se  $V \subseteq \mathbb{P}$  é aberto com  $\omega \in V$ , então existem  $\alpha < \omega$  e  $\beta < \omega$  tais que  $(\alpha, \beta) \subseteq V$  (por quê?)\*, acarretando  $(\alpha, \omega] \subseteq V$ . ▲

Como os exemplos sugerem, bases locais não permitem apenas descrever topologias conhecidas, mas também são uma ferramenta útil na *construção* de topologias “novas”. A topologia  $\mathcal{T}$  definida na demonstração da Proposição 1.1.30, por exemplo, foi feita *sob medida* para que a coleção

$$\mathcal{B}_f := \{B(f; S; r) : S \subseteq \mathbb{R} \text{ é finito e } r \in (0, +\infty)\} \quad (2.6)$$

fosse uma base local em torno de  $f$ , para cada  $f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . De fato, com a definição de  $\mathcal{T}$ , para todo subconjunto  $\mathcal{T}$ -aberto  $\mathcal{A} \subseteq \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  em torno de  $f$  existe  $B \in \mathcal{B}_f$  com  $B \subseteq \mathcal{A}$  (entendeu?)\*. O que levanta a

<sup>†</sup>Se  $X$  for discreto, por exemplo,  $\mathcal{D} = \{\{p\}, X\}$ . Por outro lado, isto não ocorre se  $X$  for  $\mathbb{K}$ -espaço normado com dimensão pelo menos 1 (por quê?)\*.

PERGUNTA: fixados um conjunto  $X$  e, para cada  $p \in X$ , uma coleção  $\mathcal{B}_p$  de subconjuntos em torno de  $p$ , existe uma topologia  $\mathcal{T}$  em  $X$  que tenha  $\mathcal{B}_p$  como base local (de vizinhanças) em  $p$  para cada  $p$ ?

RESPOSTA: nem sempre.

**Proposição 2.1.64.** *Com as notações anteriores, se  $\mathcal{T}$  é uma topologia em  $X$  segundo a qual cada  $\mathcal{B}_p$  é uma base local de vizinhanças em  $p$ , então  $\mathcal{B}_p$  é um pré-filtro em  $X$  para cada  $p \in X$ . Além disso:*

- (i) *se cada  $\mathcal{B}_p$  é uma base local de  $\mathcal{T}$ -vizinhanças em torno de  $p$ , então sempre que  $B \in \mathcal{B}_p$ , existe  $C \in \mathcal{B}_p$  tal que  $B \in (\mathcal{B}_q)^\uparrow$  para todo  $q \in C$ ;*
- (ii) *se cada  $\mathcal{B}_p$  é uma base local em torno de  $p$ , então sempre que  $B \in \mathcal{B}_p$  e  $q \in B$ , existe  $C' \in \mathcal{B}_q$  com  $C' \subseteq B$ .*

*Demonstração.* Para a primeira parte, note que se  $A, B \in \mathcal{B}_p$ , então em particular ambos são  $\mathcal{T}$ -vizinhanças de  $p$  e, por conseguinte,  $A \cap B$  é uma vizinhança de  $p$ . Logo, a hipótese sobre  $\mathcal{B}_p$  ser base local de vizinhanças força a existência de  $C \in \mathcal{B}_p$  com  $C \subseteq A \cap B$ , donde se conclui que  $\mathcal{B}_p$  é um pré-filtro (cf. Proposição 2.1.17). Tratem-se dos subcasos (i) e (ii).

- (i) Se  $B \in \mathcal{B}_p$ , então  $B$  é  $\mathcal{T}$ -vizinhança de  $p$  por hipótese, donde segue que existe um  $\mathcal{T}$ -aberto  $A \subseteq X$  com  $p \in A \subseteq B$ . Dado que  $A$  também é  $\mathcal{T}$ -vizinhança, a hipótese assegura  $C \in \mathcal{B}_p$  com  $C \subseteq A$ . Por fim, se  $q \in C$ , então  $A$  testemunha que  $B$  é  $\mathcal{T}$ -vizinhança em torno de  $q$  e, por  $\mathcal{B}_q$  ser base local de vizinhanças em torno de  $q$ , tem que existir  $D \in \mathcal{B}_q$  com  $D \subseteq B$ , i.e.,  $B \in (\mathcal{B}_q)^\uparrow$ .
- (ii) Se  $p, q \in B$  com  $B \in \mathcal{B}_p$ , então  $B$  é um  $\mathcal{T}$ -aberto em torno de  $q$ , donde a hipótese acerca de  $\mathcal{B}_q$  assegura  $C' \in \mathcal{B}_q$  com  $C' \subseteq B$ .  $\square$

A proposição acima estende o “nem sempre” usado como resposta para a última pergunta, mas não só isso: ela elenca critérios *pontuais* que famílias de coleções de subconjuntos precisam satisfazer a fim de que o *modus operandi* usual para definir topologias por meio de testemunhas “locais” funcione. Mais precisamente:

**Teorema 2.1.65** (Opcional<sup>†</sup>). *Para um conjunto  $X$  fixado, seja  $\mathcal{B}_p$  uma família de subconjuntos de  $X$  em torno de  $p$ , para cada  $p \in X$ , e considere*

$$\mathcal{T} := \left\{ A \subseteq X : A \in (\mathcal{B}_p)^\uparrow \text{ para todo } p \in A \right\}.$$

*Se cada  $\mathcal{B}_p$  for um pré-filtro satisfazendo a tese da condição (i) (respectivamente, (ii)) da última proposição, então  $\mathcal{T}$  é a única topologia que faz de  $\mathcal{B}_p$  uma base local de vizinhanças em  $p$  (respectivamente, base local em  $p$ ).*

*Demonstração.* Primeiro, observe que a definição de  $\mathcal{T}$  diz apenas que um subconjunto  $A \subseteq X$  será membro de  $\mathcal{T}$  sse para todo  $p \in A$  existir  $B \in \mathcal{B}_p$  com  $B \subseteq A$ , ou seja: trata-se do modo usual de definir topologias empregado até aqui! E de fato, como cada  $(\mathcal{B}_p)^\uparrow$  é um filtro próprio, todas as condições de topologia seguem quase automaticamente (concorda?)<sup>\*</sup>. É no restante que a coisa se torna um pouco mais delicada, mas não muito.

<sup>†</sup>Na prática, o mais comum é definir  $\mathcal{T}$  como no enunciado sem checar as hipóteses sobre cada  $\mathcal{B}_p$  — e torcer para dar certo. Em geral, é só depois de fazer isso que alguém na sala se lembra que bastava aplicar essa observação de Bourbaki/Engelking.

No primeiro caso, basta mostrar que  $\mathcal{N}_{p,\mathcal{T}} = (\mathcal{B}_p)^\uparrow$  (por que basta isso?)\*. É claro que se  $N \in \mathcal{N}_{p,\mathcal{T}}$ , então  $N \in (\mathcal{B}_p)^\uparrow$  (é claro mesmo?)\*. O problema está na inclusão oposta: se  $V \in (\mathcal{B}_p)^\uparrow$ , devemos encontrar um  $\mathcal{T}$ -aberto  $A$  com  $p \in A$  e  $A \subseteq V$ . Mostraremos que  $A := \{x \in X : V \in (\mathcal{B}_x)^\uparrow\}$  serve†.

- $(p \in A)$ . Pois  $V \in (\mathcal{B}_p)^\uparrow$  por hipótese.
- $(A \subseteq V)$ . Se  $x \in A$ , então existe  $D \in \mathcal{B}_x$  com  $x \in D$  e  $D \subseteq V$ , e daí  $x \in V$ .
- $(A \in \mathcal{T})$ . Para  $x \in A$  qualquer, devemos mostrar que  $A \in (\mathcal{B}_x)^\uparrow$ . Ora, por termos  $x \in A$ , resulta  $V \in (\mathcal{B}_x)^\uparrow$ , i.e., existe  $B \in \mathcal{B}_x$  com  $B \subseteq V$ . A hipótese acerca das famílias  $\mathcal{B}_p$ 's assegura a existência de  $C \in \mathcal{B}_x$  tal que  $B \in (\mathcal{B}_c)^\uparrow$  para todo  $c \in C$ . Agora, o pulo do gato é perceber que  $C \subseteq A$ : de fato, se  $c \in C$ , então existe  $E \in \mathcal{B}_c$  com  $E \subseteq B$  e, por valer  $B \subseteq V$  (lembra?)\*<sup>2</sup>, resulta  $V \in (\mathcal{B}_c)^\uparrow$ , mostrando que  $c \in A$ . Enfim, como tínhamos  $C \in \mathcal{B}_x$ , concluímos  $A \in (\mathcal{B}_x)^\uparrow$ .

Para o segundo caso, i.e., em que as famílias  $\mathcal{B}_p$  satisfazem a tese da condição (ii), temos automaticamente satisfeita a tese da condição (i) (por quê?)\*, de modo que resta provar que os membros de cada  $\mathcal{B}_p$  são  $\mathcal{T}$ -abertos. Vejamos: dado  $B \in \mathcal{B}_p$ , devemos mostrar que  $B \in (\mathcal{B}_x)^\uparrow$  para qualquer  $x \in B$ , mas isto segue diretamente (ii), já que por hipótese existe  $C' \in \mathcal{B}_x$  com  $C' \subseteq B$ . A unicidade de  $\mathcal{T}$  será problema seu.  $\square$

**Exercício 2.1.31** (\*). Complete a demonstração anterior, i.e., mostre que sob as condições dadas,  $\mathcal{T}$  é a única topologia com as propriedades enunciadas. Dica: encare a Proposição 2.1.40 até que ela te encare de volta.  $\blacksquare$

O teorema anterior‡ não altera a Definição 2.1.61, que estabelece os critérios para que uma família de vizinhanças em torno de um ponto seja uma base local de vizinhanças para o ponto: note que a definição exige uma topologia para começo de conversa. O que o teorema faz é garantir que, ao atribuir pré-filtros satisfazendo certas condições a cada ponto do *conjunto*, então existe e é única a topologia no *conjunto* que tem tais pré-filtros como bases locais (de vizinhanças)††. A fim de simplificar futuras referências a esse método de construção topológica, diremos que a topologia  $\mathcal{T}$  do último teorema é **gerada** por  $(\mathcal{B}_p)_{p \in X}$  como sistema bases locais (de vizinhanças se for o caso). Para praticar:

**Exercício 2.1.32** (\*). Para cada  $f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , defina  $\mathcal{B}_f$  como em (2.6) (pág. 70). Mostre que  $(\mathcal{B}_f)_{f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$  satisfaz a tese da condição (ii) no último teorema. Conclua que a família  $\mathcal{T}$  definida na demonstração da Proposição 1.1.30 é, automaticamente, uma topologia tal que cada  $\mathcal{B}_f$  é uma base local em torno de  $f$ .  $\blacksquare$

Bases locais fazem bem mais do que apenas descrever localmente as vizinhanças de um ponto.

**Definição 2.1.66.** Costuma-se dizer que um espaço topológico satisfaz o **primeiro axioma de enumerabilidade** (ou, para pessoas apressadas, é **1º-contável**)†‡ se todo ponto do espaço admite uma base local (de vizinhanças) enumerável.  $\P$

†Intuitivamente,  $A$  é o conjunto dos pontos de  $X$  que acreditam que  $V$  é um aberto em torno deles. Em outras palavras:  $A$  é o  $\mathcal{T}$ -interior de  $V$ .

‡Adaptado de Bourbaki [5] (critério (i)) e Engelking [14] (critério (ii)).

††PROVOCAÇÃO: o que acontece se cada  $\mathcal{B}_p$  for apenas um pré-filtro de subconjuntos em torno de  $p$ , sem restrições adicionais?

‡‡Ou ainda, para pessoas modernas, *tem caráter enumerável*.

**Exercício 2.1.33** (\*). Mostre que espaços *metrizáveis*<sup>†</sup> são  $1^{\text{o}}$ -contáveis. ■

**Exemplo 2.1.67** (Nem todo espaço  $1^{\text{o}}$ -contável é metrizável). O espaço  $[0, \omega_1)$ , composto por todos os ordinais enumeráveis<sup>‡</sup>, satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade mas não é metrizável. Para a primeira parte, basta notar que, se  $\alpha \in [0, \omega_1)$ , então

$$\mathcal{I}_\alpha := \{(\beta, \alpha] : \beta < \alpha\}$$

é base local em torno de  $\alpha$  (cf. Exemplo 2.1.63), enumerável pois  $\alpha < \omega_1$ , i.e., o ordinal  $\alpha$ , enquanto conjunto  $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$ , é enumerável. No entanto, veremos em breve que toda sequência em  $[0, \omega_1)$  admite *subsequência* convergente (cf. Lema 1.2.33), ao mesmo tempo em que  $[0, \omega_1)$  não é *compacto*. Isto impede que sua topologia seja metrizável pois *compacidade sequencial* e *compacidade* são equivalentes em espaços métricos.

Outro exemplo típico é dado pela *Reta de Sorgenfrey*, que consiste no conjunto dos números reais com uma topologia  $\mathcal{S}$  diferente da usual: um subconjunto  $A \subseteq \mathbb{R}$  é considerado aberto na **topologia de Sorgenfrey** sse para todo  $x \in A$  existe  $a > x$  tal que  $[x, a) \subseteq A$ . Alternativamente:

- para cada  $p \in \mathbb{R}$  definimos a família  $\mathcal{S}_p := \{[p, a) : a > p\}$ ;
- note que para  $[p, a) \in \mathcal{S}_p$  e  $q \in [p, a)$ , temos  $p \leq q < a$ , donde segue que existe  $b \in (q, a)$  e, consequentemente,  $[q, b) \in \mathcal{S}_q$  satisfaz  $[q, b) \subseteq [p, a)$ ;
- logo, pelo teorema anterior, existe e é única a topologia em  $\mathbb{R}$  que tem  $\mathcal{S}_p$  como base local para cada  $p \in \mathbb{R}$  (pronto!)<sup>††</sup>.

Denotaremos por  $\mathbb{R}_S$  a reta real com a topologia de Sorgenfrey, que por simplicidade será xingada de **reta de Sorgenfrey**. Como no Exemplo 2.1.62, não é difícil perceber que  $\mathcal{B}_p := \{[p, p + \frac{1}{2^n}) : n \in \mathbb{N}\}$  também é base local em  $p$  para cada  $p \in \mathbb{R}_S$ . Portanto,  $\mathbb{R}_S$  é  $1^{\text{o}}$ -contável. Ainda nesta subseção veremos um dos motivos pelos quais  $\mathbb{R}_S$  não é metrizável. ▲

Apesar do alerta que os exemplos acima podem levantar, o primeiro axioma de enumerabilidade acarreta metrizabilidade numa gama muito grande de espaços, mas ainda é cedo para discutir isso. O que já podemos discutir é o seguinte: embora não seja equivalente à metrizabilidade de modo geral, a existência de bases locais enumeráveis é uma das grandes responsáveis pela *boa fama* dos espaços métricos.

**Lema 2.1.68.** *Se um ponto admite uma base local enumerável de vizinhanças, então o ponto admite uma base local enumerável e decrescente, i.e., da forma  $\{B_n : n \in \mathbb{N}\}$  tal que  $B_n \subseteq B_m$  sempre que  $n \geq m$ .*

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{V} := \{V_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma base local enumerável de vizinhanças em torno de um ponto  $p$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , fixe um aberto  $U_n \subseteq V_n$  com  $p \in U_n$  e defina

$$B_n := \bigcap_{m \leq n} U_m.$$

Claramente,  $B_n$  é um aberto em torno de  $p$  satisfazendo  $B_n \subseteq V_n$  e, além disso,  $B_i \subseteq B_j$  sempre que  $j \leq i$  (certo?)<sup>\*</sup>. Para ver que  $\mathcal{B} := \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$  é base local em torno de  $p$ , basta tomar uma vizinhança  $O$  de  $p$  e observar que, para algum  $n \in \mathbb{N}$  deve ocorrer  $V_n \subseteq O$  (por quê?)<sup>\*</sup>, donde segue que  $B_n \subseteq O$ . □

<sup>†</sup>Isto é, aqueles cuja topologia é induzida por uma métrica.

<sup>‡</sup>Confira a Observação 1.2.30 e a Proposição 1.2.32 se não souber do que se trata

<sup>††</sup>Confesse: foi bem mais divertido do que checar os três axiomas de topologia, não é mesmo?



**Exemplo 2.1.69.** A coleção  $\mathcal{B} := \{(-q, q) : q \in \mathbb{Q} \cap (0, +\infty)\}$  é uma base local para 0 em  $\mathbb{R}$  com sua topologia usual. Como  $\mathbb{Q} \cap (0, +\infty)$  é enumerável, podemos reescrever  $\mathbb{Q} \cap (0, +\infty) = \{q_n : n \in \mathbb{N}\}$  de tal forma que  $q_i \neq q_j$  sempre que  $i \neq j$ . No entanto, embora  $\mathcal{B}$  seja enumerável,  $\mathcal{B}$  não tem como ser decrescente com respeito a essa reindexação: se  $B_{q_n} \subseteq B_{q_m}$  sempre que  $n \geq m$ , então a bijeção

$$\begin{aligned} q: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{Q} \\ n &\mapsto q_n \end{aligned}$$

é estritamente decrescente, o que impede  $q$  de ser bijetora (percebeu?)<sup>\*</sup>.

Isto ilustra a importância do lema anterior. Em geral, ao sabermos que uma base local  $\mathcal{B}$  é enumerável, garante-se apenas a existência de uma sobrejeção  $V: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{B}$  que permite expressar  $\mathcal{B} = \{V_n : n \in \mathbb{N}\}$ , mas nada se sabe, a princípio, sobre as relações de inclusão entre  $V_n$  e  $V_m$ . Assim, o lema permite *uniformizar* o tipo de decrescimento de bases locais enumeráveis, tornando-as moralmente similares às bases locais decrescentes de espaços métricos. ▲

SUGESTÃO: antes de prosseguir para o próximo resultado, reveja a sua *própria* solução para o Exercício 1.1.1, ou confira a proposta na página 183.

**Teorema 2.1.70.** *Sejam  $f: X \rightarrow Y$  uma função entre espaços topológicos e  $p \in X$  um ponto qualquer. Se  $p$  admite base local enumerável de vizinhanças, então são equivalentes:*

- (i)  $f$  é contínua em  $p$ ;
- (ii)  $f$  é sequencialmente contínua em  $p$ , i.e.,  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(p)$  em  $Y$  sempre que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow p$  em  $X$ .

Em particular, se  $X$  é  $1^0$ -contável, então  $f$  é contínua se, e somente se,  $f$  é sequencialmente contínua<sup>†</sup>.

*Demonstração.* A implicação (i)  $\Rightarrow$  (ii) vale em geral (lembra?)<sup>\*</sup>. Para a recíproca, o lema anterior permite supor que  $p$  admite uma base local enumerável e decrescente em torno de  $p$  da forma  $\mathcal{B} := \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Agora, se  $f$  não fosse contínua em  $p$ , então existiria um subconjunto  $V \subseteq Y$  aberto em  $Y$  com  $f(p) \in V$  mas tal que  $f[U] \not\subseteq V$  para qualquer  $U \subseteq X$  aberto com  $p \in U$ . Em particular, para cada  $n \in \mathbb{N}$  existe  $x_n \in B_n$  tal que  $f(x_n) \notin V$ . Consequentemente,  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \not\rightarrow f(p)$  em  $Y$ . No entanto,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow p$  em  $X$ . Com efeito, para qualquer aberto  $W \subseteq X$  em torno de  $p$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $B_N \subseteq W$ . Daí, por  $\mathcal{B}$  ser decrescente, resulta  $B_n \subseteq W$  para todo  $n \geq N$  e, por conseguinte,  $x_n \in W$  para todo  $n \geq N$ . □

**Exercício 2.1.34** (\*). Sejam  $X$  um espaço topológico,  $S \subseteq X$  um subconjunto e  $p \in X$  um ponto. Mostre que se  $p$  tem base local enumerável, então  $p \in \bar{S}$  sse existe sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $S$  tal que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow p$ . ■

**Exemplo 2.1.71.** Em virtude do exercício anterior, o espaço de funções  $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  (cf. Proposição 1.1.30) não satisfaz o  $1^0$  axioma de enumerabilidade pois a função nula  $0_{\mathbb{R}}$  não pode ter base local enumerável (cf. Exemplo 2.1.51). Ocorre que nenhuma função  $f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  admite base local enumerável<sup>‡</sup>.

<sup>†</sup>Confira a Definição 1.1.35.

<sup>‡</sup>Na verdade, isto segue diretamente do fato já verificado para  $0_{\mathbb{R}}$  (por quê?!)\*.



Um modo árduo, mas honesto, de verificar isso, é notar que se  $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$  é uma família enumerável de  $\mathcal{T}$ -abertos em torno de  $f$ , então podemos assumir que para cada  $n$  existem subconjuntos finitos  $F_n \subseteq \mathbb{R}$  e números reais  $r_n > 0$  tais que  $B_n = B(f; F_n; r_n)$  (certo?)\*. Posto que  $M := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$  é, no máximo, enumerável, existe  $p \in \mathbb{R} \setminus M$ , de modo que  $B := B(f; \{p\}; 1)$  é um  $\mathcal{T}$ -aberto em torno de  $f$  que não contém nenhum dos  $B_n$ 's previamente fixados:  $g := f \cdot \chi_{F_n} + (f(p) + 1) \cdot \chi_{\mathbb{R} \setminus F_n}$  é tal que  $g \in B_n$  mas  $|g(p) - f(p)| = 1$ , i.e.,  $g \notin B$ . ▲

### §3 Bases “globais” e o segundo axioma de enumerabilidade

O próximo passo é bastante natural, afinal, o que vem depois do primeiro? Ora, o segundo!

**Definição 2.1.72.** Sejam  $(X, \mathcal{T})$  um espaço topológico e  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$  uma família de  $\mathcal{T}$ -abertos. Diremos que  $\mathcal{B}$  é **base**<sup>†</sup> para a topologia  $\mathcal{T}$  (ou para o espaço  $X$ ) se para todo ponto  $p \in X$  e todo  $\mathcal{T}$ -aberto  $U \subseteq X$  em torno de  $p$  existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $p \in B$  com  $B \subseteq U$ . Em tais situações, costuma-se dizer que os membros de  $\mathcal{B}$  são **abertos básicos** da topologia. ¶

**Exercício 2.1.35** (\*). Mostre que  $\mathcal{B}$  é base para a topologia  $\mathcal{T}$  sse para todo  $\mathcal{T}$ -aberto  $U \subseteq X$  existir  $\mathcal{B}_U \subseteq \mathcal{B}$  tal que  $U = \bigcup_{B \in \mathcal{B}_U} B$ . ■

Bases *globalizam* o que bases locais fazem em torno de pontos. Consequentemente (\*):

- se  $\mathcal{B}$  é base para o espaço  $X$ , então  $\mathcal{B}_p := \{B \in \mathcal{B} : p \in B\}$  é base local em  $p$ , para cada  $p$ ;
- se  $\mathcal{C}_p$  é base local em  $p$  para cada  $p \in X$ , então  $\mathcal{C} := \bigcup_{p \in X} \mathcal{C}_p$  é base para  $X$ .

**Observação 2.1.73.** Cuidado para não se confundir acima: como cada  $\mathcal{C}_p$  é uma coleção de subconjuntos de  $X$ ,  $\bigcup_{p \in X} \mathcal{C}_p$  ainda é uma coleção de subconjuntos de  $X$ : ora, se  $A \in \bigcup_{p \in X} \mathcal{C}_p$ , então existe  $p \in X$  tal que  $A \in \mathcal{C}_p$  e, portanto,  $A$  é um subconjunto de  $X$ . Se esse tipo de coisa for um problema para você, procure textos básicos sobre linguagem elementar de conjuntos e revise por conta própria. △

**Exemplo 2.1.74.** A coleção de *todas* as bolas abertas de um espaço métrico constitui uma base para a topologia induzida pela métrica. Mas diferente do que ocorreu no Exemplo 2.1.62, já não parece óbvio que todo espaço métrico admita bases enumeráveis: o melhor que podemos fazer é definir  $\mathcal{B} := \{B(x, \frac{1}{2^n}) : x \in X \text{ e } n \in \mathbb{N}\}$ , que é uma base (certo?)\*, mas nada garante que  $\mathcal{B}$  seja enumerável, pois  $x$  varia em  $X$ . De qualquer forma, é sempre bom quando algo falso não parece obviamente verdadeiro. ▲

**Definição 2.1.75.** Costuma-se dizer que um espaço topológico satisfaz o **segundo axioma de enumerabilidade** (ou, para pessoas apressadas, é **2º-contável**)<sup>‡</sup> se sua topologia admite uma base enumerável. ¶

**Teorema 2.1.76.** *Todo espaço 2º-contável é separável. A recíproca é verdadeira para espaços metrizáveis.*

<sup>†</sup>No conforto da sala de aula, eu costumava chamá-las de *bases globais* (em contraponto às bases locais).

<sup>‡</sup>Ou ainda, para pessoas modernas, tem *peso enumerável*.

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{B}$  uma base para  $X$  e, para cada  $B \in \mathcal{B}$  não vazio escolha  $d_B \in B$ . Por construção,  $D := \{d_B : B \in \mathcal{B}\}$  é um subconjunto denso de  $X$ , afinal, para quaisquer  $x \in X$  e aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $x$ , existe  $B \in \mathcal{B}$  com  $x \in B \subseteq V$ , acarretando  $d_B \in V \cap B$  e, por conseguinte,  $x \in \overline{D}$ . Como  $|D| \leq |\mathcal{B}|$ , segue que  $D$  é enumerável se  $\mathcal{B}$  for enumerável, i.e.,  $X$  é separável sempre que for  $2^0$ -contável.

Agora, supondo  $X$  metrizável com um denso enumerável  $E$ , podemos definir

$$\mathcal{B}_e := \left\{ B_d \left( e, \frac{1}{2^n} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

para cada  $e \in E$ , onde  $d$  é uma métrica que induz a topologia de  $X$ . Como cada  $\mathcal{B}_e$  também é enumerável, tudo se resume a mostrar que a família enumerável<sup>†</sup>  $\mathcal{B} := \bigcup_{e \in E} \mathcal{B}_e$  é base para a topologia de  $X$ . Ora, dado um aberto  $U$  de  $X$  e um ponto  $x \in U$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  com  $B_d \left( x, \frac{1}{2^N} \right) \subseteq U$  (certo?)\*. Em particular, como  $B_d \left( x, \frac{1}{2^{N+1}} \right) \neq \emptyset$ , existe  $e \in E$  com  $e \in B_d \left( x, \frac{1}{2^{N+1}} \right)$ . Para encerrar, basta notar (note!)\* que

$$x \in B_d \left( e, \frac{1}{2^{N+1}} \right) \subseteq U. \quad \square$$

Um olhar (des)atento sugere que a métrica não foi importante: bastaria que  $X$  fosse  $1^0$ -contável e separável a fim de garantir a existência de uma base enumerável... O que posso dizer?

**Exemplo 2.1.77** (Às vezes a intuição engana). Vamos mostrar que a reta de Sorgenfrey  $\mathbb{R}_S$  (cf. Exemplo 2.1.67) não admite base enumerável. Fixada uma base  $\mathcal{B}$  para  $\mathbb{R}_S$ , para cada  $x \in \mathbb{R}_S$  deve existir um aberto  $B_x \in \mathcal{B}$  com  $x \in B_x \subseteq [x, x+1)$ , o que define uma função

$$\begin{aligned} B: \mathbb{R} &\rightarrow \mathcal{B} \\ x &\mapsto B_x. \end{aligned}$$

Acontece que  $B$  é injetora (por quê?)\* e, consequentemente,  $\mathcal{B}$  é não enumerável<sup>‡</sup>. Por outro lado, já sabemos que  $\mathbb{R}_S$  é  $1^0$ -contável e, como todo intervalo da forma  $[a, b)$  contém um número racional,  $\mathbb{R}_S$  também é separável. Portanto, a topologia de Sorgenfrey não é metrizável — e, mais ainda, a combinação “ $1^0$ -contável + separável” não é capaz de assegurar, sozinha, a existência de bases enumeráveis. ▲

**Exemplo 2.1.78** (Espaços métricos não separáveis). O vício por espaços euclidianos nos leva a crer, por um momento, que todo espaço métrico é separável (já que  $\mathbb{R}^n$  com sua topologia usual é sempre separável/ $2^0$ -contável), o que faz a tarefa de encontrar espaços métricos não separáveis parecer mais difícil do que realmente é. Há um exemplo muito simples: espaços discretos não enumeráveis!

**Exercício 2.1.36** (\*). Mostre que se  $\mathcal{B}$  é base para a topologia de um espaço  $X$ , então

$$\{\{x\} : x \in X \text{ e } \{x\} \text{ é aberto em } X\} \subseteq \mathcal{B}.$$

Conclua que um espaço discreto é  $2^0$ -contável sse (é separável sse) é enumerável. ■

<sup>†</sup>... se não,  $\mathbb{R}$  seria reunião enumerável de conjuntos finitos...

<sup>‡</sup>... se fosse, teríamos bijeção  $\mathcal{B} \rightarrow \mathbb{N}$  e daí existiria injeção  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ , absurdo... Não se acostume com a apresentação de argumentos que você supostamente já deveria dominar.

**Definição 2.1.79.** Xingam-se de **isolados** os pontos do espaço como no exercício anterior, i.e.,  $x \in X$  é **isolado** (em  $X$ ) se  $\{x\}$  é aberto em  $X$ .  $\blacksquare$

Com a terminologia acima, uma das consequências do exercício anterior é o

**Corolário 2.1.80.** Se  $X$  é  $2^0$ -contável, então  $X$  tem, no máximo, enumeráveis pontos isolados. Consequentemente, se  $Y \subseteq X$  é não enumerável, então  $Y$  não é discreto com a topologia de subespaço.

*Demonstração.* A primeira parte é o exercício anterior. Para a segunda parte, note que se  $\mathcal{B}$  é base para  $X$ , então  $\mathcal{B}_Y := \{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$  é base para a topologia de subespaço de  $Y$  (concorda?)\*. Logo, se  $X$  é  $2^0$ -contável, então  $Y$  também é (certo?)\*, donde o restante segue pela primeira parte (por quê?)\*.  $\square$

O último corolário pode ser usado para obter exemplos menos tediosos de espaços metrizáveis e não separáveis/ $2^0$ -contáveis. Fazendo  $X := [0, 1]$  no Exemplo 1.2.9, o subconjunto não enumerável  $\mathcal{D} := \{\chi_{[0,a]} : 0 < a < 1\}$  se revela um subespaço discreto de  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}[0, 1]$ . De fato, para  $a \in (0, 1)$  qualquer,

$$B_{\|\cdot\|_{\infty}}(\chi_{[0,a]}, 1) \cap \mathcal{D} = \{\chi_{[0,a]}\},$$

pois, se  $b \in (0, 1)$  com  $b \neq a$ , então existe  $x \in [0, 1]$  tal que  $|\chi_{[0,a]}(x) - \chi_{[0,b]}(x)| = 1$ , acarretando  $\|\chi_{[0,a]} - \chi_{[0,b]}\|_{\infty} = 1$ , i.e.,  $\chi_{[0,b]} \notin B_{\|\cdot\|_{\infty}}(\chi_{[0,a]}, 1)$ . Portanto,  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}[0, 1]$  não é  $2^0$ -contável e, por ser metrizável, também não pode ser separável.  $\blacktriangle$

**Exercício 2.1.37** (\*). Você percebeu que bastaria escolher  $X$  infinito?  $\blacksquare$

Feitas essas considerações iniciais, convém retornar ao problema prático de determinar quando uma família de subconjuntos *serve* para ser base de alguma topologia. Quer uma boa notícia?

**Exercício 2.1.38** (\*). Sejam  $X$  um conjunto,  $\mathcal{B}$  uma família de subconjuntos de  $X$  e  $\mathcal{T}$  uma topologia em  $X$ .

a) Mostre que se  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$  é base para  $\mathcal{T}$ , então

- (i) para todo  $x \in X$  existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$ , e
- (ii) para quaisquer  $A, B \in \mathcal{B}$  e  $x \in A \cap B$ , existe  $C \in \mathcal{B}$  com  $x \in C$  e  $C \subseteq A \cap B$ .

b) Mostre que se  $\mathcal{B}$  satisfaz as condições (i) e (ii) acima, então

$$\mathcal{S} := \{O \subseteq X : \text{para todo } x \in O \text{ existe } B \in \mathcal{B} \text{ tal que } x \in B \text{ e } B \subseteq O\}$$

é a única topologia em  $X$  que tem  $\mathcal{B}$  como base.  $\blacksquare$

O exercício anterior *não* altera a definição de base para uma topologia conhecida: ainda vale que se  $(X, \mathcal{T})$  é espaço topológico, então  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$  é base sse todo  $\mathcal{T}$ -aberto de  $X$  se escreve como reunião de membros de  $\mathcal{B}$  (cf. Exercício 2.1.35)<sup>†</sup>. O que se discute acima é mais sutil: dado um conjunto  $Z$  e uma família  $\mathcal{G}$  de subconjuntos de  $Z$ , existe *alguma* topologia  $\mathcal{S}$  sobre  $Z$  que tenha  $\mathcal{G}$  como base?

<sup>†</sup>Portanto, quando quiser verificar se  $\mathcal{B}$  é base de  $(X, \mathcal{T})$ , você usará a Definição 2.1.72 ou o Exercício 2.1.35 para decidir — e não as condições (i) e (ii) do Exercício 2.1.38!

A próxima subsubseção apresenta a *topologia produto* como ilustração de como usar famílias de conjuntos satisfazendo as condições (i) e (ii) acima na definição de topologias — e diremos que essas topologias são **geradas** por tais famílias *como bases*. Porém, antes disso, é importante lidar com a situação em que a vida não nos dá uma família em tais condições.

**PROBLEMA:** dado um conjunto  $Z$  e uma família  $\mathcal{G}$  de subconjuntos de  $Z$ , existe *alguma* topologia sobre  $Z$  segundo a qual todos os membros de  $\mathcal{G}$  são abertos?

**RESPOSTA:** obviamente sim, já que a topologia discreta em  $Z$  declara todos os subconjuntos de  $Z$  como abertos.

A resposta acima foi decepcionante pois o problema não foi bem formulado. Mas isto é corrigível.

**Exercício 2.1.39** (\*). Mostre que se  $\mathcal{S}$  é uma topologia em  $Z$  segundo a qual todos os membros de  $\mathcal{G}$  são  $\mathcal{S}$ -abertos, então qualquer topologia  $\mathcal{T}$  em  $Z$  com  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$  também torna  $\mathcal{T}$ -abertos todos os membros de  $\mathcal{G}$ . ■

O exercício acima ajuda a entender o que faz da topologia discreta uma resposta tão sem graça para o problema: por um lado, se alguma topologia resolve o problema, então toda topologia *mais forte* do que ela também resolve (cf. Definição 2.1.39); por outro lado, a topologia discreta já é a maior topologia possível num conjunto.

**REFORMULAÇÃO DO PROBLEMA:** qual é a *menor* topologia em  $Z$  que torna os membros de  $\mathcal{G}$  abertos? Ela existe?

**Proposição 2.1.81.** *A resposta para a pergunta anterior é sim.*

*Demonstração.* Considere  $\mathfrak{F} := \{\mathcal{T} : \mathcal{T} \text{ é topologia em } Z \text{ tal que } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{T}\}$ . Como a topologia discreta em  $Z$  pertence a  $\mathfrak{F}$ , podemos aplicar o Exercício 1.1.17, segundo o qual

$$\mathfrak{T}(\mathcal{G}) := \bigcap_{\mathcal{T} \in \mathfrak{F}} \mathcal{T}$$

é uma topologia em  $Z$ . Como  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{T}$  para toda  $\mathcal{T} \in \mathfrak{F}$ , resulta  $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}(\mathcal{G})$ . O restante segue por construção (percebeu?)\*. □

Assim como nas situações algébricas em que esse tipo de “construção” é empregado de forma análoga, diremos que a topologia  $\mathfrak{T}(\mathcal{G})$  é **gerada** pela família  $\mathcal{G}$ , enquanto os membros de  $\mathcal{G}$  serão ocasionalmente chamados de *abertos geradores*. Embora possa parecer inédito no texto, este método unifica tudo o que foi feito ao longo desta subsubseção<sup>†</sup> — a escolha por apresentá-lo apenas no final foi meramente *estético-pedagógica*. Além de ser útil em casos em que não dispomos de uma família bem comportada para definir uma topologia (nos moldes do Exercício 2.1.38 (b) ou do Teorema 2.1.65), conhecer geradores de uma topologia tem algumas vantagens.

**Proposição 2.1.82.** *Sejam  $X$  e  $Y$  espaços topológicos e  $f: X \rightarrow Y$  uma função. Se a topologia de  $Y$  é gerada por  $\mathcal{G}$  e  $f^{-1}[G]$  é aberto em  $X$  para todo  $G \in \mathcal{G}$ , então  $f$  é contínua.*

<sup>†</sup>De fato, se  $\mathcal{B}$  é base de um espaço  $(X, \mathcal{T})$ , então  $\mathcal{T} = \mathfrak{T}(\mathcal{B})$ , i.e.,  $\mathcal{T}$  é, necessariamente, a menor topologia a conter  $\mathcal{B}$  (por quê?)\*. Em particular, se  $\mathcal{C}_p$  é uma base local para cada  $p$  num espaço topológico  $(Y, \mathcal{S})$ , então  $\mathcal{C} := \bigcup_{p \in Y} \mathcal{C}_p$  é uma base para o espaço e, portanto,  $\mathcal{C}$  gera  $\mathcal{S}$ , i.e.,  $\mathfrak{T}(\mathcal{C}) = \mathcal{S}$ .

*Demonstração.* Defina  $\mathcal{S} := \{O \subseteq Y : f^{-1}[O] \text{ é aberto em } X\}$  e note  $(\star)$  que se trata de uma (outra) topologia em  $Y$ . Pela hipótese acerca de  $f$  e  $\mathcal{G}$  temos  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$  e, como a topologia nativa de  $Y$  é, por hipótese, a menor a conter  $\mathcal{G}$ , resulta que todo aberto nativo de  $Y$  pertence a  $\mathcal{S}$ , i.e.,  $f^{-1}[U]$  é aberto em  $X$  sempre que  $U \subseteq Y$  é aberto em  $Y$ .  $\square$

Alternativamente, pode-se mostrar (e você fará isso, certo?)<sup>\*</sup> que a topologia num conjunto  $Z$  gerada por uma família  $\mathcal{H}$  de subconjuntos de  $Z$  tem por base a coleção

$$\mathcal{B}(\mathcal{H}) := \{Z\} \cup \left\{ S : \text{existe subconjunto finito } \mathcal{H}' \subseteq \mathcal{H} \text{ tal que } S = \bigcap_{H \in \mathcal{H}'} H \right\}, \quad (2.7)$$

o que permite apresentar uma prova menos “esotérica” para a última proposição (só faça isso se quiser muito)<sup>\*</sup>. Em particular, nas situações em que  $\bigcup_{H \in \mathcal{H}} H = Z$ , é comum dizer que  $\mathcal{H}$  é **sub-base** da topologia  $\mathfrak{T}(\mathcal{H})$ . Neste caso, note que basta tomar  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  como a coleção formada pelas interseções finitas de membros de  $\mathcal{H}$ .

**Exercício 2.1.40**  $(\star)$ . Mostre que os intervalos fundamentais de uma ordem constituem uma sub-base para a topologia usual de uma ordem (cf. Definições 1.2.18 e 1.2.23).  $\blacksquare$

## §4 Topologias fracas e produtos

Se você já estudou um pouco de Análise Funcional, talvez imagine que o título desta subsubseção se refira a algo *intrínseco* dessa área. Ocorre justamente o contrário: as *topologias fracas* em Análise Funcional são *mero* caso particular de uma construção típica da Topologia Geral. É isso que será discutido aqui<sup>†</sup>.

**PROBLEMA:** fixados um conjunto  $X$ , uma coleção de índices  $\mathcal{I}$  e uma  $\mathcal{I}$ -upla de espaços topológicos  $((X_i, \mathcal{T}_i))_{i \in \mathcal{I}}$  juntamente com uma  $\mathcal{I}$ -upla de funções  $(f_i : X \rightarrow X_i)_{i \in \mathcal{I}}$ , existe uma topologia em  $X$  que torne contínuas *cada uma* funções  $f_i : X \rightarrow X_i$ ?

Assim como na subsubseção anterior, esse problema admite uma resposta trivial: a topologia discreta em  $X$ , uma vez que qualquer função entre espaços topológicos com domínio discreto é, automaticamente, contínua. Essa resposta também é desinteressante pois o mesmo fenômeno do Exercício 2.1.39 se repete aqui: se uma topologia  $\mathcal{S}$  em  $X$  torna todas as  $f_i$ ’s contínuas, então qualquer topologia  $\mathcal{T}$  em  $X$  com  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$  também torna as  $f_i$ ’s contínuas (percebeu?)<sup>\*</sup>. Por “indução”, procederemos com o mesmo tipo de reformulação.

**REFORMULAÇÃO DO PROBLEMA:** qual é a *menor* topologia em  $X$  que torna contínuas cada uma das funções  $f_i : X \rightarrow X_i$ ? Ela existe?

**Proposição 2.1.83.** *A resposta para a pergunta anterior é sim.*

*Demonstração.* A fim de que  $f_i : X \rightarrow X_i$  seja contínua, cada um dos subconjuntos  $f_i^{-1}[U]$  deve ser aberto em  $X$ , para qualquer subconjunto  $U \subseteq X_i$  aberto em  $X_i$ . Como se espera que isto ocorra para todo  $i$ , basta considerar  $\mathcal{G} := \{f_i^{-1}[U] : i \in \mathcal{I} \text{ e } U \in \mathcal{T}_i\}$  e definir  $\mathfrak{T}(\mathcal{G})$ , i.e., a topologia em  $X$  gerada por  $\mathcal{G}$ . Por valer  $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}(\mathcal{G})$ , segue que  $f_i : (X, \mathfrak{T}(\mathcal{G})) \rightarrow (X_i, \mathcal{T}_i)$  é contínua para todo  $i$  e, por  $\mathfrak{T}(\mathcal{G})$  ser a menor topologia contendo  $\mathcal{G}$ , segue que qualquer outra topologia tornando todas as  $f_i$ ’s contínuas também deve conter  $\mathfrak{T}(\mathcal{G})$  (entendeu?)<sup>\*</sup>.  $\square$

<sup>†</sup>Mas não se preocupe: na Subseção 2.2.6 veremos como topologias fracas podem ser usadas em Análise Funcional.



**Definição 2.1.84.** Dizemos que a topologia  $\mathfrak{T}(\mathcal{G})$  da demonstração acima é a **topologia fraca** (ou **inicial**)<sup>†</sup> induzida pelas funções  $(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$ . Quando for benéfico denotá-la por alguma notação simbólica, isto será feito com  $\mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$ .  $\P$

Antes de ilustrar os casos particulares mais comuns de topologias fracas, convém destacar uma consequência muito útil desse tipo de construção.

**Corolário 2.1.85** (da Proposição 2.1.82). *Sob as condições, anteriores, para um espaço topológico  $Z$  e uma função  $g: Z \rightarrow X$ , são equivalentes:*

- (i)  $g: Z \rightarrow X$  é contínua, onde  $X$  é munido da topologia fraca  $\mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$ ;
- (ii)  $f_i \circ g: Z \rightarrow X_i$  é contínua para cada  $i \in \mathcal{I}$ .

*Demonstração.* Como a topologia fraca em  $X$  torna cada  $f_i$  contínua, (i)  $\Rightarrow$  (ii) segue pois composição de funções contínuas é contínua. Para a recíproca, note que se  $f_i \circ g$  é contínua para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então

$$(f_i \circ g)^{-1}[U] = g^{-1}[f_i^{-1}[U]]$$

é aberto em  $Z$  para qualquer subconjunto  $U \subseteq X_i$  aberto em  $X_i$  (viu?)<sup>\*</sup>. Por  $i \in \mathcal{I}$  ter sido tomado arbitrariamente, mostramos, na verdade, que  $g$  torna abertas as pré-imagens dos geradores da topologia de  $X$ . Logo, pela Proposição 2.1.82,  $g$  é contínua.  $\square$

**Exemplo 2.1.86** (Subespaços revisitados). A topologia de subespaço é um exemplo típico de topologia inicial. Neste caso, o conjunto de índices tem apenas um índice e a única função considerada é a inclusão  $i: Y \rightarrow X$ , onde  $X$  é um espaço topológico e  $Y \subseteq X$  é um subconjunto ainda sem topologia.

Daí, a topologia fraca em  $Y$  induzida pela inclusão  $i: Y \rightarrow X$  é, por definição, a menor topologia em  $Y$  que torna a inclusão contínua. Pela demonstração da Proposição 2.1.83, sabemos que tal topologia é gerada pelos subconjuntos da forma  $i^{-1}[U]$  com  $U \subseteq X$  aberto em  $X$ . Em outras palavras: reobtemos a topologia  $\mathcal{T}_Y$  introduzida na distante Proposição 2.1.44. Nesse contexto, observe que o corolário anterior se traduz *literalmente* no Exercício 2.1.20.  $\blacktriangle$

**Exemplo 2.1.87** (Convergência na topologia fraca<sup>‡</sup>). Convém observar que o último corolário caracteriza quais redes e filtros em  $X$  convergem com respeito à topologia fraca. Primeiro, a um conjunto dirigido  $\mathbb{D}$  associamos o espaço topológico  $\mathbb{D}^\# := \mathbb{D} \cup \{\#\}$ , onde  $\#$  é um objeto tal que  $\# \notin \mathbb{D}$ , com a topologia gerada pelas famílias  $(\mathcal{B}_e)_{e \in \mathbb{D}^\#}$  como bases locais, onde  $\mathcal{B}_d := \{\{d\}\}$  se  $d \in \mathbb{D}$  e  $\mathcal{B}_\# := \{D^\uparrow \cup \{\#\} : D \in \mathbb{D}\}$ . Explicitamente, um subconjunto  $A \subseteq \mathbb{D}^\#$  é aberto segundo tal topologia sse<sup>††</sup>  $\# \notin A$  ou existe  $D \in \mathbb{D}$  tal que  $d \in A$  para todo  $d \succeq D$ .

**Exercício 2.1.41** (\*). Seja  $\mathbb{D}$  como acima e considere  $X$  um espaço topológico. Mostre que uma rede  $\varphi: \mathbb{D} \rightarrow X$  converge para um ponto  $p \in X$  sse a função  $\varphi^\#: \mathbb{D}^\# \rightarrow X$  é contínua (em  $\#$ ), onde

$$\varphi^\#(e) := \begin{cases} \varphi(e), & \text{se } e \in \mathbb{D} \\ p, & \text{se } e = \# \end{cases}.$$

<sup>†</sup>Ela está no “início” das setas.

<sup>‡</sup>Dado que continuidade também se descreve via convergência, é de se esperar que topologias fracas possam ser rephraseadas em termos de *convergências fracas*. Isto será feito oportunamente, não se preocupe.

<sup>††</sup>E você pode provar isso diretamente (\*) ou notar que a tese da condição (ii) na Proposição 2.1.64 é satisfeita (\*).



Por outro lado, ao fazer  $Z = \mathbb{D}^\#$  e  $g = \varphi^\#$  no último corolário, resulta que  $\varphi^\#$  é contínua sse  $f_i \circ \varphi^\#$  é contínua para todo  $i \in \mathcal{I}$ . Portanto, em vista do exercício anterior, conclui-se que  $\varphi \rightarrow p$  em  $X$  com a topologia fraca sse  $f_i \circ \varphi \rightarrow f_i(p)$  em  $X_i$ . O caso de filtros será problema seu.  $\blacktriangle$

**Exercício 2.1.42** (\*). Mostre que um filtro próprio  $\mathcal{G}$  em  $X$  converge para  $p \in X$  com respeito à topologia fraca sse  $f_i(\mathcal{G}) \rightarrow f_i(p)$  em  $X_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ .  $\blacksquare$

Talvez um dos casos mais importantes de topologia fraca seja o da *topologia produto*, na qual a caracterização de convergência do exemplo anterior assume a forma emblemática da *convergência pontual*.

**Definição 2.1.88.** Dados um conjunto de índices  $\mathcal{I}$  e uma  $\mathcal{I}$ -upla  $((X_i, \mathcal{T}_i))_{i \in \mathcal{I}}$  de espaços topológicos, chamamos de **topologia produto** em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  à topologia fraca induzida pela  $\mathcal{I}$ -upla de funções  $(\pi_j)_{j \in \mathcal{I}}$ , onde

$$\pi_j: \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow X_j$$

é a *projeção na  $j$ -ésima coordenada*, i.e., a função dada por  $\pi_j((x_i)_{i \in \mathcal{I}}) := x_j$ . A menos de menção explícita em contrário, produtos de espaços topológicos sempre serão munidos da topologia produto<sup>†</sup>.  $\P$

Assim, pela definição de topologia fraca, a topologia produto em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é a topologia mais fraca a tornar todas as projeções contínuas. Explicitamente, a descrição sugerida em (2.7) (pág. 79) indica que *ela* tem como *abertos básicos* as interseções finitas de subconjuntos da forma  $\pi_i^{-1}[U]$ , onde  $i \in \mathcal{I}$  e  $U \subseteq X_i$  é aberto em  $X_i$  (certo?)\*. Em outras palavras, uma base para a topologia produto é composta por subconjuntos da forma  $B = \prod_{i \in \mathcal{I}} B_i$ , onde cada  $B_i \subseteq X_i$  é aberto em  $X_i$ , com a restrição de que o **suporte** de  $B$  é *finito*, onde se entende por suporte o conjunto de índices<sup>‡</sup>

$$\text{supp} \left( \prod_{i \in \mathcal{I}} B_i \right) := \{i \in \mathcal{I} : B_i \neq X_i\}. \quad (2.8)$$

De fato, para um subconjunto finito  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ , se  $U_j \subseteq X_j$  é aberto em  $X_j$  para cada  $j \in \mathcal{J}$ , então

$$A := \bigcap_{j \in \mathcal{J}} \pi_j^{-1}[U_j] = \prod_{i \in \mathcal{I}} V_i,$$

onde

$$V_i := \begin{cases} X_i, & \text{se } i \notin \mathcal{J} \\ U_i, & \text{se } i \in \mathcal{J} \end{cases}, \quad (\text{certo?})^*$$

mostrando que  $A$  é produto de abertos cujo suporte está contido no conjunto finito  $\mathcal{J}$ .

Reciprocamente, se  $W = \prod_{i \in \mathcal{I}} W_i$  é um produto de abertos cujo suporte é um conjunto finito  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{I}$ , então

$$W = \prod_{i \in \mathcal{I}} W_i = \bigcap_{j \in \mathcal{F}} \pi_j^{-1}[W_j].$$

<sup>†</sup>Se precisar revisar produtos e *uplas*, confira a Subseção 2.2.1. Faça isso o quanto antes, pois em breve enfrentaremos o Teorema de Tychonoff.

<sup>‡</sup>De modo geral, o *suporte* de um objeto (função, produto cartesiano, etc.) é, essencialmente, um conjunto de índices relacionados ao objeto em que não se assumem valores triviais em algum sentido.

**Observação 2.1.89** (Importante). Pelo que se discutiu no exemplo anterior, uma rede  $\varphi$  em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  converge para uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$  sse para cada  $i \in \mathcal{I}$ , a rede  $\varphi_i := \pi_i \circ \varphi$  converge para o ponto  $x_i$  no espaço  $X_i$ . Quem preferir escrever redes explicitamente indexadas deve notar que se  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$  é uma rede em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ , então cada  $x_d$  é uma  $\mathcal{I}$ -upla, digamos  $x_d := (x_d(i))_{i \in \mathcal{I}}$  com  $x_d(i) \in X_i$  para cada  $d \in \mathbb{D}$  e  $i \in \mathcal{I}$ . Sob tais notações, o que se expressou foi que  $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$  converge para  $(p_i)_{i \in \mathcal{I}}$  em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  sse  $(x_d(i))_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow p_i$  em  $X_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ . Os próximos casos particulares devem ajudar a entender a ideia.  $\triangle$

**Exemplo 2.1.90** (Produtos finitos). Em textos mais *pacientes*, costuma-se introduzir primeiro a topologia produto para o caso de *dois* espaços topológicos, digamos  $X$  e  $Y$ , e só depois se discutem os produtos finitos arbitrários<sup>†</sup>. A ideia é considerar a coleção dos *retângulos abertos* da forma  $A \times B$ , com  $A \subseteq X$  e  $B \subseteq Y$  abertos em seus respectivos espaços, a fim de declarar  $O \subseteq X \times Y$  aberto sse para todo  $(a, b) \in O$  existir um retângulo aberto  $A \times B$  com  $(a, b) \in A \times B \subseteq O$ . Em outras palavras: os retângulos abertos geram a topologia produto como uma base<sup>‡</sup>.



Figura 2.2: A televisão nos ensina a topologia produto, desde sempre.

Assim, é claro que a topologia descrita acima é a topologia produto. Se duvida, basta observar que um retângulo aberto  $A \times B$  é uma interseção finita de pré-imagens de abertos pelas projeções<sup>††</sup>:

$$A \times B = (A \times Y) \cap (X \times B) = \pi_X^{-1}[A] \cap \pi_Y^{-1}[B] \quad (\text{certo?})^*.$$

De modo geral, para qualquer número finito de espaços topológicos, a topologia produto no produto cartesiano desses espaços tem por abertos básicos, justamente, os produtos cartesianos de abertos tomados nos respectivos espaços — e sem restrições sobre o suporte, já que em tais situações, o conjunto de índices é finito! Nesse contexto, a particularização do Corolário 2.1.85 costuma ser enunciada da seguinte forma (que justifica, *categoricamente*, a terminologia atribuída à topologia produto)<sup>††</sup>:

**Teorema 2.1.91** (Propriedade universal da topologia produto). *Dadas funções contínuas  $f: Z \rightarrow X$  e  $g: Z \rightarrow Y$ , existe uma única função contínua  $(f, g): Z \rightarrow X \times Y$  tal que  $\pi_X \circ (f, g) = f$  e  $\pi_Y \circ (f, g) = g$ .*

*Demonstração.* Conjuntisticamente, a função  $(f, g): Z \rightarrow X \times Y$  só pode ser<sup>††</sup> dada por  $(f, g)(z) = (f(z), g(z))$ , afinal,  $\pi_X((f, g)(z)) = f(z)$  e  $\pi_Y((f, g)(z)) = g(z)$  por hipótese. Restaria a continuidade, mas isto segue do Corolário 2.1.85 (percebeu?)<sup>\*</sup>.  $\square$

<sup>†</sup>Textos introdutórios tendem a evitar produtos arbitrários — e os mais ousados fazem  $\mathcal{I} := \mathbb{N}$ .

<sup>‡</sup>Afinal de contas, a coleção dos retângulos abertos satisfaz as condições (i) e (ii) do Exercício 2.1.38 (percebeu?)<sup>\*</sup>.

<sup>††</sup>Se *precisar* “visualizar” de maneira geométrica, perceba que um “quadrado” em  $\mathbb{R}^2$  pode ser obtido como a interseção de duas “faixas retangulares” infinitas. Como não é da minha índole colaborar com os vícios de outras pessoas, você deverá fazer o desenho por conta própria.

<sup>‡‡</sup>Caso precise revisar propriedades universais sob a perspectiva categórica, confira a Subseção 2.2.2.

<sup>††</sup>Unicidade é isso...

Em particular, uma rede  $(x_\alpha, y_\alpha)_\alpha$  em  $X \times Y$  converge para um ponto  $(x, y)$  na topologia produto sse  $(x_\alpha)_\alpha \rightarrow x$  em  $X$  e  $(y_\alpha)_\alpha \rightarrow y$  em  $Y$ , exatamente como você aprendeu em Cálculo  $n$ , para  $n \geq 2$ .  $\blacktriangle$

O teorema anterior também tem uma versão para produtos infinitos que justifica o título de “topologia produto” de um ponto de vista categórico: *para uma  $\mathcal{I}$ -upla de funções contínuas  $(f_i: Z \rightarrow X_i)_{i \in \mathcal{I}}$ , existe uma única função contínua da forma  $Z \rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ , geralmente denotada por  $(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$ , tal que  $\pi_j \circ (f_i)_{i \in \mathcal{I}} = f_j$  para cada  $j \in \mathcal{I}$* . Em virtude da similaridade da prova, ela será deixada para você  $(*)$ .

No entanto, para pessoas que não se deixam influenciar por Teoria de Categorias, o mero fato de  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  satisfazer uma propriedade universal pode não ser apelo suficiente para lidar com uma topologia cujos abertos básicos são tão *estranhos*. Afinal, num primeiro momento, parece muito mais natural utilizar como abertos básicos os subconjuntos da forma  $\prod_{i \in \mathcal{I}} A_i$ , com  $A_i \subseteq X_i$  aberto para todo  $i \in \mathcal{I}$ , sem restrições sobre suportes. O exercício a seguir deve te ajudar a tirar suas próprias conclusões.

**Exercício 2.1.43**  $(*)$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$  considere  $X_n := \mathbb{R}$  e, sobre  $X := \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ , considere a topologia que tem por abertos básicos os subconjuntos da forma  $\prod_{n \in \mathbb{N}} A_n$ , com  $A_n \subseteq \mathbb{R}$  aberto em  $\mathbb{R}$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ .

- Convença-se que isto define, de fato, uma topologia em  $X$ .
- Mostre que a função  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow X$ , dada por  $\varphi(r) := (r)_{n \in \mathbb{N}}$ , é tal que  $\pi_n \circ \varphi$  é contínua para todo  $n \in \mathbb{N}$ .
- Mostre que  $\varphi$  não é contínua. Dica:  $\varphi^{-1}[\prod_{n \in \mathbb{N}} A_n] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$  para qualquer sequência  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de subconjuntos de  $\mathbb{R}$ .  $\blacksquare$

**MORAL DA HISTÓRIA:** a preguiça nem sempre é uma boa bússola para a intuição. No caso, ao permitir que produtos quaisquer de abertos sejam abertos (algo desejável por envolver uma descrição mais simples), obtemos como resultado uma topologia *grande demais* (algo indesejado pois, com mais abertos, fica *mais difícil* convergir).

**Exercício 2.1.44**  $(*)$ . Para  $n \in \mathbb{N}$ , mostre que a topologia produto de  $\mathbb{R}^n$  é a topologia induzida pela norma do máximo. Dica: se não quiser apelar para retângulos, combine o Corolário 2.1.42 com a Observação 2.1.89.  $\blacksquare$

**Exemplo 2.1.92** (Funções e convergência pontual). Além de atormentar quem *ignora* se esquece da condição de suporte finito em produtos infinitos de espaços topológicos, o último exercício também indica como espaços de funções podem ser encarados como produtos, processo em que a topologia produto revela um modo sistemático de generalizar a convergência pontual introduzida na demonstração da Proposição 1.1.30.

De fato, se  $X_i = Y$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(y_i)_{i \in \mathcal{I}}$  é, *tradicionalmente*, a função  $y_\bullet: \mathcal{I} \rightarrow \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i$  dada pela correspondência  $i \mapsto y_i$ . Contudo, em virtude da identidade óbvia  $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i = Y$ , segue que as  $\mathcal{I}$ -uplas de  $\prod_{i \in \mathcal{I}} Y$  são, precisamente, as funções do tipo  $\mathcal{I} \rightarrow Y$ . Em símbolos, temos a igualdade

$$\prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i = \text{Fun}(\mathcal{I}, Y), \quad (2.9)$$

que embora trivial para quem adota as implementações usuais da Teoria dos Conjuntos, pode ser chocante para pessoas *alérgicas* aos formalismos conjuntistas.

Assim, a depender do seu gosto, você pode encarar (2.9) tanto como uma obviedade quanto como um abuso de notação. De qualquer forma, a prometida convergência pontual se revela um mero subcaso da convergência oriunda da topologia produto. ▲

**Definição 2.1.93.** Para um conjunto  $X$  qualquer e um espaço topológico  $Y$ , a notação  $\text{Fun}_p(X, Y)$  indica o conjunto  $\text{Fun}(X, Y)$  munido da topologia produto (... ao identificarmos  $\text{Fun}(X, Y) = \prod_{x \in X} Y$ ). Se, adicionalmente,  $X$  também for um espaço topológico, então  $C_p(X, Y)$  indica o conjunto  $C(X, Y)$ , formado pelas funções contínuas do tipo  $X \rightarrow Y$ , com a topologia de subespaço herdada de  $\text{Fun}_p(X, Y)$ . ■

**Teorema 2.1.94.** *Sejam  $X$  um conjunto,  $Y$  um espaço topológico e  $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$  uma rede em  $\text{Fun}_p(X, Y)$ . Para  $f: X \rightarrow Y$  qualquer, são equivalentes:*

- (i)  $(f_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow f$  em  $\text{Fun}_p(X, Y)$ ;
- (ii)  $(f_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_p f$ , i.e.,  $(f_d(x))_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow f(x)$  em  $Y$  para cada  $x \in X$  (caso em que se diz que  $(f_d)_d$  **converge pontualmente para  $f$** ).

*Demonstração.* Primeiro, note que da identificação

$$\text{Fun}(X, Y) = \prod_{x \in X} Y,$$

a projeção  $\pi_x: \text{Fun}(X, Y) \rightarrow Y$  é apenas a *função avaliação* em  $x$ , i.e.,  $\pi_x(f) = f(x)$  para cada  $f \in \text{Fun}(X, Y)$  (percebeu?)<sup>†</sup>. Feito isso, a equivalência desejada segue do que se discutiu no Exemplo 2.1.87 ao trocar  $(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$  por  $(\pi_x)_{x \in X}$ . Detalhes adicionais ficam por sua conta (★). □

O teorema acima é a razão pela qual a topologia produto também responde pela alcunha de **topologia da convergência pontual**. Ela não será a única topologia a ser considerada sobre  $\text{Fun}(X, Y)$  ou  $C(X, Y)$ , mas ainda é cedo para discutir outras. Por ora, será mais conveniente espiar pelo buraco da fechadura.

## §5 Exercícios adicionais

**Exercício 2.1.45 (★).** Seja  $f: X \rightarrow Y$  uma função entre espaços topológicos. Mostre que  $f$  é contínua sse:

- a) ...  $f[\overline{S}] \subseteq \overline{f[S]}$  para todo subconjunto  $S \subseteq X$ ;
- b) ...  $f^{-1}[G] \subseteq X$  é fechado em  $X$  sempre que  $G \subseteq Y$  é fechado em  $Y$ ;
- c) ...  $f^{-1}[\text{int}(T)] \subseteq \text{int}(f^{-1}[T])$  para todo subconjunto  $T \subseteq Y$ ;
- d) ...  $f^{-1}[B]$  é aberto em  $X$  sempre que  $B \subseteq Y$  é um aberto de uma base  $\mathcal{B}$  de  $Y$  fixada.
- e) Enumere, sem repetições, as caracterizações de funções contínuas apresentadas no texto e prove, de forma direta, que todas são equivalentes<sup>‡</sup>. ■

<sup>†</sup>Uma resposta negativa de sua parte é forte indicativo de que você deveria conferir a Subseção 2.2.1.

<sup>‡</sup>Por exemplo, se tivéssemos apenas três caracterizações (I), (II) e (III), a ideia é que se provem (I)  $\Rightarrow$  (II), (II)  $\Rightarrow$  (III) e (III)  $\Rightarrow$  (I) (ou suas contrapositivas).

**Exercício 2.1.46** (\*). Ao longo deste exercício, você deve tratar  $\bar{S}$  como o menor fechado que contém  $S$  e  $\text{int}(S)$  como o maior aberto contido em  $S$ . Em outras palavras: redes, filtros e pontos aderentes estão proibidos.

- a) Mostre que a correspondência  $S \mapsto \bar{S}$  tem as propriedades (i), (ii), (iii) e (iv) enunciadas na Observação 2.1.58. Em particular,  $\bar{S} \subseteq \bar{T}$  sempre que  $S \subseteq T$ .
- b) Mostre que  $\text{int}(S) = X \setminus \overline{X \setminus S}$  para qualquer  $S \subseteq X$ .
- c) Use o item anterior para dualizar as propriedades (i), (ii), (iii) e (iv) do item (a) para a correspondência  $S \mapsto \text{int}(S)$ . ■

**Exercício 2.1.47** (\*). Sejam  $(X, \mathcal{T})$  um espaço topológico com subconjuntos  $S \subseteq Y \subseteq X$ .

- a) Mostre que  $\text{cl}_{\mathcal{T}_Y}(S) = Y \cap \text{cl}_{\mathcal{T}}(S)$ , i.e., o fecho do subconjunto  $S$  como subespaço de  $Y$  é a interseção entre o fecho de  $S$  como subespaço de  $X$  e o subespaço  $Y$ .
- b) Mostre que  $S$  é fechado em  $Y$  sse existe  $F \subseteq X$  fechado em  $X$  tal que  $S = F \cap Y$ .
- c) Mostre que se  $Y$  é fechado em  $X$ , então  $S$  é fechado em  $Y$  sse  $S$  é fechado em  $X$ .
- d) Mostre que se  $Y$  é aberto em  $X$ , então  $S$  é aberto em  $Y$  sse  $S$  é aberto em  $X$ .
- e) Mostre que  $\text{int}_{\mathcal{T}_Y}(S) = Y \cap \text{int}_{\mathcal{T}}(S \cup (X \setminus Y))$ . Observação: é sério! ■

**Exercício 2.1.48** (\*). Sejam  $X$  e  $Y$  espaços topológicos e  $f: X \rightarrow Y$  uma função contínua. Mostre que se  $D \subseteq X$  é denso, então  $f[D]$  é denso no subespaço  $\text{im}(f)$ . ■

**Exercício 2.1.49** (“denso de denso é denso” (\*)). Se  $X$  é um espaço topológico e  $D \subseteq X$  é denso, então qualquer subespaço denso de  $D$  é denso em  $X$ . ■

**Exercício 2.1.50** (\*). Mostre que se  $X$  é espaço separável, então  $|\mathcal{C}(X, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}|$ . Dica:  $|\text{Fun}(D, \mathbb{R})| = |\mathbb{R}|$  para qualquer conjunto  $D$  não vazio e enumerável. ■

**Exercício 2.1.51** (\*, \*). Sejam  $X$  um espaço de Hausdorff  $1^0$ -contável e  $B \subseteq X$  um subconjunto tal que  $|B| \leq |\mathbb{R}|$ . Mostre que  $|\bar{B}| \leq |\mathbb{R}|$ . ■

**Exercício 2.1.52** (\*). Sejam  $\varphi := (r_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência em  $(0, +\infty)$  e  $X$  um espaço métrico. Mostre que se  $\varphi \rightarrow_{\mathbb{R}} 0$ , então  $\mathcal{B}_p(\varphi) := \{B(p, r_n) : n \in \mathbb{N}\}$  é base local em  $p$ , para qualquer  $p \in X$ . Vale a volta? ■

**Exercício 2.1.53** (\*). Mostre que espaços  $2^0$ -contáveis são  $1^0$ -contáveis. ■

**Exercício 2.1.54** (\*). Mostre que se  $X$  é  $1^0$ -contável, então  $X$  é de Hausdorff sse limites de sequências convergentes em  $X$  são únicos. ■

**Exercício 2.1.55** (\*). Mostre que se  $X$  é metrizável e separável, então todo subespaço  $Y$  de  $X$  também é separável. Dica: não comece com um denso enumerável de  $X$ , mas sim com uma base enumerável para  $X$ . ■

**Exercício 2.1.56** (\*, \*). O resultado anterior permanece válido sem a hipótese de metrizabilidade? Dica:  $\mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S$  não é metrizável (cf. Exemplo 2.1.67). ■

**Exercício 2.1.57** (\*). Sejam  $\mathcal{S}$  e  $\mathcal{T}$  topologias de um mesmo conjunto, com bases  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$ , respectivamente. Quais condições  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  devem satisfazer a fim de que ocorra  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$ ? ■

**Exercício 2.1.58** (\*). Sejam  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  bases para uma topologia  $\mathcal{T}$  em  $X$ . Mostre que se  $|\mathcal{B}| \leq |\mathcal{C}|$ , com  $\mathcal{B}$  infinita, então existe  $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ , com  $|\mathcal{C}'| \leq |\mathcal{B}|$  tal que  $\mathcal{C}'$  ainda é base da mesma topologia. Dica: use os abertos de  $\mathcal{B}$  como fatias de um sanduíche cujo recheio são membros de  $\mathcal{C}$ ; lembre-se de que por  $\mathcal{B}$  ser infinita vale  $|\mathcal{B} \times \mathcal{B}| = |\mathcal{B}|$ . ■

**Exercício 2.1.59** (\*). Mostre que um subconjunto  $S$  de um espaço topológico  $X$  é aberto e denso em  $X$  sse  $X \setminus S$  é fechado em  $X$  e tem interior vazio. ■

**Exercício 2.1.60** (\*). Mostre que  $(X, \mathcal{T})$  é  $2^0$  contável sse existe uma família enumerável  $\mathcal{G}$  de subconjuntos de  $X$  tal que  $\mathcal{T} = \mathfrak{T}(\mathcal{G})$ , i.e., sse a topologia  $\mathcal{T}$  é gerada por uma família enumerável de subconjuntos. Dica: a dificuldade, se existente, está na recíproca. ■

**Exercício 2.1.61** (\*). Para um conjunto não vazio de índices  $\mathcal{I}$ , considere um espaço topológico  $(X_i, \mathcal{T}_i)$  e um subconjunto  $S_i \subseteq X_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ . Por fim, seja  $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  com a topologia produto, que aqui será denotada por  $\mathcal{T}$ .

- Determine  $\text{int}_{\mathcal{T}}(\prod_{i \in \mathcal{I}} S_i)$ . Dica: considere primeiro o caso em que  $\mathcal{I}$  é finito.
- Mostre que  $\text{cl}_{\mathcal{T}}(\prod_{i \in \mathcal{I}} S_i) = \prod_{i \in \mathcal{I}} \text{cl}_{\mathcal{T}_i}(S_i)$ .
- Mostre que se cada  $S_i$  é denso em  $X_i$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} S_i$  é denso em  $X$ .
- Para cada  $i \in \mathcal{I}$  considere, adicionalmente, um espaço topológico  $Y_i$  e uma função contínua  $f_i: X_i \rightarrow Y_i$ . Mostre que a função

$$\prod_{i \in \mathcal{I}} f_i: \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i$$

$$(x_i)_{i \in \mathcal{I}} \mapsto (f_i(x_i))_{i \in \mathcal{I}}$$

é contínua.

- Se você tiver familiaridade com Teoria de Categorias, use o item anterior para obter um funtor  $\text{TOP}^{\mathcal{I}} \rightarrow \text{TOP}$ . ■

**Exercício 2.1.62** (\*). Seja  $(X_i)_{i \in \mathcal{I}}$  uma  $\mathcal{I}$ -upla de espaços topológicos com uma *propriedade topológica*  $\mathcal{P}$ . Mostre que  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  tem a propriedade  $\mathcal{P}$  em cada um dos casos a seguir.

- $\mathcal{P} = \text{Hausdorff}$ .
- $\mathcal{P} = 2^0\text{-contável com } \mathcal{I} \text{ enumerável}$ .
- $\mathcal{P} = 1^0\text{-contável com } \mathcal{I} \text{ enumerável}$ .
- $\mathcal{P} = \text{separável com } \mathcal{I} \text{ finito}^\dagger$ . ■

**Exercício 2.1.63** (\*). Se  $X_i$  é discreto para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é discreto? ■

**Exercício 2.1.64** (\*). Para um espaço topológico  $X$  e um subconjunto  $S$ , mostre que uma rede  $\varphi$  em  $S$  converge para  $p \in S$  na topologia de subespaço que  $S$  herda de  $X$  sse  $\varphi \rightarrow p$  em  $X$ . Dica:  $i \circ \varphi = \varphi$ . ■

**Exercício 2.1.65** (\*). Mostre que espaços enumeráveis são separáveis. ■

**Exercício 2.1.66** (\*). Em geral, se  $X$  é espaço topológico enumerável, então  $X$  é  $2^0$ -contável ou  $1^0$ -contável? Dica: não. ■

**Exercício 2.1.67** (Transitividade das topologias fracas (\*)). Sejam  $\mathcal{I}$  um conjunto de índices e  $\{\mathcal{J}_i : i \in \mathcal{I}\}$  uma coleção de conjuntos de índices. Para cada  $i \in \mathcal{I}$  e  $j \in \mathcal{J}_i$ , fixe:

<sup>†</sup>O resultado permanece válido para  $|\mathcal{I}| \leq |\mathbb{R}|$ , mas a prova é complicada demais para ser deixada como exercício.



- uma função  $f_i: X \rightarrow Y_i$ ,
- um conjunto  $Y_i$ ,
- um espaço topológico  $Z_j$ ,
- e uma função  $g_{i,j}: Y_i \rightarrow Z_j$ .

Mostre que se cada  $Y_i$  tem a topologia fraca induzida pelas funções  $\{g_{i,j} : j \in \mathcal{J}_i\}$ , então as topologias fracas sobre  $X$  induzidas pelas famílias  $\{g_{i,j} \circ f_i : i \in \mathcal{I}, j \in \mathcal{J}_i\}$  e  $\{f_i : i \in \mathcal{I}\}$  coincidem. Dica: encare a Proposição 2.1.40 e o Exemplo 2.1.87 até que te encarem de volta. ■

**Exercício 2.1.68** (\*). Considere um conjunto  $X$  com a topologia fraca induzida por uma  $\mathcal{I}$ -upla de funções  $(f_i: X \rightarrow X_i)_{i \in \mathcal{I}}$ .

- Mostre que se  $Y \subseteq X$ , então a topologia de  $Y$  como subespaço de  $X$  é a topologia fraca induzida por  $(f_i|_Y)_{i \in \mathcal{I}}$ . Dica: use o exercício anterior.
- Mostre que se a topologia de cada  $X_i$  é gerada por  $\mathcal{G}_i$ , então a topologia de  $X$  é gerada por  $\{f_i^{-1}[G] : i \in \mathcal{I} \text{ e } G \in \mathcal{G}_i\}$ . Dica: encare a Proposição 2.1.82 até que ela te encare de volta. ■

**Exercício 2.1.69** (\*). Mostre que se  $X \subseteq Y \subseteq Z$  com  $Z$  espaço topológico, então a topologia de  $X$  como subespaço de  $Y$  é a topologia de  $X$  como subespaço de  $Z$ . ■

**Exercício 2.1.70** (\*). Seja  $(Y_i)_{i \in \mathcal{I}}$  uma  $\mathcal{I}$ -upla de espaços topológicos.

- Mostre que se  $X_i \subseteq Y_i$  para todo  $i \in \mathcal{I}$  e cada  $X_i$  tem a topologia de subespaço herdada de  $Y_i$ , então a topologia produto em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  coincide com a topologia de subespaço herdada de  $\prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i$ .
- Mostre que se a topologia de cada  $Y_i$  é gerada por uma família  $\mathcal{B}_i$  como base, então os conjuntos da forma  $B = \prod_{i \in \mathcal{I}} B_i$ , com  $B_i \in \mathcal{B}_i$  para todo  $i$  e  $\text{supp}(B)$  finito, constituem uma base para a topologia produto de  $\prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i$ . ■

**Exercício 2.1.71** (\*). Para  $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ ,  $G \subseteq X$  e  $r > 0$ , considere

$$B(f; G; r) := \{h \in \text{Fun}_p(X, \mathbb{K}) : |h(x) - f(x)| < r \text{ para todo } x \in G\}$$

(cf. Proposição 1.1.30). Mostre que  $\mathcal{B}_f := \{B(f; G; r) : G \subseteq X \text{ é finito e } r > 0\}$  é base local em torno de  $f$  no espaço  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$ . Dica: expresse  $B(f; G; r)$  como um produto de abertos ou como uma interseção finita de pré-imagens de abertos por projeções. ■

**Exercício 2.1.72** (\*). Mostre que se  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$  é metrizável, então  $X$  é enumerável. ■

**Exercício 2.1.73** (\*). Mostre que se  $X_i$  é metrizável para todo  $i \in \mathcal{I}$  e  $|\mathcal{I}| = |\mathbb{N}|$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é metrizável. Em particular, conclua que a recíproca do exercício anterior é verdadeira. ■

**Exercício 2.1.74** (\*). Responda a última pergunta da Observação 1.1.32 (pág. 24). ■

## 2.2 Extras

Esta seção traz tópicos que dependem majoritariamente do que foi introduzido nas partes “essenciais” deste capítulo. As quatro primeiras subseções revisam e aprofundam as principais “novidades”: produtos arbitrários, filtros e redes. O restante delas busca ilustrar *aplicações* do conteúdo topológico discutido. Com isso dito, não se preocupe: as partes *essenciais* dos próximos capítulos *quase* não dependerão do que for discutido aqui — e as exceções serão óbvias ou devidamente indicadas.

### 2.2.1 Revisão: produtos generalizados e uplas

**MOTIVAÇÃO.** Os pares ordenados num produto cartesiano  $X_0 \times X_2$  podem ser encarados como funções da forma  $\{0, 1\} \xrightarrow{f} X_0 \cup X_1$ , com a restrição de que  $f(i) \in X_i$  para  $i = 0$  e  $i = 1$ . Vale a “volta”: uma função  $g$  com a mesma propriedade induz o par  $(g(0), g(1))$  no produto cartesiano  $X_0 \times X_1$ . Analogamente, uma tripla  $t := (a, b, c)$  em  $A \times B \times C$  induz uma *única função*

$$T: \{A, B, C\} \rightarrow \bigcup_{X \in \{A, B, C\}} X = A \cup B \cup C$$

tal que  $T(X) \in X$  para todo  $X \in \{A, B, C\}$ . Por outro lado, uma função  $S$  do mesmo tipo induz o par  $(S(A), S(B), S(C)) \in A \times B \times C$ .

**Definição 2.2.1.** Para um conjunto de índices  $\mathcal{I}$  e uma coleção  $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$  de conjuntos, denota-se por  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  a família das funções da forma  $f: \mathcal{I} \rightarrow \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i$  tais que  $f(i) \in X_i$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ . Tradicionalmente, essas funções são xingadas de **funções escolha**<sup>†</sup> — mas, em virtude da próxima proposição, também é comum chamá-las de  **$\mathcal{I}$ -uplas** (ou apenas **uplas** quando o contexto permite), justamente a terminologia que será adotada no texto. ◻

**Proposição 2.2.2.** Para  $f, g \in \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ , tem-se  $f = g$  se, e somente se,  $f(i) = g(i)$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ .

*Demonstração.* Duas funções  $f, g: A \rightarrow B$  são iguais sse  $f(a) = g(a)$  para todo  $a \in A$ . ◻

Assim, uplas se comportam como pares ordenados, em que  $(a, b) = (c, d)$  sse  $a = c$  e  $b = d$ , razão pela qual o conjunto  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  de todas as  $\mathcal{I}$ -uplas da família  $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$  é chamado de **produto cartesiano** da família<sup>‡</sup>  $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ . É também por conta de tal analogia que uma  $\mathcal{I}$ -upla em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é denotada como  $(f(i))_{i \in \mathcal{I}}$ .

É claro que se  $X_i = \emptyset$  para algum  $i \in \mathcal{I}$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i = \emptyset$  (por favor!)\*<sup>5</sup>. A recíproca desta afirmação é uma das manifestações do:

**AXIOMA DA ESCOLHA:** se  $X_i \neq \emptyset$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \neq \emptyset$ .

Se for de seu interesse saber mais detalhes sobre o Axioma da Escolha entre outras questões de Fundamentos, confira [13, 21]. Por aqui, *seguiremos* usando o Axioma da Escolha bem como suas outras encarnações sem um pingão de preocupação<sup>††</sup>.

Como você já deve saber, um produto cartesiano  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  vem de fábrica com uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(\pi_j)_{j \in \mathcal{I}}$  de funções, as **projeções**: para cada  $j \in \mathcal{I}$ ,

$$\pi_j: \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow X_j$$

é a função que a cada  $\mathcal{I}$ -upla  $(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$  associa sua  $j$ -ésima coordenada  $x_j$ . Como de costume, a grafia das projeções acompanha o modo como se denota o produto cartesiano: por exemplo, no caso de  $X \times Y$ , escreve-se  $\pi_X$  e  $\pi_Y$  para as projeções na primeira e segunda coordenadas, respectivamente.

A melhor maneira de lidar com os fatos básicos sobre produtos cartesianos é jogar com a definição “debaixo do braço”. Vejamos alguns:

<sup>†</sup>Pois elas escolhem um elemento  $f(i)$  em cada  $X_i$  conforme  $i$  varia no conjunto de índices  $\mathcal{I}$ .

<sup>‡</sup>Seria *mais correto* dizer que  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é o produto cartesiano de  $(X_i : i \in \mathcal{I})$ , mas ninguém se importa.

<sup>††</sup>Ocasionalmente, algumas equivalências do Axioma da Escolha ou de versões mais fracas serão discutidas, mas só por diversão.

- se  $B_i \subseteq X_i$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então  $B := \prod_{i \in \mathcal{I}} B_i \subseteq \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i := X$ , pois se uma  $\mathcal{I}$ -upla  $f := (f_i)_{i \in \mathcal{I}}$  pertence ao conjunto  $B$ , então  $f_i \in B_i \subseteq X_i$ , logo  $f \in X$ ;
- por outro lado, um subconjunto de  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  não precisa ser da forma acima, como as bolas típicas de  $\mathbb{R}^2$  já nos ensinam desde tempos imemoriais;
- em geral,  $(\prod_{i \in \mathcal{I}} A_i) \cap (\prod_{i \in \mathcal{I}} B_i) = \prod_{i \in \mathcal{I}} (A_i \cap B_i)$ , pois uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(c_i)_{i \in \mathcal{I}}$  habita a interseção dos dois produtos cartesianos sse  $c_i \in A_i \cap B_i$  para todo  $i$ ;
- com a notação de suporte introduzida em (2.8) (pág. 81), verifica-se

$$B := \prod_{i \in \mathcal{I}} B_i = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \pi_i^{-1}[B_i] = \bigcap_{i \in \text{supp}(B)} \pi_i^{-1}[B_i],$$

independentemente da cardinalidade do suporte, pois

$$\begin{aligned} x := (x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \prod_{i \in \mathcal{I}} B_i &\Leftrightarrow \forall i \in \mathcal{I} \quad x_i \in B_i \Leftrightarrow \forall i \in \mathcal{I} \quad x \in \pi_i^{-1}[B_i] \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \forall i \in \text{supp}(B) \quad x \in \pi_i^{-1}[B_i], \end{aligned}$$

onde  $(\Leftrightarrow)$  na última equivalência segue pois  $\pi_j^{-1}[X_j] = \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  para qualquer índice  $j \in \mathcal{I} \setminus \text{supp}(B)$ .

Mesmo situações aparentemente mais complexas, como os malabarismos realizados na vindoura Subseção 3.1.2, seguem com argumentos *by the book* análogos ao que se fez acima. Por essa razão, casos semelhantes ficarão por sua conta.

Falta pouca coisa para encerrar esta revisão. A principal se dá na próxima

**Proposição 2.2.3** (Propriedade universal de  $\prod_{i \in \mathcal{I}}$ ). *Se  $X$  é um conjunto munido de uma função  $f_i: X \rightarrow X_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ , então existe uma única função  $F: X \rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  satisfazendo  $\pi_j \circ F = f_j$  para todo  $j \in \mathcal{I}$ .*

*Demonstração.* Fixado  $x \in X$ , a função  $F$  deve associar tal objeto a uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$ . Dado que se espera  $\pi_j \circ F = f_j$  para todo  $j \in \mathcal{I}$ , deve-se ter  $x_j = \pi_j(F(x)) = f_j(x)$ , mostrando que a função  $F$  procurada é dada por  $F(x) = (f_i(x))_{i \in \mathcal{I}}$ . Os detalhes ficam por sua conta  $(\star)$ .  $\square$

**Definição 2.2.4.** Quando precisarmos dar um nome para a função  $F$  acima, diremos que se trata do **produto (diagonal)** das funções  $f_i$ , que será denotado por  $(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$ .  $\P$

Supondo que para cada  $i \in \mathcal{I}$  se tenha uma função  $g_i: X_i \rightarrow Y_i$  fixada, define-se ainda

$$\prod_{i \in \mathcal{I}} g_i: \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i \quad (2.10)$$

que a cada  $\mathcal{I}$ -upla  $(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$  de  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  associa a  $\mathcal{I}$ -upla  $(g_i(x_i))_{i \in \mathcal{I}}$  de  $\prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i$ . Naturalmente, ela se obtém da propriedade universal com  $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  e  $f_i := \pi_i \circ g_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ . Esta sim é chamada de **produto (cartesiano)** das funções  $g_i$ .

Por fim, note que se  $X_i = X$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$  em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é apenas uma função  $f: \mathcal{I} \rightarrow \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i = X$ , que a cada  $i \in \mathcal{I}$  associa  $f_i$ . Consequentemente,  $\text{Fun}(\mathcal{I}, X) = \prod_{i \in \mathcal{I}} X$ . Em particular, neste caso,  $\pi_j(f) = f(j)$  para todo índice  $j \in \mathcal{I}$  e toda função  $f \in \text{Fun}(\mathcal{I}, X)$ , mostrando que as projeções são as avaliações nos pontos de  $\mathcal{I}$ . Futuramente, a própria *avaliação*

$$\text{Fun}(\mathcal{I}, X) \times \mathcal{I} \rightarrow X$$

será importante, mas isto pode esperar. Se precisar, implemente exemplos com conjuntos de índices pequenos a fim de perceber o que está acontecendo  $(\star)$ .

### 2.2.2 A linguagem de categorias: objetos universais e dualidade

AVISO: a presente subseção dá prosseguimento à introdução iniciada na Subseção 1.2.3.

**Definição 2.2.5.** Diremos que um objeto  $u$  de uma categoria  $\mathcal{C}$  é **universal** se uma das duas condições a seguir for satisfeita:

- (i) para todo objeto  $c$  de  $\mathcal{C}$  existe uma única seta  $i_c: u \rightarrow c$ , caso em que  $u$  é dito ser **objeto inicial** de  $\mathcal{C}$ ;
- (ii) para todo objeto  $c$  de  $\mathcal{C}$  existe uma única seta  $f_c: c \rightarrow u$ , caso em que  $u$  é dito ser **objeto final** de  $\mathcal{C}$ .  $\blacksquare$

Parece inofensiva, certo?

**Exercício 2.2.1** ( $\star$ ). Pratique!

- a) Mostre que  $\emptyset$  é objeto inicial em SET e, para qualquer  $x$ ,  $\{x\}$  é objeto final em SET.
- b) Mostre que  $\mathbb{Z}$  é objeto inicial de CRING, enquanto o anel trivial  $\{0\}$  é objeto final da mesma categoria<sup>†</sup>.
- c) Mostre que  $\{0\}$  é, simultaneamente, objeto inicial e final da categoria dos espaços vetoriais sobre um corpo fixado.
- d) (Cf. Exemplo 1.2.41) Numa ordem parcial  $\mathbb{P}$ , mostre que  $p \in \mathbb{P}$  é objeto final sse  $p = \max \mathbb{P}$ . Analogamente,  $p$  é objeto inicial sse  $p = \min \mathbb{P}$ .  $\blacksquare$

Objetos universais generalizam diversos tipos de construção comuns em Matemática Abstrata, ao mesmo tempo em que nos eximem de perder tempo provando um fato bastante corriqueiro.

**Teorema 2.2.6.** *Sejam  $a$  e  $b$  objetos de  $\mathcal{C}$ , com  $a$  inicial em  $\mathcal{C}$ . Então  $b$  é objeto inicial de  $\mathcal{C}$  se, e somente se,  $a$  e  $b$  são  $\mathcal{C}$ -isomorfos.*

*Demonstração.* Se  $a$  e  $b$  são iniciais, então existem únicas setas  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow a$ , donde segue que  $f \circ g$  é uma seta da forma  $b \rightarrow b$ , enquanto  $g \circ f$  é uma seta da forma  $a \rightarrow a$ . Por outro lado, sempre que  $u$  é universal,  $\text{id}_u: u \rightarrow u$  é a única seta nesse formato possível (certo?)<sup>\*</sup>, acarretando  $f \circ g = \text{id}_b$  e  $g \circ f = \text{id}_a$ , i.e.,  $a$  e  $b$  são isomorfos.

Reciprocamente, seja  $\psi: b \rightarrow a$  um isomorfismo. Para  $c \in \text{Obj}(\mathcal{C})$  fixado, a hipótese de  $a$  ser inicial diz que existe uma única seta  $h: a \rightarrow c$  e, consequentemente,  $h \circ \psi$  é uma seta da forma  $b \rightarrow c$ . Se  $h': b \rightarrow c$  é outra seta, então  $h' \circ \psi^{-1}$  é uma seta da forma  $a \rightarrow c$ , que deve ser igual a  $h$  por  $a$  ser objeto inicial. Logo,

$$h' \circ \psi^{-1} = h \Rightarrow (h' \circ \psi^{-1}) \circ \psi = h \circ \psi \Rightarrow h' = h \circ \psi,$$

mostrando que  $h \circ \psi$  é a única seta da forma  $b \rightarrow c$ , como queríamos.  $\square$

É claro que a versão análoga da proposição acima, obtida da substituição do termo “inicial” por “final”, ainda é verdadeira. Você pode provar isso diretamente ou apelar para o *Princípio da Dualidade*, que discutiremos abaixo.

<sup>†</sup>Se estiver confortável com anéis não comutativos, faça para RING.

**Definição 2.2.7.** Fixada uma categoria  $\mathcal{C}$ , vamos definir uma “nova” categoria, denotada por  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  e chamada de **categoria dual** (ou **oposta**) a  $\mathcal{C}$ , cujos objetos e setas são os mesmos de  $\mathcal{C}$ , a menos da orientação das setas:

- $\text{Obj}(\mathcal{C}^{\text{op}}) := \text{Obj}(\mathcal{C})$ ;
- cada seta  $a \xrightarrow{f} b$  de  $\mathcal{C}$  determina a seta  $b \xrightarrow{f^{\text{op}}} a$  de  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ , denotada apenas por  $f^{\text{op}}$ , de modo que  $(\bullet)^{\text{op}}: \text{Arr}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Arr}(\mathcal{C}^{\text{op}})$  seja uma *bijecção*;
- dadas setas  $c \xrightarrow{f^{\text{op}}} b$  e  $b \xrightarrow{g^{\text{op}}} a$  de  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ , a composição entre elas é  $g^{\text{op}} \circ f^{\text{op}} := (f \circ g)^{\text{op}}$ , o que faz sentido pois a composta  $f \circ g: a \rightarrow b \rightarrow c$  está definida em  $\mathcal{C}$ .  $\blacksquare$

A ideia é bem mais simples do que sua descrição formal sugere:  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  consiste precisamente da categoria  $\mathcal{C}$ , salvo pela troca de cada seta da forma  $a \xrightarrow{f} b$  (nativa de  $\mathcal{C}$ ) por uma da forma  $b \xrightarrow{f^{\text{op}}} a$  (típica de  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ ). Você faz isso todas as vezes em que decide escrever  $b \geq a$  em vez de  $a \leq b$ : sim,  $(\mathbb{P}, \geq)$  é a categoria dual de  $(\mathbb{P}, \leq)$ .

Em particular, ao se tomar a categoria oposta de uma categoria  $\mathcal{C}$ , há um funtor contravariante implícito,  $\bullet^{\text{op}}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ , que faz  $\bullet^{\text{op}}(c) := c$  para cada objeto  $c \in \text{Obj}(\mathcal{C})$  e  $\bullet^{\text{op}}(f) := f^{\text{op}}$  para cada seta  $f \in \text{Arr}(\mathcal{C})$ . Logo, pode-se dizer alternativamente que  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  é um funtor contravariante se  $F \circ \bullet^{\text{op}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$  for um funtor covariante.

Por falta de mais espectros políticos, dualizar uma categoria duas vezes *retorna* a categoria original, i.e., vale a *igualdade*  $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$  para qualquer categoria  $\mathcal{C}$ . Consequentemente, ao se provar uma afirmação  $P$  a respeito de categorias arbitrárias, prova-se de maneira automática a *afirmação dual* de  $P$ , fenômeno que costuma ser chamado de **Princípio da Dualidade**.

Consideremos, por exemplo, a afirmação do último teorema: “se  $a, b \in \text{Obj}(\mathcal{C})$  e  $a$  é objeto inicial de  $\mathcal{C}$ , então  $b$  é objeto inicial de  $\mathcal{C}$  se, e somente se,  $a \simeq_{\mathcal{C}} b$ ”. Simbolicamente, ela pode ser abreviada como segue:

$$\forall a, b \in \text{Obj}(\mathcal{C}) \left( \underbrace{\left( \forall z \in \text{Obj}(\mathcal{C}) \exists! f: a \rightarrow z \right)}_{a \text{ é inicial em } \mathcal{C}} \right) \Rightarrow \left( \underbrace{\left( \forall z \in \text{Obj}(\mathcal{C}) \exists! g: b \rightarrow z \right)}_{b \text{ é inicial em } \mathcal{C}} \right) \Leftrightarrow a \simeq_{\mathcal{C}} b. \quad (2.11)$$

Supondo a validade da sentença acima para uma categoria qualquer, ela deve valer, em particular, para  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ . Ao reescrever em  $\mathcal{C}$  a conclusão aferida em  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ , obtém-se

$$\forall a, b \in \text{Obj}(\mathcal{C}) \left( \underbrace{\left( \forall z \in \text{Obj}(\mathcal{C}) \exists! f: z \rightarrow a \right)}_{a \text{ é final em } \mathcal{C}} \right) \Rightarrow \left( \underbrace{\left( \forall z \in \text{Obj}(\mathcal{C}) \exists! g: z \rightarrow b \right)}_{b \text{ é final em } \mathcal{C}} \right) \Leftrightarrow a \simeq_{\mathcal{C}} b. \quad (2.12)$$

Essencialmente isso mostra que  $\forall \mathcal{C} \text{ (2.11)} \Rightarrow \forall \mathcal{C} \text{ (2.12)}$ . Se optássemos por assumir (2.12) para toda categoria  $\mathcal{C}$ , a repetição do argumento acima na *direção oposta* levaria a (2.11), mostrando a recíproca da implicação anterior e, por conseguinte, garantindo

$$\forall \mathcal{C} \text{ (2.11)} \Leftrightarrow \forall \mathcal{C} \text{ (2.12)}.$$

Sintaticamente, a única diferença entre as duas sentenças é a direção das setas. Grosso modo, dada uma sentença  $P$  na *linguagem de categorias*, pode-se denotar por  $P^{\text{op}}$  a sentença obtida a partir de  $P$  por meio da “inversão” de todas as setas que ocorrem na sentença  $P$ , frequentemente xingada de **sentença dual** de  $P$ . Consequentemente,

$$\mathcal{C} \models P \Leftrightarrow \mathcal{C}^{\text{op}} \models P^{\text{op}},$$


i.e.,  $\mathcal{C}$  satisfaz  $P$  sse sua categoria oposta satisfaz a condição dual  $P^{\text{op}}$ .

De volta aos objetos universais:

**Exemplo 2.2.8** (Produtos). Fixada uma categoria  $\mathcal{C}$ , sejam  $\mathcal{I}$  um conjunto de índices e  $\varphi := (\varphi(i))_{i \in \mathcal{I}}$  uma  $\mathcal{I}$ -upla de objetos de  $\mathcal{C}$ . Com tais informações, vamos definir uma nova categoria  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$ :

- seus objetos são  $\mathcal{I}$ -uplas  $\left(x \xrightarrow{f_i} \varphi(i)\right)_{i \in \mathcal{I}}$ , com  $f_i \in \text{Arr}(\mathcal{C})$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ ;
- um morfismo  $p: \left(x \xrightarrow{f_i} \varphi(i)\right)_{i \in \mathcal{I}} \rightarrow \left(y \xrightarrow{g_i} \varphi(i)\right)_{i \in \mathcal{I}}$  é uma seta  $p: x \rightarrow y$  de  $\mathcal{C}$  tal que  $g_i \circ p = f_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ .


Intuitivamente, cada objeto de  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$  é um objeto  $x$  de  $\mathcal{C}$  munido de uma seta  $f_i: x \rightarrow \varphi(i)$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ : quando  $\mathcal{I} := \{0, 1\}$ , por exemplo, convém denotar seus objetos como no diagrama abaixo (à esquerda),



o que (in)felizmente não pode ser repetido da mesma forma para um conjunto  $\mathcal{I}$  qualquer.

Porém, há um paliativo interessante: pode-se representar um elemento de  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$  como no diagrama anterior (ao centro) com a ressalva de que  $i \in \mathcal{I}$  é qualquer. Uma vantagem imediata dessa abordagem estética está no entendimento de que um morfismo entre dois objetos  $x$  e  $y$  de  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$  é apenas uma seta  $p: x \rightarrow y$  em  $\mathcal{C}$  tal que o diagrama acima (à direita) seja comutativo para todo  $i \in \mathcal{I}$ .

Isso permite intuir de modo quase fácil que a composição usual de setas em  $\mathcal{C}$  serve como *lei de composição* em  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$ . Mais precisamente, para setas  $p: x \rightarrow y$  e  $q: y \rightarrow z$  de  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$ , consideramos o diagrama



Como ambos os “triângulos” acima são comutativos, i.e.,  $g_i \circ p = f_i$  e  $h_i \circ q = g_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ , segue que o “triângulo” maior é comutativo, ou seja,  $h_i \circ (q \circ p) = f_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ , mostrando que  $q \circ p$  é uma seta legítima entre os objetos  $x$  e  $z$  de  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$ . A verificação de que isso dá uma composição fidedigna, com identidades e associatividade, torna-se então um exercício simples  $(\star)$ .

Um objeto final na categoria  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$  deve ser uma  $\mathcal{I}$ -upla  $\left(u \xrightarrow{p_i} \varphi(i)\right)_{i \in \mathcal{I}}$  tal que para todo objeto  $\left(x \xrightarrow{f_i} \varphi(i)\right)_{i \in \mathcal{I}}$  de  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$  exista um único morfismo  $p: x \rightarrow u$  nas condições acima. Em particular, qualquer outra  $\mathcal{I}$ -upla  $\left(u' \xrightarrow{p'_i} \varphi(i)\right)_{i \in \mathcal{I}}$  final deve ser  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$ -isomorfa a  $\left(u \xrightarrow{p_i} \varphi(i)\right)_{i \in \mathcal{I}}$ , o que assegura que os objetos  $u$  e  $u'$  são  $\mathcal{C}$ -isomorfos (certo?) $\star$ . Já vimos isso antes, não é mesmo?



- Ao substituir  $\mathcal{C}$  por SET, o produto cartesiano  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$ , junto com as projeções, é objeto final da categoria  $(\text{SET} \rightarrow \varphi)$  (cf. Proposição 2.2.3, com  $\varphi(i) := X_i$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ ).
- Ao substituir  $\mathcal{C}$  por TOP, o produto  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$ , com a topologia produto e as projeções, é objeto final de  $(\text{TOP} \rightarrow \varphi)$ .
- Ao substituir  $\mathcal{C}$  por DIR, a **categoria dos conjuntos dirigidos**<sup>†</sup>, o produto  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$  com a relação  $\preceq$  em que  $(f_i)_i \preceq (g_i)_i$  sse  $f_i \preceq_i g_i$  para todo  $i$ , é objeto final de  $(\text{DIR} \rightarrow \varphi)$ .
- Ao substituir  $\mathcal{C}$  por GROUP, etc.

Nem sempre uma categoria  $\mathcal{C}$  é tal que  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$  admite objetos finais. No entanto, em diversas situações positivas, esses objetos finais são realizados por produtos. Por essa razão, um objeto final da categoria  $(\mathcal{C} \rightarrow \varphi)$ , chamado de **produto categorial** dos objetos  $\varphi(i)$ , costuma ser denotado por  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$ . Em tempo, note que apesar de tal notação enfatizar o *objeto*  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$ , a  $\mathcal{I}$ -upla de setas  $(\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i) \rightarrow \varphi(j))_{j \in \mathcal{I}}$  também faz parte da informação. ▲

**Exercício 2.2.2** (\*). Para um conjunto  $\mathcal{I}$  fixado, suponha que uma categoria  $\mathcal{C}$  admita o produto  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$  para qualquer  $\mathcal{I}$ -upla  $(\varphi(i))_{i \in \mathcal{I}}$  de objetos de  $\mathcal{C}$ .

- Mostre que se  $\varphi(i)$  e  $\psi(i)$  forem  $\mathcal{C}$ -isomorfos para cada  $i \in \mathcal{I}$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$  e  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \psi(i)$  também são  $\mathcal{C}$ -isomorfos.
- Mostre que se  $X_i$  e  $Y_i$  são espaços topológicos homeomorfos, então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  e  $\prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i$  são homeomorfos.
- Sejam  $\mathcal{J}$  um conjunto munido de uma bijeção  $\rho: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{J}$ . Mostre que se  $(\psi(j))_{j \in \mathcal{J}}$  é uma  $\mathcal{J}$ -upla tal que  $\varphi(i)$  e  $\psi(\rho(i))$  são  $\mathcal{C}$ -isomorfos para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então o produto  $\prod_{j \in \mathcal{J}} \psi(j)$  existe em  $\mathcal{C}$  e, mais ainda, é  $\mathcal{C}$ -isomorfo a  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \varphi(i)$ . Dica: mostre que o último tem a propriedade universal que caracteriza o primeiro.
- Supondo  $\mathcal{I}$  e  $\mathcal{J}$  como no item anterior, mostre que se  $X_i$  e  $Y_{\rho(i)}$  são espaços homeomorfos para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  e  $\prod_{j \in \mathcal{J}} Y_j$  são espaços homeomorfos.
- Para espaços topológicos  $X$  e  $Y$  quaisquer, mostre que  $X \times Y$  e  $Y \times X$  são homeomorfos. ■

Futuramente, essa perspectiva categórica guiará a descrição de outras construções topológicas, como limites e colimites de espaços topológicos, o que incluirá as noções de quocientes (duais da inclusão!) e coprodutos (duais do produto!).

### 2.2.3 Um pouco mais sobre filtros

Mesmo que *filtros de conjuntos* (cf. Subseção 2.2.3 §4) tenham a mesma “ordem de complexidade” das topologias, i.e., são coleções de subconjuntos de um conjunto, manipulá-los exige uma dose adicional de malícia, o que não ocorre com topologias, posto que elas costumam permanecer fixas ao longo dos problemas. Nesta subseção, você encontrará alguns truques que, possivelmente, ajudarão a lidar com eles.

<sup>†</sup>Objetos são conjuntos dirigidos. Setas são funções crescentes e cofinais (cf. Exemplo 3.1.31).

## §1 O que filtros filtram?

RESPOSTA: conjuntos grandes, *em algum sentido*.

Um pouco mais precisamente, chamando de “grandes” os elementos de um filtro próprio  $\mathcal{F}$  num conjunto  $X$ :

- o subconjunto  $\emptyset$  não é grande, já que  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ , ao passo que  $X$  é grande, pois  $X \in \mathcal{F}$ ;
- se dois subconjuntos são grandes, então a interseção entre eles ainda é grande;
- um subconjunto que contém um subconjunto grande é grande.

**Exemplo 2.2.9.** A coleção dos subconjuntos *cofinitos*<sup>†</sup> de um conjunto infinito  $X$  exemplifica bem essa ideia:  $X$  é cofinito pois  $X \setminus X = \emptyset$ ; se  $A$  e  $B$  são subconjuntos cofinitos de  $X$ , então  $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$  é uma reunião de dois conjuntos finitos; por fim, se  $C$  é cofinito em  $X$  e  $C \subseteq D \subseteq X$ , então  $X \setminus D \subseteq X \setminus C$ . ▲

Pelo menos três perguntas *podem* estar te incomodando agora:

- o que generaliza os subconjuntos pequenos?
- não ser grande = ser pequeno?
- (mais importante) as vizinhanças de um ponto  $p$  não deveriam ser conjuntos *pequenos*, que se *aproximam* de  $p$ ?

A resposta de (i) se baseia no *princípio* de que “ $S$  é grande sse  $X \setminus S$  é pequeno”, uma das portas de entrada para o conceito de *ideais de conjuntos* (cf. Exercício 2.2.11). Sob tal princípio, “não ser grande = não pertencer ao filtro”, enquanto “ser pequeno = o complementar pertencer ao filtro”. Portanto, para que a resposta de (ii) seja “sim”, o filtro  $\mathcal{F}$  deve ser tal que  $S \notin \mathcal{F} \Leftrightarrow X \setminus S \in \mathcal{F}$ , algo que nem sempre ocorre.

**Exercício 2.2.3** (\*). Para  $X$  infinito, mostre que existe  $S \subseteq X$  tal que tanto  $S$  quanto  $X \setminus S$  não pertencem ao filtro dos subconjuntos cofinitos de  $S$ . Opcional (\*): se parecer difícil demais, suponha  $X$  infinito enumerável. ■

Os filtros que tornam a resposta de (ii) afirmativa podem ser chamados de *filtros primos* por pessoas preciosistas, mas na prática eles *já recebem* outro nome: são os *ultrafiltros*, tema da subsubseção §3. Por ora, convém dar mais atenção ao problema (iii): como sempre acontece nas metáforas em Matemática Abstrata, o segredo está no fato de que “em algum sentido” não significa “em todos os sentidos”.

No caso, para um espaço topológico  $X$  e um ponto  $p$ , o filtro de vizinhanças de  $p$  tem como membros os subconjuntos de  $X$  que são “grandes o suficiente” para servirem como testemunhas de convergência para  $p$ . Em outras palavras, trata-se de uma noção de grandeza *qualitativa*. Quando a topologia é oriunda de uma métrica, ganha-se mais uma ideia de grandeza, desta vez de natureza numérica, incompatível com a anterior<sup>‡</sup>. *C’est la vie*.

<sup>†</sup>Aqueles cujo complementar é finito.

<sup>‡</sup>Fenômeno semelhante ocorre com as noções de cardinalidade e medida. No sentido usual, por exemplo,  $[0, 1]$  é um subconjunto de  $\mathbb{R}$  com medida finita, mas cuja cardinalidade é infinita. O jogo segue.

## §2 Ordenando filtros

Quando  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  são coleções de subconjuntos de algum conjunto fixado  $X$ , temos pelo menos dois modos naturais de *comparar*  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$ : o primeiro é a inclusão de sempre, que consiste em ignorar o conjunto  $X$  e levar em consideração apenas os membros de  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  como “átomos”, afinal  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$  sse  $C \in \mathcal{B}$  sempre que  $C \in \mathcal{A}$ ; o segundo é relação de *refinamento*.

**Definição 2.2.10.** Para famílias  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  de conjuntos, diremos que  $\mathcal{B}$  é **mais fina** do que  $\mathcal{A}$  (ou que  $\mathcal{B}$  *refina*  $\mathcal{A}$ , ou que  $\mathcal{B}$  é um **refinamento** de  $\mathcal{A}$ , etc.) se para todo  $A \in \mathcal{A}$  existir  $B \in \mathcal{B}$  com  $B \subseteq A$ . Isto será abreviado com  $\mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$ . A relação inversa,  $\mathcal{B} \succeq \mathcal{A}$ , será lida como  $\mathcal{A}$  é **mais grosso** do que  $\mathcal{B}$ , ou  $\mathcal{A}$  é refinado por  $\mathcal{B}$ , etc. ◻

De modo geral, a implicação

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$$

se verifica para quaisquer famílias  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  (checou?)\*, mas a recíproca é falsa: para um exemplo minimal, considere  $X := \{0, 1\}$ ,  $\mathcal{A} := \{\{0, 1\}\}$  e  $\mathcal{B} := \{\{0\}\}$ , e note que se verifica  $\mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$ , enquanto  $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{B}$ . Sem mais hipóteses, o melhor que se pode fazer está no próximo

**Exercício 2.2.4** (★). Mostre que  $\mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$  sse  $\mathcal{A} \subseteq (\mathcal{B})^\uparrow$ . ◻

Como um filtro  $\mathcal{F}$  *trivialmente* satisfaz  $\mathcal{F} = (\mathcal{F})^\uparrow$  (certo?)\*, resulta que a relação de refinamento, quando aplicada a filtros, coincide com a inclusão:

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \Rightarrow \mathcal{F} \preceq \mathcal{G} \Rightarrow \mathcal{F} \subseteq (\mathcal{G})^\uparrow = \mathcal{G}.$$

MANTRA: quanto menores os membros do filtro, maior o filtro.

**Observação 2.2.11.** Em particular, para um filtro próprio  $\mathcal{F}$ , resulta que um subconjunto  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$  satisfaz a identidade  $(\mathcal{C})^\uparrow = \mathcal{F}$  sse  $\mathcal{C}$  é  $\supseteq$ -*cofinal*<sup>†</sup> em  $\mathcal{F}$  (verifique!)\*. Em particular, bases locais em espaços topológicos são apenas subconjuntos cofinais de filtros de vizinhanças (★). ◻

Quem tem olhos treinados certamente percebeu que há mais coisas acontecendo<sup>‡</sup>.

**Exercício 2.2.5** (★). Mostre que se  $\mathfrak{F} \neq \emptyset$  é uma família de filtros em  $X$ , então  $\bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{F}} \mathcal{F}$  é um filtro em  $X$ . Em particular, se todo  $\mathcal{F} \in \mathfrak{F}$  for próprio, então  $\bigcap \mathfrak{F}$  também é próprio. ◻

**Proposição 2.2.12.** Para uma família  $\mathcal{G}$  de subconjuntos de  $X$ , existe um filtro  $\mathcal{F}$  em  $X$  com as duas propriedades a seguir:

- (i)  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ ;
- (ii)  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}$  sempre que  $\mathcal{H}$  é filtro em  $X$  tal que  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$ .

Além disso,  $\mathcal{F}$  é próprio se, e somente se, vale a **propriedade da interseção finita** (*p.i.f.*):  $\bigcap_{I \in \mathcal{I}} I \neq \emptyset$  para qualquer subconjunto não vazio e finito  $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{G}$ .

<sup>†</sup>Numa ordem  $(\mathbb{P}, \leq)$ , um subconjunto  $C \subseteq \mathbb{P}$  é  $\leq$ -**cofinal** se para todo  $p \in \mathbb{P}$  existe  $c \in C$  com  $p \leq c$ . Logo, dizer que  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$  é  $\supseteq$ -cofinal em  $\mathcal{F}$  significa que para todo  $F \in \mathcal{F}$  existe  $C \in \mathcal{C}$  tal que  $C \subseteq F$ .

<sup>‡</sup>Quem tem olhos muito treinados já percebeu reticulados completos aqui, mas não precisaremos de toda essa tecnologia explícita.

*Demonstração.* Para a primeira parte, basta tomar  $\mathfrak{F}$  como a coleção dos filtros em  $X$  que contém  $\mathcal{G}$  e aplicar o resultado do exercício anterior, definindo  $\mathcal{F} := \bigcap_{\mathcal{H} \in \mathfrak{F}} \mathcal{H}$ . Para a segunda parte, convém *explicitar*  $\mathcal{F}$ , observando que  $F \in \mathcal{F}$  sse existem  $n \in \mathbb{N}$  e  $G_0, \dots, G_n \in \mathcal{G}$  tais que  $\bigcap_{j \leq n} G_j \subseteq F$ . Os detalhes ficam por sua conta  $(*)$ .  $\square$

**Definição 2.2.13.** Com as notações acima, indicaremos o filtro  $\mathcal{F}$  por  $(\mathcal{G})^\uparrow$ , e diremos que  $(\mathcal{G})^\uparrow$  é **gerado** pela família  $\mathcal{G}$ .  $\P$

A relação entre filtros gerados e pré-filtros é semelhante à relação entre topologias geradas e bases (confira a nota de rodapé  $\dagger$ , pág. 78). Mais precisamente, se  $\mathcal{G}$  é um pré-filtro num conjunto  $X$ , então o filtro próprio  $(\mathcal{G})^\uparrow$  é o menor filtro (próprio) a conter a família  $\mathcal{G}$  e, por conseguinte,  $(\mathcal{G})^\uparrow = (\mathcal{G})^\uparrow$ .

**Exemplo 2.2.14.** A reunião de filtros pode não ser um filtro. Afinal, se  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  são filtros em  $X$  e  $A, B \in \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ , então *pode ocorrer*  $A \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{G}$  e  $B \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$ , o que elimina as garantias de se ter  $A \cap B \in \mathcal{F}$  ou  $A \cap B \in \mathcal{G}$ . Apesar disso, podemos definir

$$\mathcal{F} \vee \mathcal{G} := (\mathcal{F} \cup \mathcal{G})^\uparrow,$$

o menor filtro a conter  $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ , que por alusão ao contexto algébrico de ideais será chamado de **soma dos filtros**  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$ .

Em consonância com o *mantra* sobre filtros,  $\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$  é gerado pelos subconjuntos da forma  $F \cap G$ , com  $F \in \mathcal{F}$  e  $G \in \mathcal{G}$ : a princípio,  $S \in \mathcal{F} \vee \mathcal{G}$  sse existem  $F_0, \dots, F_m \in \mathcal{F}$  e  $G_0, \dots, G_n \in \mathcal{G}$  tais que

$$F_0 \cap \dots \cap F_m \cap G_0 \cap \dots \cap G_n \subseteq S,$$

mas por  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  serem filtros, temos  $F_0 \cap \dots \cap F_m \in \mathcal{F}$  e  $G_0 \cap \dots \cap G_n \in \mathcal{G}$ . Consequentemente,  $\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$  é filtro próprio sse  $F \cap G \neq \emptyset$  para quaisquer  $F \in \mathcal{F}$  e  $G \in \mathcal{G}$ .

Com isso, a definição do filtro  $\mathcal{F} := (\mathcal{H})^\uparrow$  na demonstração do Teorema 2.1.31 deve soar menos esotérica agora: com as notações atuais, temos  $\mathcal{F} = \mathcal{N}_x \vee \mathcal{N}_y$ , um filtro que por construção satisfaz  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}$  e  $\mathcal{N}_y \subseteq \mathcal{F}$ , algo perfeitamente natural para o contexto do argumento. Analogamente, o filtro  $\mathcal{G}$  da Observação 2.1.41 é  $\mathcal{N}_p \vee \{X \setminus A\}$ .  $\blacktriangle$

**Exercício 2.2.6**  $(*)$ . Descreva geradores para o filtro  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ . Generalize  $(**)$ .  $\blacksquare$

### §3 Filtros maximais

A discussão iniciada nesta subseção sugeriu investigar os filtros (próprios)  $\mathcal{F}$  num conjunto  $X$  que satisfazem a condição

$$S \notin \mathcal{F} \Leftrightarrow X \setminus S \in \mathcal{F}$$

para qualquer subconjunto  $S \subseteq X$ .

Um primeiro ponto a observar é o seguinte: se a condição acima *falha* para algum subconjunto não vazio  $S \subseteq X$ , então existem (pelo menos) *dois* filtros *melhores* do que  $\mathcal{F}$  que resolvem o problema com relação a  $S$ . Com efeito, para que a condição falhe, deve-se ter tanto  $S \notin \mathcal{F}$  quanto  $X \setminus S \notin \mathcal{F}$ , pois a ocorrência simultânea de  $S \in \mathcal{F}$  e  $X \setminus S \in \mathcal{F}$  é impedida por termos  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ . Logo, por filtros serem *fechados para cima*, não pode existir  $F \in \mathcal{F}$  satisfazendo  $F \subseteq S$  ou  $F \subseteq X \setminus S$ . Consequentemente  $F \cap (X \setminus S) \neq \emptyset$  e  $F \cap S \neq \emptyset$  para todo  $F \in \mathcal{F}$  (entendeu?) $^*$ . Em outras palavras,  $\mathcal{G}_0 := \mathcal{F} \cup \{X \setminus S\}$  e  $\mathcal{G}_1 := \mathcal{F} \cup \{S\}$  têm a p.i.f. e, portanto,  $\mathcal{F}_0 := (\mathcal{G}_0)^\uparrow$  e  $\mathcal{F}_1 := (\mathcal{G}_1)^\uparrow$  são filtros próprios que contêm  $\mathcal{F}$  (são *melhores*) e resolvem o problema criado por  $S$ :  $X \setminus S \in \mathcal{F}_0$  e  $S \notin \mathcal{F}_0$ , enquanto  $S \in \mathcal{F}_1$  e  $X \setminus S \notin \mathcal{F}_1$ .

Um segundo ponto a observar é o seguinte: se a condição falha para  $\mathcal{F}_0$  ou  $\mathcal{F}_1$ , então...

**Teorema 2.2.15.** *Para um filtro próprio  $\mathcal{F}$  num conjunto  $X$ , são equivalentes:*

- (i) (*dicotomia*) para todo  $S \subseteq X$ , tem-se  $S \in \mathcal{F}$  ou  $X \setminus S \in \mathcal{F}$ ;
- (ii) (*maximalidade*)  $\mathcal{F} = \mathcal{G}$  para qualquer filtro próprio  $\mathcal{G}$  em  $X$  satisfazendo  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ ;
- (iii) (*primalidade*) para quaisquer  $A, B \subseteq X$ ,  $A \cup B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \in \mathcal{F}$  ou  $B \in \mathcal{F}$ .

*Demonstração.* A implicação (i)  $\Rightarrow$  (ii) segue, pela contrapositiva, com o argumento que antecede o enunciado: se  $\mathcal{F} \subsetneq \mathcal{G}$  para um filtro próprio  $\mathcal{G}$ , então existe  $G \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$ , mas disto segue que  $X \setminus G \notin \mathcal{F}$ . Para (ii)  $\Rightarrow$  (iii), note que se  $A \notin \mathcal{F}$ , então  $\mathcal{H} := \mathcal{F} \cup \{X \setminus A\}$  tem a p.i.f. (certo?)<sup>\*</sup>, e daí  $\mathcal{G} := (\mathcal{H})^\uparrow$  é filtro próprio com  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ , donde (ii) acarreta  $\mathcal{F} = \mathcal{G}$  e  $X \setminus A \in \mathcal{F}$ . Analogamente, se  $B \notin \mathcal{F}$ , então a condição (ii) obriga que se tenha  $X \setminus B \in \mathcal{F}$ . Dessa forma, se  $A, B \notin \mathcal{F}$ , então  $X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{F}$ , donde segue que  $(X \setminus A) \cap (X \setminus B) = X \setminus (A \cup B) \in \mathcal{F}$  e, portanto,  $A \cup B \notin \mathcal{F}$ , provando (iii)<sup>†</sup>. Finalmente, assumindo (iii), se ocorrer  $S \notin \mathcal{F}$ , então da identidade  $X = S \cup (X \setminus S)$ , a suposição de (iii) garante que  $X \setminus S \in \mathcal{F}$ .  $\square$

**Exercício 2.2.7** (\*). Mostre que se  $\mathcal{F}$  é filtro próprio em  $X$  satisfazendo qualquer uma das condições anteriores e  $S \subseteq X$  é tal que  $S \cap F \neq \emptyset$  para todo  $F \in \mathcal{F}$ , então  $S \in \mathcal{F}$ . ■

Filtros com as propriedades acima são chamados de **ultrafiltros**. Por questões logísticas, o *problema* da existência de ultrafiltros só será abordado na Subseção 3.1.1 §3 (cf. Afirmação 3.1.26). Por aqui, exploraremos algumas particularidades oriundas da maximalidade que serão úteis nos próximos capítulos.

Apesar do que se mencionou acima, é bastante fácil dar exemplos *triviais* de ultrafiltros, o que inclusive já foi feito (cf. Exercício 2.1.13): para um elemento  $p$  de um conjunto  $X$ ,  $\text{ult}(p) := \{A \subseteq X : p \in A\}$  é um ultrafiltro (pela dicotomia), chamado de **ultrafiltro principal**<sup>‡</sup> (sobre  $p$ ).

A fim de que um ultrafiltro  $\mathfrak{u}$  em  $X$  não seja principal, deve-se ter  $\mathfrak{u} \neq \text{ult}(p)$  para todo  $p \in X$ , i.e.,  $\{p\} \notin \mathfrak{u}$  para todo  $p \in X$  (de acordo?)<sup>\*</sup>. Consequentemente<sup>††</sup>,  $\mathfrak{u}$  não é principal sse  $F \notin \mathfrak{u}$  qualquer que seja o subconjunto finito  $F \subseteq X$ . Em linguagem técnico, acabamos de mostrar que ultrafiltros não principais são *livres*. O **núcleo** de um filtro próprio  $\mathcal{F}$ , denotado por  $\ker \mathcal{F}$ , é a interseção de seus membros, i.e.,  $\ker \mathcal{F} := \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ , e dizemos que  $\mathcal{F}$  é **livre** se seu núcleo é vazio.

**Proposição 2.2.16** (Opcional, mas nem tanto). *Um filtro próprio  $\mathcal{F}$  em  $X$  é livre se, e somente se,  $X \setminus G \in \mathcal{F}$  para todo subconjunto finito  $G \subseteq X$ .*

*Demonstração.* Se  $X \setminus G \notin \mathcal{F}$  para algum subconjunto finito  $G \subseteq X$ , então  $F \cap (X \setminus G) \neq \emptyset$  para todo  $F \in \mathcal{F}$ , e daí  $G \cap \ker \mathcal{F} \neq \emptyset$ : caso contrário, para todo  $x \in G$  existe  $F_x \in \mathcal{F}$  tal que  $x \notin F_x$ , mas então  $F := \bigcap_{x \in G} F_x \in \mathcal{F}$  e  $G \cap F = \emptyset$  (verifique!)<sup>\*</sup>. A recíproca é quase automática: se  $p \in \ker \mathcal{F}$ , então  $X \setminus \{p\} \notin \mathcal{F}$  pois  $p \notin X \setminus \{p\}$ .  $\square$

**Exercício 2.2.8** (\*). Mostre que um ultrafiltro não é principal sse é livre. ■

<sup>†</sup>Atenção: note que cada uma das condições é, por si só, uma implicação. No caso, (iii) é a implicação “ $A \cup B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \in \mathcal{F}$  ou  $B \in \mathcal{F}$ ”, que provamos ser válida pela contrapositiva. Isto não deveria ser um problema nesta altura do campeonato.

<sup>‡</sup>Lembra de ideais principais? Pois bem, é a mesma ideia.

<sup>††</sup>E você pode se convencer mais facilmente pela contrapositiva (faça isso!)<sup>\*</sup>.



No dia a dia, são os ultrafiltros livres que realmente interessam. Apesar disso, como a existência deles depende do Axioma da Escolha (cf. Afirmação 3.1.26), é *impossível* descrever qualquer um deles explicitamente<sup>†</sup>. Por falar em dia a dia, os dois próximos resultados serão úteis em breve:

**Proposição 2.2.17.** *Se  $X$  é um espaço topológico e  $\mathfrak{u}$  é um ultrafiltro em  $X$ , então*

$$\lim \mathfrak{u} = \bigcap_{A \in \mathfrak{u}} \overline{A} = \bigcap \{F \in \mathfrak{u} : F \text{ é fechado}\}. \quad (2.13)$$

*Demonstração.* Como  $\mathfrak{u}$  é fechado para cima, resulta que os conjuntos  $\{\overline{A} : A \in \mathfrak{u}\}$  e  $\{F \in \mathfrak{u} : F \text{ é fechado}\}$  são iguais (percebeu?)<sup>\*</sup>, acarretando a segunda igualdade. Para a primeira igualdade, note que ocorre  $x \notin \lim \mathfrak{u}$  sse existe um aberto  $U \subseteq X$  com  $x \in U$  e  $U \notin \mathfrak{u}$ , donde o restante segue pela *dicotomia* de  $\mathfrak{u}$  (por quê?)<sup>\*</sup>.  $\square$

**Corolário 2.2.18.** *Se  $\mathcal{B}$  é uma sub-base para a topologia de  $X$  e  $\mathfrak{u}$  é ultrafiltro em  $X$ , então  $\lim \mathfrak{u} = \bigcap \{F \in \mathfrak{u} : X \setminus F \in \mathcal{B}\}$ .*

*Demonstração.* Temos  $\{F \in \mathfrak{u} : X \setminus F \in \mathcal{B}\} \subseteq \{F \in \mathfrak{u} : F \text{ é fechado}\}$ , de modo que a inclusão “ $\subseteq$ ” segue da proposição anterior. Para “ $\supseteq$ ”, note que se  $x \notin \lim \mathfrak{u}$ , então existe um aberto  $V \subseteq X$  com  $x \in V$  e  $V \notin \mathfrak{u}$ . Por  $\mathcal{B}$  ser sub-base, existem  $B_0, \dots, B_n \in \mathcal{B}$  com  $x \in \bigcap_{i \leq n} B_i \subseteq V$ . Logo,  $\bigcap_{i \leq n} B_i \notin \mathfrak{u}$ , donde a dicotomia de  $\mathfrak{u}$  implica em

$$X \setminus \bigcap_{i \leq n} B_i = \bigcup_{i \leq n} X \setminus B_i \in \mathfrak{u},$$

enquanto a primalidade garante que  $X \setminus B_i \in \mathfrak{u}$  para algum  $i$ , mostrando que  $B_i \in \mathcal{B}$  é testemunha de que  $x \notin \bigcap \{F \in \mathfrak{u} : X \setminus F \in \mathcal{B}\}$ .  $\square$

Para encerrar esta primeira discussão sobre ultrafiltros, vamos ver que a *recursão* sugerida implicitamente antes do Teorema 2.2.15 poderia não terminar em enumeráveis passos.

**Teorema 2.2.19.** *Seja  $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência crescente de filtros livres sobre um conjunto  $X$ . Se nenhum  $\mathcal{F}_n$  for ultrafiltro, então  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$  não é ultrafiltro. Em particular, não existe família infinita enumerável<sup>‡</sup>  $\mathcal{B}$  de subconjuntos infinitos de  $X$  tal que  $(\mathcal{B})^\uparrow$  seja ultrafiltro livre em  $X$ .*

*Demonstração*<sup>††</sup>. Primeiro, note que nada precisa ser feito se  $(\mathcal{F}_n)_n$  for *estacionária*, i.e., se existir  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_N$  para todo  $n \geq N$ , então  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n = \mathcal{F}_N$  não é ultrafiltro. Assim, com  $(\mathcal{F}_n)_n$  *não-estacionária*, podemos tomar uma *subsequência* se necessário a fim de garantir que  $\mathcal{F}_n \subsetneq \mathcal{F}_{n+1}$  para todo  $n$ . Feito isso, para cada  $n \in \mathbb{N}$ , existe  $A_n \in \mathcal{F}_{n+1} \setminus \mathcal{F}_n$ , e não há perda de generalidade em supor que  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  seja decrescente: caso contrário, pode-se substituir cada  $A_n$  por  $B_n := \bigcap_{j \leq n} A_j$ , que ainda satisfaz  $B_n \in \mathcal{F}_{n+1} \setminus \mathcal{F}_n$  pois  $\mathcal{F}_j \subseteq \mathcal{F}_n$  para  $j \leq n$  e  $B_n \subseteq A_n$  (entendeu?)<sup>\*</sup>. Definindo  $C_n := A_n \setminus A_{n+1}$  para todo  $n$ , segue que  $(C_n)_n$  é uma sequência de subconjuntos não vazios (pois...) e dois a dois disjuntos (já que...) <sup>\*</sup>.

<sup>†</sup>Nem no caso finito: encare a Proposição 2.2.16 até que ela te encare de volta.

<sup>‡</sup>Se  $\mathcal{B}$  é finito e  $\mathcal{F} = (\mathcal{B})^\uparrow$  é filtro próprio, então  $\mathcal{F}$  não é livre (certo?)<sup>\*</sup>.

<sup>††</sup>Adaptada de um argumento atribuído a Blass nessa divertida discussão, iniciada por Boaz Tsaban: <https://mathoverflow.net/q/235374/41407>.



Isto permite descrever  $X$  como a reunião

$$X = \underbrace{(X \setminus A_0)}_{S_0} \cup \underbrace{\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} C_{2k}\right)}_{S_1} \cup \underbrace{\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} C_{2k+1}\right)}_{S_2} \cup \underbrace{\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)}_{S_3} \quad (\text{por quê?})^*.$$

Se  $\mathcal{F} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$  fosse ultrafiltro, então algum dos  $S_i$ 's pertenceria a  $\mathcal{F}$ . Mas nenhum deles pode pertencer:

- $S_0 \notin \mathcal{F}$  pois  $A_0 \in \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$ ;
- $S_3 \notin \mathcal{F}$  pois, do contrário, existe  $N \in \mathbb{N}$  com  $S_3 \in \mathcal{F}_N$ , mas daí  $A_N \in \mathcal{F}_N$  por valer  $S_3 \subseteq A_N$ , contrariando a escolha de  $A_N$ ;
- se  $S_1 \in \mathcal{F}$ , então existe  $N$  ímpar tal que  $S_1 \in \mathcal{F}_N \subseteq \mathcal{F}_{N+1}$  (certo?)<sup>\*</sup>, com  $S_1 \cap C_N = \emptyset$  (pela definição de  $S_1$ ) e  $C_N = A_N \setminus A_{N+1}$ , donde segue que  $A_N \cap S_1 \subseteq A_{N+1}$  (por quê?)<sup>\*</sup> e, como  $A_N \in \mathcal{F}_{N+1}$ , resulta  $A_{N+1} \in \mathcal{F}_{N+1}$ , contrariando a escolha de  $A_{N+1}$ ;
- se  $S_2 \in \mathcal{F}$ , então existe  $N \in \mathbb{N}$  par... (conclua!)<sup>\*</sup>.

Para o restante<sup>†</sup>, note que se  $\mathcal{G} := (\mathcal{B})^\uparrow$  é filtro livre, com  $\mathcal{B}$  como no enunciado, então existe uma sequência crescente de filtros livres, digamos  $(\mathcal{G}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , tal que nenhum  $\mathcal{G}_n$  é ultrafiltro mas  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{G}_n = \mathcal{G}$ . De fato, podemos escrever  $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$  com  $B_m \subseteq B_n$  sempre que  $m \geq n$  (certo?)<sup>\*</sup>, para daí definir  $\mathcal{G}_n := \mathcal{H} \vee \{B_n\}$ , onde  $\mathcal{H}$  é o filtro dos subconjuntos cofinitos de  $X$ .

- Como  $\mathcal{G}$  é livre por hipótese, temos  $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$  e daí  $B_n \cap H \neq \emptyset$  para todo  $H \in \mathcal{H}$ . Consequentemente, cada  $\mathcal{G}_n$  é filtro livre (cf. Proposições 2.2.12 e 2.2.16).
- Explicitamente,  $S \in \mathcal{G}_n$  sse  $B_n \setminus S$  é finito, já que  $S \in \mathcal{G}_n$  sse existe um subconjunto finito  $F \subseteq X$  tal que  $B_n \cap (X \setminus F) \subseteq S$ , mas esta última inclusão equivale a  $B_n \setminus S \subseteq F$ . Logo, ao escrever  $B_n = C \cup D$ , com  $C$  e  $D$  infinitos e  $C \cap D = \emptyset$ , resulta que  $C \cup D \in \mathcal{G}_n$ , mas  $C, D \notin \mathcal{G}_n$  e, portanto,  $\mathcal{G}_n$  não é ultrafiltro (verifique os detalhes!)<sup>\*</sup>.
- Como  $B_m \subseteq B_n$  sempre que  $m \geq n$ , resulta que  $(\mathcal{G}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é crescente (percebeu?)<sup>\*</sup>.
- Se  $G \in \mathcal{G}$ , então existe  $n \in \mathbb{N}$  com  $B_n \subseteq G$ , mostrando que  $G \in \mathcal{G}_n$  (viu?)<sup>\*</sup>.
- Por outro lado, se  $G \in \mathcal{G}_n$ , então existe um subconjunto finito  $F \subseteq X$  tal que  $B_n \setminus G \subseteq F$ , mas isto significa que  $B_n \cap (X \setminus F) \subseteq G$ , com  $B_n \in \mathcal{G}$  e  $X \setminus F \in \mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ . Portanto,  $G \in \mathcal{G}$ .  $\square$

**Observação 2.2.20.** Pode ser importante destacar que sob as condições anteriores,  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$  é filtro. Embora a reunião de filtros quaisquer possa não ser filtro, neste caso temos uma *cadeia* de filtros, situação em que a falha observada no Exemplo 2.2.14 é eliminada.  $\triangle$

<sup>†</sup>Se você preferir uma prova direta apenas para essa última afirmação, note que se  $\mathcal{B}$  é um prefiltro tal que  $\mathbf{u} = (\mathcal{B})^\uparrow$  é ultrafiltro livre, então  $|\mathcal{B}| > \aleph_0$ : caso contrário, para cada  $B \in \mathcal{B}$  podemos escolher pontos distintos  $s_B, t_B \in B$  tais que  $S := \{s_B : B \in \mathcal{B}\}$  e  $T := \{t_B : B \in \mathcal{B}\}$  satisfazem  $S, T \in \mathbf{u}$  (cf. Exercício 2.2.7) mas  $S \cap T = \emptyset$ . Como eu não prefiro este método, os detalhes ficarão por sua conta (mas só se você quiser).

#### §4 Filtros sobre ordens e o Teorema de Rasiowa-Sikorski

Embora tenham nascido como estruturas de subconjuntos, filtros se adaptam naturalmente em ambientes (pré-) ordenados.

**Definição 2.2.21.** Dada uma pré-ordem  $(\mathbb{P}, \leq)$ , um subconjunto não vazio  $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{P}$  será chamado de  $\leq$ -**filtro** se ocorrer o seguinte:

- (i) para quaisquer  $p, q \in \mathcal{F}$  existe  $r \in \mathcal{F}$  com  $r \leq p$  e  $r \leq q$ ;
- (ii) se  $p \in \mathcal{F}$  e  $q \in \mathbb{P}$  é tal que  $p \leq q$ , então  $q \in \mathcal{F}$ . ¶

É um exercício simples de tradução mostrar, por exemplo, que  $\mathcal{F} \subseteq \wp(X)$  é  $\subseteq$ -filtro (no sentido acima, para  $(\mathbb{P}, \leq) := (\wp(X), \subseteq)$ ) se, e somente se,  $\mathcal{F}$  é filtro (no sentido da Definição 2.1.14). No entanto, a flexibilidade das pré-ordens permite dar novas aplicações aos filtros, e o próximo teorema ilustrará isso. Para enunciá-lo, precisamos apenas de uma definição “nova” (cf. Exercício 2.2.13): um subconjunto  $D \subseteq \mathbb{P}$  é  $\leq$ -**denso** se para todo  $p \in \mathbb{P}$  existe  $d \in D$  com  $d \leq p$ .

**Teorema 2.2.22** (*A.k.a.* Lema de Rasiowa-Sikorski). *Seja  $\mathbb{P}$  uma pré-ordem e  $\mathcal{D}$  uma família enumerável de subconjuntos  $\leq$ -densos de  $\mathbb{P}$ . Para cada  $p \in \mathbb{P}$ , existe um  $\leq$ -filtro  $\mathcal{F}_p \subseteq \mathbb{P}$  tal que  $p \in \mathcal{F}_p$  e  $\mathcal{F}_p \cap D \neq \emptyset$  para todo  $D \in \mathcal{D}$ .*

*Demonstração.* Escrevendo  $\mathcal{D} = \{D_n : n \in \mathbb{N}\}$ , podemos definir  $f_{-1} := p$  e escolher  $f_n \in D_n$  para cada  $n$  de modo a satisfazer  $f_{n+1} \leq f_n$  para todo  $n$ : como  $D_0$  é  $\leq$ -denso, existe  $f_0 \in D_0$  com  $f_0 \leq f_{-1}$  e, como  $D_1$  é  $\leq$ -denso, existe  $f_1 \in D_1$  com  $f_1 \leq f_0$ , e... Agora, é um exercício simples de checagem ( $\star$ ) observar que

$$\mathcal{F}_p := \{a \in \mathbb{P} : \text{existe } z \geq -1 \text{ tal que } f_z \leq a\}$$

é um  $\leq$ -filtro que satisfaz as condições impostas. □

Quase banal, não é mesmo? Poucas coisas estariam mais longe da verdade neste caso.

**ARQUÉTIPO.** Para conjuntos  $X$  e  $Y$  quaisquer, defina

$$\text{Fn}(X, Y) := \{f : \text{existe subconjunto finito } Z \subseteq X \text{ tal que } f \in \text{Fun}(Z, Y)\}, \quad (2.14)$$

ou, em notação de gente grande,  $\text{Fn}(X, Y) := \bigcup_{Z \in [X]^{<\aleph_0}} Y^Z$ , coleção que será chamada de *forcing de Cohen*.

Explicitamente,  $\text{Fn}(X, Y)$  é a coleção de todos os “pedaços finitos” de funções da forma  $X \rightarrow Y$ , e que possivelmente *guardam* informações de “funções inteiras”. Aqui, será melhor encarar os elementos de  $\text{Fn}(X, Y)$  como conjuntos de pares ordenados, i.e.,  $f \in \text{Fn}(X, Y)$  sse

- $f \subseteq X \times Y$  (é uma *relação binária*),
- $y = y'$  sempre que  $(x, y), (x, y') \in f$  (é *funcional*), e
- $\text{dom}(f) := \{x \in X : \text{existe } y \in Y \text{ tal que } (x, y) \in f\}$  é subconjunto finito de  $X$ .

Dessa forma, a relação de inclusão pode ser usada para ordenar  $\text{Fn}(X, Y)$  de modo bastante natural. Todavia, por questões históricas, usaremos a relação de inclusão inversa. Assim, para  $f, g \in \text{Fn}(X, Y)$ , vamos escrever  $f \preceq g$  sse  $g \subseteq f$ . Consequentemente,  $\emptyset = \max \text{Fn}(X, Y)$ . A primeira grande surpresa vem agora.

**Lema 2.2.23.** Se  $\mathcal{F} \subseteq \text{Fn}(X, Y)$  é um  $\preceq$ -filtro, então  $F := \bigcup_{f \in \mathcal{F}} f$  é uma função do tipo  $Z \rightarrow Y$ , para algum subconjunto  $Z \subseteq X$ .

*Demonstração.* É claro que  $F \subseteq X \times Y$ . Para  $(x, y), (x, y') \in F$ , existe  $f, g \in \mathcal{F}$  com  $(x, y) \in f$  e  $(x, y') \in g$ . Como  $\mathcal{F}$  é  $\preceq$ -filtro, existe  $h \in \mathcal{F}$  com  $h \preceq f, g$ , i.e.,  $f, g \subseteq h$ . Logo,  $y = y'$  pois  $h$  é função! Por fim, basta fazer  $Z := \bigcup_{f \in \mathcal{F}} \text{dom}(f)$ .  $\square$

A segunda surpresa depende de uma observação que parece inútil.

**Exercício 2.2.9** (\*). Com as notações anteriores, mostre que para  $x \in X$ , o subconjunto  $D_x := \{f \in \text{Fn}(X, Y) : x \in \text{dom}(f)\}$  é  $\preceq$ -denso em  $\text{Fn}(X, Y)$ .  $\blacksquare$

**Proposição 2.2.24.** Se  $\mathcal{F} \subseteq \text{Fn}(X, Y)$  é um  $\preceq$ -filtro tal que  $\mathcal{F} \cap D_x \neq \emptyset$  para todo  $x \in X$ , então  $F := \bigcup_{f \in \mathcal{F}} f$  é uma função do tipo  $X \rightarrow Y$ .

*Demonstração.* Pelo lema,  $F$  já é função do tipo  $Z \rightarrow Y$  para  $Z = \bigcup_{f \in \mathcal{F}} \text{dom}(f)$ . Porém, para  $x \in X$  qualquer, existe  $f_x \in \mathcal{F} \cap D_x$ , donde segue que  $x \in \text{dom}(f_x) \subseteq Z$ .  $\square$

Evidentemente, as considerações acima são roupagens alternativas de fatos simples sobre colagens de funções. Em particular, nada disso depende do Lema de Rasiowa-Sikorski. O ponto é que, se  $X$  fosse enumerável e, além da família de  $\preceq$ -densos  $\{D_x : x \in X\}$  tivéssemos *outra* coleção enumerável  $\mathcal{E}$  de  $\preceq$ -densos, o Lema de Rasiowa-Sikorski nos garantiria, automaticamente, um  $\preceq$ -filtro  $\mathcal{F}_0$  tal que  $\mathcal{F}_0 \cap D_x \neq \emptyset$  para todo  $x \in X$  e  $\mathcal{F}_0 \cap E \neq \emptyset$  para todo  $E \in \mathcal{E}$ . Logo, pela proposição anterior, teríamos uma função do tipo  $X \rightarrow Y$  satisfazendo, adicionalmente, as *condições* codificadas pelos  $\preceq$ -densos da coleção  $\mathcal{E}$ . Serve para alguma coisa?

**Exercício 2.2.10** (\*). Use o Lema de Rasiowa-Sikorski para mostrar que se  $(\mathbb{T}, \preceq)$  é uma ordem total, *separável*<sup>†</sup>, enumerável e sem extremos, então existe um isomorfismo de ordens entre  $(\mathbb{T}, \preceq)$  e  $(\mathbb{Q}, \leq)$ , onde  $(\mathbb{Q}, \leq)$  denota o conjunto dos números racionais com sua ordenação usual. Para tanto, considere o seguinte roteiro.

- Seja  $\mathbb{P} := \{p \in \text{Fn}(\mathbb{T}, \mathbb{Q}) : p \text{ é estritamente crescente}\}$ , parcialmente ordenado pela inclusão reversa. Note que  $\emptyset \in \mathbb{P}$ .
- Mostre que  $D_t := \{p \in \mathbb{P} : t \in \text{dom}(p)\}$  é denso em  $\mathbb{P}$ , para cada  $t \in \mathbb{T}$ .
- Mostre que  $E_q := \{p \in \mathbb{P} : q \in \text{im}(p)\}$  é denso em  $\mathbb{P}$ , para cada  $q \in \mathbb{Q}$ .
- Obtenha um isomorfismo  $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{Q}$ .  $\blacksquare$

**Corolário 2.2.25.** Se  $(\mathbb{T}, \preceq)$  é uma ordem total, separável, Dedekind-completa e sem extremos, então existe um isomorfismo de ordens entre  $(\mathbb{T}, \preceq)$  e  $(\mathbb{R}, \leq)$ . Em particular,  $\mathbb{T}$  e  $\mathbb{R}$  são homeomorfos.

*Demonstração.* Por definição, existe um subconjunto infinito enumerável  $S \subseteq \mathbb{T}$  que atesta sua separabilidade. Logo, existe um isomorfismo de ordens  $f: S \rightarrow \mathbb{Q}$ , o que nos permite definir  $\varphi(t) := \sup \{f(s) : s \in S \text{ e } s \prec t\}$  para cada  $t \in \mathbb{T}$ , donde se obtém um isomorfismo de ordens  $\varphi: (\mathbb{T}, \preceq) \rightarrow (\mathbb{R}, \leq)$ . O restante segue do Exercício 1.2.9. Os detalhes ficarão por sua conta (\*).  $\square$

<sup>†</sup>Uma ordem  $\mathbb{T}$  é **separável** se existe um subconjunto enumerável  $S \subseteq \mathbb{T}$  tal que para quaisquer  $x, y \in \mathbb{T}$  com  $x < y$  existe  $s \in S$  com  $x < s < y$ . Percebeu que  $S$  precisa ser infinito? (\*)

**Corolário 2.2.26.** *Todos os intervalos abertos e não vazios da reta são isomorfos como ordens. Em particular, todos são homeomorfos.*

Eu disse que não era banal. Ao longo do texto, outros argumentos desse tipo serão usados ocasionalmente. Caso queira conhecer mais aplicações desse tipo de técnica, você terá que estudar *forcing*! Pois é. Para saber mais, confira [13].

## §5 Exercícios adicionais

**Exercício 2.2.11** (Ideais  $(\star\star)$ ). Sejam  $X$  um conjunto e  $\mathcal{I} \neq \emptyset$  uma família de subconjuntos de  $X$ . Dizemos que  $\mathcal{I}$  é um **ideal** em  $X$  (ou de  $X$ ) se as duas condições abaixo forem satisfeitas:

- (i)  $A, B \in \mathcal{I} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{I}$ , e
- (ii)  $A \in \mathcal{I}$  e  $B \subseteq A \subseteq X \Rightarrow B \in \mathcal{I}$ .

O ideal  $\mathcal{I}$  será chamado de (ideal) **próprio** se  $X \notin \mathcal{I}$ . Em particular,  $X = \emptyset$  não admite ideais próprios.

- a) Note que  $\emptyset \in \mathcal{I}$  para qualquer ideal  $\mathcal{I}$  em  $X$ .
- b) Mostre que as famílias  $\{\emptyset\}$  e  $\wp(X)$  são ideais em  $X$ . Assim como ocorre com os filtros,  $\{\emptyset\}$  é chamado de ideal *antidiscreto*, enquanto  $\wp(X)$  é o ideal *trivial* de  $X$ .
- c) Mostre que um ideal  $\mathcal{I}$  é trivial se, e somente se,  $X \in \mathcal{I}$ .
- d) Observe que a família  $\mathcal{I}$  dos ideais em  $X$  é parcialmente ordenada pela inclusão. Dada uma família  $\mathcal{G}$  de subconjuntos de  $X$ , mostre que existe  $\mathcal{G}^\downarrow \in \mathcal{I}$  o menor ideal que contém  $\mathcal{G}$ .
- e) Determine  $\mathcal{G}^\downarrow$  explicitamente em termos dos membros de  $\mathcal{G}$ .
- f) Apresente uma definição razoável para o que poderia ser  $\mathcal{G}^\downarrow$ . Qual a definição correspondente de *pré-ideal*?
- g) Mostre que  $\mathcal{I}$  é um ideal em  $X$  se, e somente se,  $\mathcal{F}(\mathcal{I}) := \{X \setminus A : A \in \mathcal{I}\}$  é um filtro. O ideal  $\mathcal{I}$  é dito *dual* ao filtro  $\mathcal{F}(\mathcal{I})$ .
- h) A função  $\mathcal{F}: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{F}$  é um isomorfismo de ordens, i.e.,  $\mathcal{F}$  é uma bijeção que satisfaz

$$\mathcal{I} \subsetneq \mathcal{J} \Leftrightarrow \mathcal{F}(\mathcal{I}) \subsetneq \mathcal{F}(\mathcal{J}).$$

- i) Conclua que  $\mathcal{I}$  é maximal na família dos ideais próprios de  $X$  se, e somente se,  $\mathcal{F}(\mathcal{I})$  é ultrafiltro. ■

**Exercício 2.2.12**  $(\star)$ . Sejam  $\mathcal{F}$  um filtro em  $X$  e subconjuntos  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D} \subseteq \mathcal{F}$ . Mostre que se  $\mathcal{D}$  é  $\supseteq$ -cofinal em  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{C}$  é  $\supseteq$ -cofinal em  $\mathcal{D}$ , então  $\mathcal{C}$  é  $\supseteq$ -cofinal em  $\mathcal{F}$ . ■

**Exercício 2.2.13.** Seja  $\mathbb{P}$  uma pré-ordem e para cada  $q \in \mathbb{P}$  considere sobre  $\mathbb{P}$  a topologia gerada pela família  $\{q^\downarrow : q \in \mathbb{P}\}$ , onde  $q^\downarrow := \{p \in \mathbb{P} : p \leq q\}$  para cada  $q \in \mathbb{P}$ . Mostre que  $D \subseteq \mathbb{P}$  é  $\leq$ -denso sse  $D$  é denso em  $\mathbb{P}$  (no sentido topológico). ■

## 2.2.4 Manipulação das redes

Redes são objetos mais simples do que filtros. No entanto, à primeira vista, a interação entre elas costuma ser menos direta: a definição não sugere, de imediato, relações naturais entre duas redes quaisquer num mesmo conjunto. Para filtros próprios  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  sobre um conjunto  $X$ , por exemplo, é *natural* considerar o filtro próprio  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$  e, embora  $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$  não seja necessariamente um filtro, é fácil corrigir esse problema passando a  $\mathcal{F} \vee \mathcal{G} := (\mathcal{F} \cup \mathcal{G})^\uparrow$ . Em contrapartida, com redes (ou mesmo sequências), operações análogas sequer parecem fazer sentido.

Nesta subseção, veremos que a primeira impressão nem sempre está certa.

### §1 Sincronização de domínios

Okay, a verdade é que a interação entre redes só faz sentido *por meio* de filtros ou, mais especificamente, *através* do Teorema 2.1.27 e seus corolários: o que definiremos como *interseção* entre redes  $\varphi$  e  $\psi$ , por exemplo, será *uma* rede  $\varphi \wedge \psi$  satisfazendo a identidade  $(\varphi \wedge \psi)^\uparrow = (\varphi)^\uparrow \cap (\psi)^\uparrow$ . Porém, para propósitos topológicos, qualquer outra rede  $\rho$  satisfazendo  $(\rho)^\uparrow = (\varphi)^\uparrow \cap (\psi)^\uparrow$  pode substituir  $\varphi \wedge \psi$ . Quem tem familiaridade com Álgebra Abstrata já deve ter percebido o *quociente* implícito aqui.

**Definição 2.2.27.** A fim de uniformizar a discussão, diremos que duas redes  $\varphi$  e  $\psi$  sobre um conjunto  $X$  são **filtro-equivalentes** se ocorrer  $(\varphi)^\uparrow = (\psi)^\uparrow$ .  $\blacksquare$

Apesar do nome, você *pode* omitir filtros na definição de filtro-equivalência. Basta notar que  $(\varphi)^\uparrow = (\psi)^\uparrow$  sse as duas condições a seguir forem satisfeitas,

- para todo  $A \in \text{dom}(\varphi)$  existe  $\tilde{B} \in \text{dom}(\psi)$  tal que  $\psi[\tilde{B}^\uparrow] \subseteq \varphi[A^\uparrow]$ , e
- para todo  $B \in \text{dom}(\psi)$  existe  $\tilde{A} \in \text{dom}(\varphi)$  tal que  $\varphi[\tilde{A}^\uparrow] \subseteq \psi[B^\uparrow]$ ,

já que elas equivalem, respectivamente, a  $(\varphi)^\uparrow \subseteq (\psi)^\uparrow$  e  $(\psi)^\uparrow \subseteq (\varphi)^\uparrow$  (certo?)<sup>\*</sup>. Com as terminologias da Subseção 3.1.1 §4,  $\varphi$  e  $\psi$  são filtro-equivalentes sse  $\varphi$  e  $\psi$  são *sub-redes* uma da outra.

MANTRA: todas as operações entre redes devem ser invariantes por filtro-equivalência.

A primeira aplicação do mantra acima será a *sincronização de domínios*, uma observação simples mas poderosa, capaz de eliminar uma das coisas mais irritantes ao lidar com redes distintas sobre um mesmo conjunto: a incompatibilidade entre os conjuntos dirigidos.

**Teorema 2.2.28** (Sincronização de domínios). *Para uma  $\mathcal{I}$ -upla  $\Phi := (\varphi_i)_{i \in \mathcal{I}}$  de redes num conjunto  $X$ , existem um conjunto dirigido  $\mathbb{D}_\Phi$  e redes  $\psi_i: \mathbb{D}_\Phi \rightarrow X$  tais que  $\psi_i$  e  $\varphi_i$  são filtro-equivalentes para cada  $i \in \mathcal{I}$ .*

*Demonstração.* Vamos definir  $\mathbb{D}_\Phi := \prod_{i \in \mathcal{I}} \text{dom}(\varphi_i)$  com a relação produto usual, dada por

$$(a_i)_{i \in \mathcal{I}} \preceq (b_i)_{i \in \mathcal{I}} \Leftrightarrow a_i \preceq_i b_i \text{ para todo } i \in \mathcal{I},$$

onde  $\preceq_i$  indica a relação sobre  $\text{dom}(\varphi_i)$  segundo a qual este é um conjunto dirigido. É um exercício simples (<sup>\*</sup>) mostrar que  $(\mathbb{D}_\Phi, \preceq)$  é um conjunto dirigido, o que faz da função  $\psi_i := \varphi_i \circ \pi_i: \mathbb{D}_\Phi \rightarrow X$  uma rede legítima. Só falta provar  $(\psi_i)^\uparrow = (\varphi_i)^\uparrow$ .

- Se  $a \in \text{dom}(\varphi_i)$ , então para qualquer  $A \in \mathbb{D}_\Phi$  satisfazendo  $\pi_i(A) = a$  verifica-se  $\pi_i(B) \succeq_i a$  sempre que  $B \in \mathbb{D}_\Phi$  for tal que  $B \succeq A$ , mostrando que  $\psi_i[A^\uparrow] \subseteq \varphi_i[a^\uparrow]$  (percebeu mesmo?)\*.
- Se  $D = (D_j)_{j \in \mathcal{I}} \in \mathbb{D}_\Phi$ , então  $\varphi_i[D_i^\uparrow] \subseteq \psi_i[D^\uparrow]$  pois, se  $d \succeq_i D_i$ , então a  $\mathcal{I}$ -upla  $E := (E_j)_{j \in \mathcal{I}} \in \mathbb{D}_\Phi$  dada por

$$E_j := \begin{cases} D_j, & \text{se } j \neq i \\ d, & \text{se } j = i \end{cases}$$

é tal que  $\varphi_i(d) = \varphi_i(\pi_i(E)) = \psi_i(E)$  com  $E \succeq D$ , i.e.,  $\varphi_i(d) \in \psi_i[D^\uparrow]$ .  $\square$

Se  $\varphi$  é uma rede em  $X$  e  $Z$  é um conjunto não vazio qualquer, por exemplo, então existe uma rede  $\varphi': Z \times \text{dom}(\varphi) \rightarrow X$  satisfazendo  $(\varphi')^\uparrow = (\varphi)^\uparrow$ : basta dirigir  $Z \times \text{dom}(\varphi)$  declarando  $(z, \alpha) \preceq (z', \beta)$  sse  $\alpha \preceq \beta$  em  $\text{dom}(\varphi)$ , para daí definir<sup>†</sup>  $\varphi' := \varphi \circ \pi_{\text{dom}(\varphi)}$ . Em particular, se você veio até aqui por conta do Exemplo 3.1.31, perceba que se  $\varphi$  for uma sequência, então  $\varphi'$  é uma sub-rede que não é subsequência: na verdade, como  $Z$  pode ser tomado como *qualquer* conjunto não vazio, segue que  $\varphi'$  admite como domínio conjuntos de índices arbitrariamente *grandes*.

Para uma ilustração mais interessante, considere o problema de lidar com redes num produto de espaços, digamos  $X \times Y$ . É claro que se  $\varphi = ((x_d, y_d))_{d \in \mathbb{D}}$  é uma rede em  $X \times Y$  que converge para  $(x, y) \in X \times Y$ , então  $\pi_X \circ \varphi = (x_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_X x$  e  $\pi_Y \circ \varphi = (y_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_Y y$  (cf. Observação 2.1.89). Porém, dadas redes  $\psi := (s_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{A}}$  em  $X$  e  $\zeta := (t_\beta)_{\beta \in \mathbb{B}}$  em  $Y$ , com  $\psi \rightarrow_X x$  e  $\zeta \rightarrow_Y y$ , torna-se menos óbvio usar  $\psi$  e  $\zeta$  para induzir uma rede em  $X \times Y$  que convirja para  $(x, y)$ , pois a princípio pode ocorrer  $\mathbb{A} \neq \mathbb{B}$ : se tivéssemos  $\mathbb{A} = \mathbb{B}$ , bastaria considerar  $((s_\alpha, t_\alpha))_{\alpha \in \mathbb{A}}$ , num espelho do que se fez na ida.

Como você já deve ter imaginado, o natural aqui é considerar  $\varphi := ((s_\alpha, t_\beta))_{(\alpha, \beta) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}}$ , com  $\mathbb{A} \times \mathbb{B}$  dirigido pela pré-ordem *produto* das pré-ordens em  $\mathbb{A}$  e  $\mathbb{B}$ . O curioso disso tudo é que, secretamente, fizemos uma sincronização de domínios segundo a qual  $\varphi = ((x_d, y_d))_d$ . Duvida? Com  $\mathbb{D} := \mathbb{A} \times \mathbb{B}$ ,  $x_d := s_{\pi_{\mathbb{A}}(d)}$  e  $y_d := t_{\pi_{\mathbb{B}}(d)}$  para cada  $d \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}$ , temos  $\pi_X \circ \varphi = (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$  e  $\pi_Y \circ \varphi = (y_d)_{d \in \mathbb{D}}$ ! Assim, você não precisa sentir tanta culpa se confundir, de vez em quando,  $(s_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{A}}$  com  $(s_\alpha)_{(\alpha, \beta) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}}$ .

**Exercício 2.2.14** (\*). Apenas para registro: convença-se de que se  $(x_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{A}} \rightarrow x$  em  $X$  e  $(y_\beta)_{\beta \in \mathbb{B}} \rightarrow y$  em  $Y$ , então  $((x_\alpha, y_\beta))_{(\alpha, \beta) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B}} \rightarrow (x, y)$  em  $X \times Y$ .  $\blacksquare$

## §2 Misturas e colagens

A *convergência topológica* em termos de filtros vem de fábrica com uma propriedade que parece completamente inútil quando vista pela primeira vez.

**Proposição 2.2.29.** *Dados filtros próprios  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  num espaço topológico  $X$ , tem-se  $\lim \mathcal{F} \cap \lim \mathcal{G} \subseteq \lim \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ . Em outras palavras: se  $\mathcal{F} \rightarrow x$  e  $\mathcal{G} \rightarrow x$ , então  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \rightarrow x$ .*

*Demonstração.* Ora, se  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}$  e  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{G}$ , então  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ .  $\square$

**Exercício 2.2.15** (\*). Você percebeu que, na verdade,  $\lim \mathcal{F} \cap \lim \mathcal{G} = \lim \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ ?  $\blacksquare$

<sup>†</sup>Você também pode aplicar diretamente o teorema anterior: basta dirigir  $Z$  de qualquer modo arbitrário e considerar uma rede auxiliar  $\psi: Z \rightarrow X$ , que será irrelevante no final das contas.



Por que alguém se importaria com interseções de filtros?

**Corolário 2.2.30.** *Sejam  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  e  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sequências num espaço  $X$ , e considere  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tal que  $z_n \in \{x_n, y_n\}$  para todo  $n$ . Se  $(x_n)_n \rightarrow z$  e  $(y_n)_n \rightarrow z$ , então  $(z_n)_n \rightarrow z$ .*

*Demonstração.* Fazendo  $\mathcal{F} := (x_n)_n^\uparrow$  e  $\mathcal{G} := (y_n)_n^\uparrow$  no último corolário, o resultado segue pois  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \subseteq (z_n)_n^\uparrow$ : se  $S \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ , então existem índices  $M, N \in \mathbb{N}$  tais que

$$\{x_m : m \geq M\} \cap \{y_n : n \geq N\} \subseteq S,$$

de modo que para  $L \geq M, N$  resulta  $\{z_l : l \geq L\} \subseteq S$  (entendeu?)<sup>\*</sup>.  $\square$

**Exercício 2.2.16** (\*). No corolário anterior, mostre que *bastaria existir*<sup>†</sup>  $K \in \mathbb{N}$  tal que  $z_k \in \{x_k, y_k\}$  para todo  $k \geq K$ .  $\blacksquare$

Assim, a interseção de filtros *codifica*, em certo sentido, o processo de *misturar* os termos de duas sequências para obter uma terceira sequência, enquanto a Proposição 2.2.29 prova que a *noção topológica* de convergência é estável por *misturas*. Dada a natureza desta subseção, convém fazer isso *sem* filtros — e com redes.

**Teorema 2.2.31.** *Para uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(\varphi_i)_{i \in \mathcal{I}}$  de redes sobre um conjunto  $X$ , existe uma rede  $\Lambda_\varphi \in \text{Net}(X)$  tal que  $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} (\varphi_i)^\uparrow = (\Lambda_\varphi)^\uparrow$ .*

*Demonstração.* De modo geral, se cada  $\mathcal{F}_i$  é filtro próprio em  $X$ , então  $\mathcal{F} := \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{F}_i$  é gerado pelos subconjuntos da forma  $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} F_i$ , com  $F_i \in \mathcal{F}_i$  para todo  $i \in \mathcal{I}$  (cf. Exercício 2.2.6), afinal, se  $S$  contém um subconjunto dessa forma, então  $S \in \mathcal{F}_i$  para cada índice  $i$  em  $\mathcal{I}$ . Assim, procuramos um conjunto dirigido  $\mathbb{D}$  e uma rede  $\Lambda_\varphi : \mathbb{D} \rightarrow X$  cujos ramos  $\Lambda_\varphi [D^\uparrow]$  sejam precisamente subconjuntos da forma  $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} \varphi_i [d_i^\uparrow]$ , com  $d_i \in \text{dom}(\varphi_i)$  para todo  $i$ , conforme  $D$  varia em  $\mathbb{D}$ .

Pelo que se discutiu na última subsubseção, não há perda de generalidade em assumir  $\text{dom}(\varphi_i) = \mathbb{A}$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ . Ao fazer isso, note que uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(d_i)_{i \in \mathcal{I}}$  em  $\prod_{i \in \mathcal{I}} \text{dom}(\varphi_i)$  é apenas uma função  $d : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{A}$ , enquanto a própria  $\mathcal{I}$ -upla de redes dada pela hipótese é uma função  $\mathcal{I} \times \mathbb{A} \rightarrow X$  que a cada  $(i, \alpha) \in \mathcal{I} \times \mathbb{A}$  associa  $\varphi_i(\alpha) \in X$ . Quase acabou: a rede  $\Lambda_\varphi$  procurada é resultado da composição

$$\text{Fun}(\mathcal{I}, \mathbb{A}) \times \mathcal{I} \xrightarrow{\pi_{\mathcal{I}} \times \text{ev}} \mathcal{I} \times \mathbb{A} \longrightarrow X$$

que explicitamente faz  $\Lambda_\varphi(d, i) := \varphi_i(d(i))$  para cada  $d \in \text{Fun}(\mathcal{I}, \mathbb{A})$  e  $i \in \mathcal{I}$ .

Para encerrar de fato, precisamos apenas *dirigir*  $\mathbb{D} := \text{Fun}(\mathcal{I}, \mathbb{A}) \times \mathcal{I}$  de maneira adequada, mas não há novidades<sup>‡</sup>: basta declarar  $(d, i) \preceq (e, j)$  sse  $d(k) \preceq_{\mathbb{A}} e(k)$  para todo  $k \in \mathcal{I}$ . Dessa forma, não é difícil perceber (e você percebeu, certo?)<sup>\*</sup> que para quaisquer  $d \in \text{Fun}(\mathcal{I}, \mathbb{A})$  e  $j \in \mathcal{I}$  se verifica  $\Lambda_\varphi [(d, j)^\uparrow] = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \varphi_i [d(i)^\uparrow]$ , como desejado.  $\square$

**Exercício 2.2.17** (\*). Mostre que o teorema anterior permanece verdadeiro para *sequências* se  $\mathcal{I}$  for enumerável. Dica:  $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$ .  $\blacksquare$

<sup>†</sup>Isto não significa que essa será sua única hipótese: é *óbvio* que você ainda precisa supor  $(x_n)_n \rightarrow z$  e  $(y_n)_n \rightarrow z$ , já que o resultado se tornaria falso sem isso. Interpretação de texto também exige uma certa dose de malícia.

<sup>‡</sup>Compare com as definições dos conjuntos dirigidos nas demonstrações dos Teoremas 2.1.27 e 2.2.28.

**Exercício 2.2.18** (\*). Para um conjunto dirigido  $\mathbb{D}$ , sejam  $\varphi, \psi: \mathbb{D} \rightarrow X$  redes num espaço topológico  $X$ , bem como uma rede  $\rho: \mathbb{D} \rightarrow X$  e um ponto  $x \in X$ . Mostre que se  $\varphi \rightarrow x$ ,  $\psi \rightarrow x$  e existe  $D \in \mathbb{D}$  tal que  $\rho(d) \in \{\varphi(d), \psi(d)\}$  para todo  $d \succeq D$ , então  $\rho \rightarrow x$ . Dica: adapte o Corolário 2.2.30 e o Exercício 2.2.16 para redes. ■

Agora, se você acha que nunca usou esse tipo de propriedade na sua vida, tenho uma novidade:

**Teorema 2.2.32** (*A.k.a.* Lema da Colagem). *Seja  $f: X \rightarrow Y$  uma função entre espaços topológicos  $X$  e  $Y$ . Se  $S, T \subseteq X$  são fechados tais que  $X = S \cup T$ , com  $f|_S$  e  $f|_T$  contínuas, então  $f$  é contínua.*

*Demonstração.* Para  $x \in X$  qualquer, provaremos que  $f$  é contínua em  $x$  e, para isso, usaremos redes<sup>†</sup>: mostraremos que se  $\varphi \in \text{Net}(X)$  for tal que  $\varphi \rightarrow x$ , então  $f \circ \varphi \rightarrow f(x)$ . Há, essencialmente, dois casos.

Se  $x \in S \setminus T$ , então  $A := X \setminus T$  é um aberto tal que  $x \in A$ , com  $A \subseteq S$ . Pela Proposição 2.1.40, existe  $D \in \text{dom}(\varphi)$  tal que  $\varphi(d) \in A$  para todo  $d \succeq D$ , mostrando que  $\psi := \varphi|_{D^\uparrow}$  é uma rede em  $S$  com  $\psi \rightarrow x$  em  $S$ . Finalmente, a hipótese de continuidade assegura  $f|_S \circ \psi \rightarrow f(x)$  em  $Y$  e, por valer  $f|_S \circ \psi = (f \circ \varphi)|_{D^\uparrow}$ , conclui-se que  $f \circ \varphi \rightarrow f(x)$  (por quê?!).<sup>‡</sup> O caso em que  $x \in T \setminus S$  é simétrico.

Por outro lado, se  $x \in S \cap T$ , definimos duas redes auxiliares,  $\psi_S$  e  $\psi_T$  com o mesmo domínio de  $\varphi$ , declarando

$$\psi_S(d) := \begin{cases} \varphi(d), & \text{se } \varphi(d) \in S \\ x, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \text{e} \quad \psi_T(d) := \begin{cases} \varphi(d), & \text{se } \varphi(d) \in T \\ x, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Pelo exercício anterior, tanto  $\psi_S$  quanto  $\psi_T$  são redes em  $X$  que convergem para  $x$  (discorda?!)\*, mas não só isso:  $\psi_S \in \text{Net}(S)$ , enquanto  $\psi_T \in \text{Net}(T)$ . Logo, pela hipótese sobre  $f$ , temos  $f|_S \circ \psi_S \rightarrow f(x)$  e  $f|_T \circ \psi_T \rightarrow f(x)$  em  $Y$ . Novamente por conta do exercício anterior, obtemos  $f \circ \varphi \rightarrow f(x)$  em  $Y$  (como?)\*. □

O correspondente para redes da *reunião* de filtros tem um agravante: não há rede que induza o filtro trivial em  $X$ , pois não há rabos vazios. Assim, para redes  $\varphi$  e  $\psi$  e  $X$ , a definição de uma rede  $\rho \in \text{Net}(X)$  tal que  $(\rho)^\uparrow = (\varphi)^\uparrow \vee (\psi)^\uparrow$  só é possível se  $(\varphi)^\uparrow \cup (\psi)^\uparrow$  for um coleção de subconjuntos de  $X$  com a p.i.f. (cf. Exemplo 2.2.14). Um dos modos de realizar tal construção é considerar  $\mathbb{E} := \{(\alpha, \beta) \in \text{dom}(\varphi) \times \text{dom}(\psi) : \varphi(\alpha) = \psi(\beta)\}$  e fazer  $\rho: \mathbb{E} \rightarrow X$  de um jeito maroto. Os detalhes ficarão por sua conta (\*).

### §3 Redes de redes

Para encerrar esta *primeira* imersão no universo das redes, vamos retornar ao Teorema 2.1.50, especificamente para a demonstração (via redes) da inclusão

$$\text{ad}_{\mathcal{T}}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S)) \subseteq \text{ad}_{\mathcal{T}}(S),$$

onde  $S$  é um subconjunto de um espaço topológico  $(X, \mathcal{T})$ .

<sup>†</sup>É possível provar o Lema da Colagem sem usar redes? Certamente! É difícil? Muito pelo contrário, é quase simples! Você encontrará uma dessas provas aqui? Não.

<sup>‡</sup>Tente entender o motivo sem ajuda (\*). Se não conseguir, confira o Exercício 3.1.11.

Em resumo, a partir da existência de uma rede  $\psi \in \mathbf{Net}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S))$  com  $\psi \rightarrow x$ , busca-se uma rede  $\varphi \in \mathbf{Net}(S)$  tal que  $\varphi \rightarrow x$ . No argumento previamente apresentado (cf. pág. 66), a rede  $\varphi$  foi obtida por meio do pré-filtro de abertos em torno de  $x$ . Tal desvio ideológico foi tomado apenas para adiar algumas revelações e evitar traumas prematuros: para quem já tem familiaridade com redes, seria muito mais natural *construir*  $\varphi$  a partir de  $\psi$ . Ou quase isso.

Como  $\psi \in \mathbf{Net}(\text{ad}_{\mathcal{T}}(S))$ , a princípio temos  $\psi(a) \in \text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$  para cada  $a \in \text{dom}(\psi)$ . Logo, pela definição de *aderência*, para cada  $a \in \text{dom}(\psi)$  existe uma rede  $\psi_a \in \mathbf{Net}(S)$  tal que  $\psi_a \rightarrow \psi(a)$  em  $X$ . Em outras palavras, obtivemos uma rede  $(\psi_a)_{a \in \text{dom}(\psi)}$  cujos termos  $\psi_a$  são redes em  $S$  — uma *rede de redes* [26]. Sincronizando o domínio de todas elas se necessário (cf. Teorema 2.2.28), a existência de  $\varphi$  segue diretamente do próximo teorema (e você deve se convencer disso!)\*.




Figura 2.3: Se as bolinhas convergem para o ponto  $x$  enquanto os triângulos convergem para as respectivas bolinhas, então os triângulos convergem para o ponto  $x$ .

**Teorema 2.2.33** (dos limites iterados). *Seja  $\mathbb{D}$  um conjunto dirigido e, para cada  $d \in \mathbb{D}$ , fixe  $\psi(d) \in X$  e uma rede  $\psi_d: \mathbb{D} \rightarrow X$  com  $\psi_d \rightarrow \psi(d)$ . Se a rede  $\psi := (\psi(d))_{d \in \mathbb{D}}$  converge para  $x$  em  $X$ , então a rede*

$$\begin{aligned} \Delta^\psi: \text{Fun}(\mathbb{D}, \mathbb{D}) \times \mathbb{D} &\rightarrow X \\ (g, d) &\mapsto \psi_d(g(d)) \end{aligned}$$

*também converge para  $x$ , onde  $\text{Fun}(\mathbb{D}, \mathbb{D}) \times \mathbb{D}$  é dirigido pela pré-ordem produto usual<sup>†</sup>.*

*Demonstração.* Para um aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $x$ , existe  $D \in \mathbb{D}$  tal que  $\psi[D^\uparrow] \subseteq V$  (pois  $\psi \rightarrow x$ ) e, para cada  $d \in D^\uparrow$ , existe  $A_d \in \mathbb{D}$  tal que  $\psi_d(a) \in V$  sempre que  $a \succeq_{\mathbb{D}} A_d$  (pois  $\psi_d \rightarrow \psi(d)$ ). Fixando  $(g, D) \in \text{Fun}(\mathbb{D}, \mathbb{D}) \times \mathbb{D}$  tal que  $g(d) = A_d$  para todo  $d$  em  $D^\uparrow$ , segue que  $\Delta^\psi[(g, D)^\uparrow] \subseteq V$ : se  $(h, d) \succeq (g, D)$ , então  $d \succeq_{\mathbb{D}} D$ ,  $h(d) \succeq_{\mathbb{D}} g(d) := A_d$  e, portanto,  $\Delta^\psi(h, d) = \psi_d(h(d)) \in V$ .  $\square$

Secretamente, o teorema acima caracteriza o modo sutil por meio do qual a *convergência* se *propaga* num espaço topológico. Supondo que  $X$  seja de Hausdorff para acalmar nossos corações, mostrou-se que se  $\lim_{\alpha \in \mathbb{D}} \psi_d(\alpha) = \psi_d$  para todo  $d \in \mathbb{D}$  e  $(\psi_d)_d$  converge, então

$$\lim \Delta^\psi = \lim_{d \in \mathbb{D}} \psi_d = \lim_{d \in \mathbb{D}} \left( \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} \psi_d(\alpha) \right).$$

<sup>†</sup>I.e.,  $(g, \alpha) \preceq (h, \beta)$  sse  $\alpha \preceq_{\mathbb{D}} \beta$  e  $g(d) \preceq_{\mathbb{D}} h(d)$  para todo  $d \in \mathbb{D}$ . Não confunda com a ordenação utilizada no Teorema 2.2.31.

Em certo sentido, a rede  $\Delta^\psi$  *diagonaliza com delicadeza* as informações contidas na rede de redes  $(\psi_d)_d$ , permitindo tratar todas elas como se fossem uma só... Se você ainda não estiver com sono, é bem provável que essa explicação tenha te levado a fazer pelo menos uma das duas perguntas a seguir.

PERGUNTA I: o que há de indelicado com a rede  $\Delta_\psi := (\psi_d(\alpha))_{(d,\alpha) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}}$ ?

PERGUNTA II: quem precisa de delicadeza quando se tem a rede  $\nabla_\psi := (\psi_d(d))_{d \in \mathbb{D}}$ ?

Já deve estar claro que alterar o conjunto dirigido afeta a convergência (cf. Observação 2.1.11). Assim, as respostas das perguntas se escondem, num primeiro momento, nas diferenças entre  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{D} \times \mathbb{D}$  e  $\text{Fun}(\mathbb{D}, \mathbb{D}) \times \mathbb{D}$ .

**Proposição 2.2.34.** *Com as notações anteriores, valem as inclusões  $(\Delta_\psi)^\uparrow \subseteq (\nabla_\psi)^\uparrow$  e  $(\Delta_\psi)^\uparrow \subseteq (\Delta^\psi)^\uparrow$ .*

*Demonstração.* É um exercício edificante (\*) observar que para  $D \in \mathbb{D}$ ,  $(A, B) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}$  e  $(g, C) \in \text{Fun}(\mathbb{D}, \mathbb{D}) \times \mathbb{D}$ , temos  $\nabla_\psi [D^\uparrow] = \{\psi_d(d) : d \succeq D\}$ ,  $\Delta_\psi [(A, B)^\uparrow] = \bigcup_{\alpha \in A^\uparrow} \psi_\alpha [B^\uparrow]$  e  $\Delta^\psi [(g, C)^\uparrow] = \bigcup_{\gamma \in C^\uparrow} \psi_\gamma [g(\gamma)^\uparrow]$ . As inclusões desejadas seguem quase sem esforço dessas identidades. Bom, pelo menos sem o meu esforço (entendeu?)\*.  $\square$

**Exercício 2.2.19** (Adiável (\*)). Com as notações dos Teoremas 2.2.31 e 2.2.33, mostre que  $(\Lambda_\psi)^\uparrow \subseteq (\Delta^\psi)^\uparrow$ .  $\blacksquare$

**Corolário 2.2.35.** *Se  $\Delta_\psi \rightarrow x$ , então  $\nabla_\psi \rightarrow x$  e  $\Delta^\psi \rightarrow x$ . Em outras palavras, se  $(\psi_d(\alpha))_{(d,\alpha) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}}$  converge em  $X$ , então*

$$\lim_{(d,\alpha) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}} \psi_d(\alpha) = \lim_{d \in \mathbb{D}} \psi_d(d) = \lim_{(g,d) \in \text{Fun}(\mathbb{D}, \mathbb{D}) \times \mathbb{D}} \psi_d(g(d)).$$

**Exercício 2.2.20** (\*). Prove o corolário anterior.  $\blacksquare$

O problema, como você já deve imaginar, está nas recíprocas. Mas não se preocupe, nada muito sofisticado é necessário para se dar conta disso. Por exemplo, para cada  $m, n \in \mathbb{N}$ , considere em  $\mathbb{R}$  o número

$$S_m(n) := \begin{cases} 1, & \text{se } n \leq m \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Para  $m \in \mathbb{N}$  fixado, é claro que  $S_m := \lim_{n \rightarrow \infty} S_m(n) = 0$  (... ok?)\*<sup>5</sup> e, por conseguinte,  $\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = 0$ . Todavia, 0 não é limite da rede  $(S_m(n))_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ : para  $\varepsilon := \frac{1}{2}$  e um par de índices  $(M, N) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  qualquer, basta observar que  $K := \max\{M, N\}$  satisfaz  $(K, K) \geq (M, N)$  com  $|S_K(K)| > \frac{1}{2}$ . Portanto, com as notações da última proposição, temos  $\lim \nabla_S = 1$  e  $\lim \Delta^S = 0$ , enquanto  $\Delta_S$  nem chega a convergir! Em tempo, perceba que ao fazer  $T_m(n) := S_n(m)$ , resulta  $\Delta^T \rightarrow 1$ .

**Exercício 2.2.21** (\*, \*\*). Para uma rede de redes  $(\psi_d)_{d \in \mathbb{D}}$  num espaço de Hausdorff  $X$ , suponha que para quaisquer  $D, A \in \mathbb{D}$  fixados as redes  $(\psi_D(\alpha))_{\alpha \in \mathbb{D}}$  e  $(\psi_d(A))_{d \in \mathbb{D}}$  convirjam em  $X$ . Mostre que se  $(\psi_d(\alpha))_{(d,\alpha) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}}$  converge em  $X$ , então

$$\lim_{d \in \mathbb{D}} \left( \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} \psi_d(\alpha) \right) = \lim_{(d,\alpha) \in \mathbb{D} \times \mathbb{D}} \psi_d(\alpha) = \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} \left( \lim_{d \in \mathbb{D}} \psi_d(\alpha) \right).$$

Dica: será útil notar que em espaços de Hausdorff,  $\{p\} = \bigcap_{V \in \mathcal{T}_p} \overline{V}$  para todo  $p$ .  $\blacksquare$

Embora a narrativa possa ter feito parecer que limites iterados são um jeito complicado de lidar com algo simples (o fechamento da aderência em espaços topológicos), trata-se de um problema muito natural em Análise<sup>†</sup>. Suponha que  $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$  seja uma rede de funções contínuas, digamos que da forma  $X \rightarrow Y$ , tal que  $(f_d)_d \rightarrow_L f$  com respeito a alguma *noção de convergência*  $L$ , onde  $f: X \rightarrow Y$  é uma função não necessariamente contínua.

PROBLEMA: encontrar condições que assegurem a continuidade da função  $f$ .

Ora, fixado um ponto  $x \in X$ , deve-se mostrar que se uma rede  $\varphi$  em  $X$  converge para  $x$ , então  $f \circ \varphi \rightarrow f(x)$  em  $Y$ . Como podemos sincronizar os domínios, não há perda de generalidade em supor  $\varphi = (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ . Para tornar a escrita menos ofensiva, podemos assumir que todas as *convergências* envolvidas sejam de Hausdorff, de modo que a condição procurada, “ $f \circ \varphi \rightarrow f(x)$ ”, se reescreve como

$$\lim(f \circ \varphi) = \lim(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}} = \lim_{d \in \mathbb{D}} f(x_d) = f\left(\lim_{d \in \mathbb{D}} x_d\right),$$

que, pela *natureza* de  $f$ , se torna

$$\lim_{d \in \mathbb{D}} \left( \left( \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_\alpha \right) (x_d) \right) = \left( \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_\alpha \right) \left( \lim_{d \in \mathbb{D}} x_d \right). \quad (2.15)$$

Ainda não parece um limite iterado, mas estamos quase lá. Sem exigências sobre a “noção de convergência”  $\rightarrow_L$ , saber que  $f = \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_\alpha$  não nos diz efetivamente *como* usar  $f$  para, digamos, calcular  $f(p)$ . Encontramos aí uma primeira

SUPosição RAZOÁVEL:  $\rightarrow_L$  é *mais forte* do que  $\rightarrow_p$ , i.e., se  $\lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_\alpha = f$  com respeito à *noção de convergência*  $\rightarrow_L$ , então  $f(p) = \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_\alpha(p)$  para todo  $p \in X$ .




Figura 2.4: O grande problema é encontrar condições que assegurem a convergência *pontilhada*.

<sup>†</sup>O que em outras palavras significa “um jeito complicado de lidar com algo complicado”.

Com essa suposição, a identidade expressa em (2.15) se reescreve como

$$\lim_{d \in \mathbb{D}} \left( \left( \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_{\alpha} \right) (x_d) \right) = \lim_{d \in \mathbb{D}} \left( \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_{\alpha}(x_d) \right) = \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} f_{\alpha} \left( \lim_{d \in \mathbb{D}} x_d \right) \stackrel{(\heartsuit)}{=} \lim_{\alpha \in \mathbb{D}} \left( \lim_{d \in \mathbb{D}} f_{\alpha}(x_d) \right),$$

onde  $(\heartsuit)$  se deve à continuidade de cada  $f_{\alpha}$ .

CONCLUSÃO: decidir se um limite razoável de funções contínuas é uma função contínua consiste, basicamente, em resolver um problema de limites iterados.

Ainda é cedo para investir na procura de condições que resolvam o problema em si. Mas não se preocupe: isso voltará a ser discutido no texto.

## 2.2.5 Álgebra Topológica: primeiros contatos

Antes de qualquer outra coisa, é importante deixar clara a distinção semântica entre as expressões “Topologia Algébrica” e “Álgebra Topológica”: enquanto a primeira, mais conhecida no meio matemático, lida com o trabalho de associar estruturas algébricas a espaços topológicos de modo *functorial*, a segunda se interessa por tratar de estruturas algébricas munidas de topologias compatíveis com suas operações.

Desse modo, objetos como *grupos topológicos*, *anéis topológicos*, *espaços vetoriais topológicos* e outras quinquilharias fazem parte do dia a dia da Álgebra Topológica, enquanto *grupos fundamentais*, *módulos de homologia* e coisas do tipo pertencem à rotina da Topologia Algébrica. Portanto, apesar do título, esta subseção tem muito mais a ver com Análise em seus aspectos fundamentais do que com Topologia Algébrica<sup>†</sup>.

ARQUÉTIPO. Fixada uma *linguagem algébrica*  $\mathcal{L}$ , dizemos que  $X$  é uma  $\mathcal{L}$ -**álgebra topológica** se  $X$  for uma  $\mathcal{L}$ -álgebra munida de uma topologia que torne as operações  $p_X: X^n \rightarrow X$  contínuas para cada *símbolo*  $p$  de operação  $n$ -ária<sup>‡</sup>, onde  $X^n$  é dotado da topologia produto usual. Neste caso, diremos que a topologia de  $X$  é **compatível** com a  $\mathcal{L}$ -estrutura algébrica  $X$ . A *categoria das  $\mathcal{L}$ -álgebras topológicas*,  $\mathcal{L}$ -TOP, tem como objetos as  $\mathcal{L}$ -álgebras topológicas e, como setas, os  $\mathcal{L}$ -**morfismos contínuos**, i.e., funções que são simultaneamente setas da categoria das  $\mathcal{L}$ -álgebras e da categoria dos espaços topológicos. Em particular, os  $\mathcal{L}$ -**isomorfismos topológicos** são os  $\mathcal{L}$ -morfismos contínuos com inversas contínuas.

Apesar das definições acima, não é frequente que se estudem álgebras topológicas tão gerais quanto os objetos típicos da Álgebra Universal, pois o seu tratamento já é bastante delicado mesmo em casos simples, exatamente aqueles que tomarão nossa atenção ao longo desta subseção.

### §1 Grupos topológicos

**Definição 2.2.36.** Um **grupo topológico** consiste de um grupo  $(G, \cdot, e)$  munido de uma topologia que torna contínuas as funções<sup>††</sup>

$$\begin{array}{ll} \cdot: G \times G \rightarrow G & \text{e} \quad \text{inv}: G \rightarrow G \\ (x, y) \mapsto x \cdot y & x \mapsto x^{-1} \end{array}$$

onde  $G \times G$  tem a topologia produto. ¶

<sup>†</sup>Isto **não** significa que Topologia Algébrica não se interesse por objetos da Álgebra Topológica!

<sup>‡</sup>Operações de aridade 0 são contínuas, independentemente da topologia sobre  $X$ .

<sup>††</sup>Por conveniência, o símbolo “ $\cdot$ ” será frequentemente omitido, de modo que escreveremos “ $xy$ ” em vez de “ $x \cdot y$ ”, como de costume.



A reta real com a soma e sua topologia usual costuma ser o primeiro exemplo desse tipo de animal. De modo geral, um  $\mathbb{K}$ -espaço normado  $E$  é um grupo topológico com a adição de vetores e a topologia induzida pela norma pois  $\|x + y - (u + v)\| \leq \|x - u\| + \|y - v\|$  e  $\|z\| = \|-z\|$  para quaisquer  $u, v, x, y, z \in E$  (percebeu?)\*.

**Exemplo 2.2.37** (Círculo). Vamos verificar que o subconjunto  $\mathbb{T} := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  é um grupo topológico *multiplicativo* com a topologia herdada de  $\mathbb{C}$ . Primeiro, deve ser claro que  $(\mathbb{T}, \cdot, 1)$  é realmente um grupo (certo?)\*. Para o aspecto topológico da coisa, podemos apelar para a identificação  $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ . Neste caso, a multiplicação em  $\mathbb{C}$  faz

$$((a, b), (c, d)) \mapsto (ac - bd, ad + bc),$$

o que define uma função contínua  $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ . Embora você já saiba disso (Cálculo 2?!), essa é uma boa oportunidade para um pouco de *pirotecnia* e excessos.

**Lema 2.2.38.** *Sejam  $X$  um conjunto,  $S$  um espaço topológico e  $*$ :  $S \times S \rightarrow S$  uma operação contínua.*

- (i) *A operação induzida<sup>†</sup>  $\otimes$ :  $\text{Fun}_p(X, S) \times \text{Fun}_p(X, S) \rightarrow \text{Fun}_p(X, S)$  é contínua, onde  $(f \otimes g)(x) := f(x) * g(x)$  para quaisquer  $f, g \in \text{Fun}(X, S)$  e  $x \in X$ .*
- (ii) *Se  $X$  é espaço topológico e  $f, g \in C(X, S)$ , então  $f \otimes g \in C(X, S)$ .*

*Demonstração.* Para (i), note que se  $(f_\alpha, g_\alpha) \rightarrow (f, g)$  em  $\text{Fun}_p(X, S) \times \text{Fun}_p(X, S)$ , então  $(f_\alpha)_\alpha \rightarrow_p f$  e  $(g_\alpha)_\alpha \rightarrow_p g$ . Logo, para  $x \in X$  fixado,  $(f_\alpha(x))_\alpha \rightarrow f(x)$  e  $(g_\alpha(x))_\alpha \rightarrow g(x)$  em  $S$ , donde a continuidade de  $*$  assegura que  $(f_\alpha(x) * g_\alpha(x))_\alpha \rightarrow f(x) * g(x)$ . Como isto significa, precisamente,  $((f_\alpha \otimes g_\alpha)(x))_\alpha \rightarrow (f \otimes g)(x)$ , conclui-se que  $(f_\alpha \otimes g_\alpha)_\alpha \rightarrow_p f \otimes g$  (certo?)\*. Para (ii), basta observar que se  $(x_\beta)_\beta \rightarrow x$  em  $X$ , então  $(f(x_\beta))_\beta \rightarrow f(x)$  e  $(g(x_\beta))_\beta \rightarrow g(x)$  em  $S$ , acarretando  $((f(x_\beta), g(x_\beta)))_\beta \rightarrow (f(x), g(x))$  em  $S \times S$ . O restante decorre da continuidade da operação  $*$ :  $S \times S \rightarrow S$ , bem como pela definição de  $\otimes$ .  $\square$

*Demonstração usual, sem redes.* Temos  $\pi_x \circ (\otimes) = (*) \circ (\pi_x \times \pi_x)$  para todo  $x \in X$  e  $f \otimes g = (*) \circ (f, g)$ . Logo, (i) segue do Teorema 2.1.91, enquanto (ii) decorre do Corolário 2.1.85.  $\square$

De volta ao problema da multiplicação em  $\mathbb{C}$ , as funções

$$\begin{aligned}\pi_1: ((a, b), (c, d)) &\mapsto (a, b) \mapsto a \\ \pi_2: ((a, b), (c, d)) &\mapsto (a, b) \mapsto b \\ \pi_3: ((a, b), (c, d)) &\mapsto (c, d) \mapsto c \\ \pi_4: ((a, b), (c, d)) &\mapsto (c, d) \mapsto d\end{aligned}$$

são contínuas (por serem composições de funções contínuas), de modo que aplicações sucessivas do lema anterior garantem que tanto  $\pi_1 \cdot \pi_3 - \pi_2 \cdot \pi_4$  quanto  $\pi_1 \cdot \pi_4 + \pi_2 \cdot \pi_3$  são contínuas. Finalmente, o Teorema 2.1.91 encerra o trabalho (entendeu?)\*.

Para a inversão multiplicativa, basta lembrar que, neste caso,  $(a + bi)^{-1} = a - bi$ , e a função  $(a, b) \mapsto (a, -b)$  é contínua. Portanto, ao restringir tais funções ao subespaço  $\mathbb{T}$ , o resultado desejado segue.  $\blacktriangle$

<sup>†</sup>No dia a dia, o mesmo símbolo é usado para representar a operação induzida entre funções. A distinção aqui visou apenas zelar pelo seu conforto psicológico.

Como grupos topológicos são, antes de qualquer outra coisa, *grupos*, seus pontos se comportam de maneira (algebricamente) simétrica. O curioso é que a exigência de compatibilidade topológica com as operações se reflete num tipo de *simetria topológica*.

**Definição 2.2.39.** Um espaço topológico  $X$  é **homogêneo** se para quaisquer  $x, y \in X$  existir um homeomorfismo  $\varphi: X \rightarrow X$  com  $\varphi(x) = y$ .  $\P$

**Proposição 2.2.40.** *Todo grupo topológico é homogêneo.*

*Demonstração.* Para um grupo topológico  $G$  e um ponto  $p \in X$ , a regra  $x \mapsto px$  define uma função contínua  $\varphi_p: G \rightarrow G$  (certo?)<sup>\*</sup>. Analogamente,  $\varphi_{p^{-1}}$  é contínua<sup>†</sup>. Dado que  $\varphi_p \circ \varphi_{p^{-1}} = \varphi_{p^{-1}} \circ \varphi_p = \text{Id}_G$  (não é óbvio?)<sup>‡</sup>, segue que  $\varphi_p$  é um homeomorfismo satisfazendo  $\varphi_p(e) = p$ , onde  $e$  é o elemento neutro de  $G$ . Acabou (certo?)<sup>\*</sup>.  $\square$

**Exercício 2.2.22** (\*). Sejam  $X$  um espaço topológico com um ponto fixado  $e \in X$ . Mostre que se para todo  $p \in X$  existe um homeomorfismo  $\psi_p: X \rightarrow X$  satisfazendo  $\psi_p(e) = p$ , então  $X$  é homogêneo.  $\blacksquare$

Intuitivamente, espaços homogêneos são aqueles em que *tudo parece igual* em torno de *qualquer* ponto. Logo, espaços topológicos com pontos *dissonantes entre si*, i.e., em que a condição de homogeneidade falha, não podem admitir estrutura de grupo compatível com sua topologia. É o caso de  $[0, 1]$ , por exemplo.

**Exercício 2.2.23** (\*). Mostre que não existe homeomorfismo  $\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  tal que  $\varphi(0) = \frac{1}{2}$ . Dica: conexidade na reta.  $\blacksquare$

Um modo ligeiramente mais sofisticado de usar a última proposição na detecção de espaços que não podem ser grupos topológicos faz uso da noção de *pontos fixos*. Diz-se que um espaço topológico  $X$  tem a **propriedade do ponto fixo** se para qualquer função contínua  $f: X \rightarrow X$  existe pelo menos um ponto  $p \in X$  tal que  $f(p) = p$ .

Agora, ao encarar a demonstração da proposição anterior com algum cuidado, percebe-se que *todo grupo topológico  $G$  com pelo menos dois pontos não tem a propriedade do ponto fixo* (por quê?)<sup>\*</sup>. Em particular, isto assegura mais um modo de provar que  $[0, 1]$  não admite estrutura de grupo topológico com sua topologia usual — com a vantagem de que, desta vez, você só precisa do Teorema do Valor Intermediário<sup>††</sup>.

**Exemplo 2.2.41.** O intervalo  $(0, +\infty)$  é um grupo topológico com a topologia herdada de  $\mathbb{R}$  e com a operação de multiplicação usual. Assim, em virtude do Corolário 2.2.26, podemos afirmar que  $(\mathbb{R}, +, 0)$  e  $((0, +\infty), \cdot, 1)$  são grupos topológicos *homeomorfos*, mesmo sem exibir qualquer bijeção explícita entre ambos. É possível garantir que tais grupos são topologicamente GROUP-isomorfos?

RESPOSTA PARA QUEM SE LEMBRA DA FUNÇÃO EXPONENCIAL: sim.

RESPOSTA PARA QUEM NÃO SE LEMBRA DA FUNÇÃO EXPONENCIAL: também.

<sup>\*</sup>Sim: tanto as *translações* da forma  $x \mapsto xp$  quanto as da forma  $x \mapsto px$  são homeomorfismos em grupos topológicos.

<sup>†</sup>Revise seus conhecimentos de Álgebra Elementar URGENTEMENTE se você não souber justificar essa passagem mentalmente. É sério.

<sup>††</sup>E para quem estiver com paciência, esse é um dos ingredientes na verificação de que o **cubo de Hilbert**,  $H := \text{Fun}_p(\mathbb{N}, [0, 1])$ , atesta a falha da recíproca da Proposição 2.2.40, pois  $H$  é um espaço homogêneo com a propriedade do ponto fixo. Infelizmente, a prova foge do escopo do meu tempo. Como compensação, confira o Exercício 2.2.40.

Em geral, sempre que  $G$  é um grupo topológico *homeomorfo* à reta real, pode-se *construir* um isomorfismo topológico entre  $G$  e  $\mathbb{R}$  por meio de *integrais de Haar*. Mas isto pode esperar. Até lá, será mais fácil revisar suas anotações de Análise Real. ▲

**Exemplo 2.2.42** (Séries). Seja  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de elementos de um grupo topológico abeliano<sup>†</sup>  $(G, +, 0)$ . Pode-se induzir uma nova sequência em  $G$ , recursivamente, por meio da operação de  $G$  e da sequência  $(a_n)_n$ . Mais precisamente, declaremos  $s_0 := a_0$  e  $s_{n+1} := s_n + a_{n+1}$  para todo  $n > 0$ . Embora a operação de  $G$  seja finitária, sua topologia permite extrapolar os *limites* da Álgebra: *pode* existir  $s \in G$  tal que  $(s_n)_n \rightarrow s$ , o que moralmente corresponde ao resultado do que seria fazer  $a_0 + a_1 + a_2 + \dots$ , pelo menos se  $G$  for um grupo de Hausdorff.

Sim, trata-se da generalização natural das *séries* da Análise Real, que precisam apenas dos dois ingredientes acima: um operação binária para determinar as somas parciais, e uma topologia para decidir (extrapolar) o caráter finitário da operação. Como ilustração, vamos ver que mesmo neste contexto geral é possível realizar o *teste da divergência*.

**Proposição 2.2.43** (Teste da Divergência). *Nas notações acima, se  $(s_n)_n \rightarrow s$  para algum  $s \in G$ , então  $(a_n)_n \rightarrow 0$ .*

*Demonstração.* A menos da notação aditiva, o Exercício 2.2.34 garante a continuidade da função  $\psi: G \times G \rightarrow G$  dada por  $\psi(x, y) := x - y$ . Agora, como  $(s_n)_n \rightarrow s$  por hipótese, sua *subsequência*  $(s_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  também deve convergir para  $s$  (cf. Corolário 3.1.29). Assim,  $(s_{n+1}, s_n) \rightarrow (s, s)$  em  $G \times G$ , donde a continuidade de  $\psi$  acarreta

$$a_{n+1} = \psi(s_{n+1}, s_n) \rightarrow \psi(s, s) = s - s = 0,$$

donde segue que  $a_n \rightarrow 0$ , como queríamos. □

Em situações como a anterior, escreve-se

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n := \sum_{n=0}^{\infty} a_n := \lim_{n \in \mathbb{N}} \left( \sum_{j \leq n} a_j \right) \quad (2.16)$$

para indicar a *coleção* de todos os limites da sequência  $(s_n)_n$  das *somas parciais* da sequência  $(a_n)_n$ , que será chamada de **série da sequência**  $(a_n)_n$ . Aqui, faz-se a convenção usual de que se  $G$  for de Hausdorff, então  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  denota o único elemento de  $G$ , caso exista, para o qual a sequência  $(s_n)_n$  converge, tal qual fizemos com a notação “lim” para filtros e redes (Observação 2.1.37). ▲

**Exercício 2.2.24** (\*). Num grupo topológico abeliano  $G$ , mostre que se  $(x_n)_n \rightarrow x$  em  $G$ , então  $(\sum x_n - x_{n+1})_n \rightarrow x_0 - x$  em  $G$ . Dica:  $\sum_{m \leq n} x_m - x_{m+1} = x - x_n$ . ■

Há muita coisa sobre grupos topológicos para se explorar ao longo da vida, e neste texto ainda discutiremos diversos resultados conforme mais ferramentas se tornarem *disponíveis*. Porém, para este primeiro contato, deve ser suficiente destacar duas particularidades oriundas da compatibilidade entre as estruturas algébrica e topológica de um grupo topológico.

O primeiro fato diz respeito à continuidade dos morfismos de grupos.

<sup>†</sup>Eu não tenho a mínima ideia se tal resultado é válido em grupos topológicos não-abelianos.

**Teorema 2.2.44** (Compare com a Proposição 1.2.13).<sup>†</sup> *Sejam  $G$  e  $H$  grupos topológicos e  $f: G \rightarrow H$  um morfismo de grupos. A função  $f$  é contínua se, e somente se,  $f$  é contínua em  $e_G$ , onde  $e_G$  denota o elemento neutro do grupo  $G$ .*

*Demonstração.* Supondo que  $f$  é contínua em  $e_G$ , vamos provar que  $f$  é contínua num ponto  $g \in G$ . Para isso, basta tomar uma rede  $(g_d)_d$  em  $G$  com  $(g_d)_d \rightarrow g$  e mostrar que  $(f(g_d))_d \rightarrow f(g)$ . Ora, pela continuidade das translações no grupo topológico  $G$ , resulta  $(g_d g^{-1})_d \rightarrow g g^{-1} = e_G$ , enquanto a continuidade de  $f$  em  $e_G$  acarreta

$$(f(g_d)f(g)^{-1})_d = (f(g_d g^{-1}))_d \rightarrow f(e_G) = e_H.$$

O restante segue pois  $y \mapsto yf(g)$  é contínua (certo?)<sup>\*</sup>. A recíproca é automática.  $\square$

*Demonstração via abertos.* Note que se  $W \subseteq H$  é um aberto com  $f(x) \in W$ , então  $f(x)^{-1}W := \{f(x)^{-1}w : w \in W\}$  é um aberto de  $H$  (certo?)<sup>\*</sup> com  $f(e_G) = e_H \in f(x)^{-1}W$ . Por  $f$  ser contínua em  $e_G$ , existe um aberto  $U \subseteq G$  com  $e_G \in U$  e  $f[U] \subseteq f(x)^{-1}W$ . Daí, não deveria ser difícil concluir que  $xU \subseteq G$  é um aberto com  $x \in xU$  e  $f[xU] \subseteq W$  (concluiu?)<sup>\*</sup>. A recíproca ainda é automática.  $\square$

**Exercício 2.2.25** (\*). Mostre que uma rede  $(x_d)_d$  num grupo topológico  $G$  converge para  $x \in G$  sse  $(x_d x^{-1})_d$  converge para o elemento neutro de  $G$ .  $\blacksquare$

Quem já tem olhos treinados pela Análise pode ter sentido falta de algo importante e que foi escondido na Proposição 1.2.13: a *continuidade uniforme*. Recorde-se de que uma função  $f: X \rightarrow Y$  entre *espaços métricos* é **uniformemente contínua** se para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que  $d(f(a), f(b)) < \varepsilon$  sempre que  $a, b \in X$  satisfazem  $d(a, b) < \delta$ . No caso das transformações lineares contínuas, tem-se<sup>‡</sup>

$$\|T(u) - T(v)\| = \|T(u - v)\| \leq \|T\| \|u - v\|,$$

de modo que basta tomar  $\delta := \frac{\varepsilon}{\|T\|+1}$ .

Assim, embora seja curioso que a mera compatibilidade com a estrutura de grupo seja capaz de recuperar a parte da Proposição 1.2.13 relacionada ao elemento neutro, *parece* que a propriedade mais importante se perdeu, já que não há como expressar continuidade uniforme em espaços topológicos<sup>††</sup>. Todavia, a situação se torna um pouco mais favorável com grupos topológicos.

Secretamente, desde os seus tempos de Cálculo I, você aplicava translações de grupos topológicos a vizinhanças de elementos neutros: afinal de contas, para  $p \in \mathbb{R}$  e  $\varepsilon > 0$  quaisquer,  $(p - \varepsilon, p + \varepsilon) = p + (-\varepsilon, \varepsilon) := \{p + y : y \in (-\varepsilon, \varepsilon)\}$ . Consequentemente, verifica-se  $|x - y| < \varepsilon$  sse  $x - y \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Em vista disso, o próximo passo é bastante natural.

**Definição 2.2.45.** Uma função  $f: G \rightarrow H$  entre grupos topológicos será chamada de **uniformemente contínua** (à direita)<sup>‡‡</sup> se para todo  $V \subseteq H$  aberto em torno de  $e_H$  existir um aberto  $V \subseteq G$  em torno de  $e_G$  satisfazendo a implicação

$$xy^{-1} \in V \Rightarrow f(x)f(y)^{-1} \in U$$

para quaisquer  $x, y \in G$ .  $\P$

<sup>†</sup>Você certamente se lembra que uma transformação linear entre espaços vetoriais é, em particular, um morfismo de grupos com relação aos grupos aditivos subjacentes, certo? (\*).

<sup>‡</sup>Condição ainda mais forte do que continuidade uniforme, chamada de (condição de) **Lipschitz**.

<sup>††</sup>Uma função entre espaços métricos pode ser uniformemente contínua em relação a um par de métricas, mas *apenas* contínua com respeito a outro par de métricas *equivalentes* (cf. Exercício 4.1.1).

<sup>‡‡</sup>Como nem todo grupo é abeliano, também faria sentido pedir “ $y^{-1}x \in V \Rightarrow f(y)^{-1}f(x) \in U$ ”, o que levaria à noção de *continuidade uniforme à esquerda*. Mas não é hora de se preocupar com isso.

De repente grupos topológicos ficaram mais interessantes, não é mesmo?

**Proposição 2.2.46.** *Morfismos contínuos de grupos topológicos são uniformemente contínuos.*

*Demonstração.* Com as mesmas notações da definição anterior, note que se  $f$  é um morfismo contínuo de grupos, então  $f^{-1}[V]$  é um aberto de  $G$  em torno de  $e_G$  tal que se  $xy^{-1} \in f^{-1}[V]$ , então  $f(xy^{-1}) = f(x)f(y^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in V$ , mostrando que basta tomar  $U := f^{-1}[V]$ .  $\square$

**Exercício 2.2.26** (\*). Mostre que uma transformação linear  $T: X \rightarrow Y$  entre  $\mathbb{K}$ -espaços normados é contínua sse é uniformemente contínua com respeito à última definição. Dica: a métrica de um espaço normado é compatível com sua estrutura aditiva. ■

Este é o segundo aspecto sobre grupos topológicos que merece destaque: a similaridade com espaços métricos/normados, no sentido de que se pode tratar da noção de proximidade de maneira *uniforme*. Moralmente, é como se os abertos em torno do elemento neutro parametrizassem “relações de distância” da mesma maneira que os números reais positivos o fazem em espaços métricos.

MANTRA: para um aberto  $U \subseteq G$  em torno do elemento neutro  $e_G$ , vamos pensar em “ $xy^{-1} \in U$ ” como se fosse “ $d(x, y) < U$ ”.

Foi por meio do mantra acima que a definição métrica de continuidade uniforme foi adaptada para grupos topológicos. Por que parar?

**Definição 2.2.47.** Diremos que uma rede  $(x_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{A}}$  num grupo topológico  $G$  é **de Cauchy** se para todo aberto  $V \subseteq G$  em torno de  $e_G$  existir um índice  $A \in \mathbb{A}$  tal que  $x_\alpha x_\beta^{-1} \in V$  para quaisquer  $\alpha, \beta \in \mathbb{A}$  com  $\alpha, \beta \succeq A$ . ¶

**Exercício 2.2.27** (\*). Pratique!

- (Compare com o Exercício 2.1.22) Mostre que uma rede  $(x_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{A}}$  é de Cauchy num grupo topológico  $G$  sse  $(x_\alpha x_\beta^{-1})_{(\alpha, \beta) \in \mathbb{A} \times \mathbb{A}} \rightarrow e_G$  em  $G$ .
- Mostre que toda rede convergente num grupo topológico é de Cauchy. Dica: além do item anterior, use os Exercícios 2.2.14 e 2.2.34. ■

A definição dos *grupos topológicos completos* deve estar saltando aos olhos quase evidente agora, mas ainda é cedo para explorar essa ideia. Por ora, encerraremos esta apresentação com uma caracterização bastante *intuitiva* do fecho de subconjuntos em grupos topológicos (cf. Exercício 2.2.28).

**Teorema 2.2.48.** *Para qualquer subconjunto  $S$  de um grupo topológico  $G$  se verifica*

$$\overline{S} = \bigcap_{V \in \mathcal{B}_e} \overline{SV},$$

onde  $e \in G$  é o elemento neutro de  $G$  e  $\mathcal{B}_e$  é uma base local de abertos em torno de  $e$ .

*Demonstração.* A inclusão “ $\subseteq$ ” segue pois  $e \in V$  para todo  $V \in \mathcal{B}_e$ , de modo que  $S \subseteq SV$  e, por conseguinte,  $\overline{S} \subseteq \overline{SV}$ . A inclusão oposta depende de um truque que parecerá estranho, mas que no fundo nada mais é do que considerar “ $\frac{\varepsilon}{3}$ ” em vez de “ $\varepsilon$ ”.



⌈ **Afirmção.** Para todo  $B \in \mathcal{B}_e$  existe  $C \in \mathcal{B}_e$  tal que  $CC(C^{-1}) \subseteq B$ .

*Prova da Afirmção.* A função  $\varphi: G \times G \times G \rightarrow G$  que faz  $\varphi(x, y, z) := xyz$  é contínua (certo?)<sup>\*</sup>. Dado que  $\varphi(e, e, e) = e \in B$ , existem  $U, V, W \subseteq G$  abertos em torno de  $e$  tais que  $\varphi[U \times V \times W] \subseteq B$ . Por  $U \cap V \cap W$  também ser aberto em torno de  $e$ , existe  $D \in \mathcal{B}_e$  tal que  $e \in D$  com  $D \subseteq U \cap V \cap W$ . Logo,

$$DDD := \{xyz : x, y, z \in D\} = \varphi[D \times D \times D] \subseteq \varphi[U \times V \times W] \subseteq B,$$

onde o resultado desejado segue com qualquer  $C \in \mathcal{B}_e$  satisfazendo  $C \subseteq D \cap D^{-1}$ . Completar os detalhes omitidos será tarefa sua (<sup>\*</sup>). ┘

De volta ao problema original, supondo que  $p \notin \overline{S}$ , existe  $W \subseteq G$  aberto em torno de  $p$  tal que  $W \cap S = \emptyset$ . Como translações são homeomorfismos, segue que  $p^{-1}W$  é um aberto em torno de  $e$ . Logo, existe  $V \in \mathcal{B}_e$  tal que  $V \subseteq p^{-1}W$ .

KATZENSPRUNG<sup>†</sup>: para qualquer  $C \in \mathcal{B}_e$  satisfazendo  $CC(C^{-1}) \subseteq V$  se verifica  $p \notin \overline{SC}$ .

Caso contrário, teríamos  $p^2 \in p\overline{SC} = \overline{pSC}$ , enquanto  $p^2CC$  seria um aberto em torno de  $p^2$ , acarretando a existência de  $a, b, c \in C$  e  $s \in S$  tais que  $p^2ab = psc$ . Logo,

$$s = p(ab)c^{-1} \in pCC(C^{-1}) \subseteq pV \subseteq W,$$

mostrando que  $S \cap W \neq \emptyset$ , uma contradição. O Exercício 2.2.35 deve te ajudar a justificar os detalhes omitidos. □

**Corolário 2.2.49.** Um grupo topológico  $G$  é de Hausdorff se, e somente se,  $\{e\}$  é fechado.

*Demonstração.* Ficarà por sua conta (<sup>\*</sup>). □

**Exercício 2.2.28** (<sup>\*</sup>). Para  $S \subseteq \mathbb{R}$ , mostre que  $\overline{S} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B[S, \frac{1}{2^n}]$ , onde se define  $B[S, r] := \bigcup_{s \in S} [s - r, s + r]$  para qualquer  $r > 0$ . Dica/Sugestão: se estiver com saudades de exercitar desigualdades simples de Análise Real, mostre que  $\overline{S + (-r, r)} = B[S, r]$ . ■

**Exercício 2.2.29** (<sup>\*</sup><sup>6</sup>). Para um espaço topológico  $X$ , seja  $\text{Homeo}(X)$  o grupo (via composição) dos homeomorfismos de  $X$  sobre  $X$ . A topologia que  $\text{Homeo}(X)$  herda de  $\text{Fun}_p(X, X)$  faz dele um grupo topológico? Dica: experimente  $X := \mathbb{R}^2$ . ■

## §2 Anéis topológicos

Grupos topológicos são a porta de entrada para *estruturas* mais pesadas.

**Definição 2.2.50.** Dizemos que um anel  $(A, +, \cdot, 0, 1)$  é um **anel topológico** (... com unidade)<sup>‡</sup> se existe uma topologia que faz de  $(A, +, 0)$  um grupo topológico em que a operação  $\cdot: A \times A \rightarrow A$  é contínua. ¶

Além dos exemplos *imediatos* ( $\mathbb{C}$  e seus subanéis/subcorpos com a topologia usual)<sup>††</sup>, anéis topológicos ocorrem frequentemente nos contextos de Análise. Com  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ , o espaço  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$  (cf. Definição 2.1.93) é um anel (comutativo) topológico para qualquer conjunto  $X$  ao considerarmos as operações induzidas pelo corpo (cf. Lema 2.2.38, item (i)), enquanto  $C_p(X, \mathbb{K})$  é subanel topológico de  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$  sempre que  $X$  também for espaço topológico (cf. item (ii) do mesmo lema).

<sup>†</sup>*Pulo do gato*, em alemão... É uma longa história.

<sup>‡</sup>Nesse tipo de contexto faz sentido tratar de anéis não comutativos e *sem unidade*. Mas não se preocupe, quando for o caso, isto será enfatizado.

<sup>††</sup>Certo? (<sup>\*</sup>)



**Exemplo 2.2.51** (Anéis via composição). Para um  $\mathbb{K}$ -espaço normado  $E$ , o espaço formado pelas transformações lineares contínuas da forma  $E \rightarrow E$ , denotado por  $\text{TLin}_{\mathbb{K}}(E, E)$  (cf. pág. 31), se revela um anel topológico com a topologia induzida pela norma de operadores e a composição de funções como multiplicação. A parte algébrica da afirmação deveria ser clara<sup>†</sup>, de modo que resta apenas a parte topológica.

Por ser um espaço normado, já sabemos que  $\text{TLin}_{\mathbb{K}}(E, E)$  é grupo topológico. Para a continuidade da composição, basta empregar o Exercício 1.2.2 duas vezes: para  $x \in E$  e  $f, g \in \text{TLin}_{\mathbb{K}}(E, E)$ , temos  $\|(f \circ g)(x)\| \leq \|f\| \|g(x)\| \leq \|f\| \|g\| \|x\|$ . Em particular,  $\|f \circ g\| \leq \|f\| \|g\|$  e  $\|\text{Id}_E\| = 1$ . ▲

O anel  $\text{TLin}_{\mathbb{K}}(E, E)$  é um exemplo de  **$\mathbb{K}$ -álgebra normada**: trata-se de um  $\mathbb{K}$ -espaço normado  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$  com uma operação  $*$ :  $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  segundo a qual  $(\mathcal{A}, +, *, 0)$  é um anel tal que  $\|x * y\| \leq \|x\| \|y\|$  para quaisquer  $x, y \in \mathcal{A}$ . Caso  $\mathcal{A}$  também tenha unidade  $e \in \mathcal{A} \setminus \{0\}$ , é comum *pedir* por  $\|e\| = 1$ , mas não há perda de generalidade em *assumir* isso<sup>‡</sup>. Quando  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$  é de Banach, diz-se que  $\mathcal{A}$  é uma **álgebra de Banach**. Para aquecer:

**Exercício 2.2.30** (\*). Mostre que a multiplicação  $*$  de uma álgebra normada é contínua. Dica:  $\|x * y - u * v\| \leq \|x\| \|y - v\| + \|x - u\| \|v\|$ . ■

**Teorema 2.2.52** (da Série de Neumann). Numa álgebra de Banach  $\mathcal{B}$  com unidade  $e$ , o grupo multiplicativo<sup>††</sup>  $\text{Inv}(\mathcal{B}) := \{b \in \mathcal{B} : b \text{ é } * \text{-invertível}\}$  é aberto em  $\mathcal{B}$ . Além disso, a regra  $b \mapsto b^{-1}$  define um homeomorfismo de  $\text{Inv}(\mathcal{B})$  sobre si mesmo.

*Demonstração.* Note que se  $y \in G := \text{Inv}(\mathcal{B})$ , então  $\|y\| > 0$  (certo?)<sup>\*</sup>, o que permite tomar  $\delta := \frac{1}{\|y^{-1}\|}$  uma vez que  $y^{-1} \in G$ . Não há muito mistério agora: provaremos que  $B(y, \delta) \subseteq G$ . Para  $x \in B(y, \delta)$ , considere  $a := y^{-1}x$  (como de costume, apenas se omitiu o símbolo  $*$ ). Note que

$$\|e - a\| = \|y^{-1}y - y^{-1}x\| = \|y^{-1}(y - x)\| \leq \|y^{-1}\| \|y - x\| < 1.$$

Pelo que você aprendeu sobre séries geométricas em suas aulas de Análise, resulta

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|e - a\|^n < \infty.$$

O que talvez você não saiba (ou não se lembre) é que isto basta para concluir que a série  $\sum_{n=0}^{\infty} (e - a)^n$  converge em  $\mathcal{B}$ .

▮ **Afirmção 2.2.53.** Num espaço de Banach  $X$ , sempre que  $\sum_{n=0}^{\infty} \|x_n\|$  converge em  $\mathbb{R}$ , existe  $x \in X$  tal que  $x = \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ . *Observação:* em tais situações, diz-se que a série  $\sum x_n$  é **absolutamente convergente**.

*Prova da Afirmção.* Para uma série  $\sum x_n$  em  $X$ , tem-se

$$\left\| \sum_{j=0}^m x_j - \sum_{j=0}^n x_j \right\| \leq \sum_{j=m}^n \|x_j\| \leq \sum_{j=m}^{\infty} \|x_j\| := S_m \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|x_j\| := M$$

<sup>†</sup>A função identidade  $\text{Id}_E$  é o elemento neutro dessa multiplicação, e para  $f, g, h \in \text{TLin}_{\mathbb{K}}(X, Y)$ , é um exercício de primeiro semestre verificar as igualdades  $f \circ (g+h) = (f \circ g) + (f \circ h)$  e  $(f+g) \circ h = (f \circ h) + (g \circ h)$  (certo?)<sup>\*</sup>. Em particular, se  $\dim_{\mathbb{K}} E \geq 2$ , então  $\text{TLin}_{\mathbb{K}}(E, E)$  não é comutativo.

<sup>‡</sup>Cf. Exercício 2.2.45.

<sup>††</sup>Os elementos em  $\text{Inv}(\mathcal{B})$  costumam ser chamados de *regulares* ou *não singulares*.

sempre que  $m \leq n$ . Em particular, se  $\sum x_n$  é absolutamente convergente, então  $M < +\infty$ . Ocorre que em tais condições,  $(S_m)_m \rightarrow 0$  (Análise I, certo?)\*. Logo, a sequência das somas parciais da série satisfaz o critério de Cauchy. A completude de  $X$  faz o resto. ┘

De volta ao problema, existe  $z \in \mathcal{B}$  com  $z = \sum_{n=0}^{\infty} (e - a)^n$  pois

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|(e - a)^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|e - a\|^n < +\infty.$$

E daí? Ora, como o produto de  $\mathcal{B}$  é contínuo, segue que tanto  $p \mapsto ap$  quanto  $p \mapsto pa$  são contínuas, acarretando

$$az = \sum_{n=0}^{\infty} a(e - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (e - (e - a))(e - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} ((e - a)^n - (e - a)^{n+1}) = e,$$

bem como  $za = e$  (por quê?!)<sup>†</sup>. Portanto,  $a \in G$ , com  $z = a^{-1}$  e, conseqüentemente,  $x \in G$ , já que  $x(zy^{-1}) = e = (zy^{-1})x$  (certo?)\*.

Em particular, para tal  $x$  em  $B(y, \delta)$ , temos

$$\begin{aligned} \|x^{-1} - y^{-1}\| &= \|zy^{-1} - y^{-1}\| = \|(z - e)y^{-1}\| = \left\| \sum_{n=1}^{\infty} (e - a)^n y^{-1} \right\| \leq \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \|e - a\|^n \|y^{-1}\| = \frac{1}{\delta} \frac{\|e - a\|}{1 - \|e - a\|} \leq \frac{1}{\delta^2} \frac{\|x - y\|}{1 - \frac{\|x - y\|}{\delta}}, \end{aligned}$$

donde a continuidade de  $b \mapsto b^{-1}$  em  $y$  segue sem grandes esforços (\*). □

**Observação 2.2.54** (Séries geométricas). Em particular, fazendo  $y := e$  na demonstração anterior (e supondo  $\|e\| = 1$ ), resulta

$$x^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (e - x)^n$$

para qualquer  $x \in B(e, 1)$ . Dado que  $x \in B(e, 1)$  sse  $u := e - x \in B(0, 1)$ , mostramos não apenas que  $\sum_{n=0}^{\infty} u^n$  converge sempre que  $\|u\| < 1$ , mas também que converge exatamente para  $(e - u)^{-1}$ . Faça  $\mathcal{B} := \mathbb{R}$  e  $e := 1$  para ter uma recordação da infância. △

Além da beleza Bourbakista intrínseca, álgebras de Banach constituem o cenário ideal para tratar de espectros de operadores em espaços de dimensão infinita, o que os torna úteis para lidar com equações diferenciais parciais e coisas do gênero. Infelizmente, se Análise fosse uma guerra, eu seria apenas o ferreiro — e não a pessoa que empunha a espada em combate<sup>‡</sup>. Por aqui, o ponto que importa foi defendido: anéis topológicos ocorrem com certa frequência em Análise...

E também em Álgebra! Porém, como eu ainda sou apenas um simples ferreiro, minha incapacidade de ilustrar aplicações em Álgebra (também) é intrínseca. Todavia, tal qual no exemplo anterior ambientado no Reino da Análise, isto não precisa impedir a apresentação de algumas ~~armas~~ ferramentas.

<sup>†</sup>Cf. Proposição 2.2.43 e Exercício 2.2.24 (\*).

<sup>‡</sup>Se minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta.

AVISO: para prosseguir, é melhor ter alguma familiaridade com Álgebra Abstrata.

Fixados um anel  $A$  comutativo e com unidade e um ideal  $I$ , consideremos o ideal  $I^n$  definido da seguinte forma:  $I^0 := A$  e  $I^{n+1} := I^n I$  para qualquer  $n \in \mathbb{N}$ , onde o produto entre os ideais  $I^n$  e  $I$  é definido como o menor ideal de  $A$  contendo todos os elementos da forma  $ab$ , com  $a \in I^n$  e  $b \in I$ . Vamos mostrar que ao definir  $\mathcal{B}_a := \{a + I^n : n \in \mathbb{N}\}$  para cada  $a \in A$ ,  $(\mathcal{B}_a)_{a \in A}$  satisfaz a tese da condição (ii) no Teorema 2.1.65 e, portanto, existe uma única topologia sobre  $A$  que tem  $\mathcal{B}_a$  como base local em  $a$ , para cada  $a \in A$ .

O argumento é quase óbvio:  $\mathcal{B}_a$  é um pré-filtro pois  $(a + I^n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência  $\subseteq$ -decrecente de subconjuntos não vazios de  $A$  para qualquer  $a \in A$  fixado, enquanto a condição (ii) se verifica pois se  $q \in p + I^n$ , então  $q = p + y$  com  $y \in I^n$ , e daí  $p = q - y \in q + I^n$  posto que  $-y \in I^n$ .

A topologia descrita acima, chamada de **topologia  $I$ -ádica** do anel  $A$ , eleva  $A$  ao patamar de anel topológico: se  $(x_m, y_m)_{m \in \mathbb{N}} \rightarrow (x, y)$  em  $A \times A$  e  $N \in \mathbb{N}$ , então existe  $M \in \mathbb{N}$  tal que  $x_m \in x + I^N$  e  $y_m \in x + I^N$  para todo  $m \geq M$  (pois  $(x_m)_m \rightarrow x$  e  $(y_m)_m \rightarrow y$ ), i.e., existem  $\alpha, \beta \in I^N$  com  $x_m = x + \alpha$  e  $y_m = y + \beta$ , logo

- $x_m - y_m = x - y + (\alpha - \beta) \in (x - y) + I^N$ , mostrando que a função  $(a, b) \mapsto a - b$  é contínua e, por conseguinte,  $(A, +, 0)$  é grupo topológico com a topologia  $I$ -ádica (cf. Exercício 2.2.34);
- $x_m y_m = xy + (x\beta + \alpha y) + \alpha\beta \in xy + I^N + I^{2N} \subseteq xy + I^N$  pois  $I^N + I^{2N} \subseteq I^N$  (certo?)\*, mostrando que a multiplicação é contínua.

Nesse contexto, o próximo teorema serve como teste para encontrar topologias  $I$ -ádicas de Hausdorff (cf. Teorema 2.2.48 e Corolário 2.2.49).

**Teorema 2.2.55** (da interseção de Krull). *Seja  $A$  um anel comutativo com unidade no qual todo ideal seja finitamente gerado. Se  $J$  é ideal próprio de  $R$  e  $I := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} J^n$ , então  $I \subseteq IJ$ . Em particular, se  $J$  for subconjunto do radical de Jacobson de  $A$  ou se  $A$  for um domínio, então  $I = \{0\}$ .*

*Demonstração.* A prova, adaptada do trabalho de Perdry [27], consiste em mostrar que se  $b \in I$ , então existe  $c \in J$  tal que  $b = bc$ . A parte final do enunciado também decorre disso, haja vista que

- uma das manifestações do **radical de Jacobson** de  $A$  é

$$J(A) = \{r \in A : 1 + sy \text{ é invertível para todo } s \in A\},$$

de modo que se  $J \subseteq J(A)$ , então  $b - bc = b(1 - c) = 0$  com  $c \in J$  acarreta em  $1 - c$  ser invertível e, por conseguinte,  $b = 0$ ,

- enquanto  $0 = b - bc = b(1 - c)$  com  $c \neq 1$  num domínio acarreta em  $b = 0$ .

Pela hipótese sobre  $A$ , existem  $a_1, \dots, a_n \in J$  tais que  $J = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ , i.e.,  $J$  é o ideal gerado pelo subconjunto  $\{a_1, \dots, a_n\}$ . Consequentemente,  $\rho \in J$  sse existe um polinômio  $p \in A[x_1, \dots, x_n]$ , *homogêneo* de grau 1, tal que  $\rho = p(a_1, \dots, a_n)$ : de fato,  $\rho \in J$  sse existem  $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in A$  tais que  $\rho = \sum_{i \leq n} \gamma_i a_i$ , donde segue que  $p := \sum_{i \leq n} \gamma_i x_i$  tem a propriedade desejada<sup>†</sup>.

<sup>†</sup>Lembre-se de que polinômios **homogêneos** de grau  $l$  são aqueles cujas parcelas têm todas *grau total*  $l$ : por exemplo,  $x^3 + xyz - 2x^2y - z^3$  é um polinômio homogêneo de grau 3, enquanto  $2x^2 - 1$  não é.

KATZENSprung: se  $p$  e  $q$  são polinômios homogêneos de graus  $i$  e  $j$ , então  $pq$  é homogêneo de grau  $i + j$ .

Por conta do Katzensprung acima<sup>†</sup>, segue que se  $b \in I$ , então para todo  $k \in \mathbb{N}$  existe um polinômio homogêneo de grau  $k$ , digamos  $p_k \in A[x_1, \dots, x_n]$ , tal que  $b = p_k(a_1, \dots, a_n)$  (percebeu?)<sup>\*</sup>. Isto nos permite definir os ideais  $L_k := \langle p_1, \dots, p_k \rangle$  em  $A[x_1, \dots, x_n]$ , o que induz uma *cadeia ascendente* de ideais  $(L_k)_{k \geq 0}$ , que deve ser *estacionária* em virtude do Teorema da Base de Hilbert (cf. Teorema 2.2.70), i.e., existe  $m \geq 1$  tal que  $L_{m+1} = L_m$ . Logo, existem polinômios  $q_1, \dots, q_m \in A[x_1, \dots, x_n]$  tais que  $p_{m+1} = q_1 p_1 + \dots + q_m p_m$ .

▮ **Afirmção.** Nas condições acima, cada  $q_i$  é homogêneo de grau  $m + 1 - i$ .

*Prova da Afirmção.* Isto segue pois, como grupo aditivo,

$$A[x_1, \dots, x_n] = \bigoplus_{d \in \mathbb{N}} A_d[x_1, \dots, x_n],$$

onde  $G_d := A_d[x_1, \dots, x_n]$  é o subgrupo dos polinômios homogêneos de grau  $d$  (*juntamente* com o polinômio nulo). Em particular, se  $g_d \in G_d$  para todo  $d$  num subconjunto finito  $D \subseteq \mathbb{N}$ , então

$$\sum_{d \in D} g_d = 0 \Rightarrow g_d = 0 \quad \text{para todo } d \in D.$$

Logo, ao expressar  $q_i = \sum Q_{i,j}$ , com cada  $Q_{i,j}$  homogêneo de grau  $j$ , resulta que  $Q_{i,j} p_i$  tem grau  $j + i$ , de modo que as únicas parcelas não nulas devem ser tais que  $m + 1 = j + i$ , i.e.,  $q_i = Q_{i,j}$  é homogêneo de grau  $j = m + 1 - i$ . Para mais detalhes, procure um livro de Álgebra! ▮

Enfim, por valer  $p_i(a_1, \dots, a_n) = b$  para todo  $i$ , temos

$$b = q_1(a_1, \dots, a_n)b + \dots + q_m(a_1, \dots, a_n)b = b(q_1(a_1, \dots, a_n) + \dots + q_m(a_1, \dots, a_n)),$$

com  $q_i(a_1, \dots, a_n) \in J$  em virtude de sua homogeneidade e grau  $> 0$ . Completar os detalhes é um bom jeito de exercitar seus *fundamentos* de Álgebra Elementar ( $\star\star$ ). ▮

Discutir exemplos e aplicações da topologia  $I$ -ádica exigiria que eu estudasse mais Álgebra do que o meu tempo permite. Se for do seu interesse, procure por termos como “Análise  $p$ -ádica” ou “Análise Funcional Não-Arquimediana” nas suas fontes favoritas de conhecimento.

Mas se prepare: trata-se de um mundo bastante diferente.

**Exercício 2.2.31** ( $\star$ ). Num anel comutativo e com unidade  $A$  com a topologia  $I$ -ádica induzida por um ideal  $I$ , mostre que para uma sequência  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $A$ , são equivalentes:

- (i)  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$  em  $A$ ;
- (ii) a sequência  $(\sum_{m=0}^n a_m)_n$  é de Cauchy (cf. Definição 2.2.47). ▮

**Exercício 2.2.32** ( $\star\star$ ). Mostre que  $\mathbb{Z}$  não é discreto com a topologia  $I$ -ádica, qualquer que seja o ideal não trivial  $I$  de  $\mathbb{Z}$  considerado. ▮

<sup>†</sup>Cuja prova é um simples exercício de indução (se você escrever os polinômios de um jeito maroto)<sup>\*</sup>.

### §3 Corpos e espaços vetoriais topológicos

Quem tem letramento em Álgebra Universal pode se incomodar quando se referem a *corpos* como *estruturas algébricas*<sup>†</sup>. No entanto, existir em sociedade nos obriga a conviver com vícios de linguagem inofensivos — fazer estardalhaço é uma escolha. Sendo assim, nas felizes ocasiões em que um anel topológico  $A$  também é *corpo*, i.e., todos os seus elementos não nulos são multiplicativamente invertíveis, diz-se que  $A$  é **corpo topológico** se, além das condições para ser anel topológico, a inversão multiplicativa  $a \mapsto \frac{1}{a}$  também definir uma função contínua da forma  $A \setminus \{0\} \rightarrow A \setminus \{0\}$ .

**AVISO.** Um anel topológico pode ter estrutura de corpo e ainda assim não ser corpo topológico: basta que a inversão não seja contínua. Se quiser muito saber de um exemplo, confira o Exercício 2.2.54.

Corpos ordenados (como  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ , etc.) são corpos topológicos com a topologia induzida por suas ordens (certo?)<sup>\*</sup>. Embora  $\mathbb{C}$  não seja ordenável, a topologia usual também faz de  $\mathbb{C}$  um corpo topológico (cf. Exemplo 2.2.37). Mais *geralmente*, todo corpo  $K$  munido de uma função da forma  $|\cdot|: K \rightarrow [0, \infty)$  satisfazendo

- (i)  $|x| = 0$  sse  $x = 0$ ,
- (ii)  $|xy| = |x||y|$  e
- (iii)  $|x + y| \leq |x| + |y|$  para quaisquer  $x, y \in K$ ,

admite uma topologia compatível com sua estrutura de corpo induzida pela métrica  $d(x, y) := |x - y|$ . Como as mesmas demonstrações que você fez em Análise Real se aplicam aqui, as verificações ficarão por sua conta (\*).

**Definição 2.2.56.** Uma função  $|\cdot|$  como acima é chamada de **valor absoluto**<sup>‡</sup> em  $K$ . ◀

Embora seja bastante frequente lembrar apenas dos valores absolutos típicos de  $\mathbb{R}$  e  $\mathbb{C}$ , há muitos outros. Para citar pelo menos mais um, fixe um número inteiro primo  $p \in \mathbb{Z}$ . Como todo número racional não nulo se expressa de forma única como  $p^k \cdot \frac{m}{n}$  para certos  $k, m, n \in \mathbb{Z}$ , com  $m, n \neq 0$  e não divisíveis por  $p$ , pode-se definir o número

$$\left| p^k \frac{m}{n} \right|_p := \frac{1}{e^k},$$

onde  $e$  é o número de Euler que você conheceu na escola<sup>††</sup>. Ao declarar  $|0|_p := 0$ , ganha-se um valor absoluto em  $\mathbb{Q}$ .

Observe que a topologia em  $\mathbb{Q}$  induzida por  $|\cdot|_p$  difere de sua topologia usual: enquanto  $(p^k)_k$  não converge em  $\mathbb{Q}$  no sentido usual (pois  $(p^k)_k \rightarrow +\infty$  em  $\mathbb{R}$ ), temos  $(p^k)_k \rightarrow 0$  em  $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$  (certo?)<sup>\*</sup>. Embora isso não soe bombástico, a métrica induzida por  $|\cdot|_p$  satisfaz a desigualdade  $d(x, y) \leq \max\{d(x, z), d(z, y)\}$  para quaisquer  $x, y, z \in \mathbb{Q}$ , o que faz de  $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$  um **espaço ultramétrico**. Oportunamente, veremos que isso *sim* afeta drasticamente a topologia de um espaço.

Evidentemente, todos os resultados obtidos para grupos topológicos permanecem válidos para corpos topológicos. Todavia, as exigências adicionais satisfeitas pelos corpos *disponibilizam* mais propriedades:

<sup>†</sup>Já que a exigência de invertibilidade dos elementos não nulos não é exprimível *algebricamente*, i.e., por meio exclusivo de expressões polinomiais — se fosse, produtos de corpos seriam corpos...

<sup>‡</sup>Como em [15], mas também há quem a chame de *valoração* real (por exemplo, [24]), o que não deve ser confundido com as *valorações de Krull*, que generalizam *apenas* as valorações reais *não arquimedianas*.

<sup>††</sup>Também é comum usar o próprio  $p$  no lugar de  $e$ . De modo geral, qualquer número real  $a > 0$  *serve*.

- além das translações aditivas, as ~~translações multiplicativas~~<sup>†</sup> funções  $p \mapsto \lambda p$  são homeomorfismos para qualquer  $\lambda \in K \setminus \{0\}$  fixado, essencialmente por serem contínuas (certo?)<sup>\*</sup> com inversas contínuas dadas por  $p \mapsto \frac{1}{\lambda}p$ ;
- $K$  é de Hausdorff sse  $\{0\}$  é fechado (cf. Corolário 2.2.49), mas para tanto basta que exista um aberto não vazio e próprio<sup>‡</sup> — afinal, se  $\overline{\{0\}} \neq \{0\}$ , então  $\overline{\{0\}}$  é um ideal não nulo de  $K$  e, portanto, deve ser o próprio  $K$  (entendeu?)<sup>★★</sup>.

Uma vez em posse de um corpo topológico  $K$ , o próximo passo é considerar  $K$ -espaços vetoriais munidos de topologias compatíveis com sua estrutura vetorial.

**Definição 2.2.57.** Dizemos que um  $K$ -espaço vetorial  $E$  é um  **$K$ -espaço vetorial topológico** (abrev.  $K$ -e.v.t.) se  $E$  admite uma topologia que faz de  $(E, +, 0)$  um grupo topológico de tal forma que a multiplicação  $K \times E \rightarrow E$  seja contínua<sup>††</sup>. ◻

Mais uma vez, os  $\mathbb{K}$ -espaços normados (para  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ) constituem os e.v.t.'s “de entrada” para esse universo. Mas não se acostume: normas se tornam ineficazes em contextos relativamente elementares.

**Exemplo 2.2.58.** Para qualquer conjunto  $X$ ,  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$  também é  $\mathbb{K}$ -e.v.t., afirmação que permanece verdadeira ao substituir  $\mathbb{K}$  por qualquer outro corpo topológico  $K$  (certo?)<sup>\*</sup>. No entanto, não existe norma que induza a topologia de  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$  se o conjunto  $X$  for infinito<sup>††</sup>.

Com efeito, se existisse uma norma  $\|\cdot\|$  em  $\text{Fun}(X, \mathbb{K})$  cuja topologia induzida fosse a topologia produto, existiriam um subconjunto finito  $F \subseteq X$  e um número real  $r > 0$  satisfazendo  $B(\underline{0}_X; F; r) \subseteq B_{\|\cdot\|}(\underline{0}_X, 1)$ , onde  $\underline{0}_X: X \rightarrow \mathbb{K}$  denota a função nula e  $B(\underline{0}_X; F; r)$  é um aberto básico da topologia produto em torno de  $\underline{0}_X$  (cf. Exercício 2.1.71). Ocorre que para  $f := \chi_F$ , temos  $f \neq \underline{0}_X$  pois existe  $x \in X \setminus F$  (certo?!)<sup>\*</sup>, acarretando  $\|f\| \neq 0$ , com  $\lambda f \in B(\underline{0}_X; F; r)$  para todo  $\lambda \in \mathbb{K}$ , enquanto  $\lambda f \notin B_{\|\cdot\|}(\underline{0}_X, 1)$  sempre que  $\lambda \geq \frac{1}{\|f\|}$ . ▲

Por outro lado, se  $X$  é finito, então a topologia de  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$  é oriunda de uma norma pois, neste caso, *existe apenas uma topologia sobre  $\mathbb{K}^{|X|}$  que faz dele um  $\mathbb{K}$ -e.v.t. de Hausdorff*. Ainda é cedo para explorar esse resultado no caso de um conjunto  $X$  finito qualquer, pois isso depende de *outras propriedades topológicas* de  $\mathbb{R}$  e  $\mathbb{C}$  que ainda não foram exploradas. Na verdade, mesmo para  $|X| = 1$ , o resultado pode falhar. Fazendo  $K := \mathbb{R}$  com a topologia discreta e  $E := \mathbb{R}$  com sua topologia usual, obtemos  $K$  um corpo topológico tal que  $E$  é um  $K$ -e.v.t. de Hausdorff não homeomorfo a  $K$  (certo?)<sup>\*</sup>.

*Ah, mas o problema foi permitir o corpo discreto!*

Tudo bem, podemos considerar  $K := \mathbb{R}$  com sua topologia usual e tomar  $E := \mathbb{R}$  com a topologia *caótica*  $\{\emptyset, \mathbb{R}\}$ . Mais uma vez,  $E$  é um  $K$ -e.v.t. (por quê?)<sup>\*</sup> não homeomorfo a  $K$  já que, por exemplo,  $E$  não é de Hausdorff.

*Ah! Mas o problema foi permitir que  $E$  não fosse de Hausdorff!* (cf. Exercício 2.2.55).

<sup>†</sup>Há quem as xingue de *homotetias*.

<sup>‡</sup>Consequentemente, os únicos abertos de um corpo topológico  $K$  que não é de Hausdorff são  $\emptyset$  e  $K$ .

<sup>††</sup>*Módulos topológicos* (sobre anéis topológicos) se definem de maneira análoga, evidentemente.

<sup>★★</sup>A topologia de  $\text{Fun}_p(X, \mathbb{K})$  não é *metrizável* se  $X$  for não enumerável (cf. Exercício 2.1.73). Normas são mais exigentes do que métricas.



Se essa recursão socrática não for encerrada, logo estaremos discutindo *topologias minimais, continuidade automática, retrobounded fields...* entre muitas outras terminologias pagãs [34, 35]. Uma vez que O próprio BOURBAKI (!!!) se restringe a corpos dotados de valores absolutos em [6], quem sou eu para me propor a investigar espaços vetoriais topológicos sobre corpos topológicos mais gerais? Portanto, sempre que for preciso, assumiremos que a topologia dos corpos topológicos em questão é induzida por um valor absoluto, a fim de tornar a discussão útil tanto para analistas (que se importam majoritariamente por  $\mathbb{R}$  e  $\mathbb{C}$ ) quanto para algebristas<sup>†</sup> (que preferem corpos com valorações não arquimedianas). Em particular, a letra “ $\mathbb{K}$ ” será mantida para denotar  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  pelo restante do texto.

AVISO: até o final desta subsubseção,  $K$  é um corpo dotado de um valor absoluto  $|\cdot|$ .

Uma das principais utilidades dos valores absolutos é dar sentido aos conjuntos *balanceados* nos espaços vetoriais.

**Definição 2.2.59.** Dizemos que um subconjunto  $S$  de um  $K$ -espaço vetorial  $X$  é **balanceado** se  $\alpha S \subseteq S$  para todo  $\alpha \in \mathbb{K}$  com  $|\alpha| \leq 1$ .  $\blacksquare$

A noção de balanceamento generaliza certos aspectos geométricos de simetria (via *reflexões*) e *contratibilidade*, já que  $S$  é balanceado sse  $S = B_K[0, 1] \cdot S$  (certo?)<sup>\*</sup>:

- observe que com  $K := \mathbb{C}$  e  $X := \mathbb{C}$ , os únicos subconjuntos balanceados de  $X$  são  $X$ ,  $\emptyset$ ,  $\{0\}$  e as bolas abertas ou fechadas;
- para  $K := \mathbb{R}$  e  $X := \mathbb{C}$ , além dos subconjuntos acima, também são balanceados os *segmentos* da forma  $[-v, v]$ , onde  $[x, y] := \{tx + (1-t)y : t \in [0, 1]\}$ .

**Exercício 2.2.33** (\*). Além de verificar as afirmações acima, mostre que um subconjunto  $S$  de um  $\mathbb{R}$ -espaço vetorial  $X$  é balanceado sse  $S = -S$  e  $[0, 1)S \subseteq S$ .  $\blacksquare$

O próximo lema será fundamental em diversos resultados sobre e.v.t's.

**Lema 2.2.60.** *Todo  $K$ -e.v.t.  $E$  admite uma base local de vizinhanças balanceadas em torno de  $0 \in E$ . Explicitamente: se  $U \subseteq E$  é um aberto em torno de  $0 \in E$ , então existe um aberto não vazio e balanceado  $B \subseteq U$  tal que  $0 \in B \subseteq U$ .*

*Demonstração.* Como a multiplicação é contínua em  $(0, 0) \in K \times E$ , existem  $\delta > 0$  e um aberto  $W \subseteq E$  em torno  $0 \in E$  tais que  $B_K(0, \delta) \cdot W \subseteq U$ , i.e., tal que  $\alpha W \subseteq U$  sempre que  $|\alpha| < \delta$ . Logo, basta notar que  $B := B_K(0, \delta) \cdot W = \bigcup_{|\alpha| < \delta} \alpha W$  serve (verifique!)<sup>\*</sup>.  $\square$

**Teorema 2.2.61.** *Para um  $K$ -e.v.t.  $E$  e um funcional linear não nulo  $\varphi: E \rightarrow K$ , são equivalentes:*

- $\varphi$  é contínuo;
- $\ker \varphi := \{x \in E : \varphi(x) = 0\}$  é fechado;
- $\ker \varphi$  não é denso em  $E$ ;
- $\varphi$  é limitado em algum aberto em torno de  $0 \in E$ , i.e., existem um aberto  $B \subseteq E$  em torno de  $0 \in E$  e um número real  $M > 0$  tais que  $|\varphi(x)| < M$  para todo  $x \in B$ .

<sup>†</sup>Além de pessoas que pesquisam em Física! Confira [37] para mais detalhes.

*Demonstração.* As implicações (i)  $\Rightarrow$  (ii) e (ii)  $\Rightarrow$  (iii) serão problema seu (\*). Supondo que  $\ker \varphi$  não é denso, segue que existem  $p \in E \setminus \{0\}$  e um aberto  $W \subseteq E$  tais que  $p \in W$  e  $W \cap \ker \varphi = \emptyset$ . Logo,  $U := W - p$  é um aberto em torno de  $0 \in E$ , o que permite usar o lema anterior para conjurar um aberto balanceado  $B \subseteq E$  tal que  $0 \in B$  com  $B \subseteq U$ .

「**Afirmção 2.2.62.** Se  $T: X \rightarrow Y$  é uma transformação linear entre  $K$ -espaços vetoriais e  $S \subseteq X$  é balanceado, então  $T[S]$  é balanceado em  $Y$ .

*Prova da Afirmção.*  $S = B_K[0, 1]S \Rightarrow T[S] = T[B_K[0, 1]S] = B_K[0, 1]T[S]$ . 」

Por conta da afirmação acima, segue que  $\varphi[B] \subseteq K$  é balanceado. Se, por absurdo,  $\varphi[B]$  não fosse limitado no sentido de (iv), existiria  $y \in \varphi[B]$  com  $|y| > |\varphi(p)|$ . Logo,  $y \neq 0$  em  $K$ , permitindo considerar  $\lambda := -\frac{\varphi(p)}{y}$ , que satisfaz  $|\lambda| < 1$  (por quê?!)\* e, por conseguinte,  $\lambda y \in \varphi[B]$ , i.e., existe  $v \in B$  com  $\varphi(v) = \lambda y = -\varphi(p)$ , donde segue que  $p + v \in \ker \varphi$ . Mas isto é absurdo, pois  $p + v \in p + B \subseteq p + (W - p) = W$ , acarretando  $W \cap \ker \varphi \neq \emptyset$ . Portanto, vale (iv).

Por fim, assumindo (iv), basta mostrar que  $\varphi$  é contínua em  $0 \in E$ . Para isso, dado  $\varepsilon > 0$  e tomando  $B$  e  $M$  como em (iv), basta notar que  $W := \frac{\varepsilon}{M}B$  é um aberto em torno de  $0 \in E$  tal que  $|\varphi(x)| < \varepsilon$  para todo  $x \in W$  (por quê?)\*. □

*Demonstração alternativa de (ii)  $\Rightarrow$  (i), para o caso normado.* Procedendo pela contrapositiva, suponha que  $y \in E \setminus \ker \varphi$ . Como  $\varphi$  não é contínua, para cada  $n \in \mathbb{N}$  existe  $x_n \in E$  com  $|\varphi(x_n)| > 2^n \|x_n\|$ . Daí, não é difícil perceber que

$$y_n := y - \frac{\varphi(y)}{\varphi(x_n)} \cdot x_n$$

é tal que  $y_n \in \ker \varphi$  para todo  $n$  e  $(y_n)_n \rightarrow y$ , mostrando que  $\ker \varphi$  não é fechado. □

**Corolário 2.2.63.** Sejam  $E$  um  $K$ -e.v.t. de Hausdorff e  $v \in E \setminus \{0\}$ . Se  $\dim_K E = 1$ , então o isomorfismo linear dado por  $\lambda \mapsto \lambda v$  é um homeomorfismo para qualquer vetor  $v \in E \setminus \{0\}$  fixado.

*Demonstração.* Em geral, a função  $\gamma: K \rightarrow E$  dada por  $\gamma(\lambda) := \lambda v$  é  $K$ -linear e contínua. Com a hipótese sobre a dimensão de  $E$ , segue que  $\gamma$  é invertível, com  $\gamma^{-1}: E \rightarrow K$  um funcional linear injetivo. Finalmente, por  $E$  ser de Hausdorff, a continuidade de  $\gamma^{-1}$  segue do teorema anterior (pois...?)\*. □

O corolário anterior está longe de ser banal: além de formalizar a intuição de que um  $K$ -espaço vetorial com dimensão 1 *deveria*<sup>†</sup> ser o próprio  $K$ , trata-se do primeiro passo na descrição dos  $K$ -e.v.t's de Hausdorff *finito-dimensionais*, tarefa cuja conclusão depende da introdução da *compacidade local*. Há mais resultados interessantes que podem ser abordados sobre  $K$ -e.v.t's no *presente grau de generalidade*? Certamente! Porém, a maioria deles nos desviaria do objetivo central do texto. A próxima subsubseção de exercícios elenca alguns desses fatos gerais que podem ser abordados de forma segura, enquanto a subseção seguinte diminui a generalidade a fim de estender um pouco mais a discussão no âmbito da Análise Funcional.

<sup>†</sup>Mas nem sempre é... (cf. Exercício 2.2.55).

#### §4 Exercícios adicionais

**Exercício 2.2.34** (\*). Sejam  $G$  um grupo e  $\mathcal{T}$  uma topologia sobre  $G$ . Mostre que a topologia  $\mathcal{T}$  faz de  $G$  um grupo topológico sse a função  $\varphi: G \times G \rightarrow G$  dada por  $\varphi(x, y) := xy^{-1}$  é contínua, onde  $G \times G$  tem a topologia produto. ■

**Exercício 2.2.35** (\*). Para um grupo topológico  $G$  com elemento neutro  $e$ , sejam  $p \in G$  um ponto fixado e  ${}_p\tau, \tau_p$  as translações dadas por  $x \mapsto px$  e  $x \mapsto xp$ , respectivamente.

- Mostre que  $\mathcal{N}_p = \tau_p(\mathcal{N}_e) = {}_p\tau(\mathcal{N}_e)$ . Explicitamente:  $M \subseteq G$  é vizinhança de  $p$  sse existe  $N \subseteq G$  vizinhança de  $e$  tal que  $Np \subseteq M$  sse existe  $O \subseteq G$  vizinhança de  $e$  tal que  $pO \subseteq M$ .
- Mostre que translações são funções *fechadas*<sup>†</sup>. Conclua que  $\overline{pS} = p\overline{S}$  e  $\overline{Sp} = \overline{S}p$  para qualquer  $S \subseteq G$ .
- Mostre que translações são funções *abertas*<sup>‡</sup>. Conclua que  $AB$  é aberto em  $G$  sempre que  $A$  ou  $B$  forem abertos de  $G$ . Dica:  $AB = \bigcup_{b \in B} Ab = \bigcup_{a \in A} aB$ . ■

**Exercício 2.2.36** (\*). Mostre que  $A := \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$  e  $B := \{(x, \frac{1}{x}) : x > 0\}$  são fechados do grupo topológico  $(\mathbb{R}^2, +, 0)$ , mas  $A + B$  não é fechado em  $\mathbb{R}^2$ . Dica: descreva explicitamente os membros de  $A + B$ . ■

**Exercício 2.2.37** (\*). Para subconjuntos  $S$  e  $T$  de um grupo topológico  $G$ , mostre que vale a inclusão  $\overline{S} \cdot \overline{T} \subseteq \overline{ST}$ . Conclua que se  $S \subseteq G$  é subgrupo de  $G$ , então  $\overline{S}$  ainda é subgrupo de  $G$ . Dica: não se esqueça dos Exercícios 2.1.45 e 2.1.61. ■

**Exercício 2.2.38** (\*). Mostre que se  $G$  é um grupo, então a topologia discreta sobre  $G$  faz de  $G$  um grupo topológico. ■

**Exercício 2.2.39** (\*). Mostre que um grupo topológico é discreto sse existe pelo menos um ponto isolado<sup>††</sup>. ■

**Exercício 2.2.40** (Cf. Exemplo 2.1.67 (\*)). Mostre que a adição  $+: \mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S \rightarrow \mathbb{R}_S$  é contínua. A reta de Sorgenfrey é um espaço homogêneo? É um grupo topológico? Dica: no futuro, veremos que todo grupo topológico 1<sup>o</sup>-contável de Hausdorff é metrizável. ■

**Exercício 2.2.41** (\*). Diremos que uma métrica  $d$  sobre um grupo  $G$  é **compatível à direita** se  $d(ac, bc) = d(a, b)$  para quaisquer  $a, b, c \in G$ . Sejam então  $G$  e  $H$  grupos topológicos e  $f: G \rightarrow H$  um morfismo de grupos. Mostre que se as topologias de  $G$  e  $H$  forem induzidas por métricas  $d_G$  e  $d_H$ , ambas compatíveis à direita com seus respectivos grupos, então  $f$  é uniformemente contínua (com respeito às métricas  $d_G$  e  $d_H$ ) sse  $f$  é uniformemente contínua (com respeito à Definição 2.2.45). ■

**Exercício 2.2.42** (\*). Determine todos os subgrupos fechados de  $(\mathbb{R}, +, 0)$ . Dica: mostre que os subgrupos de  $\mathbb{R}$  são discretos ou densos. ■

**Exercício 2.2.43** (\*). Ao considerar  $(\mathbb{R}, +, 0)$  com sua estrutura de grupo topológico usual, mostre que  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é morfismo contínuo de grupos sse existe  $a \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = ax$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

<sup>†</sup>I.e., tais que a imagem de fechados é fechada (cf. Afirmação 3.1.18).

<sup>‡</sup>I.e., tais que a imagem de abertos é aberta.

<sup>††</sup>É bobagem, mas não se esqueça: estruturas algébricas com *constantes*, como grupos, nunca são vazias.

**Exercício 2.2.44**  $(\star^5)$ . Mostre que existem *muitos* morfismos descontínuos de grupos de  $(\mathbb{R}, +, 0)$  em si mesmo. ■

**Exercício 2.2.45**  $(\star)$ . Seja  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$  uma  $\mathbb{K}$ -álgebra normada com unidade  $e \in \mathcal{A}$ .

- Mostre que  $\|e\| \geq 1$ . Dica:  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ , lembra?
- Seja  $E_z: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  a translação multiplicativa por  $z$  à esquerda, i.e.,  $E_z(x) := zx$  para todo  $x \in \mathcal{A}$ . Mostre que  $E_z$  é um operador  $\mathbb{K}$ -linear contínuo, para todo  $z \in \mathcal{A}$ .
- Finalmente, para cada  $a \in \mathcal{A}$ , defina  $\|a\|' := \|E_a\|$ , onde  $\|E_a\|$  é a norma do operador contínuo  $E_a$  (pág. 31). Mostre que  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|')$  é uma  $\mathbb{K}$ -álgebra normada tal que  $\text{Id}: (\mathcal{A}, \|\cdot\|) \rightarrow (\mathcal{A}, \|\cdot\|')$  é contínua com inversa contínua e  $\|e\|' = 1$ . ■

**Exercício 2.2.46**  $(\star)$ . Seja  $S$  um subconjunto de um anel topológico  $A$ .

- Mostre que se  $S$  é ideal de  $A$ , então  $\overline{S}$  é ideal de  $A$ .
- Mostre que se  $S$  é subanel de  $A$ , então  $\overline{S}$  é subanel de  $A$ . ■

**Exercício 2.2.47**  $(\star)$ . Seja  $A$  um anel topológico (com unidade!) e considere o subgrupo multiplicativo  $\text{Inv}(A) := \{x \in A \setminus \{0\} : x \text{ é invertível}\}$ . Mostre que se  $1 \in \text{int}(\text{Inv}(A))$ , então  $\text{Inv}(A)$  é aberto. Conclua que na primeira parte do Teorema 2.2.52, bastaria mostrar que  $e \in \mathcal{B}$  é ponto interior de  $\text{Inv}(\mathcal{B})$ . Dica: se  $p \in \text{Inv}(A)$ , então  $x \mapsto px$  é um homeomorfismo. ■

**Exercício 2.2.48** (Topologia espectral<sup>†</sup>, Harte [17]  $(\star\star)$ ). Dado um anel comutativo e com unidade  $A$ , para cada  $J \subseteq A$  finito considere o subconjunto

$$\mathcal{B}(0, J) := \{x \in A : 1 - jx \in \text{Inv}(A) \text{ para todo } j \in J\},$$

e declare  $\mathcal{B}(a, J) := a + \mathcal{B}(0, J)$  para todo  $a \in A$ .

- Mostre que ao definir  $\mathcal{B}_a := \{\mathcal{B}(a, J) : J \subseteq A \text{ é finito}\}$  para cada  $a \in A$ , a  $A$ -upla  $(\mathcal{B}_a)_{a \in A}$  é um sistema de bases locais para uma topologia  $\mathcal{S}$  em  $A$ .
- Mostre que  $(A, \mathcal{S})$  é um anel topológico,  $\text{Inv}(A)$  é  $\mathcal{S}$ -aberto e  $\rho: \text{Inv}(A) \rightarrow \text{Inv}(A)$  dada por  $\rho(x) := x^{-1}$  é contínua com respeito à topologia  $\mathcal{S}$ .
- Seja  $\mathcal{T}$  uma topologia sobre  $A$  que torne  $(A, \mathcal{T})$  um anel topológico. Mostre que  $\text{Inv}(A)$  é  $\mathcal{T}$ -aberto e  $\rho$  é contínua com respeito à topologia  $\mathcal{T}$  sse a função identidade  $\text{Id}_A: (A, \mathcal{T}) \rightarrow (A, \mathcal{S})$  é contínua. ■

**Exercício 2.2.49**  $(\star\star)$ . Sejam  $K$  um corpo topológico,  $E$  um  $K$ -e.v.t. e  $\varphi: E \rightarrow K$  um funcional  $K$ -linear. Mostre que se  $\varphi \neq 0$ , então  $\varphi$  é uma função *aberta* (cf. item (c) do Exercício 2.2.35). ■

**Exercício 2.2.50**  $(\star)$ . Sejam  $K$  um corpo topológico e  $S$  um subconjunto de um  $K$ -e.v.t.  $E$ .

- Mostre que se  $S$  é subespaço vetorial de  $E$ , então  $\overline{S}$  é subespaço vetorial de  $E$ .

<sup>†</sup>Cuidado para não confundir com a *topologia de Zariski* no espectro, que será discutida no final deste capítulo.

- b) Assumindo  $K$  é um corpo com valor absoluto, mostre que  $\overline{S}$  é balanceado sempre que  $S$  é balanceado. Além disso, se  $0 \in \text{int}(S)$ , então  $\text{int}(S)$  também é balanceado sempre que  $S$  for balanceado. ■

**Exercício 2.2.51** (\*). Seja  $(f_i: X \rightarrow X_i)_{i \in \mathcal{I}}$  como na Proposição 2.1.83.

- Supondo que  $X$  e  $X_i$  sejam grupos e cada  $f_i$  seja um morfismo de grupos, com  $X_i$  grupo topológico para todo  $i \in \mathcal{I}$ , mostre que  $(X, \mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}})$  é grupo topológico.
- Supondo que  $X$  e  $X_i$  sejam anéis e cada  $f_i$  seja um morfismo de anéis, com  $X_i$  anel topológico para todo  $i \in \mathcal{I}$ , mostre que  $(X, \mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}})$  é anel topológico.
- Supondo que  $X$  e  $X_i$  sejam  $K$ -espaços vetoriais (para um corpo topológico  $K$ ), tal que cada  $f_i$  seja um  $K$ -linear e  $X_i$  seja  $K$ -e.v.t. para todo  $i \in \mathcal{I}$ , mostre que  $(X, \mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}})$  é  $K$ -e.v.t..
- Conclua que:
  - a topologia de subespaço sobre subgrupos, subanéis e subespaços vetoriais é compatível com as respectivas estruturas algébricas.
  - a topologia produto em produtos de grupos topológicos, anéis topológicos e  $K$ -e.v.t.'s é compatível com as respectivas estruturas algébricas dos produtos. ■

**Exercício 2.2.52** (\*). Seja  $X$  um espaço topológico que admita uma função contínua e ilimitada  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ , e considere  $C(X, \mathbb{R})$  com a *topologia da convergência uniforme*, i.e., a topologia que  $C(X, \mathbb{R})$  herda de  $\text{Fun}(X, \mathbb{R})$  com a métrica  $\rho$  do Exercício 1.1.6. Mostre que sob tais hipóteses, tanto a multiplicação  $\mathbb{R} \times C(X, \mathbb{R}) \rightarrow C(X, \mathbb{R})$  quanto o produto  $C(X, \mathbb{R}) \times C(X, \mathbb{R}) \rightarrow C(X, \mathbb{R})$  não são funções contínuas. ■

**Exercício 2.2.53** (For fun (\*)). Para um espaço topológico  $S$ , um conjunto  $X$  e uma coleção de índices  $\mathcal{I}$ , mostre que se  $P: \text{Fun}_p(\mathcal{I}, S) \rightarrow S$  é uma “operação  $\mathcal{I}$ -ária contínua”, então a operação induzida  $\tilde{P}: \text{Fun}_p(\mathcal{I}, \text{Fun}_p(X, S)) \rightarrow \text{Fun}_p(X, S)$  é contínua, onde  $\tilde{P}((f_i)_{i \in \mathcal{I}})(x) := P((f_i(x))_{i \in \mathcal{I}})$  para qualquer  $x \in X$ . Dica: trata-se apenas de uma generalização do item (i) do Lema 2.2.38. ■

**Exercício 2.2.54** (\*). Sobre  $\mathbb{Q}$ , considere a topologia gerada pelas bases  $(\mathcal{B}_q)_{q \in \mathbb{Q}}$ , onde  $\mathcal{B}_q := \{p\mathbb{Z} + q : p \in \mathbb{Z}\}$  para cada  $q \in \mathbb{Q}$ .

- Mostre que  $\mathbb{Q}$  é um anel topológico de Hausdorff com tal topologia.
- Mostre que a pré-imagem de  $U := 1 + 2\mathbb{Z}$  pela inversão multiplicativa não é aberta em  $\mathbb{Q}$ . ■

**Exercício 2.2.55** (Bourbaki [6][Exercício 6.a, §2, pág. 25] (\*)). Considere o subconjunto  $K := \mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ .

- Mostre que  $K$  é  $\mathbb{Q}$ -espaço vetorial com  $\dim_{\mathbb{Q}} K = 2$ . Observação: se seus conhecimentos de Álgebra Básica estiverem enferrujados, apenas acredite e prossiga, pois o que interessa é o restante.
- Considere  $K$  com a topologia herdada de  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ , bem como  $E := \mathbb{Q}(\sqrt{2})$  com a topologia de subespaço de  $\mathbb{R}$ . Mostre que tanto  $K$  é um corpo topológico quanto  $E$  é um  $K$ -e.v.t., ambos de Hausdorff e não discretos.
- Existe algum funcional linear contínuo e não nulo  $E \rightarrow K$ ? Existe algum homeomorfismo  $K$ -linear entre ambos? Dica: note que  $((1 - \sqrt{2})^n)_n \rightarrow 0$  em  $E$ . ■

### 2.2.6 Topologias fracas em Análise Funcional

O Exercício 2.2.51 já indicou que o método de gerar topologias a partir de funções se adapta naturalmente para e.v.t's. Porém, como você pode ter caído aqui de paraquedas, convém explicitar que isto significa o seguinte: fixados

- um corpo topológico  $K$ ,
- um  $K$ -espaço vetorial  $X$ ,
- uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(X_i)_{i \in \mathcal{I}}$  de  $K$ -e.v.t's,
- uma  $\mathcal{I}$ -upla  $(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$  de funções  $K$ -lineares da forma  $f_i: X \rightarrow X_i$ ,

a menor topologia em  $X$  que torna todas as funções  $f_i: X \rightarrow X_i$  contínuas, denotada por  $\mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$  (cf. Definição 2.1.84), também faz de  $(X, \mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}})$  um  $K$ -e.v.t.. Isto se deve ao comportamento da convergência da topologia fraca (cf. Exemplo 2.1.87), segundo a qual uma rede  $\varphi$  em  $X$  converge para  $p \in X$  sse  $f_i \circ \varphi \rightarrow_{X_i} f_i(p)$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ . Assim, por exemplo, se  $(\lambda_\alpha)_\alpha \rightarrow \lambda$  em  $K$  e  $(x_\alpha)_\alpha \rightarrow x$  em  $(X, \mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}})$ , então  $(f_i(x_\alpha))_\alpha \rightarrow f_i(x)$  em  $X_i$  para qualquer  $i \in \mathcal{I}$ , donde o fato de  $K \times X_i \rightarrow X_i$  ser contínua acarreta

$$(\lambda_\alpha f_i(x_\alpha))_\alpha = (f_i(\lambda_\alpha x_\alpha))_\alpha \rightarrow_{X_i} \lambda f_i(x) = f_i(\lambda x),$$

mostrando que  $(\lambda_\alpha x_\alpha)_\alpha \rightarrow \lambda x$  em  $(X, \mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}})$ . A compatibilidade da topologia fraca com as outras operações de  $X$  segue de maneira análoga (concorda?)\*.

Nesta subseção, veremos as principais instâncias de topologias fracas em Análise Funcional — mas nada muito além disso, já que a *compacidade* ainda não está disponível em nosso arsenal vocabulário.

#### §1 Seminormas e convexidade local

Uma das minhas mentiras favoritas é a máxima

$$\text{ANÁLISE} = \text{ÁLGEBRA} + \text{TOPOLOGIA}$$

pois ela soa verdadeira quando se olha de longe, mas se revela falsa após uma leve aproximação: entre outros problemas, parece faltar GEOMETRIA. Isto fica evidente ao nos lembrarmos de que *convexidade* é algo fundamental para Análise.

Intuitivamente, um conjunto  $C$  é *convexo* se o *segmento de reta* ligando quaisquer dois de seus pontos está inteiramente contido em  $C$ .

Embora a Álgebra tenha poder de *expressividade* suficiente para descrever *retas* (basta um espaço vetorial sobre um corpo), a ideia de *segmento de reta* lhe escapa, pois precisamos ser capazes de distinguir as *extremidades* do segmento, i.e., onde ele *começa* e onde ele *termina*. Como sempre se escuta nas reuniões de departamento, trata-se de uma questão de ORDEM.

**Definição 2.2.64.** Um subconjunto  $S$  de um  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $X$  é **convexo** se para quaisquer  $t \in (0, 1)$  e  $x, y \in S$  valer que  $ty + (1 - t)x \in S$ . ◻



Uma vez que  $ty + (1-t)x = t(y-x) + x$ , pode-se interpretar a definição acima como a formalização da definição intuitiva de convexidade: enquanto  $L := \{t(y-x) : t \in \mathbb{K}\}$  é a *reta* em  $X$  determinada pelo vetor  $y-x$ ,  $L+x$  é a translação da reta  $L$  pelo vetor  $x$ , que passa por  $x$  em  $t := 0$  e por  $y$  em  $t := 1$ . Logo,  $S$  é convexo sse o *segmento*  $[x, y] := \{t(y-x) + x : t \in [0, 1]\}$  está contido em  $S$  para quaisquer  $x, y \in S$ .

A fim de ilustrar a importância da convexidade sem descaracterizar ainda mais os objetivos deste texto, vamos ver como ela pode ser usada para responder uma pergunta aparentemente banal.

PERGUNTA: dado um  $\mathbb{K}$ -e.v.t.  $E \neq \{0\}$ , existe algum funcional linear contínuo e não nulo  $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$ ?

A depender de sua bagagem, a pergunta acima pode parecer boba: talvez você se lembre que *toda transformação linear é contínua*, o que tornaria a indagação acima bastante idiota. Contudo, trata-se de uma memória falsa: apenas as transformações lineares da forma  $\mathbb{K}^n \rightarrow E$  são automaticamente contínuas, o que será provado oportunamente.

**Exemplo 2.2.65.** Se um  $\mathbb{K}$ -e.v.t.  $E$  é  $1^o$ -contável e tem dimensão infinita, então existe um funcional linear  $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$  descontínuo<sup>†</sup>.

De fato, sejam  $\mathcal{V} := \{V_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma base local de vizinhanças em torno de  $0 \in E$  e fixe  $\mathcal{X} := \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq E$  um subconjunto l.i. infinito enumerável. Supondo que  $\mathcal{V}$  é decrescente (cf. Lema 2.1.68) e fixando  $n \in \mathbb{N}$ , a continuidade da multiplicação  $k \mapsto kx_n$  permite tomar  $t_n \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  tal que  $t_n x_n \in V_n$ , donde segue que  $(t_n x_n)_n \rightarrow_E 0$  (certo?)<sup>\*</sup>. Considerando uma base (de Hamel)  $\mathcal{B}$  que contém  $\mathcal{X}$ , pode-se definir um funcional linear  $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$  declarando  $\varphi(x_n) := \frac{1}{t_n}$  e  $\varphi(b) := 0$  se  $b \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{X}$ . Logo,  $\varphi(t_n x_n) = 1$  para todo  $n$ , mostrando que  $\varphi$  não é contínua em  $0 \in E$ . ▲

**Exercício 2.2.56** (\*). Mostre que o resultado anterior permanece válido mesmo se  $K$  for meramente um corpo topológico sem pontos isolados. ■

Portanto, para um  $\mathbb{K}$ -e.v.t.  $E$ , é relativamente comum que se tenha

$$\text{TLin}_{\mathbb{K}}(E, \mathbb{K}) \subsetneq \text{Lin}_{\mathbb{K}}(E, \mathbb{K}),$$

onde  $\text{Lin}_{\mathbb{K}}(E, \mathbb{K})$  denota o **dual algébrico** de  $E$ , i.e., a coleção de *todos* os funcionais lineares da forma  $E \rightarrow \mathbb{K}$ , contínuos ou não. Isso mostra que a pergunta é pertinente. E como veremos, não se trata de mero preciosismo, já que existem  $\mathbb{K}$ -espaços vetoriais não triviais para os quais a resposta é “Não”.

No que segue, chamaremos um subconjunto  $D$  de um  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $X$  de **disco** se  $D$  for um subconjunto convexo, balanceado e **expansível**, onde o último termo significa o seguinte<sup>‡</sup>: para qualquer  $x \in X$  existe  $\beta > 0$  tal que  $\alpha x \in D$  para qualquer  $\alpha \in \mathbb{K}$  satisfazendo  $|\alpha| \leq \beta$ .

**Exemplo 2.2.66.** Bolas em espaços normados (abertas ou fechadas) e centradas na origem são discos por excelência. Mas atenção: subconjuntos expansíveis não precisam ser convexos, como o símbolo “+” nos ensina em  $\mathbb{R}^2$ , e tampouco precisam ser balanceados, por conta de animais como  $[-1, 2]$  em  $\mathbb{R}$  (certo?)<sup>\*</sup>. Em particular, todo disco contém a origem. ▲

<sup>†</sup>Se para você for suficiente lidar com espaços normados, basta definir  $\varphi(x_n) := 2^{2n} \|x_n\|^2$  e notar que  $\left(\frac{1}{\|x_n\|^{2n}} x_n\right)_n \rightarrow 0$ .

<sup>‡</sup>A ideia é que um subconjunto expansível contém pelo menos um segmento *limitado* de cada *direção* possível.

Note que se  $D \subseteq X$  é um disco, então para qualquer  $x \in X$  existe  $r > 0$  tal que  $x \in rD$ : de fato, por  $D$  ser expansível, existe  $\beta > 0$  tal que  $\alpha x \in D$  sempre que  $|\alpha| \leq \beta$ , donde segue que basta tomar  $r := \beta^{-1}$ . Logo, o conjunto  $S_x := \{r > 0 : x \in rD\}$  é não-vazio e limitado inferiormente em  $\mathbb{R}$ , o que assegura a existência do número real  $\|x\|_D := \inf S_x$ .

**Definição 2.2.67.** Nas condições acima, a função  $\|\cdot\|_D : X \rightarrow \mathbb{R}$  será chamada de **seminorma de Minkowski**.  $\blacksquare$

Como o nome sugere, *seminormas* são funções que remetem a normas, mas são um pouco menos exigentes. Explicitamente, uma função  $s : X \rightarrow \mathbb{R}$  é uma **seminorma** se  $s$  satisfaz tudo o que uma *norma* satisfaz (cf. Definição 1.2.1), exceto pela condição “ $s(v) = 0 \Rightarrow v = 0$ ”. A justificativa para o nome dado a  $\|\cdot\|_D$  é a seguinte

**Proposição 2.2.68** (Minkowski). *Sob as condições anteriores, a seminorma de Minkowski é, de fato, uma seminorma em  $X$ . Mais precisamente, se  $D \subseteq X$  é um disco, então  $\|\cdot\|_D$  é uma seminorma em  $X$ .*

*Demonstração.* Por construção,  $\|x\|_D \geq 0$  ocorre para todo  $x \in X$ , e  $\|0\|_D = 0$  por valer  $S_0 = (0, +\infty)$  (certo?)\*. Assim, para encerrar a prova, resta verificar apenas a desigualdade  $\|x + y\|_D \leq \|x\|_D + \|y\|_D$  e a identidade  $\|\lambda x\|_D = |\lambda| \|x\|_D$  para quaisquer  $x, y \in X$  e  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Note que se  $r, s > 0$  são tais que  $r \in S_x$  e  $s \in S_y$ , então  $x \in rD$  e  $y \in sD$ , acarretando  $x + y \in rD + sD = (r + s)D$ , onde a última igualdade se deve ao fato de  $D$  ser convexo: com efeito, se  $u, v \in D$  e  $ru + sv = (r + s)z$  para algum  $z \in X$ , então

$$z = \frac{r}{r+s}u + \frac{s}{r+s}v, \text{ com } \frac{r}{r+s} + \frac{s}{r+s} = 1,$$

mostrando que  $z$  é uma *combinação convexa* de pontos em  $D$  e, portanto,  $z \in D$  (cf. Exercício 2.2.57). Logo,  $r + s \in S_{x+y}$ , mostrando que  $S_x + S_y \subseteq S_{x+y}$  e, conseqüentemente,

$$\|x + y\|_D := \inf S_{x+y} \leq r + s \leq \inf S_x + \inf S_y = \|x\|_D + \|y\|_D.$$

Para a identidade restante, tomemos  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ . Observe que para  $r > 0$ ,  $\lambda x \in rD$  sse  $x \in \frac{r}{\lambda}D$ . Agora, por  $D$  ser balanceado e  $r > 0$ , deve-se ter  $\frac{r}{\lambda}D = \frac{r}{|\lambda|}D$ : neste caso, a identidade  $\alpha D = |\alpha|D$  se verifica para qualquer  $\alpha \in \mathbb{K}$  pois, pela hipótese de balanceamento,  $\alpha D \subseteq \beta D$  sempre que  $|\alpha| \leq |\beta|$  (por quê?)\*. Conseqüentemente,

$$\begin{aligned} \|\lambda x\|_D &:= \inf \{r > 0 : \lambda x \in rD\} = \frac{|\lambda|}{|\lambda|} \inf \left\{r > 0 : x \in \frac{r}{\lambda}D\right\} = \\ &= |\lambda| \inf \left\{\frac{r}{|\lambda|} > 0 : x \in \frac{r}{|\lambda|}D\right\} = |\lambda| \inf \{\gamma > 0 : x \in \gamma D\} = |\lambda| \|x\|_D \end{aligned}$$

como desejado.  $\square$

**Observação 2.2.69** (Opcional: quando a seminorma de Minkowski é uma *norma*?). A proposição acima funciona como uma *máquina* de preparar seminormas: basta *inserir* um disco  $D$  e ela te devolve uma seminorma  $\|\cdot\|_D$ . Isto nos traz à pergunta título: quais condições sobre o disco  $D$  asseguram que  $\|\cdot\|_D$  seja uma norma?

RESPOSTA:  $\|\cdot\|_D$  é uma norma sse o único subespaço vetorial de  $X$  contido em  $D$  é  $\{0\}$ .

Por um lado, se  $\|\cdot\|_D$  é norma,  $Y \subseteq X$  é subespaço vetorial com  $Y \subseteq D$  e  $y \in Y$ , então  $\|y\|_D = 0$  pois  $ry \in Y \subseteq D$  para todo  $r \in \mathbb{R}$ , acarretando  $y = 0$ . Por outro lado, se  $\|x\|_D = 0$  para  $x \neq 0$ , então  $\mathbb{K}x \subseteq D$  pois, para  $\lambda \neq 0$  em  $\mathbb{K}$ , existe  $r \in (0, \frac{1}{|\lambda|})$  tal que  $x \in rD$ , acarretando  $\lambda x \in \lambda rD \subseteq D$  pois  $|\lambda r| < 1$  e  $D$  é balanceado.  $\triangle$

[prosseguir]

## §2 Dualidades e as topologias fraca e fraca-estrela

### §3 Exercícios adicionais

**Exercício 2.2.57** (\*). Uma **combinação convexa** de vetores  $x_1, \dots, x_n$  num  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $X$  é um vetor da forma  $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ , onde  $\lambda_i \geq 0$  para todo  $i$  e  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ . Mostre que  $C \subseteq X$  é convexo sse  $C$  é fechado por combinações convexas. Dica: se  $\alpha, \beta \geq 0$  e  $\alpha + \beta = 1$ , então  $\alpha = 1 - \beta$ ; além disso, se  $\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1$  e  $\lambda_{n+1} \neq 0$ , então

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} = 1. \quad \blacksquare$$

## 2.2.7 A topologia de Zariski

**Teorema 2.2.70** (da Base de Hilbert).



# Capítulo 3

## Uma corrida em comitê e...

Depois do alvoroço na lagoa de lágrimas, Alice chega à margem seca acompanhada de um grupo de animais falantes, todos ainda encharcados. Para se secarem, combinam uma *calculus race*<sup>‡</sup>: no original, trata-se de uma corrida sem propósito nem regras que termina quando todos estão secos. Aqui, para enxugarmos as lágrimas<sup>††</sup> provocadas pelos filtros e redes, discutiremos a propriedade topológica mais importante de todas...

### 3.1 Essencial:... uma história compacta

Há diversas formas de motivar a ideia de *compacidade*, algumas mais populares do que outras. Quem só teve contato com Análise Real (ou menos), por exemplo, pode pensar em “limitado e fechado”<sup>‡‡</sup>. Porém, como isso só faz sentido em espaços métricos (limitação?), você já deve estar ciente de que esta não será a versão mais geral de compacidade abordada no texto. Também há muitas interações com outras propriedades que, por conseguinte, resultam num número monumental de aplicações. Não seria factível, portanto, tratar de todas elas nesta seção, que busca apenas *introduzir* o assunto no texto: a Subseção 3.1.1 aborda as *principais* caracterizações *topológicas* de compacidade; o *Teorema de Tychonoff* será provado na subseção seguinte de cinco formas diferentes; a Subseção 3.1.3 discute compacidade em ambientes metrizáveis; a penúltima subseção trata da *versão local* de compacidade; finalmente, a última subseção agrupa exercícios adicionais.

#### 3.1.1 Principais manifestações topológicas

Como aprendi com Hugo C. Botós<sup>†‡</sup>,

“para quem só *sabe* martelo, todo parafuso é prego”.

Por maior que seja a nossa disposição para lidar com espaços infinitos (os parafusos), nossa intuição (o martelo) é intrinsecamente *finitária*. Nesse sentido, *compacidade* é um meio de detectar parafusos que podem ser martelados com bastante eficácia.

---

<sup>‡</sup>A tradução “corrida em comitê” provavelmente remete ao contexto original de “*calculus race*”, termo associado a campanhas eleitorais nos Estados Unidos.

<sup>††</sup>De tristeza ou de alegria?

<sup>‡‡</sup>“Fechado e limitado” soa quase como “fechado ilimitado” quando se está com pressa.

<sup>†‡</sup>Que, por sua vez, aprendeu com o saudoso Professor Alexandre “Sasha” Ananin.

## §1 Coberturas abertas e famílias de fechados

Pedir que um espaço infinito tenha apenas finitos abertos é algo extremamente restritivo, pelo menos para analistas, já que tal espaço não seria de Hausdorff: num espaço de Hausdorff  $X$ ,  $X \setminus \{x\}$  é aberto para qualquer  $x \in X$  (certo?)<sup>\*</sup>, de modo que se  $X$  tivesse apenas finitos abertos, então  $X$  teria somente finitos pontos (percebeu?)<sup>\*</sup>.

Ao pensar nos abertos como “aproximações” de pontos, poderíamos pedir, alternativamente, que os espaços *marteláveis* admitissem “aproximações finitas”. Antes de discutir essa ideia, convém introduzir uma terminologia mais precisa.

**Definição 3.1.1.** Sejam  $X$  um conjunto,  $Y \subseteq X$  um subconjunto e  $\mathcal{U}$  uma coleção não vazia de subconjuntos de  $X$ .

- (i) Diremos que  $\mathcal{U}$  é uma **cobertura de  $Y$  por subconjuntos de  $X$**  (ou que  $\mathcal{U}$  **recobre  $Y$** ) se  $Y \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$ , i.e., se para todo  $y \in Y$  existir  $U \in \mathcal{U}$  com  $y \in U$ . Caso  $Y = X$ , diz-se apenas que  $\mathcal{U}$  é uma **cobertura** de  $X$ .
- (ii) Se  $\mathcal{U}$  recobre  $Y$  e  $\mathcal{U}' \subseteq \mathcal{U}$  também recobre  $Y$ , xinga-se  $\mathcal{U}'$  de **subcobertura** de  $\mathcal{U}$  (“... para  $Y$ ” se o contexto exigir).

Além disso, se  $X$  for um espaço topológico, diremos que  $\mathcal{U}$  é uma **cobertura de  $Y$  por abertos de  $X$**  (ou apenas *cobertura aberta de  $X$*  caso  $Y = X$ ) quando todos os membros de  $\mathcal{U}$  são abertos em  $X$ . Mais geralmente, se cada membro de  $\mathcal{U}$  satisfaz uma propriedade  $\mathcal{P}$ , diremos que  $\mathcal{U}$  é uma *cobertura por subconjuntos com a propriedade  $\mathcal{P}$* , ou qualquer outra abreviação que faça sentido no contexto. ¶

Assim, uma segunda tentativa para recuperar parte do significado de finitude para espaços infinitos poderia ser pedir que o espaço admitisse uma cobertura finita por abertos *próprios*<sup>†</sup>. Desta vez, a condição se revela afrouxada demais, já que qualquer espaço de Hausdorff com pelo menos dois pontos a satisfaz (certo?)<sup>\*</sup>. O caminho do meio é a solução.

**Teorema 3.1.2.** Para um espaço topológico  $X$ , são equivalentes:

- (i) toda cobertura aberta de  $X$  admite subcobertura finita;
- (ii) se  $\mathcal{F} \neq \emptyset$  é família de fechados de  $X$  tal que  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$ , então existem  $n \in \mathbb{N}$  e  $F_0, \dots, F_n \in \mathcal{F}$  tais que  $F_0 \cap \dots \cap F_n = \emptyset$ .

*Demonstração.* Pelas leis de De Morgan, para qualquer coleção  $\mathcal{S}$  de subconjuntos de  $X$  deve valer

$$\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = X \Leftrightarrow \bigcap_{S \in \mathcal{S}} X \setminus S = \emptyset.$$

Consequentemente,

- $\mathcal{U}$  é cobertura aberta para  $X$  sse  $\mathcal{F}(\mathcal{U}) := \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$  é família de fechados satisfazendo  $\bigcap_{U \in \mathcal{U}} X \setminus U = \emptyset$ , enquanto
- uma família  $\mathcal{F} \neq \emptyset$  de fechados satisfaz  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$  sse  $\mathcal{U}(\mathcal{F}) := \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$  é cobertura aberta para  $X$ .

<sup>†</sup>Para todo espaço  $X$ ,  $\{X\}$  é uma cobertura finita para  $X$ . Preciso dizer que esta não é uma boa hora para confundir  $X$  com  $\{X\}$ ?



Assim, se vale (i) e  $\mathcal{F}$  satisfaz a hipótese de (ii), então  $\mathcal{U}(\mathcal{F})$  é cobertura por abertos para  $X$ , donde segue que existem  $F_0, \dots, F_m \in \mathcal{F}$  tais que  $X = \bigcup_{j \leq m} X \setminus F_j$  e, consequentemente,  $\bigcap_{j \leq m} F_j = \emptyset$ . Analogamente, se vale (ii) e  $\mathcal{U}$  é cobertura por abertos para  $X$ , então  $\mathcal{F}(\mathcal{U})$  satisfaz a hipótese de (ii). Logo, existem  $n \in \mathbb{N}$  e  $U_0, \dots, U_n \in \mathcal{U}$  tais que  $\bigcap_{i \leq n} X \setminus U_i = \emptyset$  e, por conseguinte,  $X = \bigcup_{i \leq n} U_i$ , como desejado.  $\square$

**Definição 3.1.3.** Um espaço topológico é **compacto** se satisfaz qualquer uma das afirmações no teorema anterior.  $\P$

Evidentemente, todo espaço finito é compacto  $(?!)^{*/10}$ . Embora seja uma observação banal, isto revela que a compacidade, realmente, é uma das *componentes topológicas* da finitude, embora suficientemente flexível para ocorrer em espaços infinitos (como o próximo exemplo mostrará). A outra componente topológica é a *discretude*:

**Exercício 3.1.1**  $(*)$ . Mostre que um conjunto é finito sse sua topologia discreta é compacta. Dica:  $\{\{x\} : x \in X\}$  é cobertura aberta de  $X$  sempre que  $X$  é discreto.  $\blacksquare$

Em tempo, fica o aviso: a banalidade da observação acima se dissolverá após introduzirmos outras caracterizações de compacidade que não trazem condições de finitude explicitamente embutidas (cf. Teoremas 3.1.17, 3.1.25 e 3.1.33).

Antes de prosseguir, convém discutir como a compacidade se manifesta num subespaço  $K$  de um espaço topológico  $X$ . A princípio,  $K$  é compacto se for compacto com a topologia de subespaço herdada de  $X$ . Explicitamente, significa que para qualquer família  $\{A_i : i \in \mathcal{I}\}$  de abertos de  $K$  satisfazendo  $K = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ , existe um subconjunto finito  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$  tal que  $K = \bigcup_{j \in \mathcal{J}} A_j$ .

Neste contexto, a descrição acima pode se revelar desnecessariamente complicada, já que para cada  $A_i$  precisamos considerar um subconjunto  $B_i \subseteq X$  aberto em  $X$  satisfazendo  $A_i = B_i \cap K$ . Costuma ser mais fácil observar o seguinte:

**Proposição 3.1.4.** *Sejam  $X$  um espaço topológico e  $K \subseteq X$  um subespaço. São equivalentes:*

- (i)  $K$  é compacto com a topologia de subespaço;
- (ii) toda cobertura de  $K$  **por abertos de  $X$**  admite subcobertura finita;
- (iii) para toda coleção  $\mathcal{F} \neq \emptyset$  de **fechados de  $X$**  satisfazendo  $K \cap \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$ , existe um subconjunto finito  $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$  tal que  $K \cap \bigcap_{F' \in \mathcal{F}'} F' = \emptyset$ .

*Demonstração.* Ficarà por sua conta  $(*)$ .  $\square$

**Corolário 3.1.5.** *Sejam  $Z$  um espaço topológico, com  $X \subseteq Y$  e  $Y \subseteq Z$ . Se  $X$  é compacto como subespaço de  $Y$ , então  $X$  é compacto como subespaço de  $Z$ .*

*Demonstração.* Segue da proposição anterior aliada ao Exercício 2.1.69.  $\square$

Apesar de simples, saber das equivalências acima facilitará muito as futuras verificações de compacidade já que, frequentemente, os exemplos de espaços compactos são subespaços de espaços não compactos.

**Exemplo 3.1.6** (Opcional: intervalos). Pode ser pedagogicamente interessante verificar, *no braço*, que intervalos limitados e fechados da reta são compactos — mesmo que, futuramente, isto se torne mero corolário de outras caracterizações de compacidade.

Fixemos então  $a, b \in \mathbb{R}$  com  $a \leq b$ . Mostraremos que para qualquer coleção  $\mathcal{U}$  de intervalos abertos de  $\mathbb{R}$  com  $[a, b] \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$  existem  $n \in \mathbb{N}$  e  $U_0, \dots, U_n \in \mathcal{U}$  satisfazendo  $[a, b] \subseteq U_0 \cup \dots \cup U_n$ , e ficará por sua conta perceber porque isto basta  $(\star\star)$ . Seja então

$$A := \left\{ x \in [a, b] : \text{existe subconjunto finito } \mathcal{U}' \subseteq \mathcal{U} \text{ tal que } [a, x] \subseteq \bigcup_{U' \in \mathcal{U}'} U' \right\}.$$

Note que  $A \neq \emptyset$  pois  $a \in A$ . Como todo  $x \in A$  satisfaz  $a \leq x \leq b$ , a completude de  $\mathbb{R}$  garante a existência de  $\sup A \in \mathbb{R}$  com  $a \leq \sup A \leq b$ . O plano para concluir o teorema é o seguinte: (i) mostrar que, necessariamente, ocorre  $\sup A \in A$  e (ii) mostrar que  $\sup A = b$ . Se fizermos isso, seguirá que  $b \in A$  e, portanto, existem  $U_0, \dots, U_k \in \mathcal{U}$  tais que  $[a, b] \subseteq U_0 \cup \dots \cup U_k$ , como desejado.

- (i)  $\sup A \in A$ : ou seja, precisa-se mostrar que existe um subconjunto finito de  $\mathcal{U}$  que recobre o intervalo  $[a, \sup A]$ . Ora, como  $\sup A \in [a, b]$ , existe  $V := (\alpha, \beta) \in \mathcal{U}$  com  $\sup A \in (\alpha, \beta)$ . Tomando  $\gamma \in [a, b]$  com  $\alpha < \gamma < \sup A$ , a definição de supremo garante  $x \in A$  com  $\gamma < x$  e, por sua vez, a definição de  $A$  exige que existam  $U_0, \dots, U_n \in \mathcal{U}$  tais que  $[a, x] \subseteq U_0 \cup \dots \cup U_n$ . Logo,  $[a, \sup A] \subseteq U_0 \cup \dots \cup U_n \cup V$ , mostrando que  $\sup A \in A$ , como afirmado.
- (ii)  $\sup A = b$ : como se tem  $\sup A \leq b$ , basta mostrar que não pode ocorrer  $\sup A < b$ . Se ocorresse  $\sup A < b$ , poderia-se tomar  $\delta \in [a, b]$  com  $\sup A < \delta < b$ , donde seguiria que  $\delta \in A$ , contrariando o fato de  $\sup A$  ser o supremo de  $A$ .  $\blacktriangle$

Para encontrar espaços *topológicos* não compactos, as quatro proposições a seguir serão tremendamente úteis. AVISO: a fim de não sobrecarregar demais o texto nos próximos enunciados,  $X$  e  $Y$  indicam espaços topológicos.

**Proposição 3.1.7.** *Se  $X$  é compacto e  $F \subseteq X$  é fechado em  $X$ , então  $F$  é compacto.*

*Demonstração usual (via abertos).* Se  $\mathcal{V}$  é uma cobertura de  $F$  por abertos de  $X$ , então a família  $\mathcal{V} \cup \{X \setminus F\}$  é uma cobertura aberta para  $X$ , donde a compacidade de  $X$  garante  $V_0, \dots, V_n \in \mathcal{V}$  tais que

$$X = (X \setminus F) \cup \bigcup_{j \leq n} V_j,$$

acarretando  $F \subseteq V_0 \cup \dots \cup V_n$  (certo?) $\star$ .  $\square$

*Demonstração via fechados.* Se  $\mathcal{G} \neq \emptyset$  é família de fechados de  $X$  satisfazendo

$$F \cap \bigcap_{G \in \mathcal{G}} G = \emptyset,$$

então  $\mathcal{H} := \mathcal{G} \cup \{F\}$  é família de fechados de  $X$  cuja interseção é vazia. Logo, por  $X$  ser compacto, existem  $G_0, \dots, G_n \in \mathcal{H}$  tais que  $F \cap G_0 \cap \dots \cap G_n = \emptyset$ , donde o resultado segue da Proposição 3.1.4 (entendeu?) $\star$ .  $\square$

**Proposição 3.1.8.** *Se  $X$  é de Hausdorff e  $K \subseteq X$  é compacto, então  $K$  é fechado em  $X$ .*

*Demonstração.* Com as presentes caracterizações, a melhor alternativa é mostrar que  $X \setminus K$  é aberto<sup>†</sup>. Para tanto, dado  $x \in X \setminus K$ , para cada ponto  $y$  em  $K$  existem abertos disjuntos  $A_y, B_y \subseteq X$  com  $x \in A_y$  e  $y \in B_y$ . Por conta da compacidade de  $K$ , existe um subconjunto finito  $G \subseteq K$  tal que

$$x \notin K \subseteq \bigcup_{y \in G} B_y \subseteq \bigcup_{y \in G} X \setminus A_y = X \setminus \bigcap_{y \in G} A_y \quad (\text{por quê?!})^*.$$

Por fim, basta notar que  $A := \bigcap_{y \in G} A_y$  é um aberto em  $X$  com  $x \in A$  e  $A \subseteq X \setminus K$ .  $\square$

**Proposição 3.1.9.** *Se  $X$  é compacto e  $f: X \rightarrow Y$  é função contínua e sobrejetora, então  $Y$  é compacto.*

*Demonstração via coberturas abertas.* Se  $\mathcal{U}$  é cobertura aberta para  $Y$ , então a continuidade de  $f$  assegura que  $f^{-1}(\mathcal{U}) := \{f^{-1}[U] : U \in \mathcal{U}\}$  é cobertura aberta para  $X$  (certo?)<sup>\*</sup>. Por sua vez, a compacidade de  $X$  garante abertos  $U_0, \dots, U_n \in \mathcal{U}$  tais que  $X = \bigcup_{j \leq n} f^{-1}[U_j]$ . Finalmente, pela sobrejetividade de  $f$ , para qualquer  $y \in Y$  existe  $x \in X$  com  $f(x) = y$ , donde segue que existe  $j \leq n$  com  $x \in f^{-1}[U_j]$  e, por conseguinte,  $y = f(x) \in U_j$ . Logo,  $\{U_0, \dots, U_n\}$  é subcobertura finita de  $\mathcal{U}$ .  $\square$

*Demonstração via fechados.* Se  $\mathcal{G} \neq \emptyset$  é família de fechados em  $Y$  cuja interseção é vazia, então a continuidade de  $f$  assegura que  $f^{-1}(\mathcal{G}) := \{f^{-1}[G] : G \in \mathcal{G}\}$  é família de fechados em  $X$  (cf. Exercício 2.1.45), com

$$\bigcap_{G \in \mathcal{G}} f^{-1}[G] = f^{-1} \left[ \bigcap_{G \in \mathcal{G}} G \right] = f^{-1}[\emptyset] = \emptyset.$$

Por  $X$  ser compacto, existem  $G_0, \dots, G_m \in \mathcal{G}$  tais que  $\bigcap_{i \leq m} f^{-1}[G_i] = \emptyset$ . Por fim, a sobrejetividade de  $f$  obriga que se tenha  $G_0 \cap \dots \cap G_m = \emptyset$  (percebeu?)<sup>\*</sup>.  $\square$

**Exercício 3.1.2** (\*). Mostre que se  $X$  é compacto e  $f: X \rightarrow Y$  é função contínua, então  $\text{im}(f)$  é subespaço compacto de  $Y$ . Dica: Exercício 2.1.20 + Proposição 3.1.4 + Proposição 3.1.9.  $\blacksquare$

**Exemplo 3.1.10** (Sequências convergentes). Se  $(x_n)_n$  é uma sequência num espaço  $X$  e  $(x_n)_n \rightarrow x$  em  $X$ , então  $K := \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$  é subespaço compacto de  $X$ . Embora isso possa ser provado diretamente (\*), é bem mais legal notar que  $K$  é imagem do espaço  $[0, \omega]$  (cf. Exemplo 1.2.21 e Observação 1.2.30) por uma função contínua (cf. Exercício 2.1.41). Como  $[0, \omega]$  é compacto (certo?)<sup>\*</sup>, o resultado segue.  $\blacktriangle$

**Proposição 3.1.11.** *Se  $E$  é espaço normado e  $K \subseteq E$  é compacto, então  $K$  é limitado.*

*Demonstração.* Se  $K \neq \emptyset$  não é limitado, então a coleção de bolas abertas centradas na origem testemunha que  $K$  não é compacto, pois

$$K \subseteq \bigcup_{r>0} B(0, r)$$

e, para quaisquer  $r_0, \dots, r_n > 0$ , existe  $x \in K$  com  $\|x\| > \max\{r_0, \dots, r_n\}$ .  $\square$

<sup>†</sup>Quase não compensa comentar, mas perceba (\*) que não há perda de generalidade em supor  $K \neq \emptyset$ .

**Corolário 3.1.12** (Teorema de Weierstrass). *Se  $X$  é compacto e  $E$  é espaço normado, então  $C(X, E) \subseteq \mathcal{B}_E(X)$ , i.e., funções contínuas com domínio compacto e contradomínio normado são limitadas. Em particular, se  $X \neq \emptyset$ , então tais funções têm máximo e mínimo.*

*Demonstração.* Se  $f \in C(X, E)$ , então  $\text{im}(f)$  é subespaço compacto de  $E$  e, portanto, é (fechado e) limitado. Em particular, se  $X \neq \emptyset$ , então  $I := \{\|f(x)\| : x \in X\}$  também é subconjunto não vazio, limitado e fechado de  $\mathbb{R}$  (por quê?)\*, donde segue que existem  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tais que  $\sup I = \alpha$  e  $\inf I = \beta$ . Do que você já sabe de Análise Real, deve se lembrar de que em tais situações, existem sequências  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  e  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $I$  com  $(s_n)_n \rightarrow \alpha$  e  $(t_n)_n \rightarrow \beta$ , donde o fato de  $I$  ser fechado permite concluir que  $\alpha, \beta \in I$ , i.e., existem  $x, y \in X$  tais que  $\|f(x)\| = \max I$  e  $\|f(y)\| = \min I$ .  $\square$

**Exercício 3.1.3** (\*). Bastaria provar o corolário acima para  $E := \mathbb{K}$ . Por quê?  $\blacksquare$

**Exemplo 3.1.13.** *Espaços normados não triviais não são compactos*, pois a norma é uma função contínua ilimitada (certo?)\*. Em particular, tanto  $\mathbb{R}$  quanto  $\mathbb{C}$  não são compactos.  $\blacktriangle$

**Exemplo 3.1.14.** Para qualquer espaço  $X \neq \emptyset$ ,  $C_p(X, \mathbb{K})$  não é compacto. Embora  $C_p(X, \mathbb{K})$  seja  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial, isto não segue do exemplo anterior, posto que a topologia de  $C_p(X, \mathbb{K})$  pode não ser induzida por uma norma se  $X$  for infinito (por quê?!)\*. Apesar disso, para qualquer  $x \in X$ , a avaliação  $\pi_x: C_p(X, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$  é uma função contínua e ilimitada (certo?)\* e, portanto,  $C_p(X, \mathbb{K})$  não pode ser compacto. Futuramente, veremos que nenhum espaço vetorial topológico de Hausdorff não trivial pode ser compacto.  $\blacktriangle$

**Exercício 3.1.4** (Cf. Exemplo 2.1.67 (\*)). Use o último corolário para mostrar que a reta de Sorgenfrey  $\mathbb{R}_S$  não é compacta. Dica: você já notou que a identidade  $\mathbb{R}_S \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua?  $\blacksquare$

**Observação 3.1.15** (Outras formulações semelhantes). Para encerrar este primeiro pacote de caracterizações de compacidade, convém destacar alguns fatos gerais que podem ter passado despercebidos.

- (i) *Se a topologia de  $X$  é gerada por uma base  $\mathcal{B}$ , então um subespaço  $K \subseteq X$  é compacto sse para toda cobertura de  $K$  por membros de  $\mathcal{B}$  admite subcobertura finita.* Observe que a direção menos trivial ( $\Leftarrow$ ) já foi usada no Exemplo 3.1.6 (onde?)\*. Para verificá-la, basta notar que se  $\mathcal{V}$  é uma cobertura de  $K$  por abertos (quaisquer!) de  $X$ , então para cada  $x \in K$  existem  $V_x \in \mathcal{V}$  e  $B_x \in \mathcal{B}$  tais que  $x \in B_x \subseteq V_x$ . Dado que  $\mathcal{U} := \{B_x : x \in K\}$  recobre  $K$ , a hipótese se aplica, donde o resultado segue pois qualquer subcobertura finita de  $\mathcal{U}$  para  $K$  induz uma subcobertura finita de  $\mathcal{V}$  para  $K$  (certo?)\*.
- (ii) A formulação de compacidade em termos de fechados no item (ii) do Teorema 3.1.2 costuma ser encontrada na contrapositiva. Para enunciá-la de maneira mais econômica, vamos dizer que uma família não vazia  $\mathcal{H}$  de subconjuntos de  $X$  tem a propriedade da interseção finita (**p.i.f.**) se  $\bigcap_{G \in \mathcal{G}} G \neq \emptyset$  para qualquer subconjunto finito e não vazio  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$ . Com isso, segue automaticamente do Teorema 3.1.2 que um espaço  $X$  é compacto sse  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$  para qualquer família  $\mathcal{F} \neq \emptyset$  de fechados de  $X$  com a p.i.f..

Caso você tenha evitado, pode ser um bom momento para (re)visitar o Exercício 1.2.21: consegue perceber que todo espaço métrico compacto é completo?  $\triangle$

## §2 Projeções fechadas e tubos

A caracterização de compacidade que discutiremos agora costuma ser mais apelativa para quem se interessa pela *perspectiva categórica*, segundo a qual o que determina a *natureza* de um objeto são suas interações (setas!) com os demais objetos da categoria. Como brinde, ela nos dará uma das provas mais simples que existem da *versão finita* do *Teorema de Tychonoff*. Primeiro, uma definição:

**Definição 3.1.16.** Uma função  $f: X \rightarrow Y$  entre espaços topológicos é **fechada** se  $f[C]$  é fechado em  $Y$  para todo  $C \subseteq X$  fechado em  $X$ . ■

Não é hora e nem lugar de achar que toda função contínua é fechada, posto que pré-imagens e imagens diretas são coisas diferentes<sup>†</sup>. Os próximos exercícios visam, entre outras coisas, testar se você realmente entendeu a ideia. AVISO: como já tem sido feito de maneira implícita, “espaço” será abreviação de “espaço topológico”.

**Exercício 3.1.5** (\*). Mostre que a composição de funções fechadas é fechada. ■

**Exercício 3.1.6** (\*). Mostre que se  $X$  é compacto,  $Y$  é de Hausdorff e  $f: X \rightarrow Y$  é contínua, então  $f$  é função fechada. ■

Funções fechadas aparecerão com frequência no texto, não se preocupe. Por ora, o importante é provar o próximo

**Teorema 3.1.17** (Mrówka, 1959). *Para um espaço  $X$ , são equivalentes:*

- (i)  $X$  é compacto;
- (ii) para todo espaço  $Y$ , a projeção  $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$  é fechada.

*Demonstração.* A ida se escreve praticamente sozinha: para um subconjunto fechado  $F \subseteq X \times Y$ , mostraremos que  $Y \setminus \pi_Y[F]$  é aberto em  $Y$ . Se  $y \notin \pi_Y[F]$ , então para cada  $x \in X$  tem-se  $(x, y) \notin F$ , donde segue que existem abertos  $U_x \subseteq X$ ,  $V_x \subseteq Y$ , com  $(x, y) \in U_x \times V_x \subseteq (X \times Y) \setminus F$  (por quê?)<sup>‡</sup>. Como  $\mathcal{U} := \{U_x : x \in X\}$  é cobertura aberta para  $X$ , a hipótese garante um subconjunto finito  $H \subseteq X$  tal que  $\mathcal{U}' := \{U_x : x \in H\}$  ainda recobre  $X$ . Por construção, temos  $y \in V := \bigcap_{x \in H} V_x$ , um aberto de  $Y$  que satisfaz  $V \subseteq Y \setminus \pi_Y[F]$ : com efeito, se  $z \in \pi_Y[F]$ , então  $(x', z) \in F$  para algum  $x' \in X$ , donde segue que existe  $x \in H$  com  $x' \in U_x$ , acarretando  $z \notin V_x$ , caso contrário teríamos  $(x', z) \in (U_x \times V_x) \cap F$ , contrariando a escolha dos abertos  $U_x \subseteq X$  e  $V_x \subseteq Y$ .

A diversão está na recíproca: mostraremos que uma família  $\mathcal{F}$  de fechados de  $X$  com a p.i.f. satisfaz  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$  (cf. Observação 3.1.15, item (ii)). Para isso, usaremos  $\mathcal{F}$  na “construção” de um espaço  $Y$ , por meio do qual a hipótese de  $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$  ser fechada garantirá um ponto em  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ . Note que como cada  $F \in \mathcal{F}$  é fechado, basta obter  $x \in X$  tal que  $x \in \overline{F}$  para qualquer  $F$ , o que por sua vez significa encontrar  $x$  tal que  $V \cap F \neq \emptyset$  para qualquer subconjunto aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $x$ .

KATZENSprung: considere  $Y := X \cup \{\infty\}$ , onde  $\infty \notin X$ , com a topologia gerada pela família  $\mathcal{B} := \{\{x\} : x \in X\} \cup \{\bigcap_{G \in \mathcal{G}} G : \emptyset \neq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}, \mathcal{G} \text{ finito}\}$  como base (funciona, certo?)<sup>\*</sup>; explicitamente,  $A \subseteq Y$  é aberto sse  $\infty \notin A$  ou existem  $F_0, \dots, F_n \in \mathcal{F}$  tais que  $F_0 \cap \dots \cap F_n \subseteq A$ .

<sup>†</sup>Se precisar muito de um exemplo para se acalmar, considere  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ . Pareceu algo abstrato demais? Revise!

<sup>‡</sup>Confira o Exemplo 2.1.90 se precisar de ajuda (\*). Ou faça um desenho (é sério, também ajuda!).



A hipótese garante então que a projeção  $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$  é fechada e, portanto, para  $D := \{(x, x) : x \in X\} \subseteq X \times Y$ , deve-se ter  $\pi_Y[\overline{D}]$  fechado em  $Y$ . E daí?

「**Afirmção 3.1.18.** *Se  $f: A \rightarrow B$  é função contínua e fechada, então  $f[\overline{C}] = \overline{f[C]}$  para qualquer  $C \subseteq A$ .*

*Prova da Afirmção.* Como  $C \subseteq \overline{C}$ , temos  $f[C] \subseteq f[\overline{C}]$ . Por  $f$  ser fechada e pela definição de fecho, resulta  $\overline{f[C]} \subseteq f[\overline{C}]$ . A inclusão restante decorre da continuidade da função (cf. Exercício 2.1.45).  $\lrcorner$

Portanto, deve-se ter que  $\pi_Y[\overline{D}] = \text{cl}_Y(\pi_Y[D]) = \text{cl}_Y(X) = Y$ , onde a última igualdade segue, precisamente, por  $\mathcal{F}$  ter a p.i.f.! Com efeito, como todo aberto  $A \subseteq Y$  com  $\infty \in A$  contém uma interseção finita de membros de  $\mathcal{F}$  e estas não são vazias por conta da p.i.f., segue que todo aberto dessa forma intercepta  $X$ , ou seja,  $\infty$  é ponto aderente ao subconjunto  $X$  no espaço  $Y$ . Agora, por valer  $\infty \in Y = \text{cl}_Y(X) = \pi_Y[\overline{D}]$ , segue que  $(x, \infty) \in \overline{D}$  para algum  $x \in X$ , justamente o ponto procurado.

De fato, dado um aberto  $V \subseteq X$  com  $x \in V$ , o conjunto

$$O := V \times (F \cup \{\infty\}) \subseteq X \times Y$$

é aberto, com  $(x, \infty) \in O$ , donde o fato de se ter  $(x, \infty) \in \overline{D}$  garante um  $z \in X$  com  $(z, z) \in O$  (certo?)\*. Logo,  $z \in V \cap F$ .  $\square$

**Observação 3.1.19.** O teorema anterior revela, entre outras coisas, que as coberturas abertas (ou as famílias de fechados com interseção vazia) de um espaço podem ser interpretadas como espaços topológicos! Para mais revelações, confira [16].  $\triangle$

**Corolário 3.1.20** (*Baby Tychonoff*). *Se  $X_i$  é espaço compacto para cada  $i \in \mathcal{I}$  e  $\mathcal{I}$  é finito, então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é compacto.*

*Demonstração.* Dado que se pode argumentar por indução, basta mostrar que  $X \times Y$  é compacto sempre que  $X$  e  $Y$  são compactos. Ora, como a composição de funções fechadas é fechada (cf. Exercício 3.1.5), tudo se resume a observar que o diagrama abaixo *comuta*<sup>†</sup>

$$\begin{array}{ccc} X \times Y \times Z & \xrightarrow{\pi_Z} & Z \\ \pi_{Y \times Z} \downarrow & \nearrow \pi'_Z & \\ Y \times Z & & \end{array}$$

onde  $Z$  é um espaço qualquer e as setas são as projeções *óbvias* (entendeu?)\*.  $\square$

O Teorema 3.1.17 admite repaginações ~~enxutas~~ *geométricas* que podem tocar o coração de quem não se importa com aspectos categóricos.

**Proposição 3.1.21.** *Para espaços topológicos  $X$  e  $Y$ , são equivalentes:*

- (i) *a projeção  $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$  é fechada;*
- (ii) *para cada  $y \in Y$ , sempre que um aberto  $O \subseteq X \times Y$  satisfaz  $X \times \{y\} \subseteq O$ , existe um aberto  $V \subseteq Y$  em torno de  $y$  tal que  $X \times V \subseteq O$ .*
- (iii) *o subconjunto  $O_Y := \{y \in Y : X \times \{y\} \subseteq O\}$  é aberto em  $Y$  para qualquer subconjunto aberto  $O \subseteq X \times Y$ .*

<sup>†</sup>No caso,  $\pi_Z = \pi'_Z \circ \pi_{Y \times Z}$ . Mas eu duvido que você nunca tenha ouvido falar no termo.



*Demonstração.* Supondo (i) e fixando  $y \in Y$  e  $O \subseteq X \times Y$  como no enunciado de (ii), temos  $F := (X \times Y) \setminus O$  fechado em  $X \times Y$ , donde segue que  $\pi_Y[F]$  é fechado em  $Y$  com  $y \notin \pi_Y[F]$  (pois  $(x, y) \in O$  para todo  $x \in X$ ). Logo, existe um aberto  $V \subseteq Y$  com  $y \in V$  e  $V \subseteq Y \setminus \pi_Y[F]$ , e daí não é difícil ver (veja!)<sup>\*</sup> que  $X \times V \subseteq O$ . Portanto, vale (ii).

Agora, tomando  $O$  e  $O_Y$  como no enunciado de (iii), note que se  $y \in O_Y$ , então (ii) garante um aberto  $V \subseteq Y$  em torno de  $y$  tal que  $X \times V \subseteq O$ , i.e.,  $V \subseteq O_Y$ . Portanto,  $O_Y$  é aberto em  $Y$  (certo?)<sup>\*</sup>.

Por fim, para (iii)  $\Rightarrow$  (i), note que se  $F \subseteq X \times Y$  é fechado e  $y \notin \pi_Y[F]$ , então  $O := (X \times Y) \setminus F$  é um aberto em  $X \times Y$  tal que  $X \times \{y\} \subseteq O$ . Logo,  $y \in O_Y$  e, por (iii), existe  $V \subseteq Y$  aberto em  $Y$  com  $y \in V$  e  $V \subseteq O_Y$ , i.e.,  $X \times V \subseteq O$ , mas disto segue que  $V \subseteq Y \setminus \pi_Y[F]$ , posto que se  $v \in V$ , então  $(x, v) \in O$  (entendeu?)<sup>\*</sup>. Portanto, mostramos que  $\pi_Y[F]$  é fechado em  $Y$ .  $\square$

**Corolário 3.1.22** (Lema do Tubo). *Se  $X$  é compacto, então o item (ii) da última proposição vale para todo espaço  $Y$ .*

Outra variação comum é dada no próximo

**Teorema 3.1.23** (Lema da Caixa). *Sejam  $X$  e  $Y$  espaços topológicos e considere subconjuntos  $C \subseteq X$  e  $K \subseteq Y$ , ambos compactos. Se  $O \subseteq X \times Y$  é aberto e  $C \times K \subseteq O$ , então existem  $A \subseteq X$  e  $B \subseteq Y$ , abertos, tais que  $C \times K \subseteq A \times B \subseteq O$ .*

*Demonstração direta clássica.* Para  $x \in C$  fixado, para cada  $y \in K$  existem abertos  $A_{x,y} \subseteq X$  e  $B_{x,y} \subseteq Y$  tais que  $(x, y) \in A_{x,y} \times B_{x,y} \subseteq O$ . Por conta da compacidade de  $K$ , existe subconjunto finito  $K' \subseteq K$  tal que  $K \subseteq \bigcup_{y \in K'} B_{x,y} := B_x$ . Isto permite definir  $A_x := \bigcap_{y \in K'} A_{x,y}$ , um aberto em  $X$  em torno de  $x$ . Agora, a coleção  $\mathcal{U} := \{A_x : x \in C\}$  se revela uma cobertura por abertos de  $X$  para  $C$ , donde sua compacidade garante um subconjunto finito  $C' \subseteq C$  tal que  $C \subseteq \bigcup_{x \in C'} A_x := A$ . Para encerrar, observe (!)<sup>\*</sup> que

$$C \times K \subseteq A \times \underbrace{\left( \bigcap_{x \in C'} B_x \right)}_{:=B} \subseteq O. \quad \square$$

**Exercício 3.1.7** (\*). Use o Lema da Caixa para provar o Lema do Tubo.  $\blacksquare$

É comum encontrar provas da versão *baby* do Teorema de Tychonoff que apelem para o Lema da Caixa, mas me recuso a discutí-las num contexto em que o Teorema de Mrówka já está disponível.

### §3 Ultrafiltros e compacidade

O Coelho Branco que guia toda essa narrativa é a convergência. Portanto, é de se esperar que compacidade possa ser entendida, motivada e discutida por meio dos *aparatos convergentes* introduzidos na primeira parte deste capítulo.

**MOTIVAÇÃO.** Seja  $(Y, \mathcal{S})$  um espaço topológico no qual *tudo convirja*, i.e., em que todo filtro próprio seja convergente.

**PERGUNTA:** o espaço acima *presta*?

**RESPOSTA:** não para analistas.

De fato, se todo filtro próprio de  $Y$  converge, então o filtro  $\{Y\}$  deve convergir. Pela Definição 2.1.22, isto significa que existe  $y \in Y$  tal que  $\mathcal{N}_y \subseteq \{Y\}$ . Logo,  $Y$  é o único aberto que contém  $y$ . Consequentemente, se  $|Y| > 1$ , então  $Y$  não é um espaço de Hausdorff, pois qualquer ponto  $x \in Y$  com  $x \neq y$  também pertence a  $Y$ . MORAL DA HISTÓRIA: para que *tudo* convirja, precisa-se abrir mão da unicidade dos limites — ou trabalhar com espaços dotados de um único ponto.

Em algum sentido, a discussão acima mostra que a condição exigida sobre  $Y$  foi extrema, o que sugere moderação. Em outras palavras, pode ser conveniente que um espaço admita filtros não convergentes<sup>†</sup>. Nesse sentido, a próxima proposição traz alguma esperança (e pode ser útil relembrar a Observação 2.1.37).

**Proposição 3.1.24.** *Dados um espaço topológico  $X$  e filtros próprios  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  em  $X$ , tem-se*

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \Rightarrow \lim \mathcal{F} \subseteq \lim \mathcal{G}.$$

*Demonstração.* Ora, se  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{F}$ , então  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{G}$ . □

A proposição acima esconde uma sutileza muito útil: embora possa existir um filtro  $\mathcal{F}$  não convergente, i.e., com  $\lim \mathcal{F} = \emptyset$ , talvez seja razoável supor que  $\mathcal{F}$  admita uma extensão convergente. Mais precisamente: pode ser interessante exigir que exista um filtro próprio  $\mathcal{G}$  com  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$  e  $\lim \mathcal{G} \neq \emptyset$ . Essa alternativa é bastante acertada.

**Teorema 3.1.25** (Compacidade vs. convergência, parte I). *Para um espaço  $X$ , são equivalentes:*

- (i)  $X$  é compacto;
- (ii) todo filtro próprio de  $X$  está contido num filtro próprio convergente.

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{F}$  um filtro próprio em  $X$  e considere  $\overline{\mathcal{F}} := \{\overline{F} : F \in \mathcal{F}\}$ . Dado que  $\mathcal{F}$  é próprio, fechado por interseções finitas e  $\overline{S} \subseteq \overline{T}$  sempre que  $S \subseteq T$  (cf. Exercício 2.1.46), segue que  $\overline{\mathcal{F}}$  tem a p.i.f. (certo?)<sup>\*</sup>.

▮ **Afirmção 3.1.26 (Lema do ultrafiltro).** *Se  $\mathcal{H}$  é família de subconjuntos de  $Z$  com a p.i.f., então existe filtro próprio  $\mathcal{G}$  em  $Z$ , maximal na família dos filtros próprios que contém  $\mathcal{H}$ , i.e.,  $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$  e  $\mathcal{G} = \mathcal{G}'$  sempre que  $\mathcal{G}'$  é filtro próprio em  $Z$  satisfazendo  $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}'$  e  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{G}'$ .*

*Prova da Afirmção.* Como a letra  $Z$  sugere, usaremos o **Lema de Zorn** (cf. Observação 3.1.27 a seguir). Considere  $\mathbb{P} := \{\mathcal{J} \in \text{Fil}^*(Z) : \mathcal{H} \subseteq \mathcal{J}\}$  com a ordem da inclusão usual. Dado que

$$\mathcal{J}' := \left\{ S \subseteq Z : \text{existe } \mathcal{H}' \subseteq \mathcal{H} \text{ finito tal que } \bigcap_{H' \in \mathcal{H}'} H' \subseteq S \right\}$$

é um filtro próprio em  $Z$  que satisfaz  $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{J}'$  (certo?)<sup>\*</sup>, temos  $\mathbb{P} \neq \emptyset$ . Agora, se  $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}$  é uma cadeia, então  $\mathcal{D} := \bigcup \mathcal{C} \in \mathbb{P}$  (por quê?)<sup>\*</sup> com  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{D}$  para todo  $\mathcal{J} \in \mathcal{C}$ , i.e.,  $\mathcal{D}$  é limitante superior de  $\mathcal{C}$ . Portanto, o Lema de Zorn se aplica, e garante a existência de  $\mathcal{G} \in \mathbb{P}$  maximal, como desejado. ▮

<sup>†</sup>Frequentemente, a fim de que uma determinada propriedade seja “interessante”, é importante que existam tanto objetos que a possuam quanto objetos que não a possuam.

Fazendo  $Z := X$  e  $\mathcal{H} := \overline{\mathcal{F}}$  na última afirmação, segue que existe um filtro próprio  $\mathcal{G}$  em  $X$ , maximal na família dos filtros próprios que contém  $\overline{\mathcal{F}}$ . E agora entra a compacidade: como  $\overline{\mathcal{G}}$  é uma família de fechados com a p.i.f. (pelo mesmo argumento que você usou para mostrar que  $\overline{\mathcal{F}}$  tem a p.i.f.), existe  $x \in X$  tal que  $x \in \overline{G}$  para todo  $G \in \mathcal{G}$ .

KATZENSPRUNG:  $\mathcal{G} \rightarrow x$ .

Se não for este o caso, i.e., se  $\mathcal{N}_x \not\subseteq \mathcal{G}$ , então existe um aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $x$  com  $V \notin \mathcal{G}$ . Consequentemente,  $\tilde{\mathcal{G}} := \mathcal{G} \cup \{X \setminus V\}$  tem a p.i.f.: se  $(X \setminus V) \cap G = \emptyset$  para algum  $G \in \mathcal{G}$ , então  $G \subseteq V$  e daí  $V \in \mathcal{G}$ . Assim, existe um filtro próprio  $\mathcal{K}$  em  $X$  satisfazendo  $\tilde{\mathcal{G}} \subseteq \mathcal{K}$  (de acordo?)\*. Como  $\overline{\mathcal{F}} \subseteq \tilde{\mathcal{G}} \subseteq \mathcal{K}$ , resulta  $\mathcal{G} = \mathcal{K}$  e, por conseguinte,  $V \in \mathcal{G}$ , absurdo. Portanto,  $\mathcal{N}_x \subseteq \mathcal{G}$ .

A recíproca é bem mais tranquila. Note que se  $\mathcal{G}$  é um filtro próprio de  $X$  que converge para  $x$ , então  $x \in \overline{G}$  para todo  $G \in \mathcal{G}$ : afinal de contas, se  $V \in \mathcal{N}_x$ , então  $V \in \mathcal{G}$  e daí  $V \cap G \neq \emptyset$  para qualquer  $G \in \mathcal{G}$ . Em particular,  $\overline{\mathcal{G}}$  é uma família de fechados de  $X$  cuja interseção é não vazia. Por outro lado, se  $\mathcal{U}$  é cobertura aberta para  $X$ , então  $\mathcal{F}(\mathcal{U}) := \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$  é família de fechados *com interseção vazia*<sup>†</sup>. Logo, não existe filtro próprio  $\mathcal{G}$  em  $X$  com  $\mathcal{F}(\mathcal{U}) \subseteq \mathcal{G}$  (certo?)\*. Tendo em vista que famílias com a p.i.f. sempre estão contidas em filtros próprios, a última conclusão significa que  $\mathcal{F}(\mathcal{U})$  *não tem a p.i.f.* (por quê?)\*, ou seja,  $\mathcal{U}$  tem subcobertura finita!  $\square$

**Observação 3.1.27.** Você já deve conhecer o enunciado do

**LEMA DE ZORN.** *Se  $\mathbb{P} \neq \emptyset$  é uma ordem parcial em que toda cadeia tem limitante superior, então  $\mathbb{P}$  tem um elemento maximal.*

Trata-se de uma das ZF-encarnações do Axioma da Escolha [13, 21]. Para usá-lo, o mais importante é saber o que são cadeias, limitantes superiores e elementos maximais em ordens: **cadeias** são subconjuntos totalmente ordenados pela ordem herdada de  $\mathbb{P}$ , enquanto  $p \in \mathbb{P}$  é **maximal** se não existe  $a \in \mathbb{P}$  tal que  $p < a$  (ou, equivalentemente,  $p = a$  sempre que  $a \in \mathbb{P}$  satisfaz  $p \leq a$ ). A definição de limitante superior é aquela que você aprendeu ao estudar supremos em Análise Real.  $\triangle$

Filtros próprios maximais como os que foram usados na última demonstração são chamados de **ultrafiltros**<sup>‡</sup>, daí o nome “Lema do ultrafiltro” dado para a Afirmação 3.1.26. Por sua vez, para um filtro próprio  $\mathcal{F}$ , os pontos do conjunto  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} \overline{F}$  são chamados de **pontos aderentes do filtro  $\mathcal{F}$** . Assim, não deve ser difícil destrinchar tudo o que se viu até agora para resolver o próximo

**Exercício 3.1.8** (Compacidade vs. convergência, parte II (\*)). Mostre que as afirmações a seguir são equivalentes para qualquer espaço topológico:

- (i) toda família de fechados do espaço com a p.i.f. tem interseção não vazia;
- (ii) todo ultrafiltro no espaço converge;
- (iii) todo filtro próprio no espaço está contido num filtro próprio convergente;
- (iv) todo filtro próprio no espaço tem ponto aderente. ■

<sup>†</sup>Confira a demonstração do Teorema 3.1.2 se não lembrar do argumento.

<sup>‡</sup>É difícil *visualizar* ultrafiltros, no sentido de ter algum tipo de entendimento intuitivo de *como eles são*. Caso se interesse, há uma discussão um pouco mais paciente na Subseção 2.2.3 §3.

#### §4 Sub-redes e compacidade

E onde as redes foram parar nessa conversa? Assim como no caso de filtros, se toda rede num espaço  $Y$  converge, então o espaço é ruim para analistas: se  $|Y| > 1$  e  $x, y \in Y$  são pontos distintos, então a convergência da sequência

$$z_n := \begin{cases} x, & \text{se } n \text{ é par} \\ y, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

impede que o espaço seja de Hausdorff (por quê?)\*. Ou seja: como no caso de filtros, exigir que toda rede convirja é algo forte. Mas diferente dos filtros, naturalmente comparáveis por meio da inclusão, não há uma maneira inteiramente óbvia de comparar redes a fim de obter uma versão análoga da Proposição 3.1.24 que motive outra manifestação de compacidade. Ainda bem que nem tudo na vida precisa ser óbvio.

**Proposição 3.1.28.** *Se  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é subsequência de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , então  $(x_n)_n^\uparrow \subseteq (y_n)_n^\uparrow$ .*

*Demonstração.* Antes de qualquer outra coisa, convém relembrar que  $(y_n)_n$  é **subsequência** de  $(x_n)_n$  se existe uma função  $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  estritamente crescente tal que  $y_n = x_{h(n)}$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Agora, se  $S \in (x_n)_n^\uparrow$ , então existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_m : m \geq N\} \subseteq S$ . Logo,  $\{y_n : n \geq N\} \subseteq S$ : com efeito, se  $n \geq N$ , então  $h(n) \geq h(N) \geq N$  (certo?)\*, acarretando  $y_n = x_{h(n)} \in \{x_m : m \geq N\} \subseteq S$ .  $\square$

**Corolário 3.1.29.** *Se  $(x_n)_n \rightarrow p$  num espaço topológico  $X$  e  $(y_n)_n$  é subsequência de  $(x_n)_n$ , então  $(y_n)_n \rightarrow p$ .*

A última proposição é a justificativa *etimológica* para a próxima

**Definição 3.1.30.** Dadas redes  $\varphi$  e  $\psi$  num conjunto  $X$ , diremos que  $\psi$  é **sub-rede** de  $\varphi$  se  $(\varphi)_n^\uparrow \subseteq (\psi)_n^\uparrow$ .  $\P$

Explicitamente,  $\psi$  é sub-rede de  $\varphi$  sse para todo  $A \in \text{dom}(\varphi)$  existe  $B \in \text{dom}(\psi)$  tal que  $\psi[B^\uparrow] \subseteq \varphi[A^\uparrow]$ . Prefere explicitar ainda mais? Pois bem:  $(y_b)_{b \in \mathbb{B}}$  é sub-rede de  $(x_a)_{a \in \mathbb{A}}$  sse para todo  $A \in \mathbb{A}$  existe  $B \in \mathbb{B}$  tal que para todo  $b \in \mathbb{B}$  com  $b \succeq_{\mathbb{B}} B$  existe  $a \succeq_{\mathbb{A}} A$  tal que  $y_b = x_a$ . Moralmente,  $\psi$  é sub-rede de  $\varphi$  se os rabos de  $\varphi$  *contêm* rabos de  $\psi$ , o que reforça a escolha pelo prefixo “sub”.

**Exercício 3.1.9** (\*). Mostre que se  $\psi$  é sub-rede de  $\varphi$  num espaço  $X$ , então  $\lim \varphi \subseteq \lim \psi$ . Explicitamente: se  $\varphi \rightarrow x$  em  $X$ , então  $\psi \rightarrow x$  em  $X$ .  $\blacksquare$

**Exemplo 3.1.31** (Sub-redes de Willard). A proposição anterior mostra que subsequências são exemplos de sub-redes. Mais geralmente, diremos que  $\psi$  é **W-sub-rede**<sup>†</sup> de  $\varphi$  se existir uma função crescente e *cofinal*<sup>‡</sup>  $\rho: \text{dom}(\psi) \rightarrow \text{dom}(\varphi)$  tal que  $\varphi \circ \rho = \psi$ .




Figura 3.1: O poder unificador das setas.

<sup>†</sup>Em referência a Willard [36].

<sup>‡</sup>Uma função  $\rho: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$  é **cofinal** se sua imagem é *cofinal* em  $\mathbb{B}$ , ou seja, se para todo  $b \in \mathbb{B}$  existir  $a \in \mathbb{A}$  tal que  $\rho(a) \succeq b$ .

Uma simples adaptação da demonstração apresentada para a Proposição 3.1.28 mostra que  $W$ -sub-redes são sub-redes (percebeu?)<sup>\*</sup>. Fora isso, é claro que se  $\varphi$  e  $\psi$  são *sequências* num mesmo conjunto, então  $\psi$  é subsequência de  $\varphi$  sse  $\psi$  é  $W$ -sub-rede de  $\varphi$  (é claro mesmo?)<sup>\*</sup>. Mas não se apresse: sequências admitem  $W$ -sub-redes que nem são sequências! Confira a Subseção 2.2.4 para mais detalhes<sup>†</sup>. ▲

**Exercício 3.1.10** (\*). Sejam  $\varphi := (1, 0, 0, 0, \dots)$  e  $\psi := (-1, 0, 0, 0, \dots)$  sequências em  $\mathbb{R}$ .

- a) Mostre que ambas convergem para 0 em  $\mathbb{R}$ .
- b) Mostre que  $\varphi$  não é subsequência de  $\psi$  e vice-versa.
- c) Mostre que  $(\varphi)^\uparrow = (\psi)^\uparrow$ . ■

**MORAL DA HISTÓRIA:** a flexibilidade das sub-redes corrige limitações técnicas oriundas das restrições impostas pela definição clássica de subsequência.

Com as formulações acima, traduzir compacidade em termos de redes se transforma num simples exercício de adaptação.

**Definição 3.1.32.** Sejam  $X$  um espaço e  $\varphi$  uma rede em  $X$ .

- (i) Diremos que  $\varphi$  é **ultrarrede** se  $(\varphi)^\uparrow$  for um ultrafiltro em  $X$ .
- (ii) Um ponto  $x \in X$  é **ponto aderente** de  $\varphi$  se  $x \in \overline{\varphi[D^\uparrow]}$  para todo  $D \in \text{dom}(\varphi)$ . ¶

**Teorema 3.1.33** (Compacidade vs. convergência, parte III). *Para um espaço  $X$ , são equivalentes:*

- (i)  $X$  é compacto;
- (ii) toda ultrarrede de  $X$  converge;
- (iii) toda rede em  $X$  tem sub-rede convergente;
- (iv) toda rede em  $X$  tem ponto aderente.

*Demonstração via filtros.* Por conta da Proposição 2.1.20 e do Teorema 2.1.27, todas as equivalências seguem do Exercício 3.1.8. Por exemplo: é claro (?)<sup>\*</sup> que todo ultrafiltro de  $X$  converge sse toda ultrarrede de  $X$  converge. Verificar os detalhes remanescentes será problema seu (\*). □

*Demonstração sem filtros (explícitos).* Para empurrar filtros para baixo do tapete, precisamos expressar ultrarredes de modo um pouco mais indireto.

▮ **Afirmção 3.1.34.** *Uma rede  $\varphi$  de um conjunto  $A$  é ultrarrede se, e somente se,  $\varphi$  é sub-rede de todas as suas sub-redes em  $A$ .*

*Prova da Afirmção.* Tendo em vista o Teorema 2.1.27, o enunciado acima é apenas um modo equivalente de dizer que  $(\varphi)^\uparrow$  contém todo filtro próprio que o contém, i.e.,  $(\varphi)^\uparrow$  é maximal na família dos filtros próprios, ou seja, é ultrafiltro. ▮

<sup>†</sup>Mesmo que não queira saber de tantos detalhes, é importante avisar que a definição de sub-rede não é consenso na literatura.

Agora, se  $\psi$  é ultrarrede em  $X$ , então  $\{\overline{\psi[d^\dagger]} : d \in \text{dom}(\psi)\}$  é uma família de fechados com a p.i.f. (certo?)<sup>\*</sup>. Logo, se  $X$  é compacto, então existe  $x \in X$  tal que  $x \in \overline{\psi[d^\dagger]}$  para todo  $d \in \text{dom}(\psi)$ .

KATZENSPRUNG:  $\psi \rightarrow x$ .

Se não for este o caso, então existe um aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $x$  tal que para todo  $d \in \text{dom}(\psi)$  existe  $d' \succeq d$  satisfazendo  $\psi(d') \notin V$  (entendeu?)<sup>\*</sup>. Logo,  $\rho: \text{dom}(\psi) \rightarrow X$  dada por  $\rho(d) := \psi(d')$  é sub-rede de  $\psi$  (por quê?)<sup>\*</sup>, donde a caracterização de ultrarredes dada pela última afirmação garante que  $(\rho)^\dagger = (\psi)^\dagger$ . Porém, por construção,  $X \setminus V$  contém todos os rabos de  $\rho$ , que devem conter rabos de  $\psi$ , mostrando que o ponto  $x$  não tem a propriedade com a qual foi escolhido (por quê?)<sup>\*</sup>. Portanto,  $\psi \rightarrow x$ .

Para provar (iii) a partir de (ii), precisamos substituir o Lema do ultrafiltro por algo que mencione apenas ultrarredes.

▮ **Afirmção 3.1.35 (“Lema da ultrarrede”).** *Se  $\varphi$  é rede em  $X$ , então  $\varphi$  admite uma sub-rede  $\psi$  que é ultrarrede.*

*Prova da Afirmção.* A ideia ainda é usar o Lema de Zorn. Começa-se com a família

$$\mathbb{P} := \{\mathcal{S} \subseteq \wp(X) : \mathcal{S} \text{ tem p.i.f. e } \{\varphi[d^\dagger] : d \in \text{dom}(\varphi)\} \subseteq \mathcal{S}\},$$

parcialmente ordenada pela inclusão. Após notar que  $\mathbb{P}$  satisfaz as hipóteses do Lema de Zorn (note!)<sup>\*</sup>, podemos tomar  $\mathcal{M} \in \mathbb{P}$  maximal.

Como no Teorema 2.1.27,  $\mathbb{D}_\varphi := \{(x, M) \in X \times \mathcal{M} : x \in M\}$  é um conjunto dirigido pela relação  $\preceq$  dada por  $(x, M) \preceq (y, N)$  sse  $N \subseteq M$  (e isto funciona pois...?)<sup>\*</sup>. Daí, a rede  $\psi: \mathbb{D}_\varphi \rightarrow X$  dada por  $\psi(x, M) := x$  é sub-rede de  $\varphi$  pois  $\psi[(d, \varphi[d^\dagger])] \subseteq \varphi[d^\dagger]$  para todo  $d \in \text{dom}(\varphi)$  (entendeu?)<sup>\*</sup>. Para ver que  $\psi$  é ultrarrede, note que se  $\rho$  for sub-rede de  $\psi$ , então ocorre  $(\psi)^\dagger \subseteq (\rho)^\dagger$ , acarretando  $(\rho)^\dagger \in \mathbb{P}$ , donde segue que  $\mathcal{M} = (\rho)^\dagger$  e, portanto,  $(\rho)^\dagger \subseteq (\psi)^\dagger$  (por quê?)<sup>\*</sup>. ▮

Assim, se toda ultrarrede converge em  $X$ , segue que toda rede tem sub-rede convergente. As implicações (iii)  $\Rightarrow$  (iv) e (iv)  $\Rightarrow$  (i) ficarão por sua conta (<sup>\*</sup><sub>★</sub>). □

Antes de avançar para as demonstrações do *Teorema de Tychonoff*, será proveitoso ilustrar como as propriedades essenciais de compacidade podem ser provadas com as caracterizações anteriores. E para quem estudou compactos em Análise Real com ênfase em *existência de subsequências convergentes* (cf. Subseção 3.1.3§1), fica o convite para ler os próximos argumentos com ainda mais atenção.

*Demonstração da Proposição 3.1.7, via redes.* Com as mesmas notações do enunciado, mostraremos que se  $\varphi$  é uma rede em  $F$ , então  $\varphi$  admite sub-rede em  $F$  que converge para um ponto de  $F$ . Ora,  $\varphi$  é rede em  $X$ , e este é compacto. Logo, existe  $\psi \in \text{Net}(X)$  tal que  $(\varphi)^\dagger \subseteq (\psi)^\dagger$  e  $\psi \rightarrow x$ . Quase acabou, mas é preciso cuidado:  $\psi$  *pode* assumir valores fora de  $F$ . Contudo, para qualquer  $A \in \text{dom}(\varphi)$ , existe  $B \in \text{dom}(\psi)$  com  $\psi[B^\dagger] \subseteq \varphi[A^\dagger] \subseteq F$ , mostrando que  $\psi|_{B^\dagger}$  é uma rede<sup>†</sup> em  $F$  que converge para  $x$  (pelo próximo exercício), donde a hipótese de  $F$  ser fechado assegura que  $x \in F$ . Portanto, em vista do Exercício 2.1.64, segue que  $F$  é compacto<sup>‡</sup>. □

<sup>†</sup>Em particular, note que  $B^\dagger$  é conjunto dirigido pela ordem herdada de  $\text{dom}(\psi)$ . Isto vale, mais geralmente, para qualquer subconjunto *cofinal* de um conjunto dirigido (entendeu?)<sup>\*</sup>.

<sup>‡</sup>Por que o Exercício 2.1.64 foi necessário?<sup>\*</sup>



**Exercício 3.1.11** ( $\star$ ). Mostre que  $(\varphi)^\uparrow = (\varphi|_{A^\uparrow})^\uparrow$  para qualquer  $A \in \text{dom}(\varphi)$ . Em particular,  $\varphi \rightarrow x$  em  $X$  sse  $\varphi|_{A^\uparrow} \rightarrow x$  em  $X$ . MORAL DA HISTÓRIA: para propósitos de convergência, só os rabos importam<sup>†</sup>. ■

*Demonstração da Proposição 3.1.8, via redes.* Com as mesmas notações do enunciado, e tendo em vista o que se discutiu ao longo da Subseção 2.1.2§1, basta mostrar que se  $\varphi$  é uma rede em  $K$  tal que  $\varphi \rightarrow x$  em  $X$ , então  $x \in K$  (por que basta isso?)<sup>\*</sup>. Ora, pela compacidade de  $K$ ,  $\varphi$  admite sub-rede  $\psi \in \text{Net}(K)$  tal que  $\psi \rightarrow y$  em  $K$  para algum  $y \in K$ . Por outro lado, por  $\psi$  ser sub-rede de  $\varphi$ , também ocorre  $\psi \rightarrow x$  em  $X$  (cf. Exercício 3.1.9). Assim, temos  $\psi \rightarrow x$  e, pelo Exercício 2.1.64,  $\psi \rightarrow y$ . Finalmente, por  $X$  ser de Hausdorff, conclui-se que  $x = y$  e, portanto,  $x \in K$ . □

*Demonstração da Proposição 3.1.9, via redes.* Com as hipóteses da proposição, devemos mostrar que se  $\varphi$  é rede em  $Y$ , então  $\varphi$  admite sub-rede convergente. Ora, por  $f$  ser sobrejetora, para cada  $a \in \text{dom}(\varphi)$  existe  $x_a \in X$  tal que  $f(x_a) = \varphi(a)$ , de modo que a correspondência  $a \mapsto x_a$  define uma rede  $\Phi: \text{dom}(\varphi) \rightarrow X$  que satisfaz  $f \circ \Phi = \varphi$ . Por  $X$  ser compacto,  $\Phi$  admite sub-rede convergente, digamos  $\psi \in \text{Net}(X)$  com  $\psi \rightarrow x$  para algum  $x \in X$ , donde a continuidade de  $f$  assegura  $f \circ \psi \rightarrow f(x)$ . Para encerrar, basta notar que  $f \circ \psi$  é sub-rede de  $f \circ \Phi = \varphi$ : dado  $A \in \text{dom}(\varphi)$ , existe  $B \in \text{dom}(\psi)$  tal que  $\psi[B^\uparrow] \subseteq \Phi[A^\uparrow]$ , acarretando

$$(f \circ \psi)[B^\uparrow] = f[\psi[B^\uparrow]] \subseteq f[\Phi[A^\uparrow]] = \{f(x_a) : a \succeq A\} = \{y_a : a \succeq A\},$$

como desejado. □

**Exercício 3.1.12** ( $\star^4$ ). Supondo que toda rede em  $X$  admita sub-rede convergente, prove que  $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$  é fechada para qualquer espaço  $Y$ . Observação: para ter alguma graça, você não pode usar outras caracterizações de compacidade. Dica: para ter uma primeira ideia do que fazer, finja que redes e sub-redes possam ser substituídas por sequências e subsequências. ■

### 3.1.2 O Teorema de Tychonoff: algumas demonstrações

Possivelmente um dos resultados mais importantes da Topologia Geral clássica, o Teorema de Tychonoff generaliza o Corolário 3.1.20 retirando a hipótese de que o conjunto de índices  $\mathcal{I}$  seja finito. Explicitamente:

**Teorema 3.1.36** (Tychonoff). *Se  $X_i$  é espaço compacto para cada  $i \in \mathcal{I}$ , então  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  é compacto.*

Dado que a topologia produto é a manifestação topológica da *convergência pontual*, você já deve imaginar que o Teorema de Tychonoff terá implicações/aplicações no estudo de compacidade em espaços de funções. Apesar de ser apenas a ponta do *iceberg*<sup>‡</sup>, nada disso será discutido nesta subseção. Por ora, só exploraremos *algumas* demonstrações do teorema<sup>††</sup>:

- as duas primeiras provas se valem da caracterização de compacidade em termos de coberturas abertas, e estão aqui, dentro outros motivos, para evitar protestos;

<sup>†</sup>Você já viu isso em Análise na Reta: “ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge para  $p$  sse  $(x_n)_{n \geq k}$  converge para  $p$ ”. Trata-se de uma instância do fenômeno explorado no Exercício 3.1.11 (percebeu?)<sup>\*</sup>.

<sup>‡</sup>As aplicações do Teorema de Tychonoff vão muito além da Análise.

<sup>††</sup>Sim, há muitas outras.

- a terceira demonstração utiliza a caracterização de compacidade via projeções fechadas, onde o Lema de Zorn será usado para esconder uma passagem que, tradicionalmente, usa *recursão transfinita*;
- a quarta prova usa a caracterização fulminante de compacidade em termos de ultrafiltros convergentes<sup>†</sup>;
- a última prova, minha favorita atualmente, esconde os ultrafiltros do argumento anterior por meio de ultrarredes de um jeito bem pouco óbvio — mas quase simples.

Porém, antes de iniciar esta jornada, cabe um alerta: em todas as provas que veremos, alguma forma do Axioma da Escolha estará presente. E não adianta reclamar:

**Teorema 3.1.37** (Kelley). (Em ZF)<sup>‡</sup> *Se o produto arbitrário de espaços compactos é compacto, então vale o Axioma da Escolha.*

*Demonstração.* Dada uma família não vazia  $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$  de conjuntos não vazios, busca-se mostrar que  $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \neq \emptyset$ . Para isso, tomemos  $p \notin \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X_i$  e, para cada  $i \in \mathcal{I}$ , façamos  $Y_i := X_i \cup \{p\}$  munido da *topologia compacta*<sup>††</sup>  $\mathcal{T}_i := \{Y_i, \{p\}, \emptyset\}$ . Por hipótese, o espaço  $Y := \prod_{i \in \mathcal{I}} Y_i$  é compacto. Como a projeção  $\pi_i : Y \rightarrow Y_i$  é contínua e  $X_i \subsetneq Y_i$  é fechado para cada  $i$  (certo?)<sup>\*</sup>, segue que  $F_i := \pi_i^{-1}[X_i]$  é fechado em  $Y$ . Agora, mostraremos que  $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} F_i \neq \emptyset$ , o que encerra a prova, posto que  $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} F_i = \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  (certo?)<sup>\*</sup>.

Como cada  $F_i$  é fechado em  $Y$  e este é compacto, basta provar que a família de fechados  $\mathcal{F} := \{F_i : i \in \mathcal{I}\}$  tem a p.i.f. (cf. Observação 3.1.15, item (ii)). É justamente neste ponto da prova que a importância da escolha de  $p$  se revela: dado um subconjunto *finito*  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ , pode-se escolher  $x_j \in X_j$  para cada  $j \in \mathcal{J}$  sem apelar para o Axioma da Escolha, posto que  $\mathcal{J}$  é finito. Daí, define-se  $f \in Y$  fazendo

$$f(i) := \begin{cases} x_i, & \text{se } i \in \mathcal{J} \\ p, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

resultando em  $f \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} F_i$  (percebeu?)<sup>\*</sup>. □

Essa observação é útil mesmo para quem não se interessa por Fundamentos: uma vez que o Teorema de Tychonoff é equivalente ao Axioma da Escolha, assumi-lo como verdadeiro (sem demonstração) é tão perigoso quanto assumir o próprio Axioma da Escolha (ou o Lema de Zorn, etc.) sem demonstração. Contudo, eu não recomendo fazer isso, posto que mesmo as demonstrações feias deste teorema são belíssimas.

LEMBRETE: você não precisa estudar todas as demonstrações a seguir. Mas deveria.

## §1 Duas provas via coberturas abertas

A primeira prova, adaptada de [32], requer apenas a convenção de uma notação bastante razoável para lidar com produtos arbitrários: para uma  $\mathcal{I}$ -upla  $u \in \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  e um subconjunto  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ , vamos indicar por  $u|_{\mathcal{J}}$  a restrição de  $u$  aos índices  $\mathcal{J}$ . Explicitamente, se  $u = (u_i)_{i \in \mathcal{I}}$ , então  $u|_{\mathcal{J}} = (u_i)_{i \in \mathcal{J}}$ . Em outras palavras, trata-se apenas da notação usual para restrição de funções aplicada a uplas, que são funções no final das contas.

<sup>†</sup>Tenho esta prova numa caneca!

<sup>‡</sup>Isto significa que o Axioma da Escolha (e qualquer uma de suas formulações equivalentes) não pode ser usada na demonstração.

<sup>††</sup>A rigor, espaços são compactos, não suas topologias. No entanto, a preguiça aliada à liberdade poética me forçam a usar tal expressão. *Caio Oliveira, desculpe-me, mas eu não presto.*

*Demonstração do Teorema de Tychonoff, via coberturas abertas.* Primeiro, note que pelo item (i) da Observação 3.1.15, podemos restringir nossa atenção às famílias de abertos de  $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$  pertencentes a uma base  $\mathcal{B}$  fixada. Por sua vez, em virtude da descrição dos abertos da topologia produto (cf. Definição 2.1.88, pág. 81), podemos tomar  $\mathcal{B}$  como a coleção dos abertos da forma

$$U := \prod_{i \in \mathcal{I}} U(i), \text{ com } U(i) \subseteq X_i \text{ aberto } \forall i \in \mathcal{I} \text{ e } \text{supp}(U) := \{i \in \mathcal{I} : U(i) \neq X_i\} \text{ finito.}$$

Será útil notar que para uma  $\mathcal{I}$ -upla  $z \in X$  e um conjunto  $U$  como acima, temos

$$z \in U \Leftrightarrow z_i \in U(i) \text{ para todo } i \in \text{supp}(U). \quad (3.1)$$

OBJETIVO: procederemos pela contrapositiva, i.e., supondo que existe  $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{B}$  tal que  $\bigcup_{V \in \mathcal{V}} V \neq X$  para qualquer subconjunto finito  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$ , mostraremos que  $\bigcup_{U \in \mathcal{U}} U \neq X$ .

Com  $\mathcal{U}$  como acima, considere

$$\mathbb{P} := \left\{ (u, \mathcal{K}) : \begin{array}{l} \mathcal{K} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } u \in \prod_{k \in \mathcal{K}} X_k \text{ tais que para} \\ \text{todo subconjunto finito } \mathcal{V} \subseteq \mathcal{U} \\ \text{existe } y \in X \setminus \bigcup_{V \in \mathcal{V}} V \text{ com } y|_{\mathcal{K}} = u \end{array} \right\}$$

e note que  $\mathbb{P} \neq \emptyset$  pois  $(\emptyset, \emptyset) \in \mathbb{P}$ , afinal  $y|_{\emptyset} = \emptyset$  para qualquer  $y \in X$  (certo?)<sup>\*</sup>. Intuitivamente,  $\mathbb{P}$  é a coleção de todas as *testemunhas parciais* do que queremos provar: para *cumprir* o objetivo estabelecido acima, basta obter  $(u, \mathcal{K}) \in \mathbb{P}$  com  $\mathcal{K} = \mathcal{I}$ , pois daí  $u \notin V$  para todo  $V \in \mathcal{U}$  (por quê?)<sup>\*</sup>. A ideia é apelar para o Lema de Zorn.

Para isso, o primeiro passo é elevar  $\mathbb{P}$  ao patamar de ordem parcial. Faremos isso declarando  $(u, \mathcal{K}) \preceq (v, \mathcal{L})$  sse  $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{L}$  e  $v|_{\mathcal{K}} = u$ . O próximo passo é a condição de cadeia: se  $\mathcal{C} := \{(u_\gamma, \mathcal{K}_\gamma) : \gamma \in \Gamma\}$  é cadeia em  $\mathbb{P}$ , então um limitante superior de  $\mathcal{C}$  se obtém fazendo  $\mathcal{K} := \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{K}_\gamma$  e definindo  $u(k) := u_\gamma(k)$  para qualquer  $\gamma \in \Gamma$  tal que  $k \in \mathcal{K}_\gamma$ . Vamos essa afirmação com muita calma.

A função  $u$  está bem definida pois  $\mathcal{C}$  é cadeia (certo?)<sup>\*</sup>. Além disso, trata-se de uma  $\mathcal{K}$ -upla, i.e.,  $u \in \prod_{k \in \mathcal{K}} X_k$ . Ora, se  $k \in \mathcal{K}$ , então existe  $\gamma$  com  $k \in \mathcal{K}_\gamma$  e  $u(k) = u_\gamma(k) \in X_k$ . Em particular, é claro que  $\mathcal{K}_\gamma \subseteq \mathcal{K}$  e  $u|_{\mathcal{K}_\gamma} = u_\gamma$  para todo  $\gamma$ . Resta provar que  $(u, \mathcal{K}) \in \mathbb{P}$ .

Para isso, considere um subconjunto finito  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$ . Pelo modo como os abertos de  $\mathcal{U}$  foram tomados,  $S := \bigcup_{V \in \mathcal{V}} \text{supp}(V)$  é subconjunto finito de  $\mathcal{I}$ , donde o fato de  $\mathcal{C}$  ser cadeia permite obter  $\gamma \in \Gamma$  tal que  $S \cap \mathcal{K} \subseteq \mathcal{K}_\gamma$  (entendeu?)<sup>\*</sup>. Como  $(u_\gamma, \mathcal{K}_\gamma) \in \mathbb{P}$ , existe  $y_\gamma = y \in X \setminus \bigcup_{V \in \mathcal{V}} V$  tal que  $y|_{\mathcal{K}_\gamma} = u_\gamma$ . Será importante notar o seguinte:

$$\text{para cada } V \in \mathcal{V} \text{ existe } i \in \text{supp}(V) \text{ tal que } y_i \notin V(i). \quad (3.2)$$

Para concluir que  $(u, \mathcal{K}) \in \mathbb{P}$ , definimos  $y' \in X$  fazendo

$$y'_i := \begin{cases} u(i), & \text{se } i \in \mathcal{K} \\ y_i, & \text{caso contrário} \end{cases},$$

que satisfaz  $y'|_{\mathcal{K}} = u$  por construção e, como veremos, não pertence a  $\bigcup_{V \in \mathcal{V}} V$ .

Por (3.2), para cada  $V \in \mathcal{V}$  existe  $i \in \text{supp}(V)$  tal que  $y_i \notin V(i)$ . Mas de duas, uma: ou  $i \in \mathcal{K}$ , e daí  $i \in \mathcal{K} \cap S \subseteq \mathcal{K}_\gamma$ , acarretando  $y_i = u_\gamma(i) = u(i) = y'_i$ , ou  $i \notin \mathcal{K}$ , e daí  $y_i = y'_i$ . Em ambos os casos, obtivemos uma testemunha de que (3.1) não se verifica com  $z := y'$  e  $U := V$ , para qualquer  $V \in \mathcal{V}$ . Portanto,  $(u, \mathcal{K}) \in \mathbb{P}$ .

Finalmente, o Lema de Zorn garante a existência de  $(v, \mathcal{L}) \in \mathbb{P}$  maximal, e só precisamos verificar que  $\mathcal{L} = \mathcal{I}$ . Para tanto, procederemos por ~~desespero~~ absurdo: assumindo  $\mathcal{L} \neq \mathcal{I}$ , concluiremos que  $(v, \mathcal{L}) \notin \mathbb{P}$ . Novamente, isto será feito por partes.

- Pela suposição acerca de  $\mathcal{L}$ , existe  $k \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{L}$ . Para simplificar as notações adiante, chamemos  $\mathcal{K} := \mathcal{L} \cup \{k\}$ .
- Pela maximalidade de  $(v, \mathcal{L})$ , para cada  $p \in X_k$  temos  $(v \hat{\wedge} p, \mathcal{K}) \notin \mathbb{P}$ , onde  $v \hat{\wedge} p$  é a  $\mathcal{K}$ -upla em  $\prod_{i \in \mathcal{K}} X_i$  dada por

$$v \hat{\wedge} p(i) := \begin{cases} v_i, & \text{se } i \in \mathcal{L} \\ p, & \text{se } i = k \end{cases} \quad (\text{entendeu?})^*.$$

Por sua vez,  $(v \hat{\wedge} p, \mathcal{K}) \notin \mathbb{P}$  significa que existe um subconjunto finito  $\mathcal{V}_p \subseteq \mathcal{U}$  tal que todo  $y \in X$  satisfazendo  $y|_{\mathcal{K}} = v \hat{\wedge} p$  deve pertencer a  $\bigcup_{V \in \mathcal{V}_p} V$ .

- Em particular,  $\mathcal{V}'_p := \{V \in \mathcal{V}_p : p \in V(k)\}$  é subconjunto não vazio (e finito!) de  $\mathcal{V}_p$ , pois existe  $y \in X$  satisfazendo  $y|_{\mathcal{K}} = v \hat{\wedge} p$  (basta *estender*  $v \hat{\wedge} p$ ), logo existe  $V \in \mathcal{V}_p$  com  $y \in V$  e, consequentemente,  $p = v \hat{\wedge} p(k) = y_k \in V(k)$ .
- Para cada  $p \in X_k$ , o conjunto  $W_p := \bigcap_{V \in \mathcal{V}'_p} V(k)$  é uma interseção finita de abertos satisfazendo  $p \in W_p$ .
- Por  $X_k$  ser compacto<sup>†</sup>, existe um subconjunto finito  $F \subseteq X_k$  tal que  $X_k = \bigcup_{p \in F} W_p$ . Consequentemente,  $\mathcal{W} := \bigcup_{p \in F} \mathcal{V}'_p$  é um subconjunto finito de  $\mathcal{U}$ .
- Finalmente,  $\mathcal{W}$  é a testemunha de que  $(v, \mathcal{L}) \notin \mathbb{P}$ . Para  $y \in X$  satisfazendo  $y|_{\mathcal{L}} = v$ , existe  $p \in F$  tal que  $y_k \in W_p$ . Assim, podemos definir  $y' \in X$  fazendo

$$y'_i := \begin{cases} y_i, & \text{se } i \neq k \\ p, & \text{se } i = k \end{cases},$$

pois daí  $y'|_{\mathcal{K}} = v \hat{\wedge} p$ , donde segue que existe  $V \in \mathcal{V}'_p$  com  $y' \in V$  (por quê?)\*. Isto significa que  $y'_i \in V(i)$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ , e disto segue que  $y \in V$ : para  $i \neq k$ , temos  $y_i = y'_i \in V(i)$  e, para  $i = k$ ,  $y_k \in W_p \subseteq V(k)$  pois  $V \in \mathcal{V}'_p$ . Portanto,  $y \in \bigcup_{W \in \mathcal{W}} W$ .  $\square$

Foi uma prova longa, sem dúvidas. Ela tem a vantagem de não depender de conceitos *pouco tradicionais*, o que pode ser útil para quem está em contextos que proíbem o uso de tecnologias mais práticas. Do meu ponto de vista, esta também é a grande desvantagem da prova, mas não discutirei questões religiosas ~~agora~~.

A segunda demonstração recorrerá a um lema técnico que consiste em estender o item (i) da Observação 3.1.15 para sub-bases (relembre a definição na página 79).

<sup>†</sup>Até agora a hipótese de compacidade não havia sido mencionada!

**Lema 3.1.38** (da Sub-base de Alexander). *Sejam  $X$  um espaço topológico e  $\mathcal{B}$  uma sub-base para a topologia de  $X$ . Se toda cobertura por abertos de  $X$  composta por elementos de  $\mathcal{B}$  tem subcobertura finita, então  $X$  é compacto.*

*Demonstração, sem filtros.* Assumindo que  $\mathcal{C}$  é uma cobertura aberta de  $X$  sem subcobertura finita, a família

$$\mathbb{P} := \left\{ \mathcal{U} : \begin{array}{l} \mathcal{U} \text{ é cobertura aberta de } X, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{U} \\ \text{e } \mathcal{U} \text{ não admite subcobertura finita} \end{array} \right\}$$

é não vazia (pois  $\mathcal{C} \in \mathbb{P}$ ), parcialmente ordenada pela inclusão e tal que toda cadeia tem limitante superior (certo?)<sup>\*</sup>. Logo, substituindo  $\mathcal{C}$  por algum elemento maximal de  $\mathbb{P}$  se necessário, podemos supor, adicionalmente, que  $\mathcal{C}$  é maximal com respeito a inclusão.

Pelas hipóteses sobre  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$ , segue que  $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$  não é uma cobertura para  $X$  (se fosse, aconteceria o quê?)<sup>\*</sup>. Logo, existe pelo menos um ponto  $x$  em  $X \setminus \bigcup_{D \in \mathcal{B} \cap \mathcal{C}} D$ .

KATZENSPRUNG: existe  $U \in \mathcal{C}$  tal que  $x \in U$ .

Parece banal, mas por conta disso, existe uma família finita de abertos  $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$  com  $x \in \bigcap_{B' \in \mathcal{B}'} B' \subseteq U$ . Pela forma como se tomou  $x$ , nenhum membro de  $\mathcal{B}'$  pode pertencer a  $\mathcal{C}$  e, portanto,  $\mathcal{C} \cup \{B'\} \notin \mathbb{P}$  para cada  $B' \in \mathcal{B}'$  (percebeu?)<sup>\*</sup>. Logo, existe subcoleção finita  $\mathcal{C}_{B'} \subseteq \mathcal{C}$  com  $X = B' \cup \bigcup_{C \in \mathcal{C}_{B'}} C$ . Por fim, note que  $\{C : C \in \mathcal{C}_{B'} \text{ e } B' \in \mathcal{B}'\} \cup \{U\}$  é uma subcobertura finita de  $\mathcal{C}$  (por quê?!)<sup>\*</sup>, contrariando o modo como  $\mathcal{C}$  foi tomada.  $\square$

*Demonstração alternativa, com filtros.* Utilizaremos a contrapositiva da caracterização de compacidade via ultrafiltros. Se  $X$  não é compacto, então existe um ultrafiltro  $\mathfrak{u}$  em  $X$  com  $\lim \mathfrak{u} = \emptyset$ . Logo, pelo Corolário 2.2.18, a família  $\mathcal{U} := \{B \in \mathcal{B} : X \setminus B \in \mathfrak{u}\}$  é cobertura aberta de  $X$ . Por sorte,  $\mathcal{U}$  não tem subcobertura finita: se  $n \in \mathbb{N}$  e  $B_0, \dots, B_n \in \mathcal{B}$  são tais que  $X \setminus B_i \in \mathfrak{u}$  para cada  $i$ , então  $\bigcap_{i \leq n} X \setminus B_i \in \mathfrak{u}$ , mostrando que  $\bigcap_{i \leq n} X \setminus B_i \neq \emptyset$  e, conseqüentemente,  $\bigcup_{i \leq n} B_i \neq X$ .  $\square$

*Demonstração do Teorema de Tychonoff, via sub-bases.* Como na demonstração anterior, ainda consideraremos  $X_i$  compacto para cada  $i \in \mathcal{I}$  com  $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ . Como sub-base  $\mathcal{B}$ , tomaremos a sub-base “canônica” de  $X$  por abertos da forma  $\pi_i^{-1}[V]$ , com  $V \subseteq X_i$  aberto e  $i \in \mathcal{I}$  (é sub-base, certo?)<sup>\*</sup>. Pelo Lema de Alexander, basta mostrar que qualquer cobertura  $\mathcal{U}$  por abertos de  $X$  composta por elementos de  $\mathcal{B}$  tem subcobertura finita.

Chamando  $\mathcal{U}_i := \{V \subseteq X_i : \pi_i^{-1}[V] \in \mathcal{U}\}$  para cada  $i \in \mathcal{I}$ , provaremos que a família  $\mathcal{U}_j$  é uma cobertura aberta de  $X_j$ , para algum  $j \in \mathcal{I}$ . É claro que  $\mathcal{U}_i$  é família de abertos de  $X_i$  (certo?)<sup>\*\*</sup>. Agora, se  $\mathcal{U}_i$  não cobre  $X_i$  para todo  $i \in \mathcal{I}$ , então é possível escolher<sup>†</sup>  $x_i \notin \bigcup_{V \in \mathcal{U}_i} V$ . No entanto, disto segue que  $x := (x_i)_{i \in \mathcal{I}}$  não é coberto por membros de  $\mathcal{U}$ : se  $x \in U$  para algum  $U \in \mathcal{U}$ , então temos  $U = \pi_i^{-1}[V]$  para algum  $i \in \mathcal{I}$  e  $V \subseteq X_i$  aberto (pelo modo como tomamos  $\mathcal{B}$ !), acarretando  $x_i \in V$  com  $V \in \mathcal{U}_i$ . Portanto, existe algum  $j \in \mathcal{I}$  tal que  $\mathcal{U}_j$  recobre  $X_j$ . Pela compacidade de  $X_j$ , existem  $V_0, \dots, V_n \in \mathcal{U}_j$  tais que  $X_j = \bigcup_{l \leq n} V_l$ , donde se conclui que  $\{\pi_j^{-1}[V_l] : 0 \leq l \leq n\}$  é subcobertura finita de  $\mathcal{U}$ : dado  $y \in X$  qualquer,  $y_j \in V_l$  para algum  $l \leq n$ , e daí  $y \in \pi_j^{-1}[V_l]$ .  $\square$

<sup>†</sup>O Axioma da Escolha está escondido aqui.



Menos da metade do comprimento da primeira prova, com a vantagem de trazer um resultado a mais: agora, sabemos que a condição de compacidade pode ser verificada por abertos de uma sub-base marota qualquer<sup>†</sup>. É uma novidade sutil que pode não ser útil sempre, sem dúvidas, mas ela é útil em pelo menos mais uma situação.


**Teorema 3.1.39.** *Dada uma ordem total  $(\mathbb{T}, \leq)$ , são equivalentes:*

- (i) *todo subconjunto de  $\mathbb{T}$  tem supremo (em  $\mathbb{T}$ );*
- (ii)  *$\mathbb{T}$  é compacto com a topologia da ordem.*

*Demonstração.* Pelo Lema de Alexander, a fim de concluir que  $\mathbb{T}$  é compacto, basta mostrar que toda cobertura aberta de  $\mathbb{T}$  composta por abertos pertencentes a *uma* sub-base  $\mathcal{B}$  fixada admite subcobertura finita. A grande jogada está na escolha da sub-base: tomaremos  $\mathcal{B}$  como no Exemplo 2.1.40, a família dos intervalos da forma  $(-\infty, a)$  e  $(b, +\infty)$  para  $a, b \in \mathbb{T}$ .

Agora, dada uma cobertura aberta  $\mathcal{U}$  de  $\mathbb{T}$  composta por abertos de  $\mathcal{B}$ , há dois pontos muito especiais que devem ser recobertos:  $t_0 := \sup \emptyset$  e  $t_1 := \sup \mathbb{T}$ . Note que como todo  $t \in \mathbb{T}$  é limitante superior de  $\emptyset$  (por vacuidade), tem-se  $t_0 = \min \mathbb{T}$ , enquanto  $t_1 = \max \mathbb{T}$ . Disso resulta que os abertos de  $\mathcal{U}$  são da forma  $[t_0, a)$  e  $(b, t_1]$  (cf. Exemplo 1.2.20).

Consideremos então o conjunto  $A := \{a \in \mathbb{T} : [t_0, a) \in \mathcal{U}\}$ , não vazio pois existe pelo menos um  $U \in \mathcal{U}$  com  $t_0 \in U$ , e tomemos  $a_0 := \sup A$ . Novamente, existe  $V \in \mathcal{U}$  com  $a_0 \in V$ , e não pode ocorrer  $V = [t_0, a)$  para algum  $a$ , pois isso contradiz a escolha de  $a_0$  como supremo de  $A$ . Logo, existe  $b \in \mathbb{T}$  com  $(b, t_1] \in \mathcal{U}$  e  $a_0 \in (b, t_1]$ , acarretando  $b < a_0$ . Mais uma vez, pelo modo como se tomou  $a_0$ ,  $b$  não é limitante superior de  $A$  e, portanto, existe  $a_1 \in A$  com  $b < a_1 \leq a_0$ . Consequentemente,  $b \in [t_0, a_1)$ . Note, por fim, que  $\mathbb{T} = [t_0, a_1) \cup (b, t_1]$ : se  $t \not\leq a_1$ , então a totalidade da ordem assegura que  $a_1 \leq t$ , e daí  $b < a_1 \leq t$ . Se parecer confuso, encare a próxima figura até que ela te encare de volta.



A recíproca será feita por contraposição. Para isso, supondo a existência de  $A \subseteq \mathbb{T}$  sem supremo, ficará por sua conta  $(\star)$  verificar que:

- se  $A = \emptyset$ , então a inexistência de  $\sup \emptyset$  garante que  $\{(t, +\infty) : t \in \mathbb{T}\}$  é uma cobertura aberta de  $\mathbb{T}$  sem subcobertura finita;
- se  $A \neq \emptyset$  não tem limitante superior, então  $\{(-\infty, a) : a \in A\}$  é uma cobertura aberta de  $\mathbb{T}$  sem subcobertura finita;
- se  $A \neq \emptyset$  é limitado superiormente, então a inexistência de  $\sup A$  garante que  $\{(-\infty, a) : a \in A\} \cup \{(b, +\infty) : b \in B\}$  é uma cobertura aberta de  $\mathbb{T}$  sem subcobertura finita, onde  $B := \{b \in \mathbb{T} : a \leq b \text{ para todo } a \in A\}$ .

Em todos os casos, a inexistência de  $\sup A$  garantiu a existência de uma cobertura aberta de  $\mathbb{T}$  sem subcobertura finita, mostrando assim que  $\mathbb{T}$  não é compacto.  $\square$

<sup>†</sup>Precisar saber o que é sub-base pode ser uma desvantagem a depender da situação, mas este é um problema que não é meu.



O teorema anterior generaliza o Exemplo 3.1.6, já que *qualquer* subconjunto de um intervalo real  $[a, b]$  tem supremo: os subconjuntos não vazios já tem supremo em  $[a, b]$  pela *completude* de  $\mathbb{R}$  e pela limitação de  $[a, b]$  em  $\mathbb{R}$ , enquanto  $\sup \emptyset$  em  $[a, b]$  é  $a$ . Porém, note que a ausência de restrição sobre quais subconjuntos admitem supremo é fundamental para a compacidade da ordem: em  $\mathbb{R}$ , apenas os subconjuntos limitados superiormente e não vazios têm supremo e, conseqüentemente, a reta não é compacta. Por outro lado, ao adicionarmos os pontos  $-\infty$  e  $+\infty$  à reta, o resultado,  $\overline{\mathbb{R}}$ , é compacto (por quê?)\*.

## §2 Uma prova com projeções

A próxima prova foi inserida neste texto por questões éticas: a caracterização de compacidade via projeções fechadas (cf. Teorema 3.1.17) forneceu um argumento tão limpo para a versão finita do Teorema de Tychonoff (cf. Corolário 3.1.20) que seria imoral não investir algum tempo em sua generalização. Por sorte, Maria Clementino e Walter Tholen [11] já tiveram o trabalho de apresentar o argumento para o mundo — coube a mim apenas o dever ~~imoral~~ *cívico* de omitir a recursão transfinita por meio do Lema de Zorn.

*Demonstração do Teorema de Tychonoff, via projeções fechadas.* Como nas provas anteriores,  $X_i$  será considerado um espaço compacto para cada  $i \in \mathcal{I}$ . Porém, desta vez também será conveniente escrever  $X_{\mathcal{J}} := \prod_{j \in \mathcal{J}} X_j$  para cada  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ .

Pelo Teorema 3.1.17, a fim de concluir que  $X_{\mathcal{I}}$  é compacto, basta mostrar que a projeção  $\pi_Y: X_{\mathcal{I}} \times Y \rightarrow Y$  é fechada, para qualquer espaço  $Y$  fixado. Assim, para um subconjunto fechado  $F \subseteq X_{\mathcal{I}} \times Y$  e um ponto  $y \in \overline{\pi_Y[F]}$ , busca-se uma  $\mathcal{I}$ -upla  $x \in X_{\mathcal{I}}$  tal que  $(x, y) \in F$ . Da arbitrariedade do ponto  $y$  tomado, resultará  $\overline{\pi_Y[F]} \subseteq \pi_Y[F]$ , mostrando que  $\pi_Y[F]$  é fechado.

Para simplificar as notações a seguir, seja  $*$   $\notin \mathcal{I}$ , considere  $X_* := Y$  e, para cada  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ , vamos escrever  $\mathcal{J}^* := \mathcal{J} \cup \{*\}$ . Além disso, para  $\mathcal{K}, \mathcal{L} \subseteq \mathcal{I}^*$  com  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{K}$ , vamos indicar por  $\pi_{\mathcal{L}}^{\mathcal{K}}$  a projeção  $X_{\mathcal{K}} \rightarrow X_{\mathcal{L}}$ , que a cada  $\mathcal{K}$ -upla  $z \in X_{\mathcal{K}}$  associa a restrição  $z|_{\mathcal{L}}$ . Assim, por exemplo, temos  $X_{\mathcal{I}} \times Y = X_{\mathcal{I}^*}$  e  $\pi_Y = \pi_{\mathcal{I}^*}^{\mathcal{I}}$  (se achar essas igualdades estranhas, *retorne* para a Subseção 2.2.1).

Para  $F \subseteq X_{\mathcal{I}^*}$  e  $y \in \overline{\pi_Y[F]}$  como acima, definimos

$$\mathbb{P} := \left\{ (\mathcal{J}, z) : \mathcal{J} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } z \in \overline{\pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{I}^*}[F]} \text{ e } \pi_Y(z) = z(*) = y \right\},$$

parcialmente ordenado pela relação  $\preceq$  em que  $(\mathcal{J}, z) \preceq (\mathcal{J}', z')$  sse  $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{J}'$  e  $z'|_{\mathcal{J}} = z$ .

Temos  $\mathbb{P} \neq \emptyset$  pois  $(\emptyset, y) \in \mathbb{P}$  (entendeu?)\*. Vamos mostrar que se  $(\mathcal{J}, z) \in \mathbb{P}$  for um elemento maximal de  $\mathbb{P}$ , então  $\mathcal{J} = \mathcal{I}$  e  $z \in F$ . De fato, se  $\mathcal{J} \neq \mathcal{I}$ , então existe  $k \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{J}$ , o que permite definir  $\mathcal{K} := \mathcal{J} \cup \{k\}$  e a projeção  $X_{\mathcal{K}} \times X_{\mathcal{J}^*} \rightarrow X_{\mathcal{J}^*}$  dada pela correspondência  $(p, u) \mapsto u$  que, com as notações anteriores, é a função  $\pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{K}^*}$ .

KATZENSprung: note (!)\* que vale a identidade  $\pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{I}^*} = \pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{K}^*} \circ \pi_{\mathcal{K}^*}^{\mathcal{I}^*}$ , pois  $\mathcal{J}^* \subseteq \mathcal{K}^* \subseteq \mathcal{I}^*$ .

Enfim, por  $X_k$  ser compacto,  $\pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{K}^*}$  é fechada, de modo que por valer  $(\mathcal{J}, z) \in \mathbb{P}$  obtemos

$$z \in \overline{\pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{I}^*}[F]} = \overline{\pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{K}^*}[\pi_{\mathcal{K}^*}^{\mathcal{I}^*}[F]]} = \pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{K}^*}[\overline{\pi_{\mathcal{K}^*}^{\mathcal{I}^*}[F]}],$$

onde as igualdades se devem ao Katzensprung e à Afirmação 3.1.18. Logo, existe  $z'$  com  $z' \in \overline{\pi_{\mathcal{K}^*}^{\mathcal{I}^*}[F]}$  tal que  $z'|_{\mathcal{J}^*} = z$ , ou seja,  $(\mathcal{K}, z') \in \mathbb{P}$  e  $(\mathcal{J}, z) \prec (\mathcal{K}, z')$ , contrariando a maximalidade. Portanto,  $\mathcal{K} = \mathcal{I}$  e  $z \in \overline{\pi_{\mathcal{I}^*}^{\mathcal{I}^*}[F]} = \overline{F} = F$ , como desejado.

Assim, para encerrar a demonstração, basta provar que  $\mathbb{P}$  tem elemento maximal, o que será feito... pelo Lema de Zorn! Diante de tudo o que discutimos, basta mostrar que se  $\mathcal{C} := \{(\mathcal{J}_\lambda, z_\lambda) : \lambda \in \Lambda\}$  é cadeia em  $\mathbb{P}$ , então  $\mathcal{C}$  tem limitante superior. Mais uma vez, o candidato natural a limitante superior é  $(\mathcal{J}, z)$ , com  $\mathcal{J} := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{J}_\lambda$  e  $z_j := z_\lambda(j)$  para qualquer  $\lambda \in \Lambda$  com  $j \in \mathcal{J}_\lambda$ . Nessa altura do campeonato já não deve ser problema para você mostrar que  $z \in X_{\mathcal{K}^*}$ ,  $z(*) = y$ ,  $\mathcal{K}_\lambda \subseteq \mathcal{K}$  e  $z|_{\mathcal{J}_\lambda} = z_\lambda$  para todo  $\lambda \in \Lambda$ . Resta apenas verificar que  $z \in \overline{\pi_{\mathcal{J}^*}^{\mathcal{I}^*}[F]}$ , pois daí  $(\mathcal{J}, z) \in \mathbb{P}$  será limitante superior de  $\mathcal{C}$ .

Para um aberto básico  $V := \prod_{i \in \mathcal{J}^*} V_i \subseteq X_{\mathcal{J}^*}$  tal que  $z \in V$ , temos  $z_i \in V_i$  para todo  $i \in \text{supp}(V) \subseteq \mathcal{J}^*$ . Por  $\Lambda$  ser cadeia e  $\text{supp}(V)$  ser finito, existe  $\lambda \in \Lambda$  com  $\text{supp}(V) \subseteq \mathcal{J}_\lambda \cup \{*\}$  (certo?)\*. Consequentemente,  $V_{\mathcal{J}_\lambda^*} := \prod_{j \in \mathcal{J}_\lambda^*} V_j$  é um aberto básico de  $X_{\mathcal{J}_\lambda^*}$  em torno de  $z|_{\mathcal{J}_\lambda^*} = z_\lambda$ , que por hipótese pertence a  $\overline{\pi_{\mathcal{J}_\lambda^*}^{\mathcal{I}^*}[F]}$ . Logo, existe  $u \in F$  tal que  $u|_{\mathcal{J}_\lambda^*} \in V_{\mathcal{J}_\lambda^*}$  (por quê?)\*, o que significa  $u_i \in V_i$  para todo  $i \in \text{supp}(V_{\mathcal{J}_\lambda^*}) = \text{supp}(V)$ . Portanto,  $u|_{\mathcal{J}^*} \in V$ , como queríamos.  $\square$

### §3 A demonstração com ultrafiltros

A penúltima prova é uma das mais rápidas — pelo menos quando se explicitam os ultrafiltros convergentes dela<sup>†</sup>. Precisamos apenas de um lema bobo.

**Lema 3.1.40.** *Se  $f: A \rightarrow B$  é sobrejetora e  $\mathfrak{u}$  é ultrafiltro em  $A$ , então  $f(\mathfrak{u})$  é ultrafiltro em  $B$ .*

*Demonstração.* Dado um filtro  $\mathcal{G}$  em  $B$  com  $f(\mathfrak{u}) \subsetneq \mathcal{G}$ , devemos mostrar que  $\mathcal{G}$  não é próprio, i.e.,  $\emptyset \in \mathcal{G}$ . Ora, por hipótese existe  $G \in \mathcal{G}$  tal que  $G \notin f(\mathfrak{u})$ , o que significa  $f^{-1}[G] \notin \mathfrak{u}$  (cf. Exercício 2.1.9). Consequentemente,  $\mathcal{H} := \mathfrak{u} \cup \{A \setminus f^{-1}[G]\}$  tem a p.i.f. (certo?)\* e, pelo Lema do Ultrafiltro (cf. Afirmção 3.1.26), existe ultrafiltro  $\mathfrak{v}$  em  $A$  com  $\mathcal{H} \subseteq \mathfrak{v}$ , donde a maximalidade de  $\mathfrak{u}$  acarreta  $\mathfrak{u} = \mathfrak{v}$ . Assim,  $B \setminus G \in f(\mathfrak{u})$  (pois  $f^{-1}[B \setminus G] = A \setminus f^{-1}[G]$ , certo?)\* e, portanto,  $\emptyset = (B \setminus G) \cap G \in \mathcal{G}$ .  $\square$

*Demonstração do Teorema de Tychonoff, via ultrafiltros.* Com as mesmas notações das demonstrações anteriores, mostraremos que se  $\mathfrak{u}$  é ultrafiltro em  $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ , então  $\mathfrak{u}$  converge. Ora, pelo lema anterior,  $\pi_i(\mathfrak{u})$  é ultrafiltro no espaço compacto  $X_i$ . Logo, podemos escolher  $x_i \in X_i$  tal que  $\pi_i(\mathfrak{u}) \rightarrow x_i$ , de modo que  $x := (x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in X$  é tal que  $\mathfrak{u} \rightarrow x$  (cf. Exercício 2.1.42).  $\square$

### §4 Uma prova com redes

É possível repaginar a última demonstração por meio de ultrarredes. Mas no lugar de um lema bobinho sobre filtros, precisamos de um lema menos bobo sobre redes.

**Lema 3.1.41.** *Seja  $f: A \rightarrow B$  uma função. Se  $\psi \in \text{Net}(B)$  é sub-rede de  $f \circ \varphi$  para alguma rede  $\varphi \in \text{Net}(A)$ , então  $\varphi$  admite uma sub-rede  $\eta$  tal que  $f \circ \eta$  é sub-rede de  $\psi$ .*

Antes de provar o lema, pode ser psicologicamente reconfortante observar que ele se torna uma trivialidade se redes e sub-redes forem trocadas por sequências e subsequências, respectivamente (como na próxima figura).

<sup>†</sup>Ela se torna horrível quando os aparatos de convergência são escondidos. Se quiser ter uma ideia disso, confira a prova para o Teorema de Tychonoff apresentada no clássico de Munkres [23].





Figura 3.2: Se  $(\psi_n)_n = (f(\varphi_{\rho(k)}))_k$ , então  $(\eta_k)_k := (\varphi_{\rho(k)})_k$  é subsequência de  $(\varphi_n)_n$  tal que  $f \circ \eta = \psi$ .

*Demonstração.* O diagrama a seguir esquematiza a ideia da prova.



Explicitamente, definimos  $\mathbb{E} := \{(\alpha, \beta) \in \text{dom}(\varphi) \times \text{dom}(\psi) : f(\varphi(\alpha)) = \psi(\beta)\}$ , um subconjunto cofinal do conjunto dirigido  $\text{dom}(\varphi) \times \text{dom}(\psi)$ , o que em particular assegura que  $\mathbb{E}$  é conjunto dirigido<sup>†</sup>. De fato, para  $(a, b) \in \text{dom}(\varphi) \times \text{dom}(\psi)$ , existe  $b_0 \in \text{dom}(\psi)$  tal que  $\psi[b_0^\uparrow] \subseteq f[\varphi[a^\uparrow]]$  pois  $\psi$  é sub-rede de  $f \circ \varphi$ . Logo, escolhendo  $\beta \succeq b, b_0$ , existe  $\alpha \succeq a$  tal que  $\psi(\beta) = f(\varphi(\alpha))$ , com  $(a, b) \preceq (\alpha, \beta)$ .

Do que se observou acima, resulta que a inclusão  $i: \mathbb{E} \rightarrow \text{dom}(\varphi) \times \text{dom}(\psi)$  é crescente e cofinal. Como o mesmo pode ser dito das projeções, obtemos uma função  $\rho := \pi_\varphi \circ i$  crescente e cofinal, atestando que  $\eta := \varphi \circ \rho$  é W-sub-rede de  $\varphi$  (cf. Exemplo 3.1.31) e tal que  $f \circ \eta$  é sub-rede de  $\tilde{\psi} := \psi \circ \pi_\psi \circ i$ . Para encerrar, basta notar que  $\tilde{\psi}$  também é W-sub-rede<sup>‡</sup> de  $\psi$ .  $\square$

**Corolário 3.1.42.** Se  $f: A \rightarrow B$  é sobrejetora e  $\varphi \in \mathbf{Net}(A)$  é ultrarrede, então  $f \circ \varphi$  é ultrarrede em  $B$ .

*Demonstração.* Pela Afirmação 3.1.34, basta mostrar que se  $\psi$  é sub-rede de  $f \circ \varphi$ , então  $f \circ \varphi$  é sub-rede de  $\psi$ . Ora, pelo lema anterior,  $\varphi$  admite sub-rede  $\eta$  tal que  $f \circ \eta$  é sub-rede de  $\psi$ . No entanto, como  $\varphi$  é ultrarrede, resulta que  $\varphi$  é sub-rede de  $\eta$  e, portanto,  $f \circ \varphi$  é sub-rede de  $f \circ \eta$  (certo?)<sup>††</sup>. Por transitividade, resulta que  $f \circ \varphi$  é sub-rede de  $\psi$ .  $\square$

*Demonstração do Teorema de Tychonoff, via ultrarredes.* Com as mesmas notações das demonstrações anteriores, mostraremos que se  $\varphi$  é ultrarrede em  $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ , então  $\varphi$  converge. Pelo corolário anterior,  $\pi_i \circ \varphi$  é ultrarrede no espaço compacto  $X_i$ . Logo, podemos escolher  $x_i \in X_i$  tal que  $\pi_i \circ \varphi \rightarrow x_i$ , de modo que  $x := (x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in X$  é tal que  $\varphi \rightarrow x$  (cf. Observação 2.1.89).  $\square$

<sup>†</sup>Confira a nota de rodapé <sup>†</sup> na página 146.

<sup>‡</sup>Você percebeu que, na verdade, vale  $(\tilde{\psi})^\uparrow = (\psi)^\uparrow$ ?

<sup>††</sup>Você já viu esse argumento na demonstração via redes da Proposição 3.1.9, pág. 147.

### 3.1.3 Compacidade em espaços métricos

Enquanto a subseção anterior trouxe várias manifestações equivalentes de compacidade, nesta subseção encontraremos variações realmente distintas dessa propriedade, mas que em virtude do bom comportamento das métricas acabam por significar a mesma coisa no reino dos  $\varepsilon$ 's e  $\delta$ 's.

#### §1 As caracterizações tradicionais

Quem enfrentou a Subseção 3.1.1 §4 e tem alguma bagagem de Análise Real deve ter se lembrado do *Teorema de Bolzano-Weierstrass*<sup>†</sup>, que costuma ser usado nos cursos de Análise para, entre muitas outras coisas, caracterizar os compactos da reta como aqueles em que *toda sequência tem subsequência convergente*.

**Definição 3.1.43.** Dizemos que um espaço topológico é **sequencialmente compacto** se toda sequência admite subsequência que converge no espaço. ¶

Sabe por que essa propriedade não apareceu entre as caracterizações gerais de compacidade?

**Exemplo 3.1.44** (Compacidade sequencial  $\nRightarrow$  compacidade). Os exemplos mais conhecidos dependem de  $\omega_1$ , *a.k.a.* o *primeiro ordinal não enumerável*<sup>‡</sup>. Dada uma sequência  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de ordinais em  $[0, \omega_1)$ , tem-se  $\alpha := \sup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n < \omega_1$  (cf. Lema 1.2.33) e, por conseguinte, existe uma subsequência  $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  que converge para  $\alpha \in [0, \omega_1)$  (certo?)<sup>\*</sup>. Logo,  $[0, \omega_1)$  é sequencialmente compacto. No entanto,  $[0, \omega_1)$  não é compacto em virtude do Teorema 3.1.39 (percebeu?)<sup>\*</sup>. ▲

**Exemplo 3.1.45** (Compacidade  $\nRightarrow$  compacidade sequencial). Pelo Teorema de Tychonoff, um espaço da forma  $X := \text{Fun}_p(\mathcal{I}, [0, 1])$  é compacto para qualquer conjunto  $\mathcal{I}$ , posto que  $\text{Fun}_p(\mathcal{I}, [0, 1]) = \prod_{i \in \mathcal{I}} [0, 1]$ , com  $[0, 1]$  compacto (entendeu?)<sup>††</sup>. Veremos que para  $\mathcal{I} := \text{Fun}(\mathbb{N}, \{0, 1\})$ , o espaço  $X$  correspondente não é sequencialmente compacto.

Primeiro, note que um habitante típico de  $X$  é uma função  $\varphi: \text{Fun}(\mathbb{N}, \{0, 1\}) \rightarrow [0, 1]$ , que associa a cada  $f \in \text{Fun}(\mathbb{N}, \{0, 1\})$  um número real  $\varphi(f) \in [0, 1]$ . Por sua vez, um elemento  $f$  de  $\text{Fun}(\mathbb{N}, \{0, 1\})$  é uma sequência de 0's e 1's. Em particular, uma sequência  $(\psi_m)_{m \in \mathbb{N}}$  em  $X$  converge para  $\psi \in X$  se, e somente se,  $(\psi_m(f))_m \rightarrow \psi(f)$  em  $[0, 1]$  para qualquer sequência  $f \in \text{Fun}(\mathbb{N}, \{0, 1\})$ , pois a convergência em  $X$  é a *convergência pontual* (cf. Teorema 2.1.94). Prometa que se lembrará disso!

Com isso em mente, vamos considerar a sequência  $(\pi_m)_{m \in \mathbb{N}}$  em  $X$ , em que

$$\begin{aligned} \pi_m: \text{Fun}(\mathbb{N}, \{0, 1\}) &\rightarrow [0, 1] \\ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} &\mapsto x_m \end{aligned}$$

é a projeção na  $m$ -ésima coordenada. Explicitamente,  $\pi_m(f) := f(m)$  para cada sequência  $f \in \text{Fun}(\mathbb{N}, \{0, 1\})$ .

KATZENSprung: para toda subsequência  $(\pi_{m_k})_{k \in \mathbb{N}}$  de  $(\pi_m)_m$ , existe uma sequência  $f$  de 0's e 1's tal que  $(\pi_{m_k}(f))_{k \in \mathbb{N}}$  não converge em  $[0, 1]$ .

<sup>†</sup> Toda sequência limitada de números reais admite subsequência convergente.

<sup>‡</sup> Para saber mais, confira a Subseção 1.2.2, com ênfase na Proposição 1.2.32 e nos resultados seguintes.

<sup>††</sup> Se precisar de ajuda, confira o Exemplo 2.1.92 que antecede a Definição 2.1.93.

Com efeito, basta definir

$$f(n) := \begin{cases} 1, & \text{se } n = m_{2k} \text{ para algum } k \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (\text{concorda?})^*.$$

Por conta do que você prometeu lembrar, segue que  $(\pi_m)_m$  não admite subsequências convergentes (percebeu?)<sup>\*</sup>. ▲

Apesar de acionarem um sinal de alerta, os exemplos acima não afetam o que você aprendeu sobre compactos na *escola*. Na verdade, para espaços *metrizáveis*, a lista de encarnações de compacidade passa a incluir várias propriedades muito familiares.

**Definição 3.1.46.** Seja  $X$  um espaço topológico.

- (i) Diremos que  $X$  é **enumeravelmente compacto** se toda cobertura enumerável de  $X$  composta por abertos admite subcobertura finita.
- (ii) Um ponto  $p \in X$  é chamado de **ponto de acumulação** de um subconjunto  $S \subseteq X$  se  $p \in \overline{S \setminus \{p\}}$ . Diremos que  $X$  é **limite-compacto** se todo subconjunto infinito de  $X$  admitir ponto de acumulação<sup>†</sup>. ¶

Antes de provar a equivalência entre todas as versões introduzidas acima, será útil considerar uma última propriedade, mas desta vez explicitamente atrelada à métrica.

**Definição 3.1.47.** Diremos que um espaço métrico é **totalmente limitado** (e sua métrica é dita *totalmente limitada*) se toda sequência admitir subsequência de Cauchy. ¶

**Observação 3.1.48** (Sobre limitação total). Um espaço métrico *sequencialmente compacto* é, quase automaticamente, completo: como sequências de Cauchy com subsequências convergentes convergem (lembra?)<sup>\*</sup>, a condição de compacidade sequencial força a convergência das sequências de Cauchy. Nesse sentido, o critério de limitação total definido acima busca apenas *resolver*, para espaços métricos, a “equação”

$$\text{“completude”} + ? = \text{“compacidade sequencial”}.$$

Há chances de que você já conheça uma propriedade de mesmo nome mas com formulação diferente (cf. Afirmação 3.1.51), mas não se preocupe: são condições equivalentes. △

Sem mais delongas:

**Teorema 3.1.49.** *As afirmações a seguir são equivalentes para espaços metrizáveis:*

- (i) *o espaço é compacto;*
- (ii) *o espaço é enumeravelmente compacto;*
- (iii) *o espaço é limite-compacto;*
- (iv) *o espaço é sequencialmente compacto;*
- (v) *a topologia do espaço é induzida por uma métrica completa e totalmente limitada.*

---

<sup>†</sup>Cuidado! O ponto de acumulação não precisa pertencer ao subconjunto em questão!

*Demonstração.* As implicações (i)  $\Rightarrow$  (ii) e (iv)  $\Rightarrow$  (v) são automáticas (certo?)\*. O trabalho de provar (ii)  $\Rightarrow$  (iii) fica bem mais fácil após observarmos três coisas:

- se  $X$  é enumeravelmente compacto e  $F \subseteq X$  é fechado, então  $F$  é enumeravelmente compacto (compare com a Proposição 3.1.7)\*,
- se  $D$  é discreto e infinito, então  $D$  não é enumeravelmente compacto (...?)\*<sup>5</sup>,

enquanto a terceira merece mais destaque.

▮ **Afirmção 3.1.50.** *Sejam  $X$  um espaço topológico e  $S \subseteq X$ . Não existe  $p \in X$  que seja ponto de acumulação de  $S$  se, e somente se,  $S$  é fechado em  $X$  e discreto com a topologia de subespaço.*

*Prova da Afirmção.* Se não há  $p \in X$  que seja ponto de acumulação de  $S$ , então:

- $S$  é fechado pois, se  $p \in X \setminus S$ , então existe um subconjunto aberto  $V \subseteq X$  em torno de  $p$  tal que  $V \cap (S \setminus \{p\}) = V \cap S = \emptyset$ , i.e.,  $p \in V \subseteq X \setminus S$ , mostrando que  $X \setminus S$  é aberto; e
- $S$  é discreto pois, se  $p \in S$ , então existe um subconjunto aberto  $V \subseteq X$  aberto em torno de  $p$  tal que  $V \cap (S \setminus \{p\}) = \emptyset$ , donde segue que  $\{p\} = S \cap V$ , mostrando que  $\{p\}$  é aberto em  $S$  com respeito à topologia de subespaço.

A recíproca ficará por sua conta (\*). ▮

Assim, se não vale (iii), então existe um subconjunto infinito, fechado e discreto com a topologia de subespaço, impedindo que o espaço seja enumeravelmente compacto. Portanto, (ii)  $\Rightarrow$  (iii) segue pela contrapositiva.

Supondo (iii) para um espaço ~~1<sup>o</sup> contável e de Hausdorff~~ metrizable  $X$ , seja  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência em  $X$ . Temos dois casos.

- (I) O subconjunto  $S := \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  é finito. Neste caso, existe um ponto  $x \in X$  com  $\{n \in \mathbb{N} : x_n = x\}$  infinito (por quê?)\*, de modo que a sequência  $(x_n)_n$  admite uma subsequência constante e, portanto, convergente.
- (II) O subconjunto  $S$  é infinito. Neste caso,  $S$  admite ponto de acumulação em  $X$ , digamos  $p \in X$ . Por ser ponto de acumulação, existe  $x_{n_0} \in B(p, 1) \setminus \{p\}$ . Como  $F_0 := \{x_0, \dots, x_{n_0}\} \setminus \{p\}$  é um subconjunto fechado de  $X$  (certo?)\*,  $B(p, \frac{1}{2}) \setminus F_0$  é um aberto em torno de  $p$ , donde segue que existe  $x_{n_1} \in B(p, \frac{1}{2})$  com  $n_1 > n_0$ . Procedendo desta forma recursivamente, obtem-se uma subsequência  $(x_{n_k})_k$  de  $(x_n)_n$  que converge para  $p$ .

Portanto, (iii)  $\Rightarrow$  (iv).

A carga dramática fica por conta da implicação (v)  $\Rightarrow$  (i), cuja prova é adaptada de Efe Ok [25].

▮ **Afirmção 3.1.51.** *Se  $X$  é espaço métrico totalmente limitado, então para todo  $r > 0$  existe um subconjunto finito  $F_r \subseteq X$  tal que  $X = \bigcup_{x \in F_r} B[x, r]$ .*

*Prova da Afirmção.* Se não fosse o caso, existiria  $r > 0$  tal que  $\{B[x, r] : x \in X\}$  não tem subcobertura finita. Em particular, para  $x_0 \in X$  fixado, existe  $x_1 \in X \setminus B[x_0, r]$ , o que dispara a existência de  $x_2 \in X \setminus B[x_0, r] \cup B[x_1, r]$ , e assim sucessivamente. A sequência  $(x_n)_n$  obtida recursivamente desse processo não admite subsequências de Cauchy, já que para quaisquer  $m, n \in \mathbb{N}$  distintos ocorre  $d(x_m, x_n) > r$ . ▮



Agora, assumindo (v), suponha que  $X$  não seja compacto e fixe uma cobertura aberta  $\mathcal{U}$  de  $X$  sem subcobertura finita. Em vista da afirmação anterior, podemos supor que existe um subconjunto finito  $F_0$  tal que  $X = \bigcup_{x \in F_0} B[x, 1]$ . Logo, existe  $x_0 \in F_0$  tal que  $B_0 := B[x_0, 1]$  não admite subcobertura finita por abertos de  $\mathcal{U}$ : caso contrário,  $\mathcal{U}$  teria uma subcobertura finita para  $X$  (percebeu?)\*. Uma vez que limitação total é uma propriedade *hereditária* para subespaços (por quê?)\*, pode-se repetir o argumento a fim de obter outra bola fechada  $B_1 := B[x_1, \frac{1}{2}] \subseteq B[x_0, 1]$  que não admite subcobertura finita por abertos da família  $\mathcal{U}$ .

Procedendo recursivamente, obtém-se uma sequência decrescente de *fechados*  $(B_n)_n$  cujo *diâmetro* converge para 0 (cf. Exercício 1.2.21). Logo, a completude permite conjurar  $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$ , o que leva a uma contradição: como existem  $U \in \mathcal{U}$  com  $x \in U$  e  $r > 0$  com  $B(x, r) \subseteq U$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  com  $x_N \in B(x, \frac{r}{2})$  e  $\frac{1}{2^N} < \frac{r}{2}$ , acarretando  $B_N \subseteq U$  (percebeu?)\*, o que contraria a escolha de  $B_N$ . Portanto,  $X$  é compacto.  $\square$

**Observação 3.1.52** (Argumentações alternativas). O roteiro anterior presou apenas pela minimalidade. A depender de sua intenção, pode ser interessante explorar outros caminhos.

- (i) *Em geral, compacidade sequencial implica compacidade enumerável.* Pela contrapositiva, basta tomar uma cobertura enumerável  $\mathcal{U}$  por abertos do espaço  $X$  sem subcobertura finita, digamos  $\mathcal{U} := \{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ , e observar que se  $x_n \in X \setminus \bigcup_{j \leq n} U_j$  para cada  $n$ , então  $(x_n)_n$  não admite subsequência convergente (certo?)\*.
- (ii) Como sugerido pelo traçado na última demonstração, *se  $X$  é limite-compacto,  $1^\circ$ -contável e todo subconjunto finito de  $X$  é fechado, então  $X$  é sequencialmente compacto.* Futuramente, a condição sublinhada será chamada de “ $T_1$ ”.
- (iii) Para mostrar que espaços métricos sequencialmente compactos são compactos sem mencionar limitação total ou completude, pode-se apelar para separabilidade (cf. Definição 2.1.59):

▮ **Afirmção 3.1.53.** *Espaços métricos sequencialmente compactos são separáveis<sup>†</sup>.*

*Prova da Afirmção.* Para um espaço métrico  $X$  com métrica  $d$ , considere, para cada  $n \in \mathbb{N}$ , o conjunto

$$\mathbb{D}_n := \left\{ D \subseteq X : d(x, y) > \frac{1}{2^n} \text{ para quaisquer } x, y \in D \text{ distintos} \right\},$$

parcialmente ordenado pela inclusão, e que só é vazio se  $X$  for vazio. Dado que  $\mathbb{D}_n$  satisfaz as condições do Lema de Zorn<sup>‡</sup> (certo?)\*, existe  $D_n \in \mathbb{D}_n$  maximal. Por conta disso, o conjunto  $D := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$  é denso em  $X$ : caso contrário, existiriam  $x \in X$  e  $n \in \mathbb{N}$  tais que  $B(x, \frac{1}{2^n}) \cap D = \emptyset$ , e daí  $D_n \subsetneq D_n \cup \{x\} \in \mathbb{D}_n$ , contrariando a maximalidade de  $D_n$ . Por fim, note que se  $D$  não fosse enumerável, então  $X$  não poderia ser sequencialmente compacto: caso contrário, o Princípio da Casa dos Pombos permitiria concluir que algum  $D_n$  é não enumerável, e nenhuma sequência *injetiva* de pontos em  $D_n$  admite subsequência convergente (certo?)\*.  $\square$

<sup>†</sup>Futuramente este argumento será desnecessário por conta da *condição de Lindelöf*, trivialmente satisfeita por espaços compactos, e equivalente à existência de base enumerável em espaços métricos.

<sup>‡</sup>É possível provar a afirmação sem o Lema de Zorn? Sim. Eu quero? Não.

Para concluir (iii), a condição de separabilidade assegura que o espaço tem base enumerável (cf. Teorema 2.1.76) e, por conseguinte, toda cobertura aberta admite subcobertura enumerável (por quê?)\*. Ao combinar isso com o primeiro item desta observação, resulta que o espaço é compacto.

- (iv) Para finalizar, é divertido provar diretamente que espaços compactos são limite-compactos: ao negar que um subconjunto  $S \subseteq X$  tem ponto de acumulação em  $X$ , a compacidade permite concluir que o próprio  $S$  é finito (por quê?)\*.  $\triangle$

## §2 O caso normado e o Lema de Riesz

Nenhuma das caracterizações de compacidade anteriores parece ser tão simples quanto a que aprendemos na escola:  $K \subseteq \mathbb{R}$  é compacto sse  $K$  é limitado e fechado. São vários os motivos pelos quais ela tem sido ignorada.

1. Ao lidar com compacidade de espaços topológicos, deve-se ter em mente que todo espaço é fechado em si mesmo, o que inutiliza tal noção para uma definição global;
2. Analogamente, limitação só faz sentido em espaços métricos ou normados. Contudo, dado que qualquer espaço métrico admite métricas limitadas e que induzem a mesma topologia (certo?)\*, segue que todo espaço métrico não compacto é testemunha de que “fechado + limitado  $\neq$  compacto”.

Como toda norma (num espaço vetorial não trivial) é ilimitada, talvez o último truque não funcione para os subconjuntos limitados e fechados de espaços normados, não é mesmo? Não é bem assim. Mas vamos com calma.

**Proposição 3.1.54** (Heine-Borel). *Ao considerar  $\mathbb{K}^n$  com a norma do máximo, as seguintes afirmações são equivalentes para um subconjunto  $C \subseteq \mathbb{K}^n$ :*

- (i)  $C$  é compacto;
- (ii)  $C$  é fechado em  $\mathbb{R}^n$  e limitado.

*Demonstração.* A implicação (i)  $\Rightarrow$  (ii) decorre das Proposições 3.1.8 (pois espaços normados são de Hausdorff) e 3.1.11. Há várias formas de lidar com a recíproca. Primeiro, com  $\mathbb{K} := \mathbb{R}$ .

- (i) Por  $C$  ser limitado na norma do máximo, existe  $M > 0$  tal que  $|x_i| < M$  para todo  $x := (x_1, \dots, x_n) \in C$ , mostrando que  $C \subseteq \prod_{i=1}^n [0, M] := K$ . Posto que  $K$  é compacto em  $\mathbb{R}^n$  e  $C$  é fechado em  $K$ , resulta que  $C$  é compacto (cf. Proposição 3.1.7).
- (ii) Para uma sequência  $((x_m(1), \dots, x_m(n)))_m$  em  $C$ , a sequência real  $(x_m(1))_{m \in \mathbb{N}}$  é limitada e, portanto, admite subsequência convergente, digamos  $(x_{m_k}(1))_{k \in \mathbb{N}}$ , o que induz a sequência limitada  $(x_{m_k}(2))_{k \in \mathbb{N}}$ , que tem subsequência convergente... (conclua)\*.

Para  $\mathbb{K} := \mathbb{C}$ , temos  $(\mathbb{C}, |\cdot|) = (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$  por definição. Como as normas  $\|\cdot\|_2$  e  $\|\cdot\|_\infty$  induzem a mesma topologia sobre  $\mathbb{R}^2$  (cf. Exemplo 1.1.25 ou Corolário 3.1.57 a seguir), a primeira parte do argumento garante que  $L \subseteq \mathbb{C}$  é compacto sse  $L$  é fechado em  $\mathbb{C}$  e limitado (verificou?)\*, o que permite reaplicar a primeira parte do argumento para qualquer  $\mathbb{C}^n$ .  $\square$

**Lema 3.1.55.** *Sejam  $(E, \|\cdot\|)$  um  $\mathbb{K}$ -espaço normado e  $T: \mathbb{K}^n \rightarrow E$  uma transformação linear. Se  $\mathbb{K}^n$  é dotado da norma do máximo, então  $T$  é contínua.*

*Demonstração.* Seja  $\{e_1, \dots, e_n\}$  a base canônica de  $\mathbb{K}^n$ , no sentido usual da Álgebra Linear. Uma vez que para cada  $x \in \mathbb{K}^n$  existem únicos escalares  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$  com  $x = \sum_{i \leq n} a_i e_i$ , resulta

$$\|T(x)\| \leq \sum_{i \leq n} |a_i| \|T(e_i)\| \leq \underbrace{\max\{|a_1|, \dots, |a_n|\}}_{\|x\|_\infty} \cdot \underbrace{n \max\{\|T(e_1)\|, \dots, \|T(e_n)\|\}}_R, \quad (3.3)$$

mostrando que  $T$  é contínua (cf. Proposição 1.2.13).  $\square$

**Corolário 3.1.56.** *Se  $(E, \|\cdot\|)$  é um  $\mathbb{K}$ -espaço normado e  $T: \mathbb{K}^n \rightarrow E$  é um isomorfismo linear<sup>†</sup>, então  $T$  é um homeomorfismo ao considerarmos  $\mathbb{K}^n$  com a topologia induzida pela norma do máximo.*

*Demonstração.* Em virtude do lema anterior, basta mostrar que  $T^{-1}$  é contínua. Note que  $\mathbb{S}_{\mathbb{K}^n} := \{x \in \mathbb{K}^n : \|x\|_\infty = 1\}$  é subespaço compacto de  $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$ :

- é fechado por ser pré-imagem de  $\{1\}$  pela função contínua  $\|\cdot\|_\infty: \mathbb{K}^n \rightarrow [0, +\infty)$  (já percebeu, certo?)\*,
- e é limitado por definição.

Como a função  $\varphi := \|\cdot\| \circ T: \mathbb{K}^n \rightarrow [0, +\infty)$  é contínua, segue do Teorema de Weierstrass que  $\varphi$  deve assumir mínimo em  $\mathbb{S}_{\mathbb{K}^n}$ , i.e., existe um ponto  $u \in \mathbb{S}_{\mathbb{K}^n}$  tal que  $\|T(u)\| \leq \|T(v)\|$  para todo  $v \in \mathbb{S}_{\mathbb{K}^n}$ . Logo, se  $y \in E$  e  $y \neq 0$ , então para  $x \in \mathbb{K}^n$  tal que  $T(x) = y$  temos  $v := \frac{x}{\|x\|_\infty} \in \mathbb{S}_{\mathbb{K}^n}$  e

$$\|T(u)\| \leq \|T(v)\| = \frac{\|T(x)\|}{\|x\|_\infty} \Rightarrow \|T(u)\| \cdot \|x\|_\infty \leq \|T(x)\| = \|y\|,$$

donde o resultado segue da Proposição 1.2.13 com  $r := \frac{1}{\|T(u)\|}$ , posto que  $\|T(u)\| > 0$  e  $\|x\|_\infty = \|T^{-1}(y)\|_\infty$  (certo?)\*.  $\square$

**Corolário 3.1.57.** *Quaisquer duas normas em  $\mathbb{K}^n$  induzem a mesma topologia. Em particular, a Proposição 3.1.54 independe da norma sobre  $\mathbb{K}^n$ .*

*Demonstração.* A primeira parte segue do corolário anterior com  $E := (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|)$  para uma norma  $\|\cdot\|$  qualquer e  $T := \text{Id}: (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow E$ , além de uma dose de simetria e transitividade (entendeu?)\*. A segunda parte segue da primeira (por quê?)\*.  $\square$

**Corolário 3.1.58.** *Sejam  $E$  um espaço normado e  $S \subseteq E$  um subespaço vetorial. Se  $S$  tem dimensão finita, então  $S$  é fechado em  $E$ .*

*Demonstração.* Enquanto espaço vetorial,  $S$  é isomorfo a  $\mathbb{K}^n$  para algum  $n$ . Logo, pelo corolário anterior,  $S$  deve ser de Banach com a norma induzida de  $E$  (cf. Observação 1.2.10 e Proposição 1.2.14). Portanto,  $S$  é fechado em virtude do Exercício 1.2.3.  $\square$

Parece promissor, mas nem tudo o que parece é.

---

<sup>†</sup>Transformação linear invertível.

**Lema 3.1.59.** Se  $(X, d)$  é um espaço métrico e  $S \subseteq X$  é um subconjunto não vazio, então a regra  $x \mapsto d(x, S) := \inf_{y \in S} d(x, y)$  determina uma função contínua da forma  $X \rightarrow \mathbb{R}$ . Em particular,  $x \in \overline{S}$  se, e somente se,  $d(x, S) = 0$ .

*Demonstração.* Para  $x_0, x \in X$  e  $y \in S$  quaisquer ocorre  $d(x_0, y) \leq d(x_0, x) + d(x, y)$ , de modo que ao se tomar o ínfimo com respeito ao conjunto  $S$ , obtém-se

$$d(x_0, S) \leq d(x_0, x) + d(x, S) \Rightarrow d(x_0, S) - d(x, S) \leq d(x_0, x).$$

Analogamente, mostra-se  $d(x, S) - d(x_0, S) \leq d(x, x_0)$ , donde resulta a desigualdade  $|d(x, S) - d(x_0, S)| \leq d(x_0, x)$ , que por sua vez assegura a continuidade (uniforme) da função.

Para a segunda parte, basta mostrar que  $d(x, S) = 0$  se, e somente se, existe uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $S$  com  $(x_n)_n \rightarrow x$ . Ora, se  $d(x, S) = 0$ , então para cada  $n \in \mathbb{N}$  existe  $y_n \in S$  com  $d(x, y_n) < \frac{1}{2^n}$  (por quê?)\*, donde segue que  $(y_n)_n \rightarrow x$  e, conseqüentemente,  $x \in \overline{S}$ . A recíproca segue da continuidade da função  $x \mapsto d(x, S)$  (concorda?)\*.  $\square$

**Lema 3.1.60** (de Riesz). Sejam  $(E, \|\cdot\|)$  um espaço normado e  $S \subseteq E$  um subespaço vetorial com  $\overline{S} \neq E$ . Para cada  $\alpha \in (0, 1)$  existe  $x \in E$  com  $\|x\| = 1$  e  $\|s - x\| \geq \alpha$  para todo  $s \in S$ .

*Demonstração.* Para  $x_0 \in E \setminus \overline{S}$ , seja  $R := d(x_0, S)$  e note que, pelo lema anterior,  $R > 0$ . Como  $R < \frac{R}{\alpha}$ , existe  $x_1 \in S$  com  $\|x_0 - x_1\| \leq \frac{R}{\alpha}$ , e daí basta fazer  $x := \frac{1}{\|x_0 - x_1\|}(x_0 - x_1)$ .  $\square$

**Corolário 3.1.61.** Se um espaço normado  $(E, \|\cdot\|)$  tem dimensão infinita, então a bola  $B[0, 1] := \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$  é um subconjunto fechado, limitado e não compacto de  $E$ .

*Demonstração.* Fixado  $x_0 \in E$  com  $\|x_0\| = 1$ , pode-se fazer  $S := [x_0]$  o subespaço de  $E$  gerado por  $x_0$ , que satisfaz  $\overline{S} = S \neq E$  em virtude da suposição sobre a dimensão de  $E$ . Logo, pelo lema anterior assegura  $x_1 \in E \setminus S$  com  $\|x_1\| = 1$  e  $\|x_0 - x_1\| \geq \frac{1}{2}$ . Como  $[x_0, x_1]$  ainda tem dimensão finita, existe  $x_2 \in E \setminus [x_0, x_1]$  com  $\|x_2\| = 1$  e  $\|x_i - x_2\| \geq \frac{1}{2}$  para  $i \in \{0, 1\}$ . Como  $[x_0, x_1, x_2]$  tem dimensão finita... Recursivamente, conclui-se que o subconjunto  $B[0, 1]$  admite uma sequência sem subsequência de Cauchy e, portanto, não pode ser compacto em vista do Teorema 3.1.49 (certo?)\*.  $\square$

MORAL DA HISTÓRIA: você não tem mais o direito de pensar em “limitado e fechado” como sinônimo de compacidade, exceto em situações elementares.

### 3.1.4 Compacidade local

### 3.1.5 Exercícios adicionais

**Exercício 3.1.13** (\*). O conjunto derivado de um subconjunto  $S$  de um espaço topológico  $X$ , denotado por  $S^d$ , é a coleção dos pontos de acumulação de  $S$  em  $X$ .

- Mostre que  $\overline{S} = S \cup S^d$  para qualquer  $S \subseteq X$ .
- Mostre que  $p \in X$  é isolado em  $X$  sse  $p \notin S^d$ .
- Mostre que se  $X$  é discreto, então  $X^d = \emptyset$ .
- Para  $X := \mathbb{R}$  e  $S := \{\frac{1}{2^n} : n \in \mathbb{N}\}$ , mostre que  $S^d = \{0\}$ .

e) Para  $X := S := \{\frac{1}{3^n} : n \in \mathbb{N}\}$ , mostre que  $S^d = \emptyset$ . ■

**Exercício 3.1.14** (\*). Mostre que uma boa ordem  $(\mathbb{B}, \leq)$  é compacta com a topologia da ordem sse  $\mathbb{B}$  tem máximo. Opcional: conclua que um ordinal é compacto sse é sucessor. Dica: você já sabe quando uma ordem total é compacta. ■

**Exercício 3.1.15** (\*). Seja  $X$  um espaço compacto de Hausdorff. Mostre que se  $F, G \subseteq X$  são fechados de  $X$  satisfazendo  $F \cap G = \emptyset$ , então existem abertos disjuntos  $U, V \subseteq X$  tais que  $F \subseteq U$  e  $G \subseteq V$ . Dica: mostre primeiro que se  $x \notin F$ , então existem abertos disjuntos  $A, B \subseteq X$  tais que  $x \in A$  e  $F \subseteq B$ . ■

**Exercício 3.1.16** (limitação em espaços métricos (\*)). Para um subconjunto  $S$  de um espaço métrico  $X$ , mostre que são equivalentes:

- (i) existe  $r > 0$  tal que  $\text{diam}(S) < r$  (cf. Exercício 1.2.21, item (a));
- (ii) existem  $x \in X$  e  $R > 0$  tais que  $S \subseteq B(x, R)$ . ■

**Observação 3.1.62.** Subconjuntos satisfazendo qualquer uma das condições no teorema anterior são chamados de **limitados**. Pode ser salutar comparar com a definição de limitação em espaços normados.  $\triangle$

**Exercício 3.1.17** (\*). Seja  $X$  um espaço métrico tal que todo subconjunto fechado e limitado de  $X$  seja compacto. Mostre que  $X$  é separável. Dica: mostre que toda cobertura aberta de  $X$  tem subcobertura enumerável e, com isso, mostre que  $X$  é  $2^0$ -contável. ■

**Exercício 3.1.18** (\*). Sejam  $X$  um espaço topológico,  $\varphi$  uma rede em  $X$  e  $p \in X$  um ponto.

- a) Mostre que  $p$  é aderente a  $\varphi$  (cf. Definição 3.1.32, item (ii)) sse  $\varphi$  tem sub-rede  $\psi$  tal que  $\psi \rightarrow p$ .
- b) Mostre que se  $X$  é  $1^0$ -contável, então o item anterior permanece válido trocando “rede” e “sub-rede” por “sequência” e “subsequência”, respectivamente.
- c) Suponha que  $\varphi$  seja uma sequência. Mostre que se toda subsequência de  $\varphi$  admite subsequência que converge para  $p$ , então  $\varphi \rightarrow p$ . Dica: se parecer trivial demais é sinal de que você leu errado.
- d) Generalize o item anterior, trocando “sequência” e “subsequência” por “rede” e “sub-rede”, respectivamente. ■

**Exercício 3.1.19** (\*). Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  sub-redes de uma rede  $\rho$  num espaço  $X$ . Mostre que se  $\lim \varphi \cap \lim \psi = \emptyset$ , então  $\rho$  não converge. Em particular, se  $X$  é de Hausdorff,  $\varphi \rightarrow x$  e  $\psi \rightarrow y$  com  $x \neq y$ , então  $\rho$  não converge. ■

**Exercício 3.1.20** (\*). Mostre que se  $D \subseteq \mathbb{R}$  é subconjunto não enumerável, então existe  $p \in D$  que é ponto de acumulação de  $D$ . Dica: por algum motivo,  $D$  não pode ser discreto com a topologia de subespaço. ■

**Exercício 3.1.21** (\*). Sejam  $\mathcal{S}$  e  $\mathcal{T}$  topologias sobre um mesmo conjunto  $X$ , com  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$ . Mostre que se  $(X, \mathcal{T})$  é compacto e  $(X, \mathcal{S})$  é de Hausdorff, então  $\mathcal{S} = \mathcal{T}$ . Conclua que duas topologias compactas de Hausdorff sobre um mesmo conjunto são incomparáveis. ■

**Exercício 3.1.22** (\*). Mostre que se  $X$  é espaço  $2^0$ -contável, então toda cobertura aberta de  $X$  tem subcobertura enumerável. ■

**Exercício 3.1.23** (\*). Mostre que se  $X$  é espaço sequencialmente compacto e  $2^0$ -contável, então  $X$  é compacto. ■

**Exercício 3.1.24** (\*). Resolva o Exercício 3.1.23 sem usar o Exercício 3.1.22. ■

**Exercício 3.1.25** (\*). Expresse a condição de compacidade enumerável em termos de famílias de fechados. ■

**Exercício 3.1.26** (\*). Mostre que se  $f: X \rightarrow Y$  é função contínua e  $X$  é enumeravelmente compacto, então a imagem  $f[X]$  é subespaço enumeravelmente compacto de  $Y$ . ■

**Exercício 3.1.27** (\*). Repita o exercício anterior, trocando “enumeravelmente compacto” por “sequencialmente compacto”. ■

**Exercício 3.1.28** (\*). Mostre que se os subconjuntos finitos de  $X$  são fechados e  $X$  é limite-compacto, então  $X$  é enumeravelmente compacto. ■

**Exercício 3.1.29** (\*). Mostre que funções polinomiais são fechadas. ■

**Exercício 3.1.30** (\*). Para um espaço métrico, mostre que são equivalentes:

- (i) (“vale Bolzano-Weierstrass”) toda sequência limitada tem subsequência convergente;
- (ii) (“vale Heine-Borel”) todo subconjunto limitado e fechado é compacto. ■

**Exercício 3.1.31** (Teorema de Dini (\*)). Sejam  $X$  um espaço enumeravelmente compacto,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de funções contínuas da forma  $X \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua tal que  $f_n \rightarrow_p f$ .

- a) Para  $\varepsilon > 0$ , mostre que  $F_n := \{x \in X : f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon\}$  é fechado. Dica: continuidade. ■
- b) Com  $F_n$  como no item anterior, mostre que se  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  é crescente para todo  $x \in X$ , então  $F_n \supseteq F_{n+1}$  para todo  $n$ .
- c) Mostre que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \emptyset$ . Dica: convergência pontual.
- d) Com a hipótese do item (b), mostre que existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $F_N = \emptyset$  e, com isso, conclua que  $f_n \rightarrow_u f$ . Dica: compacidade enumerável.
- e) Mostre que a conclusão anterior permanece válida se  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  é decrescente para todo  $x \in X$ . ■

**Exercício 3.1.32** (A.k.a. Lema da colagem (\*)). Sejam  $X$  e  $Y$  espaços topológicos,  $f: X \rightarrow Y$  uma função e  $\mathcal{S}$  uma cobertura de  $X$  por subconjuntos quaisquer tal que  $f|_S$  é contínua para cada  $S \in \mathcal{S}$ . Mostre que  $f$  é contínua em cada um dos casos a seguir.

- a) Cada  $S \in \mathcal{S}$  é aberto em  $X$ .
- b) A coleção  $\mathcal{S}$  é finita e cada  $S \in \mathcal{S}$  é fechado em  $X$ . Dica: se aceitar usar redes, confira o Teorema 2.2.32; se preferir uma prova clássica, se vire aí. ■

**Exercício 3.1.33** (\*). Mostre que o resultado anterior pode ser falso se  $\mathcal{S}$  for uma cobertura infinita de fechados. Dica: tome  $X := \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$  e fixe  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  a sua função descontínua favorita. ■



## 3.2 Extras

### 3.2.1 Espaços de Lindelöf e sigma-compactos

### 3.2.2 Álgebra Topológica: compacidade

### 3.2.3 Compactos em Análise Funcional

#### §1 O Teorema de Arzelà-Ascoli

#### §2 O Teorema de Banach-Alaoglu

#### §3 O Teorema de Eberlein-Šmulian

### 3.2.4 Compacidade em Teoria de Modelos

### 3.2.5 Manifestações do Lema do Ultrafiltro



# Capítulo 4

## Bill paga o pato

### 4.1 Essencial: mais propriedades topológicas

#### 4.1.1 Homeomorfismos

##### §1 Exercícios adicionais

Exercício 4.1.1 (Reescrever). ■

#### 4.1.2 Axiomas de separação

#### 4.1.3 Conexidade

#### 4.1.4 Compactificações

### 4.2 Extras

#### 4.2.1 Paracompacidade e metrizabilidade

#### 4.2.2 Os racionais e o Conjunto de Cantor

#### 4.2.3 Completude no sentido de Čech

**Exercício 4.2.1** (\*). Sejam  $X$  um espaço topológico e  $A \subseteq X$  um subconjunto. Diremos que  $A$  é **rarefeito**<sup>‡</sup> se  $\text{int}(\overline{A}) = \emptyset$ . Por sua vez,  $M \subseteq X$  será chamado de **magro** (em  $X$ ) se  $M$  é reunião enumerável de subconjuntos rarefeitos. Subconjuntos **não magros**<sup>††</sup> são aqueles que não são magros. **Espaços (não) magros** são aqueles que são subconjuntos (não) magros em si próprios.

a) Mostre que:

i) se  $A \subseteq B$  e  $B$  é magro em  $X$ , então  $A$  é magro em  $X$ ;

ii) a reunião enumerável de subconjuntos magros em  $X$  é magra em  $X$ ;

---

<sup>‡</sup>*Nowhere dense*, algo como *denso em lugar nenhum*. Há textos que chamam tais subconjuntos de *raros* (como Bourbaki), mas isso pode dar um entendimento mais quantitativo (“há poucos”) do que topológico.

<sup>††</sup>*Nonmeager*. É muito comum chamar subconjuntos magros como “de primeira categoria”, enquanto subconjuntos não magros são também conhecidos como “de segunda categoria”.

- iii) se  $F$  é fechado com interior vazio, então  $F$  é magro em  $X$ .
- b) Mostre que se  $f: X \rightarrow Y$  é um *homeomorfismo*, então  $A \subseteq X$  é magro em  $X$  sse  $f[A]$  é magro em  $Y$ .
- c) Mostre que um espaço com pelo menos um ponto isolado não pode ser magro.
- d) Mostre que se um espaço contém um aberto que é não magro com a topologia de subespaço, então o próprio espaço é não magro. ■

#### 4.2.4 Topologia Conjuntista?!

§1 Compacidade avançada

§2 Funções cardinais

# Capítulo 5

## Conselho de uma Lagarta

### 5.1 Essencial: gastronomia topológica

#### 5.1.1 Topologias fortes

#### 5.1.2 Coprodutos

#### 5.1.3 Quocientes

### 5.2 Extras

#### 5.2.1 Limites e colimites

#### 5.2.2 Espaços pró-finitos





# Capítulo 6

## Porco e pimenta

### 6.1 Essencial: espaços uniformes

### 6.2 Extras

#### 6.2.1 Completamento de espaços uniformes

#### 6.2.2 A integral de Haar

#### 6.2.3 A reta real revisitada

#### 6.2.4 A integral de Lebesgue



# Capítulo 7

## Um chá maluco

### 7.1 Essencial: espaços de funções

### 7.2 Extras

#### 7.2.1 A convergência contínua



## Capítulo 8

### O campo de croqué da Rainha

8.1 *Extravaganza* das convergências

8.2 A convergência uniforme como você nunca viu





## Capítulo 9

### A história da Tartaruga Falsa

9.1 Essencial: um pouco de Topologia Algébrica

9.2 Extras



# Capítulo 10

## A Quadrilha da Lagosta

10.1 Essencial: categorias topológicas

10.2 Extras



# Capítulo 11

## Quem roubou as tortas?

11.1 Essencial: topologia sem pontos

11.2 Extras





# Capítulo 12

## O depoimento de Alice

Finalmente, o último capítulo... Na obra de Lewis Carroll, é nesta etapa que Alice desperta e relata suas aventuras para sua irmã, não sem antes depor no julgamento motivado pelo roubo das tortas. Por falta de ideias, achei que uma forma razoável de depoimento para este texto seria apresentar soluções de todos os problemas deixados nos capítulos anteriores. Como isto seria demais, optei por selecionar alguns. Quais? Aqueles que eu quis. Não me alongarei em mais explicações já que, num cenário ideal, este capítulo nunca será lido, não é mesmo? ;)

### 12.1 Alguns exercícios

#### 12.1.1 (★)

##### Cap. 1

*Exercício 1.1.1.* Se não vale (i)  $\Rightarrow$  (ii), então para algum  $\varepsilon > 0$ , todo  $\delta > 0$  tem uma testemunha  $x_\delta \in X$  com  $d_X(x_\delta, x) < \delta$  e  $d_Y(f(x_\delta, x)) \geq \varepsilon$ . Faça  $x_n := x_{\frac{1}{2^n}}$  para todo  $n$  e seja feliz. Me recuso a apresentar (ii)  $\Rightarrow$  (i).  $\square$

*Exercício 1.1.3.* Se  $x \in \overline{F \cap G}$ , então existe uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $F \cap G \subseteq F, G$  com  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$ , acarretando  $x \in \overline{F} \cap \overline{G}$ . Logo,  $\overline{F \cap G} \subseteq \overline{F} \cap \overline{G} = \overline{F} \cap \overline{G}$ . Como a inclusão  $S \subseteq \overline{S}$  vale para qualquer subconjunto<sup>‡</sup>, o resultado segue.  $\square$

*Exercício 1.1.6.* Basta comparar as duas definições:  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow p$  em  $X$  sse para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $d(x_n, p) < \varepsilon$  para todo  $n \geq N$ , enquanto  $(d(x_n, p))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$  em  $\mathbb{R}$  sse para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $|d(x_n, p) - 0| < \varepsilon$  para todo  $n \geq N$ .  $\square$

*Exercício 1.1.8.* Para a ida, note que

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in A} B(x, r_x) \subseteq A.$$

Para a volta: bolas abertas são abertas; logo, reunião de bolas abertas é aberta.  $\square$

*Exercício 1.1.12.* Se  $f$  é contínua em  $x$  e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$  em  $X$ , então  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(x)$  em  $Y$ . De fato, para  $V \subseteq Y$  aberto com  $f(x) \in V$ , existe  $U \subseteq X$  aberto com  $x \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ . Pela Definição 1.1.29,  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq U$  para algum  $N \in \mathbb{N}$ . Logo,  $\{f(x_n) : n \geq N\} \subseteq V$ .  $\square$

---

<sup>‡</sup>Pois sequências constantes em espaços métricos convergem!

*Exercício 1.1.15.* Para a parte menos óbvia, considere a métrica zero-um.  $\square$

*Exercício 1.2.5.* Os subconjuntos  $(-\infty, p)_{\mathbb{P}}$  e  $(p, +\infty)_{\mathbb{P}}$  são intervalos por conta da transitividade da ordem. Para os demais, basta observar que interseção de intervalos é intervalo, i.e., se  $(I_{\gamma})_{\gamma \in \Gamma}$  é uma  $\Gamma$ -upla de intervalos, então  $I := \bigcap_{\gamma \in \Gamma} I_{\gamma}$  é um intervalo: de fato, se  $x, y, z \in \mathbb{P}$  são tais que  $x, z \in I$  e  $x \leq y \leq z$ , então  $x, z \in I_{\gamma}$  para todo  $\gamma$ , acarretando  $y \in I_{\gamma}$  para todo  $\gamma$ , ou seja,  $y \in I$ .  $\square$

*Exercício 1.2.7.* Para a segunda parte, note que se  $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$  fosse isometria, então existiriam pontos  $f(0), f(2) \in (0, 1)$  tais que  $|f(0) - f(2)| = 2$ , mas isto é impossível.  $\square$

*Exercício 1.2.11.* Note que se  $\mathbb{T}$  e  $\mathbb{T}'$  são ordens totais e  $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}'$  preserva supremos e ínfimos, então  $f: \mathbb{T}^{\text{op}} \rightarrow \mathbb{T}'^{\text{op}}$  preserva ínfimos e supremos, onde  $\mathbb{P}^{\text{op}}$  indica  $\mathbb{P}$  com a ordem inversa. Como os intervalos fundamentais de  $\mathbb{P}$  e  $\mathbb{P}^{\text{op}}$  coincidem, segue que as topologias de  $\mathbb{P}$  e  $\mathbb{P}^{\text{op}}$  são idênticas, de modo que a afirmação restante acerca de pré-imagens da forma  $f^{-1}[(-\infty, c)_{\mathbb{T}'}]$  segue pois  $(-\infty, c)_{\mathbb{T}'} = (c, +\infty)_{\mathbb{T}'^{\text{op}}}$ . Alternativamente: basta refazer todo o argumento trocando  $\leq$  por  $\geq$  e vice-versa.  $\square$

*Exercício 1.2.12.* Setas identidades são isomorfismos. A (única) inversa de um isomorfismo é um isomorfismo. Composição de isomorfismos é isomorfismo.  $\square$

*Exercício 1.2.14.* A função  $f$  do Exemplo 1.2.50 é, na verdade, uma bijeção contínua da forma  $[0, 2] \rightarrow [0, 2) \cup [3, 4]$ , onde domínio e contradomínio são considerados com as topologias induzidas por suas métricas herdadas de  $\mathbb{R}$ . No entanto, a inversa  $[0, 2) \cup [3, 4] \rightarrow [0, 2]$  não é contínua.  $\square$

**Observação 12.1.1** (*For fun*). Na solução anterior, se considerarmos  $[0, 2) \cup [3, 4]$  com a topologia induzida pela ordem herdada de  $\mathbb{R}$ , então a inversa  $[0, 2) \cup [3, 4] \rightarrow [0, 2]$  passa a ser contínua! Como isto não foi um exercício dos capítulos anteriores e não há um Capítulo 13, você terá que resolver esse por conta própria, se quiser.  $\triangle$

*Exercício 1.2.18.* (FAZER)  $\square$

*Exercício 1.2.19.* (COPIAR)  $\square$

## Cap. 2

### 12.1.2 (★★)

#### Cap. 1

*Exercício 1.1.4.* Este problema tem três partes, mas como o item (b) é um problema simples de Análise Real, apresento a seguir apenas (a) e (c).

(a) Se  $f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \geq c$  e  $n \in \mathbb{N}$ , então  $f(x) \in (c - \frac{1}{2^n}, +\infty)$  e, por conseguinte, existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $f_k(x) \in (c - \frac{1}{2^n}, +\infty)$  para todo  $k \geq N$ , de modo que basta tomar  $m := \max\{N, n\} + 1$ . Reciprocamente, se para todo  $n \in \mathbb{N}$  existe  $m_n > n$  com  $f_{m_n}(x) > c - \frac{1}{2^n}$ , então podemos definir  $k_0 := m_0$ ,  $k_1 := m_{k_0} > k_0$  e assim por diante, de maneira que

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} f_{k_n}(x) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} c - \frac{1}{2^n} = c,$$

onde  $(*)$  vale pois  $(f_{k_n}(x))_{n \in \mathbb{N}}$  é subsequência de  $(f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ . Em vista disso, o restante do item (a) segue das definições de pré-imagem, reunião e interseção.

(c) Primeiro, note que se  $I = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ , onde cada  $J_\lambda \subseteq \mathbb{R}$  é um intervalo aberto, e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência em  $\mathbb{R} \setminus I$  com  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$ , então  $x \notin I$ . Caso contrário, existiriam  $\lambda \in \Lambda$  e  $N \in \mathbb{N}$  tais que  $x_n \in J_\lambda \subseteq I$  para todo  $n \geq N$ . Isto mostra que  $\mathbb{R} \setminus I$  é fechado. Antes de prosseguir, façamos  $I_n := (-\infty, \alpha + \frac{1}{2^n})$  e  $J_n := (\beta - \frac{1}{2^n}, +\infty)$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ . Ao aplicar a segunda parte da dica, obtemos

$$\begin{aligned} f^{-1}[(\alpha, \beta)] &= f^{-1}[\mathbb{R} \setminus ((-\infty, \alpha] \cup [\beta, +\infty))] = \dots = \\ &= (\mathbb{R} \setminus f^{-1}[(-\infty, \alpha]]) \cap (\mathbb{R} \setminus f^{-1}[[\beta, +\infty)]) = \\ &= \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R} \setminus \bigcup_{m > n} f_m^{-1}[I_n] \right) \cap \left( \bigcup_{s \in \mathbb{N}} \mathbb{R} \setminus \bigcup_{t > s} f_t^{-1}[J_s] \right). \end{aligned}$$

Para simplificar o restante, escreveremos  $F_n := \mathbb{R} \setminus \bigcup_{m > n} f_m^{-1}[I_n]$  e  $G_s := \mathbb{R} \setminus \bigcup_{t > s} f_t^{-1}[J_s]$  para cada  $n, s \in \mathbb{N}$ . Dessa forma,

$$f^{-1}[(\alpha, \beta)] = \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right) \cap \left( \bigcup_{s \in \mathbb{N}} G_s \right) = \bigcup_{n, s \in \mathbb{N}} F_n \cap G_s.$$

A conclusão segue da primeira parte e dos itens anteriores (confira também o Exercício 1.1.3).  $\square$

**Exercício 1.1.9.** Três equivalências devem ser provadas. Logo, são seis implicações.

((i), ( $\Rightarrow$ )) Segue por  $A$  ser aberto (cf. Definição 1.1.20).

((i), ( $\Leftarrow$ )) Tome  $A := B_d(x, \varepsilon)$ .

((ii), ( $\Rightarrow$ )) Por  $V$  ser aberto e  $f(x) \in V$ , existe  $\varepsilon > 0$  tal que  $B(f(x), \varepsilon) \subseteq V$ , donde a continuidade em  $x$  assegura  $\delta > 0$  com  $f[B(x, \delta)] \subseteq V$ .

((ii), ( $\Leftarrow$ )) Se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$  em  $X$  e  $V \subseteq Y$  é um aberto com  $f(x) \in V$ , então existe  $U \subseteq X$  aberto com  $x \in U$  e  $f[U] \subseteq V$ . Pela Definição 1.1.20, existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq U$  e, conseqüentemente,  $\{f(x_n) : n \geq N\} \subseteq V$ . Como  $V$  foi tomado arbitrariamente, o item (i) garante que  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(x)$  em  $Y$ . Portanto,  $f$  é contínua em  $x$ .

((iii), ( $\Rightarrow$ )) Em virtude da Definição 1.1.20, basta mostrar que se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência em  $X$  que converge para um ponto  $x \in f^{-1}[V]$ , então existe  $N \in \mathbb{N}$  com  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq f^{-1}[V]$ . Ora, por  $f$  ser contínua, temos  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(x)$  em  $Y$  e, por  $V$  ser aberto em  $Y$ , a Definição 1.1.20 garante um  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\{f(x_n) : n \in \mathbb{N}\} \subseteq V$ . Acabou.

((iii), ( $\Leftarrow$ )) Se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$  em  $X$  e  $V \subseteq Y$  é um aberto em  $Y$  com  $f(x) \in V$ , então, pela hipótese,  $f^{-1}[V]$  é um aberto em  $X$  com  $x \in f^{-1}[V]$ , donde segue que existe  $N \in \mathbb{N}$  com  $\{x_n : n \geq N\} \subseteq f^{-1}[V]$  (pela Definição 1.1.20, lembra?), i.e.,  $\{f(x_n) : n \geq N\} \subseteq V$ . Pelo item (i), conclui-se que  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(x)$ .  $\square$

**Exercício 1.1.19.** Se  $\mathbb{Q} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ , com  $A_n \subseteq \mathbb{R}$  aberto para todo  $n \in \mathbb{N}$ , então as Leis de De Morgan nos dão  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R} \setminus A_n$ , com  $\mathbb{R} \setminus A_n$  fechado para todo  $n \in \mathbb{N}$  (pelo que você já viu em Análise Real)<sup>†</sup>. Por outro lado,  $\mathbb{R} \setminus A_n$  não contém intervalos abertos não vazios, posto que qualquer intervalo aberto não vazio contém números racionais. Logo,  $\mathbb{R} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R} \setminus A_n$ , o que viola o Teorema 1.1.17, posto que  $\mathbb{Q}$  é enumerável e  $\{r\}$  é fechado que não contém intervalos abertos para qualquer  $r \in \mathbb{R}$ .  $\square$

<sup>†</sup>Mas também segue do Exercício 1.1.8 + parte inicial do item (c) no Exercício 1.1.4.

*Exercício 1.2.2.* Um modo divertido de provar a desigualdade consiste em observar que, pela definição de ínfimo, existe uma sequência  $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de números reais satisfazendo  $\|T(x)\| \leq r_n \|x\|$  e  $r_n \rightarrow \|T\|$ , de modo que

$$\|T(x)\| \leq r_n \|x\| \Rightarrow \|T(x)\| \leq \|x\| \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \|x\| \cdot \|T\|. \quad \square$$

*Exercício 1.2.3.* Se  $F$  é fechado e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência de Cauchy em  $F$  com a métrica de  $X$  restrita a  $F$ , então  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ainda é de Cauchy em  $X$ , logo converge para um ponto  $x \in X$  (pois  $X$  é completo), que deve pertencer a  $F$  por este ser fechado. Reciprocamente, se  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência em  $F$  que converge em  $X$  para um ponto  $y$  de  $X$ , então  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência de Cauchy em  $X$ , logo é de Cauchy em  $F$ , donde a completude de  $F$  assegura  $y' \in F$  com  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow y'$ . A unicidade dos limites em espaços métricos permite concluir que  $y = y'$  e, portanto,  $y \in F$ , mostrando que  $F$  é fechado.  $\square$

*Exercício 1.2.4.* Este problema tem três partes.

(a). Se  $y \in Y$  e  $B(y, r) \subseteq Y$  para algum  $r > 0$ , então para qualquer  $x \in X \setminus \{0\}$  temos

$$z := \frac{r}{2\|x\|}x - y \in B(y, r) \subseteq Y,$$

acarretando  $z + y \in Y$  e  $x = \frac{2\|x\|}{r}(z + y) \in Y$ .

(b). Em vez de provar a primeira parte da dica para espaços de Banach, convém fazer a versão para espaços métricos completos de uma vez por todas.

▮ **Afirmção 12.1.2 (Teorema de Baire para métricas completas).** *Se  $X$  é espaço métrico completo e  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência de fechados de  $X$  tal que  $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ , então algum  $F_n$  contém uma bola aberta.*

*Prova da Afirmção.* Primeiramente, note que se  $B(x, r)$  é uma bola aberta e  $F \subseteq X$  é um fechado que não contém bolas abertas, então  $B(x, r) \setminus F$  contém pelo menos uma bola fechada (cf. Exercício 1.1.14). De fato, para algum  $y \in B(x, r) \setminus F$  (que existe por conta da hipótese sobre  $F$ ), deve existir  $s > 0$  tal que  $B(y, s) \subseteq B(x, r) \setminus F$ , pois o contrário permitiria obter uma sequência  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $F$  com  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow y$ , levando a  $y \in F$  (cf. Exercício 2.1.27). Daí, basta tomar  $B[y, \frac{s}{2}] \subseteq B(y, s)$ . Agora, vamos supor que nenhum dos  $F_n$ 's contém bolas abertas.

Para  $\tilde{x} \in X$  fixado, considere  $A_0 := B(\tilde{x}, 1)$ . Pelo que se observou acima,  $A_0 \setminus F_0$  contém uma bola fechada, digamos  $B[x_0, r_0]$  para certos  $x_0 \in A_0$  e  $r_0 > 0$ . Substituindo  $r_0$  por  $\min\{1, r_0\}$  se necessário, percebe-se que não há perda de generalidade em supor  $r_0 \leq 1$ . Repetindo o argumento, desta vez com  $A_1 := B(x_0, r_0)$  e  $F_1$ , existem  $x_1 \in A_1$  e  $r_1 \in (0, \frac{1}{2}]$  tais que  $B[x_1, r_1] \subseteq A_1 \setminus F_1$ . Procedendo recursivamente, obtemos  $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $(0, 1]$  com  $0 < r_n \leq \frac{1}{2^n}$  e uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  satisfazendo  $B[x_{n+1}, r_{n+1}] \subseteq B(x_n, r_n)$  e  $B[x_n, r_n] \cap F_n = \emptyset$  para todo  $n$ .

Para finalizar, basta notar que as inclusões asseguram que a sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é de Cauchy, enquanto a a vacuidade das interseções permite concluir que, se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, então  $X \neq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ . Com efeito:

(i) para  $N \in \mathbb{N}$  fixado e  $n \geq N + 1$  qualquer temos  $B[x_n, r_n] \subseteq B(x_N, r_N)$ , de modo que se  $m \geq N + 1$  então

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_N) + d(x_N, x_n) < 2r_N \leq \frac{1}{2^{N-1}},$$

donde segue a condição de Cauchy;

- (ii) se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$  em  $X$ , então  $(x_n)_{n \geq m} \rightarrow x$  para qualquer  $m \in \mathbb{N}$  fixado e, como tal subsequência está contida no fechado  $B[x_m, r_m]$ , segue que  $x \in B[x_m, r_m]$ , acarretando  $x \notin F_m$ .  $\square$

De volta ao problema, se  $X$  é espaço normado com dimensão infinita enumerável, digamos que com base  $\mathcal{B} := \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ , então ao fazer  $Y_n := \langle b_0, \dots, b_n \rangle$  para cada  $n$ , i.e., o subespaço vetorial gerado por  $b_0, \dots, b_n$ , cada  $Y_n$  é um subespaço próprio que não contém bolas abertas (pelo item (a)) e, além disso,  $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Y_n$ . Pela suposição sugerida no enunciado, cada  $Y_n$  é um subespaço de Banach de  $X$ , donde segue que cada  $Y_n$  é fechado (pelo exercício anterior). Logo,  $X$  não satisfaz a tese da afirmação inicial e, portanto, não pode ser completo.

(c). Segue do item anterior, posto que  $c_{\mathbb{K},00}(\mathbb{N})$  tem dimensão infinita enumerável. Um dos modos de perceber isso é notar que tal espaço é isomorfo ao  $\mathbb{K}$ -espaço vetorial  $\mathbb{K}[x]$  dos polinômios na indeterminada  $x$  e coeficientes em  $\mathbb{K}$ : uma sequência  $(p_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_{\mathbb{K},00}(\mathbb{N})$  corresponde naturalmente ao polinômio  $p_0 + p_1x + \dots + p_Nx^N$ , onde  $N \in \mathbb{N}$  é tal que  $p_n = 0$  para todo  $n \geq N$ .  $\square$

*Exercício 1.2.6.* A primeira parte do item (a) segue da definição de boa ordem, enquanto a segunda parte é quase automática: se  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$  fosse estritamente decrescente, então  $\text{im}(f)$  não teria menor elemento. Para o item (b), considere um subconjunto não vazio  $A \subseteq \mathbb{P}$  sem menor elemento. Por  $A$  ser não vazio, há  $a_0 \in A$  e, por  $a_0$  não ser o menor de  $A$ , existe  $a_1 \in A$  com  $a_1 < a_0$  (e aqui a tricotomia foi usada!)<sup>†</sup>. Por  $a_1 \in A$  não ser o menor elemento de  $A$ , existe  $a_2 \in A$  com  $a_2 < a_1$ .  $\square$

### 12.1.3 (★★★)

#### Cap. 1

*Exercício 1.1.13.* Com  $X$  enumerável, teríamos  $\{p\}$  aberto em  $X$ , pois  $p \in \{p\}$  e  $X \setminus \{p\}$  seria enumerável. Mas se isso ocorresse, qualquer função  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  seria trivialmente contínua em  $p$ . De modo geral, ao pensar em abertos como testemunhas de convergência, a definição da topologia de  $X$  tenta proibir que conjuntos enumeráveis sejam testemunhas de convergência em  $p$ , justamente o que impede a existência de sequências (não triviais) que convirjam para o ponto escolhido.  $\square$

*Exercício 1.2.10.* No Exercício 1.2.9, o ponto essencial do argumento está no fato de que um isomorfismo de ordens determina uma bijeção entre os intervalos fundamentais por meio de imagens e pré-imagens. Por outro lado, a função do Exemplo 1.2.50 não apresenta esse comportamento: por exemplo,  $f^{-1}[(2, +\infty)_{\mathbb{P}'}] = [1, +\infty)_{\mathbb{P}}$ .  $\square$

#### Cap. 2

*Exercício 2.1.37.* Em  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$ , para quaisquer subconjuntos distintos  $A, B \subseteq X$  deve-se ter  $\|\chi_A - \chi_B\| = 1$  pois  $|\chi_A(x) - \chi_B(x)| = 1$  para qualquer  $x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ , donde segue que  $B_{\|\cdot\|_{\infty}}(\chi_A, 1) \cap \{\chi_A : A \subseteq X\} = \{\chi_A\}$ . Em outras palavras,  $\mathcal{D} := \{\chi_A : A \subseteq X\}$  é (subespaço) discreto. Ocorre que se  $X$  é infinito, então a família  $\wp(X)$  dos subconjuntos de  $X$  é não enumerável e, por conseguinte,  $\mathcal{D}$  é um discreto não enumerável de  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$ . A conclusão segue como no final do Exemplo 2.1.78.  $\square$

<sup>†</sup>A rigor, por  $a_0$  não ser o menor de  $A$ , existe  $a_1 \in A$  com  $a_0 \not\leq a_1$ , e daí a tricotomia força que se tenha  $a_1 < a_0$ .

*Exercício 2.2.49.* Podemos fixar  $x \in E$  tal que  $\varphi(x) = 1$ . Agora, para  $u \in U$  fixado, a função  $\psi: K \rightarrow E$  dada por  $\psi(\lambda) := u + \lambda x$  é contínua, por ser composição das funções contínuas  $\lambda \mapsto (u, \lambda x)$  e  $(a, b) \mapsto a + b$ . Logo, pela continuidade na origem, existe um aberto  $O \subseteq K$  tal que  $0 \in O$  e  $\psi[O] \subseteq U$ , donde segue que  $V := O + \varphi(u)$  é um aberto de  $K$  em torno de  $\varphi(u)$  tal que  $V \subseteq \varphi[U]$ , mostrando que  $\varphi[U]$  é aberto.  $\square$

## 12.2 Verificações diversas ao longo do texto

### 12.2.1 (★)

#### Cap. 1

*Primeira pergunta (★) na demonstração do Lema 1.1.10.* Se  $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , então para todo  $n \in \mathbb{N}$  vale  $f_n(x) = \chi_{\mathbb{Q}}(x) = 0$ . Se  $x \in \mathbb{Q}$ , então existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x = a_n$ , de modo que  $x \in F_m$  para todo  $m \geq n$ , i.e.,  $f_m(x) = \chi_{\mathbb{Q}}(x) = 1$  para todo  $m \geq n$ .  $\square$

*Segunda pergunta (★) na demonstração do Lema 1.1.12.* Com os ferramentais disponíveis nesta etapa do texto, existe  $(z_m)_{m \in \mathbb{N}}$  em  $S$  com  $(z_m)_{m \in \mathbb{N}} \rightarrow y_n$ , o que garante algum  $z_N := x_n$  satisfazendo  $d(y_n, x_n) < \frac{1}{2^{n+1}}$ .  $\square$

*Primeira pergunta (★) no parágrafo final da demonstração do Teorema 1.1.17.* Confira o argumento geral na prova da Afirmação 12.1.2, item (i) (pág. 186).  $\square$

*Final da demonstração do Corolário 1.2.14 (★).* A primeira parte do corolário assegura a existência de constantes  $r, R > 0$  tais que  $r\|x\| \leq \|x\|' \leq R\|x\|$  para todo  $x \in X$ . Em particular, se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é sequência em  $X$ , então

$$r\|x_m - x_n\| \leq \|x_m - x_n\|' \leq R\|x_m - x_n\|.$$

Eu me recuso a dar mais detalhes.  $\square$

*Perguntas ao longo da demonstração da Proposição 1.2.35 (★).* Na primeira, note que se os  $\alpha_n$ 's forem escolhidos satisfazendo  $|f(\alpha_n) - f(\beta)| < \frac{1}{2^n}$  para qualquer  $\beta > \alpha_n$ , então para  $\alpha := \sup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n$  valerá  $|f(\alpha) - f(\beta)| < \frac{1}{2^n}$  para quaisquer  $\beta > \alpha$  e  $n \in \mathbb{N}$  pois  $\beta > \alpha \Rightarrow \beta > \alpha_n$ . Para a segunda pergunta, observe que se  $V \subseteq [0, \omega_1)$  é aberto com  $\gamma \in V$ , então existe um intervalo aberto  $I \subseteq [0, \omega_1)$  com  $\gamma \in I$ . Como  $\gamma \neq 0$  e tampouco é máximo de  $[0, \omega_1)$ ,  $I$  deve ser da forma  $I = (\delta, \delta')$ . Para responder a última pergunta, observe que a argumentação impede a existência de um aberto  $V$  em torno de  $\gamma$  satisfazendo  $f[V] \subseteq (f(\gamma) - \varepsilon, f(\gamma) + \varepsilon)_{\mathbb{R}}$ , i.e., este  $\varepsilon$  é testemunha de que  $f$  não é contínua no ponto  $\gamma$ .  $\square$

#### Cap. 2

*Exemplo 3.1.13, normas são contínuas e ilimitadas (★).* Se  $E \neq 0$  é espaço normado, então existe  $x \in E$  com  $x \neq 0$  e daí, para qualquer  $r > 0$ ,

$$\left\| \frac{1}{\|x\|} (r+1)x \right\| = r+1 > r,$$

mostrando que  $\|\cdot\|$  é ilimitada. Para a continuidade (uniforme), lembre-se de que para quaisquer  $u, v \in E$  se verifica  $|||u| - |v||| \leq \|u - v\|$ .  $\square$



## 12.2.2 (★★)

### Cap. 1

*Exemplo 1.2.9, completude de  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$  (\*).* Em vez de  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$ , vamos considerar  $\mathcal{B}_E(X)$ , onde  $E$  é um  $\mathbb{K}$ -espaço de Banach com uma norma  $\|\cdot\|$  e  $f \in \mathcal{B}_E(X)$  sse  $f: X \rightarrow E$  satisfaz  $\|f\|_{\infty} := \sup_{x \in E} \|f(x)\| < +\infty$ . A ideia é, justamente, mostrar que  $\|\cdot\|_{\infty}: \mathcal{B}_E(X) \rightarrow \mathbb{R}$  é uma norma cuja métrica induzida é completa.

As condições de norma seguem das propriedades de supremo em  $\mathbb{R}$  — e nisso, a demonstração da Proposição 1.1.6 pode ajudar. Para a completude, se  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é sequência de Cauchy em  $\mathcal{B}_E(X)$ , então para cada  $x \in X$ , a sequência  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  é de Cauchy em  $E$ , pois

$$\|f_m(x) - f_n(x)\| \leq \sup_{y \in X} \|f_m(y) - f_n(y)\| = \|f_m - f_n\|_{\infty}$$

e, portanto, converge para um (único!) vetor, digamos  $f(x) \in E$ .

Para encerrar, basta mostrar que  $f \in \mathcal{B}_E(X)$  e  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$  em  $\mathcal{B}_E(X)$ .

(i) Temos  $f \in \mathcal{B}_E(X)$  pois, para quaisquer  $x \in X$  e  $N \in \mathbb{N}$ ,

$$\|f(x)\| \leq \|f_N(x)\| + \|f_N(x) - f(x)\| \leq M + \|f_N(x) - f(x)\|,$$

onde  $M > 0$  é tal que  $\|f_n\|_{\infty} \leq M$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , que existe pois sequências convergentes em espaços normados são limitadas<sup>†</sup>, e daí

$$\|f(x)\| \leq M + \|f_N(x) - f(x)\| \Rightarrow \|f(x)\| \leq M + \lim_{N \rightarrow \infty} \|f_N(x) - f(x)\| = M,$$

essencialmente por Análise na Reta.

(ii) Para provar que  $(f_n)_n \rightarrow f$  em  $\mathcal{B}_E(X)$ , observe que para  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\|f_m - f_n\|_{\infty} < \varepsilon$  sempre que  $m, n \geq N$ , e veremos justamente que  $\|f - f_k\|_{\infty} \leq \varepsilon$  para todo  $k \geq N$ . Com efeito, neste caso temos

$$\|f_m(x) - f_k(x)\| \leq \|f_m - f_k\|_{\infty} < \varepsilon$$

para todo  $m \geq N$ . Como  $(f_m(x))_m$  converge para  $f(x)$  e  $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua<sup>‡</sup>, resulta

$$\|f(x) - f_k(x)\| = \left\| \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) - f_k(x) \right\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m(x) - f_k(x)\| \leq \varepsilon,$$

donde a arbitrariedade do ponto  $x$  tomado garante  $\|f - f_k\|_{\infty} \leq \varepsilon$ .  $\square$

*Exemplo 1.2.11, subespaços fechados de  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$  (\*).* Antes de qualquer outra coisa, lembre-se: se  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é sequência em  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$ , então cada  $s_n$  é uma sequência em  $\mathbb{K}$ , digamos  $s_n := (s_n(m))_{m \in \mathbb{N}}$ , com  $s_n(m) \in \mathbb{K}$  para cada  $m, n \in \mathbb{N}$ . Suponha então que  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow s$  em  $\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$ .

<sup>†</sup>For fun: um modo indireto divertidíssimo de perceber isso é lembrar que se  $x_n \rightarrow x$  num espaço topológico, então  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$  é compacto, mas compactos são limitados em espaços normados.

<sup>‡</sup>Confira a discussão do Exemplo 3.1.13 na página 188 se precisar de ajuda.



- (i) Se cada  $s_n \in c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$ , então  $s \in c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$ . Basta mostrar que  $s$  é sequência de Cauchy em  $\mathbb{K}$ . Ora, para  $m, n, N \in \mathbb{N}$  temos

$$\begin{aligned} |s(m) - s(n)| &\leq |s(m) - s_N(m)| + |s_N(m) - s_N(n)| + |s_N(n) - s(n)| \leq \\ &\leq 2\|s - s_N\|_{\infty} + |s_N(m) - s_N(n)|. \end{aligned}$$

Fixado  $\varepsilon > 0$ , a hipótese sobre  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  nos dá  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\|s - s_N\|_{\infty} < \varepsilon$ . Como  $s_N := (s_N(n))_{n \in \mathbb{N}}$  converge por hipótese, existe  $K \in \mathbb{N}$  tal que  $|s_N(m) - s_N(n)| < \varepsilon$  sempre que  $m, n \geq K$ . Logo, para  $m, n \geq K$ ,  $|s(m) - s(n)| < 3\varepsilon$ .

- (ii) Se cada  $s_n \in c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N})$ , então  $s \in c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N})$ . Por valer  $c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N}) \subseteq c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$ , o item anterior já assegura que  $s$  é sequência convergente. Resta mostrar que  $s \rightarrow 0$  em  $\mathbb{K}$ . Ora, para  $m, n \in \mathbb{N}$  temos

$$|s(n)| \leq |s_m(n)| + |s_m(n) - s(n)| \leq |s_m(n)| + \|s_m - s\|_{\infty},$$

Fixado  $\varepsilon > 0$ , existem  $N_0, N_1 \in \mathbb{N}$  tais que  $\|s_{N_0} - s\|_{\infty} < \varepsilon$  e  $|s_{N_0}(n)| < \varepsilon$  para todo  $n \geq N_1$ , acarretando  $|s(n)| < 2\varepsilon$ .  $\square$

**Observação 12.2.1.** Os fatos anteriores são sintomas de fenômenos mais gerais. Por exemplo, deve ser claro que  $\mathbb{K}$  pode ser trocado por um espaço de Banach  $E$  sem alterações significativas na notação. Mas isto é só a ponta do *iceberg*: o item (i), por exemplo, é manifestação de que limite uniforme de funções contínuas é contínua!  $\triangle$

### 12.2.3 (★ ★ ★)

#### Cap. 1

*Exemplo 1.1.25*, quem são os abertos induzidos por  $d_2$  e  $d_{\infty}$ ? (★ ★). A pergunta pode ser difícil nesse ponto do texto a depender de sua bagagem. Primeiro, pelo Exercício 1.1.8, um subconjunto  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  é  $d_2$ -aberto sse para todo  $x \in A$  existe  $r > 0$  com  $B_{d_2}(x, r) \subseteq A$ . Em outras palavras, os  $d_2$ -abertos são os abertos usuais de  $\mathbb{R}^2$ , que você provavelmente conheceu em algum curso de Cálculo  $n$ , para  $n \geq 2$ .

Por outro lado, tomando  $r' := \frac{r}{\sqrt{2}}$ , resulta<sup>†</sup>  $B_{d_{\infty}}(x, r') \subseteq B_{d_2}(x, r)$ . Assim, em virtude do Exercício 1.1.8, segue que todo subconjunto  $d_2$ -aberto é  $d_{\infty}$ -aberto: afinal, se  $A$  é  $d_2$ -aberto, então para todo  $x \in A$  existe  $r > 0$  com  $B_{d_2}(x, r) \subseteq A$  e, consequentemente,  $B_{d_{\infty}}(x, r') \subseteq A$ . Analogamente, para mostrar que todo  $d_{\infty}$ -aberto é  $d_2$ -aberto, basta *provar* que  $B_{d_2}(x, r) \subseteq B_{d_{\infty}}(x, r)$  para quaisquer  $x \in \mathbb{R}^2$  e  $r > 0$ .  $\square$

*Completar a demonstração do Corolário 1.2.36* (★ ★). A função  $f$  sugerida é sequencialmente contínua pois, se  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é sequência em  $[0, \omega_1]$  que converge para  $\alpha \in [0, \omega_1]$ , então de duas, uma:

- $\alpha < \omega_1$ , e daí precisa existir  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\alpha_n \in [0, \alpha + 1)$  para todo  $n \geq N$ , acarretando  $f(\alpha_n) = f(\alpha) = 0$  e, portanto,  $(f(\alpha_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(\alpha)$ ; ou
- $\alpha = \omega_1$ , e daí os resultados anteriores impedem que  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tenha subsequência inteiramente contida em  $[0, \omega_1)$  (pois o contrário daria uma sequência em  $[0, \omega_1)$  que converge para  $\omega_1$ ); consequentemente, existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\alpha_n = \omega_1$  para todo  $n \geq N$ , donde segue que  $(f(\alpha_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(\omega_1)$ .

<sup>†</sup>E se você PRECISOU procurar pela solução aqui: FAÇA AS CONTAS PARA VERIFICAR A INCLUSÃO. E não reclame.

No entanto,  $f$  é descontínua em  $\omega_1$ . Para  $r := \frac{|f(\omega_1)|}{2}$ , nenhum aberto  $V \subseteq [0, \omega_1]$  em torno de  $\omega_1$  satisfaz  $f[V] \subseteq (f(\omega_1) - r, f(\omega_1) + r) := U$ , afinal deve existir  $\alpha \in V \cap [0, \omega_1)$  (cf. Proposição 1.2.34) e, por conseguinte,  $f(\alpha) = 0 \notin U$ .  $\square$

## Cap. 2

*Existência de ponto maroto na demonstração da Proposição 2.1.40  $(\star\star)$ .* Trata-se de um argumento simples, mas não explicitado e usado diversas vezes ao longo do texto:

▮ **Afirmção 12.2.2.** *Um subconjunto  $A$  de um espaço topológico  $X$  é aberto se, e somente se, para todo  $p \in A$  existe um subconjunto aberto  $B_p \subseteq X$  tal que  $p \in B_p$  e  $B_p \subseteq A$ .*

*Prova da Afirmção.* Para a ida, tome  $B_p := A$  para todo  $p \in A$ . Para a volta, note que

$$A = \bigcup_{p \in A} \{p\} \subseteq \bigcup_{p \in A} B_p \subseteq A,$$

mostrando que  $A$  é reunião de abertos (cf. Exercício 1.1.8).  $\lrcorner$

No caso da proposição em questão, usou-se a contrapositiva da afirmação acima.  $\square$

## 12.3 Outras sugestões

Alguns exercícios escaparam da classificação  $(\star)$ ,  $(\star)$ ,  $(\star\star)$  por serem realmente intrincados. Por isso listarei algumas sugestões a seguir — mas sem especificar a qual problema a sugestão se refere. Divirta-se!

AVISO: meu pragmatismo acabou, o que significa que escreverei  $Y^X$  em vez de  $\text{Fun}(X, Y)$ .

SUGESTÃO. Para  $F \subseteq X \times Y$  fechado e  $y \in \overline{\pi_Y[F]}$ , existe uma rede  $(x_\alpha, y_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{A}}$  em  $F$  tal que  $(y_\alpha)_\alpha \rightarrow y$ , bem como uma sub-rede  $(z_\beta)_{\beta \in \mathbb{B}}$  de  $(x_\alpha)_\alpha$  tal que  $(z_\beta)_\beta \rightarrow x$ . Definindo  $\mathbb{E} := \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{A} \times \mathbb{B} : x_\alpha = z_\beta\}$ , segue que  $\mathbb{E}$  é subconjunto cofinal de  $\mathbb{A} \times \mathbb{B}$  e, portanto, dirigido. Definindo  $u_e := z_{\pi_{\mathbb{B}}(e)}$  e  $v_e := y_{\pi_{\mathbb{A}}(e)}$  para cada  $e \in \mathbb{E}$ , segue que  $(u_e)_e$  e  $(v_e)_e$  são sub-redes de  $(z_\beta)_\beta$  e  $(y_\alpha)_\alpha$ , respectivamente, acarretando  $(u_e, v_e)_e \rightarrow (x, y)$  em  $X \times Y$ , com  $(u_e, v_e) = (z_{\pi_{\mathbb{B}}(e)}, y_{\pi_{\mathbb{A}}(e)}) = (x_{\pi_{\mathbb{A}}(e)}, y_{\pi_{\mathbb{A}}(e)}) \in F$  pois  $e \in \mathbb{E}$ , donde segue que  $(x, y) \in F$ , como desejado.

SUGESTÃO.  $\mathbb{R}$  é um  $\mathbb{Q}$ -espaço vetorial, e  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é transformação  $\mathbb{Q}$ -linear sse é um morfismo de grupos  $(\mathbb{R}, +, 0) \rightarrow (\mathbb{R}, +, 0)$ . Como  $\mathbb{R}$  admite uma base *infinita*  $\mathcal{B}$  como  $\mathbb{Q}$ -espaço vetorial, toda função  $f: \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$  se estende de forma única a uma transformação  $\mathbb{Q}$ -linear  $\bar{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Logo, há exatamente  $|\mathbb{R}^{\mathcal{B}}|$  morfismos de grupos de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$ . Por outro lado,  $|\mathcal{B}| = |\mathbb{R}|$ , caso contrário teríamos

$$|\mathcal{B}| < |\mathbb{R}| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} |\mathbb{Q} \times \mathcal{B}|^n = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\mathbb{Q} \times \mathcal{B}| = \aleph_0 \cdot |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}|.$$

Logo, há  $|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| = |(2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{R}}| = |2^{\mathbb{N} \times \mathbb{R}}| = |2^{\mathbb{R}}|$  morfismos de grupos da forma  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , dos quais *apenas*  $|\mathbb{R}|$  são contínuos — e  $|X| < |2^X|$  para qualquer  $X$ , pelo Teorema de Cantor.

SUGESTÃO. Nem sempre. No caso sugerido ( $X := \mathbb{R}^2$ ), a composição

$$\circ: \text{Homeo}(\mathbb{R}^2) \times \text{Homeo}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \text{Homeo}(\mathbb{R}^2)$$

não é (nem sequencialmente) contínua em  $\text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ , pois existem sequências  $(f_n)_n$  e  $(g_n)_n$  de homeomorfismos da forma  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , ambas convergindo pontualmente para  $\text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ , tais que  $(f_n \circ g_n)_n$  não converge pontualmente para  $\text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ . Para isso, faça  $g_n(x) := x + (\frac{1}{n}, 0)$  para  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  e  $x \in \mathbb{R}^2$ , e note que  $f_n(g_n(0, 0)) = f_n(\frac{1}{n}, 0)$ . Assim, basta definir homeomorfismos  $f_n$ 's tais que  $(f_n)_n \rightarrow_p \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$  com  $(f_n(\frac{1}{n}, 0))_n \not\rightarrow (0, 0)$ : por exemplo, com  $\rho_n: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  contínua satisfazendo  $\rho_n(\frac{1}{n}) = 1$  e  $\rho_n(z) = 0$  para todo  $z$  fora de um intervalo fechado em torno de  $\frac{1}{n}$  com diâmetro  $\frac{1}{2n}$ , defina  $f_n(x, y) := (x, y + \rho_n(x))$ , homeomorfismo cuja inversa é dada por  $(x, y) \mapsto (x, y - \rho_n(x))$ .

# Lista de símbolos e siglas

$\mathbb{R}$	reta real, conjunto dos números reais, etc., 13
$x R y$	$x$ e $y$ são $R$ -relacionados, 13
$\text{Fun}(A, B)$	conjunto das funções do tipo $A \rightarrow B$ , 13
$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{R}} L$	a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $L$ em $\mathbb{R}$ , 13
sse	abreviação para “se, e somente se”, 14
$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_d x$	a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $x$ no espaço métrico $(X, d)$ , 14
$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_u f$	a sequência de funções $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente para $f$ , 14
$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$	a sequência de funções $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge pontualmente para $f$ , 16
$\chi_{X,S}$ ou $\chi_S$	função característica do subconjunto $S \subseteq X$ , 16
$\overline{S}$	fecho de $S$ num espaço (métrico, topológico, de convergência), 17
$ X $	número cardinal/cardinalidade do conjunto $X$ , 18
$B_d(x, r)$ ou $B(x, r)$	$d$ -bola aberta de centro $x$ e raio $r$ , 20
$d_2$	métrica euclidiana em $\mathbb{R}^n$ , 22
$d_\infty$	métrica do máximo/do supremo, 22
$\bigcup \mathcal{U}$	reunião da família $\mathcal{U}$ , 23
$\bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$	$\bigcup \mathcal{U}$ para $\mathcal{U} := \{U_i : i \in \mathcal{I}\}$ , 23
$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} x$	a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $x$ no espaço topológico $(X, \mathcal{T})$ , 23
$B_d[x, r]$ ou $B[x, r]$	$d$ -bola fechada de centro $x$ e raio $r$ , 27
$\wp(X)$	conjunto das partes de $X$ , 27
$\bigcap \mathcal{U}$	interseção de uma família não vazia $\mathcal{U}$ , 27
$\bigcap_{i \in \mathcal{I}} U_i$	$\bigcap \mathcal{U}$ para $\mathcal{U} := \{U_i : i \in \mathcal{I}\}$ , 27
$\mathbb{K}$	corpo topológico com um valor absoluto, em geral $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ , 28
$\ \cdot\ $	notação padrão para (semi) normas, 28
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	notação padrão para produtos internos, 28
$\Re(z)$	parte real do número complexo $z$ , 28
$\ \cdot\ _1$	norma $L_1$ ou norma da soma, 29
$C(X, Y)$	conjunto das funções contínuas de $X$ em $Y$ , 29
$\mathcal{B}_{\mathbb{K}}(X)$	espaço das funções limitadas da forma $X \rightarrow \mathbb{K}$ , 29
$\ \cdot\ _\infty$	norma do supremo ou norma do máximo, 29

$l_{\mathbb{K}}^{\infty}$ ou $l^{\infty}$	espaço das sequências limitadas em $\mathbb{K}$ , 30
$c_{\mathbb{K}}(\mathbb{N})$ ou $c$	espaço das sequências convergentes em $\mathbb{K}$ , 30
$c_{\mathbb{K},0}(\mathbb{N})$ ou $c_0$	espaço das sequências em $\mathbb{K}$ que convergem para 0, 30
$\text{Tlin}_{\mathbb{K}}(X, Y)$	espaço das transformações $\mathbb{K}$ -lineares contínuas de $X$ em $Y$ , 31
$(-\infty, p)_{\mathbb{P}}$	intervalo fundamental em $\mathbb{P}$ estritamente abaixo de $p$ , 33
$(p, +\infty)_{\mathbb{P}}$	intervalo fundamental em $\mathbb{P}$ estritamente acima de $p$ , 33
$\overline{\mathbb{R}}$	reta estendida, 33
$\mathbb{V}$	classe de todos os conjuntos, 34
$\omega$	primeiro ordinal infinito, <i>a.k.a.</i> $\mathbb{N}$ , 35
$\omega_1$	primeiro ordinal não enumerável, 36
$\text{Obj}(\mathcal{C})$	classe de objetos da categoria $\mathcal{C}$ , 39
$\text{Arr}(\mathcal{C})$	classe de morfismos da categoria $\mathcal{C}$ , 39
$\text{cod}(f)$	codomínio da seta $f$ , 39
$\mathcal{C}(x, y)$	classe dos morfismos entre $x$ e $y$ na categoria $\mathcal{C}$ , 39
$\text{SET}$	categoria dos conjuntos, 39
$\text{GROUP}$	categoria dos grupos, 39
$\text{RING}$	categoria dos anéis com unidade, 39
$\text{CRING}$	categoria dos anéis comutativos e com unidade, 39
${}_K\text{VECT}$	categoria dos $K$ -espaços vetoriais, 39
$\text{TOP}$	categoria dos espaços topológicos, 40
$\text{MET}_{\text{CONT}}$	categoria dos espaços métricos e funções contínuas, 40
$\text{MET}_{\text{DIST}}$	categoria dos espaços métricos e isometrias, 40
$\text{POSET}$	categoria das ordens parciais, 44
$X^*$	dual topológico do espaço normado $X$ , 46
$\text{Norm}_{\mathbb{K}}$	categoria dos $\mathbb{K}$ -espaços normados, 46
$\text{Ban}_{\mathbb{K}}$	categoria dos $\mathbb{K}$ -espaços de Banach, 46
$X^{**}$	espaço bidual topológico de $X$ , 46
$\text{diam}(S)$	diâmetro de $S$ , 47
$\mathcal{T}_p$	pré-filtro de $\mathcal{T}$ -abertos em torno de $p$ , 50
$(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ ou $(x_d)_d$	rede com respeito a um conjunto dirigido $\mathbb{D}$ , 51
$\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ ou $x_d \rightarrow_{\mathcal{T}} p$	a rede $\varphi := (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ $\mathcal{T}$ -converge para $p$ , 51
$\mathcal{N}_{p, \mathcal{T}}$ ou $\mathcal{N}_p$	filtro de $\mathcal{T}$ -vizinhanças do ponto $p$ , 53
$(\mathcal{G})^{\uparrow}$	“fecho para cima da família”/“filtro gerado por” $\mathcal{G}$ , 53
$(\varphi)^{\uparrow}$ ou $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}^{\uparrow}$ ou $(x_d)_d^{\uparrow}$	filtro induzido pela rede $\varphi = (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ , 54
$\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$	o filtro $\mathcal{F}$ $\mathcal{T}$ -converge para $p$ , 55

$h(\mathcal{F})$	imagem do filtro $\mathcal{F}$ pela função $h$ , 56
$\text{Net}(X)$	classe das redes em $X$ , 57
$\text{Fil}^*(X)$	conjunto dos filtros próprios em $X$ , 57
$\lim_{\mathcal{T}} \mathcal{F}$	limite(s) do filtro $\mathcal{F}$ com a topologia $\mathcal{T}$ , 60
$\lim_{\mathcal{T}} \varphi$ ou $\lim_{d \in \mathbb{D}} = x_d$	limite(s) da rede $\varphi := (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ com a topologia $\mathcal{T}$ , 60
$\text{ad}_{\mathcal{T}}(S)$	aderência (topológica) de um conjunto $S$ , 65
$\text{cl}_{\mathcal{T}}(S)$ ou $\bar{S}$	fecho (topológico) de um conjunto $S$ , 65
$\text{int}_{\mathcal{T}}(S)$ ou $\text{int}(S)$	interior (topológico) do conjunto $S$ , 67
$\mathbb{R}_S$	reta de Sorgenfrey, 73
$\mathfrak{T}(\mathcal{G})$	topologia gerada por $\mathcal{G}$ , 78
$\mathfrak{T}(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$	topologia fraca induzida por $(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$ , 80
$\text{supp}(\prod_{i \in \mathcal{I}} B_i)$	suporte do conjunto $\prod_{i \in \mathcal{I}} B_i$ , 81
$\text{Fun}_{\text{p}}(X, Y)$	$\text{Fun}(X, Y)$ com a topologia produto, 84
$\text{C}_{\text{p}}(X, Y)$	$\text{C}(X, Y)$ com a topologia produto ( <i>a.k.a.</i> topologia da convergência pontual), 84
$(f_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\text{p}} f$	a rede de funções $(f_d)_{d \in \mathbb{D}}$ converge pontualmente para $f$ , 84
$\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$	produto cartesiano da família $\{X_i : i \in \mathcal{I}\}$ , 88
$(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$	$\mathcal{I}$ -upla, 88
$(f_i)_{i \in \mathcal{I}}$	produto diagonal das funções $f_i$ , 89
$\prod_{i \in \mathcal{I}} f_i$	produto cartesiano de funções, 89
$\mathcal{C}^{\text{op}}$	categoria oposta de $\mathcal{C}$ , 91
$\text{DIR}$	categoria dos conjuntos dirigidos, 93
$\mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$	$\mathcal{B}$ é mais fino do que $\mathcal{A}$ (ou refina $\mathcal{A}$ , etc.), 95
$\mathcal{B} \succeq \mathcal{A}$	$\mathcal{A}$ é mais grosso do que $\mathcal{B}$ (ou é refinado por $\mathcal{B}$ , etc.), 95
$(\mathcal{G})^{\uparrow}$	filtro gerado por $\mathcal{G}$ , 96
$\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$	soma dos filtros $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ , 96
$\text{Fn}(X, Y)$	<i>forcing</i> de Cohen, 100
e.v.t.	espaço vetorial topológico, 122
$\text{Inv}(A)$	subgrupo dos elementos invertíveis de um anel, 126
$\text{Lin}_K(X, Y)$	espaço das transformações $K$ -lineares $X \rightarrow Y$ , 129
p.i.f.	propriedade da interseção finita, 138
$u _{\mathcal{J}}$	restrição de uma upla, função, etc., 148
$d(x, S)$	distância de $x$ ao subconjunto $S$ , 162
$S^{\text{d}}$	conjunto derivado de $S$ , 162





# Referências Bibliográficas

- [1] R. Alencar. Sobre o teorema de Arzelá. *Matemática Universitária*, pages 107–115, 1988.
- [2] L. F. Aurichi. *Topologia geral*. Number 21 in Série textuniversitários. Livraria da Física, São Paulo, 2022.
- [3] A. F. Beardon. *Limits: a new approach to Real Analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 1997.
- [4] H. Borges and E. Tengan. *Álgebra Comutativa em quatro movimentos*. Projeto Euclides. IMPA, 2014.
- [5] N. Bourbaki. *General Topology, part 1*. Addison-Wesley, London, 1966.
- [6] N. Bourbaki. *Topological Vector Spaces: Chapters 1-5*. Springer, 1987.
- [7] G. Bruns and J. Schmidt. Zur Äquivalenz von Moore-Smith-Folgen und Filtern. *Mathematische Nachrichten*, 13(3-4):169–186, 1955.
- [8] L. Bukovský. *The structure of the real line*. Monografie Matematyczne 71. Birkhäuser Basel, 1 edition, 2011.
- [9] G. Buskes and A. C. M. van Rooij. *Topological Spaces: From Distance to Neighborhood*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1997.
- [10] G. G. C. *Elementary Geometry of Algebraic Curves: An Undergraduate Introduction*. Cambridge University Press, 1998.
- [11] M. M. Clementino and W. Tholen. Tychonoff’s theorem in a category. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 124(11):3311–3317, 1996.
- [12] C. Constantinescu. *C\*-Algebras, Volume 1: Banach Spaces*. Elsevier, 2001.
- [13] R. A. dos Santos Fajardo. *A Teoria dos Conjuntos e os Fundamentos da Matemática*. EDUSP, 1 edition, 2025.
- [14] R. Engelking. *General Topology: Revised and completed edition*. Sigma series in pure mathematics. Heldermann Verlag, Berlin, 1989.
- [15] A. J. Engler and A. Prestel. *Valued Fields*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2005.
- [16] M. H. Escardó. Intersections of compactly many open sets are open, 2020. ar-Xiv:2001.06050, <https://arxiv.org/abs/2001.06050>.

- [17] R. Harte. *Spectral Mapping Theorems: A Bluffer's Guide*. Springer, 2 edition, 2023.
- [18] S. Kantorovitz and A. Viselter. *Introduction to Modern Analysis*. Oxford University Press, 2nd edition, 2022.
- [19] A. S. Kechris. *Classical descriptive set theory*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1 edition, 1995.
- [20] R. M. Mezabarba. Fundamentos de Topologia Geral, 2023. manuscrito, disponível em [https://github.com/mezabarbarbarm/Fund\\_Top\\_Geral](https://github.com/mezabarbarbarm/Fund_Top_Geral).
- [21] R. M. Mezabarba. *Teoria dos conjuntos: uma introdução maliciosa*. Number 26 in Textuniversitários. LF Editorial, São Paulo, 1 edition, 2025.
- [22] R. M. Mezabarba. Um curso fechado e limitado de Análise Real, 2025. manuscrito, disponível em <https://github.com/mezabarbarbarm/AnalysisZero/blob/main/UCFLAR.pdf>.
- [23] J. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Inc, 2nd ed edition, 2000.
- [24] L. Narici, E. Beckenstein, and G. Bachman. *Functional Analysis and Valuation Theory*, volume 5 of *Pure and Applied Mathematics*. Marcel Dekker, 1971.
- [25] E. A. Ok. *Real Analysis with Economic Applications*. Princeton University, 2007.
- [26] B. J. Pearson. Spaces defined by convergence classes of nets. *Glasnik Matemati?ki*, 23(43):135–142, 1988.
- [27] H. Perdry. An elementary proof of Krull's Intersection Theorem. *The American Mathematical Monthly*, 111(4):356–357, 2004.
- [28] G. Preuss. *Foundations of Topology: an approach to convenient topology*. Springer, 2002.
- [29] R. H. Redfield. Generalized intervals and topology. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 26(4):527–540, 1976.
- [30] E. Schechter. *Handbook of Analysis and Its Foundations*. Academic Press, 1996.
- [31] E. Scheinerman and N. de Silva. A concise, elementary proof of Arzelá's bounded convergence theorem. *The American Mathematical Monthly*, 117(10):pp. 918–920, 2010.
- [32] O. Tatton-Brown. A direct proof of Tychonoff's theorem, 2017. arXiv:1709.03941 [math.GN].
- [33] M. Ursul. *Topological Rings Satisfying Compactness Conditions*. Springer, 2002.
- [34] S. Warner. *Topological Fields*, volume 157 of *Mathematics Studies*. North-Holland, Amsterdam, 1989.
- [35] W. Więśław. *Topological Fields*, volume 119 of *Pure and Applied Mathematics*. Marcel Dekker, New York, 1988.

- [36] S. Willard. *General Topology*. Addison-Wesley, New York, 1970. Reprinted in 2004 by Dover.
- [37] W. A. Zúñiga-Galindo and B. Toni, editors. *Advances in Non-Archimedean Analysis and Applications: The  $p$ -adic Methodology in STEAM-H*. Springer, 2021.



# Índice Remissivo

- álgebra
  - de Banach, 117
  - normada, 117
  - topológica, 110
- aberto
  - básico, 75
  - de um espaço métrico, 20
  - de uma topologia, 23
  - em torno de um ponto, 50
- aderência
  - de um conjunto, 65
- anel
  - topológico, 116
- Axioma
  - da Escolha, 88
- axioma de enumerabilidade
  - primeiro, 72
  - segundo, 75
- axioma de separação
  - $T_2$ , 58
- base
  - de filtro, 53
  - de uma topologia, 75
  - local, 69
  - local de vizinhanças, 69
  - local enumerável decrescente, 73
- boa ordem, 34
- bola
  - aberta, 20
  - fechada, 27
- cadeia, 143
- categoria, 39
  - das ordens parciais, 44
  - dos  $\mathbb{K}$ -espaços de Banach, 46
  - dos  $\mathbb{K}$ -espaços normados, 46
  - dos anéis com unidade, 39
  - dos conjuntos, 39
  - dos conjuntos dirigidos, 93
  - dos espaços métricos com funções contínuas, 40
  - dos espaços métricos com isometrias, 40
  - dos espaços topológicos, 40
  - dos grupos, 39
  - dual, 91
  - flecha, 39
  - morfismo, 39
  - objeto, 39
  - oposta, 91
  - seta, 39
- cobertura, 134
  - aberta, 134
  - de um subconjunto, 134
- codomínio
  - da seta, 39
- combinação
  - convexa, 131
- compacidade
  - enumerável, 157
  - sequencial, 156
- condição
  - de Lipschitz, 114
- conjunto
  - bem ordenado, 34
  - das partes, 27
  - derivado, 162
  - dirigido, 50
  - totalmente ordenado, 45
- convergência
  - induzida por uma topologia, 23
- corpo
  - topológico, 121
- desigualdade
  - de Cauchy-Schwarz, 28
  - triangular, 14
- diâmetro, 47
- domínio
  - da seta, 39
- elemento
  - limite, 35
  - maximal, 143
  - sucessor, 35
- espaço
  - 1<sup>o</sup>-contável, 72
  - 2<sup>o</sup>-contável, 75
  - bidual topológico, 46
  - com produto interno, 28
  - compacto (via coberturas abertas), 135
  - compacto (via fechados), 135
  - de Banach, 30
  - de Hausdorff (ou  $T_2$ ), 58
  - de Hilbert, 30

- discreto, 27
- dual topológico, 46
- enumeravelmente compacto, 157
- homogêneo, 112
- limite-compacto, 157
- métrico, 13
- métrico completo, 30
- magro, 167
- metrizável, 24, 73
- não magro, 167
- normado, 28
- separável, 69
- sequencialmente compacto, 156
- subespaço topológico, 62
- totalmente limitado (def. métrica), 157
- ultramétrico, 121
- vetorial topológico, 122
- fechado, 65
  - num espaço métrico, 17
- fecho
  - de um conjunto, 65
  - de um subconjunto num espaço métrico, 17
- filtro, 53
  - convergente, 55
  - de vizinhanças de um ponto (top. def.), 53
  - gerado, 53, 96
  - imagem por uma função, 56
  - maximal, 143
  - núcleo do, 97
  - numa ordem, 100
  - pré-filtro, 53
  - próprio, 53
- forcing
  - de Cohen, 100
- função
  - avaliação, 84
  - característica, 16
  - cofinal, 144
  - contínua (e linear, caso normado), 31
  - contínua (versão métrica), 14
  - contínua (versão topológica), 24
  - contínua num ponto (versão métrica), 14
  - contínua num ponto (versão topológica), 24
  - escolha, 88
  - estritamente decrescente, 38
  - fechada, 139
  - homeomorfismo, 40
  - isometria, 40
  - produto diagonal, 89
  - sequencialmente contínua, 25
  - sequencialmente contínua num ponto, 25
  - translação, 112
  - uniformemente contínua (entre grupos topológicos), 114
- funtor, 41
  - contravariante, 41
  - covariante, 41
- $G_\delta$ , 46
- grupo
  - topológico, 110
- homeomorfismo, 40
- homotetia, 122
- ideal
  - de subconjuntos, 102
  - próprio, 102
- interior
  - de um conjunto, 67
- intervalo, 33
  - aberto (numa ordem), 33
  - fundamental, 33
- isometria, 40
- isomorfismo
  - de ordens, 44
  - numa categoria, 40
  - topológico, 110
- katzensprung, 116
- Lema
  - da Colagem, 106
  - da colagem, 164
  - da sub-base de Alexander, 151
  - de Rasiowa-Sikorski, 100
  - de Riesz, 162
  - de Zorn, 143
  - do Tubo, 141
  - do ultrafiltro, 142
- limite
  - (topológico) de um filtro, 55
  - (topológico) de uma rede, 51
  - de uma sequência real, 13
  - pontual de uma sequência de funções, 16
  - topológico de uma sequência, 23
  - uniforme de uma sequência de funções, 14
- métrica
  - compatível com grupo, 125
  - discreta, 22
  - do máximo, 22
  - euclidiana, 22
  - num conjunto, 13
  - zero-um, 22
- Minkowski
  - seminorma de, 130
- morfismo, 39
  - contínuo, 110
- número
  - ordinal, 35
- norma, 28
  - de operadores, 31
  - do supremo, 29
  - euclidiana, 29
  - $L_1$ , 29

- objeto, 39
  - final, 90
  - inicial, 90
  - universal, 90
- ordem, 32
  - boa, 34
  - dirigida, 50
  - estrita, 32
  - parcial, 32
  - pré-, 40
  - separável, 101
  - total, 38, 45
- parte
  - real (de um número complexo), 28
- polinômio
  - homogêneo, 119
- ponto
  - aderente a uma rede (def. top.), 145
  - aderente a um conjunto (def. top.), 64
  - aderente a um filtro (def. top.), 143
  - de acumulação, 157
  - interior, 67
  - isolado, 77
- pré-filtro, 53
- pré-ordem, 40
- Princípio
  - da Dualidade, 91
- produto
  - cartesiano, 88
  - interno, 28
  - interno canônico, 29
- propriedade
  - da interseção finita, 95, 138
  - do ponto fixo, 112
- propriedade universal
  - da topologia produto, 82
  - do produto de conjuntos, 89
- rabo, 54
- radical
  - de Jacobson, 119
- rede, 51
  - convergente, 51
  - de Cauchy (num grupo top.), 115
  - rabo da, 54
  - ultrarrede, 145
- refinamento, 95
- relação
  - binária, 13
  - de refinamento entre conjuntos, 95
- reta
  - de Sorgenfrey, 73
  - estendida, 33
- série, 113
  - absolutamente convergente, 117
- seminorma, 130
  - de Minkowski, 130
- sequência, 14
  - convergente na reta, 13
  - convergente num espaço métrico, 14
  - convergente num espaço topológico, 23
  - de Cauchy, 19
  - de funções pontualmente convergente, 16
  - de funções uniformemente convergente, 14
- sistema
  - de bases locais, 72
- sub-base
  - de topologia, 79
- sub-rede, 144
  - W, 144
- subcobertura, 134
- subconjunto
  - aberto (num espaço métrico), 20
  - aberto (num espaço topológico), 23
  - balanceado, 123
  - cofinal, 95
  - cofinito, 94
  - convexo, 128
  - denso, 69
  - diâmetro do, 47
  - disco, 129
  - expansível, 129
  - fechado, 65
  - fechado (num espaço métrico), 17
  - $G_\delta$ , 46
  - limitado, 163
  - magro, 167
  - não magro, 167
  - rarefeito, 167
  - vizinhança, 53
- subespaço
  - topológico, 62
- subsequência, 144
- suporte
  - de um produto, 81
- Teorema
  - da Base de Hilbert, 131
  - da interseção de Krull, 119
  - da Série de Neumann, 117
  - da seminorma de Minkowski, 130
  - de Baire (para a reta real), 19
  - de Baire (para métricos completos), 186
  - de Bolzano-Weierstrass, 156
  - de Dini, 164
  - de Heine-Borel, 160
  - de Mrówka, 139
  - de Tychonoff, 147
  - de Weierstrass, 138
  - dos intervalos encaixantes (versão métrica), 47
  - dos limites iterados, 107
- Teste
  - da Divergência, 113
- topologia, 23



coenumerável, 59  
cofinita, 27  
compatível, 110  
da convergência pontual, 84  
da ordem, 34  
de Sorgenfrey, 73  
de um espaço métrico, 20  
discreta, 27  
fraca (ou inicial), 80  
gerada, 78  
gerada (como base), 78  
gerada (por sistema bases locais), 72  
I-ádica, 119

mais fina do que outra, 61  
mais forte do que outra, 61  
mais fraca do que outra, 61  
mais grossa do que outra, 61  
produto, 81  
sub-base de uma, 79

ultrafiltro, 97, 143  
ultrarrede, 145  
upla, 88

valor  
absoluto, 121  
vizinhança, 53